


[illegible]



19
11
E
135



DE MORBIS
VENEREIS
LIBRI SEX.

DE MORBIS
VENEREIS
LIBRI SEX.
AUCTORE
JOANNE ASTRUC

In Regio Franciæ Collegio Professore Medico, &c.

IN QUIBUS DISSERITUR TUM DE ORIGINE.
Propagatione & Contagione horumce affectuum in genere: tum de
singulorum Natura, Etiologia & Therapeia, cum brevi Analysis &
Epicrisi Operum plerorumque quæ de eodem argumento scripta sunt.

EDITIO PRIMA VENETA

Post tertiam Lugdunensem

AUCTA, ET EMENDATA.



VENETIIS,
Apud Jo: MARIAM LAZZARONI

M. DCC. XLI.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

THE FIFTH
BOOK



PRÆFATIO.



ONSTARE passim video plerisque in Libris, qui de Morbis venereis scripti exstant, vitia occurrere non pauca; (venia sit dicto, a quo omnis invidia abest longissime, sed quæ nec eadem, nec ejusdem generis sint in singulis. In Antiquioribus, quo nomine eos intelligo, qui ante annum 1600. editi sunt, desiderari videntur diligentior symptomatum venereorum tractatio, sanioris Physicæ ac Medicinæ notitia, uberior causarum expositio, & quod est multo majoris momenti, certior morbi diagnosis prognosisque, & efficacior therapeia, in qua Guaiaco, Chinæ, Sarsæ-parillæ cæterisque id genus hidroticis remediis minus deferatur, plus efficaciz attribuat^{ur} Mercurio, sua asseratur hydrargyrosi excellentia, ac demum recta adhibendi Mercurii methodus enucleate proponatur. Sed hæc omnia non tam Auctorum, quam ipsorum ætatis vitia fuisse videntur, eo quidem ignoscenda facilius, quod tunc temporis nondum satis perspecta erat morbi medicina, quod crimini dabatur Veterum exempla deferere, quod horror Mercurii ceu venenati pharmaci in omnium animis alte insidebat, quod Guaiaci effectus magnificis præconiis certatim efferebantur quasi totidem miracula..

Peccatum est aliter sed gravius in recentioribus Scriptis, quæ nostro & superiore seculo publici juris facta sunt. In illis frustra requiras Librum unum aut alterum justæ amplitudinis, quo morborum omnium tractatio pro argumenti gravitate exponatur. Multæ quidem occurrunt Dissertatiunculæ, de uno tantum aut altero morbo venereo, sed leves, jejuna, tumultuariæ, in quibus vix summa rerum capita obiter perstringuntur. In plerisque opinionum commenta reperire est ante inaudita, *Hyporbeses* dicunt, quibus palam est superiore seculo post excussum Antiquorum jugum plus æquo capta & delinita fuisse Medicorum ingenia, cum auctoritati parerent minus, necdum rationi & experientiæ nossent parere satis. Demum e tot Scriptoribus ne quidem unus therapeiam mercurialem accurate describere, variosque scopulos per quos medios regendam est, diligenter detegere curavit; sed suum singuli arcanum remedium magnifice venditant, quod tanquam certum, indubium, efficacissimum ita enixe collaudant, ut ipsi occultam in laudibus fraudem aperiant, ac planissime designent (a) *se sui questus causa falsas suscitasse sententias*, nec alio fine suas Diatribas scriptitasse, nisi ut arcano suo lucriferam celebritatem compararet.

(a) En-
nius, in
fragment.

(b) Phe-
drus, Lib.
1. Fab.
14.

Utantur tam præposteris artibus Agyrtæ & Circulatores, (b) *quorum stultitia questus impudentia est*. Sed ab iisdem sedulo sese abstineant velim, quicumque gloriæ cupidi famæ consulant, quicumque veritatis cultores & fraudis inimici concivium incolumitati student ex animo. Quapropter ægre fero a Chirurgis non paucis, a Medicis nonnullis exteris, a Medicorum nostratium uno aut altero, arcana proponi remedia, quorum præparationem de industria celant, ut inefficaciam non prodant, sed quibus amant credulos vulgi animos ludificare, non sine lucri turpiter questu infamia.

Abunde indicant, quæ hætenus præfatus sum, quanto jure a Medicis artis suæ studiosis desideretur Opus novum, de eodem argumento diligentius, fusius, meliore fide conscriptum:

ptum: At vero indicant eadem simul quanta sit Operis illius magnitudo atque difficultas, & quot adsint quantaque a quibus Scriptori cavendum sit, si curaverit peritorum votis facere satis.

Profuit mihi hæc omnia prius *percepisse atque animo mecum ante peregrisse*, quam ad scribendum animum appuli. Inde enim probe intellexi partes meas esse, ut quæcumque ad morbi originem, ingressum, propagationem; quæcumque ad contagionem, contagionis genera, variosque modos quibus susceptum virus modo silet, modo sævit furore vario in singulos; quæcumque ad morborum venereorum rum localium tum universalium causas, symptomata, signa, therapeutiam pertinent, ita diligenter expedirem, enuclearem, definirem, ut (a) *vetustis novitatem, novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastidiis gratiam, dubiis fidem, omnibus vero naturam, & naturæ suæ omnia darem*, uno verbo, quod a Plinio Domitio Pisoni dictum tribuit, ut *Thesaurum facerem potius quam librum*.

(a) Plinius, in *Prefat. Hist. Natural.*

Haud equidem confido quæ destinaveram a me præstita fuisse, quæ sane nec ea destinaveram fiducia, ut a me præstanda sperarem; *mecum enim habito*, neque nescius sum quid ferre recusent, quid valeant humeri. Sed animum facile induxi licere mihi laboriosam, difficilem & perobscuram disputationem meditati magna & egregia spe concipere, quæ mentem excitarent, erigerent, acuerent, viresque Operi pares possent sufficere, tanto quidem magis quod rationem illam consuetudinemque noram laudi plerumque, vitio nunquam datam esse, cum (b) *etiam non affectus voluisse abunde pulchrum atque magnificum sit*.

(b) Plinius, *ubi supra.*

Hac ergo mente non dubitavi ad uberrimam propositi argumenti materiam aggredi, totamque quantacumque est, sex Libris tractandam comprehendere, in quos Opus ordinis gratia partiri visum est.

I. Agitur in *Primo* de morbi nascentis, adulti, senescen-

tis

tis historiam, probaturque illius originem ad Insulas Antillas referendam esse, unde in orbem nostrum malis avibus devesus sit: De America proinde merito dici posse ob gravissimam pestem, quæ in Europam inde dimanavit, quod a Romanis olim de Asia dicebatur ob vitia quæ in Rempublicam illinc confluerant, nimirum (a) *devictam victores suos corrupisse*: Demum id teterrimum mali genus hætenus diversas vices five periodos expertum esse, quæ varia symptomatum accessione vel decessione insignes fuerint; ac nunc tandem videri paulatim mitescere, & nisi vana fides, in senium tendere in dies, sed tamen adhuc *pede claudo*.

Locus hic erat de multis sciscitandi, quæ in quæstionem venire non ignoro. Scilicet annon Lepra, quæ a Mose describitur *Levitic. Cap. 14.* eadem fuerit cum hodierna lue venerea? Annon de lue venerea eadem intelligi debeat (b) *ulcus illud pessimum a planta pedis usque ad verticem ejus*, quo Jobus a Satana percussus fuit permissa Dei? Annon David ipse lue eadem laboraverit, cujus videtur symptomata graphice depinxisse in nonnullis Psalmis? Tandem annon ad luem veneream alludat Auctor Ecclesiastici *Cap. 19. vers. 2. & 3.* cum ait *qui se jungit fornicariis fore nequam, putredinem & vermes illum hæredituros esse*? Sed cum diligentius studeo dissolvendis aut explicandis nodis aliis gravioribus, & qui ad quæstionem magis pertinerent, factum est nescio quo fato ut hæc interciderint.

Omissionis tamen culpam si forte culpa est, elevat manifesta objectorum argumentorum vanitas, quæ confutare tanti non erat. Nam 1. Unus est (c) Doctorum omnium sensus Lepram Judaicam, quam a Mose descriptam legimus in Levitico, fuisse illam ipsam Arabum Lepram, de qua tam multa in Opere nostro diximus. Quocirca cum abunde probatum fuerit Lepram illam Arabum a Lue venerea omnino diversam fuisse natura, causa, contagionis modo, sympto-

(c) Vide Thomam Bartholinum, *De morbis Biblicis, cap. 8.*

ptomatis, curatoria methodo &c. consequens est una eademque opera quæstionem illam de Lepra Judæorum, quæ omnium potissima est, ac veluti cæterarum caput, planissime resolutam fuisse.

2. Fatendum est quidem *ulcus*, quo Jobus *percussus* dicitur, pro lue venerea habitum fuisse a Francisco (a) Vatablo, quem (b) Cyprianus Cisterciensis sequutus est: Videri eidem opinioni suffragatos esse & Joannem (b) de Pineda e Societate Jesu, & Jacobum (d) Bolducium e religiosa Capucinorum familia, & Donnum (e) Calmet Benedictinum e Congregatione SS. Vitoni & Hidulsi: Non defuisse etiam teste (f) Ulrico Hutteno, qui luis *originem a Jobi scabie olim repeterent*: Quin imo solenne fuisse (g) Jobi præsidium a syphiliticis olim implorari, quasi specialis Patroni, qui nec ipse mali ejusdem ignarus fuisset. Sed mirum hucusque proventam esse credulitatem Antiquorum, nec facile video quo nomine potuerit ea opinio tantum invalescere apud cordatos viros. Nam præterquam quod luce meridiana clarius est luem veneream exeunte tantum seculo XV. in orbem nostrum irrupisse nulla certe intercedit affinitas inter morbum Jobi, qualis describitur *Capp. 6. 16. 19. & præsertim 20.* luemque veneream, qua possit opinio illa niti. Quamobrem multo satius est de natura Ulceris, quo Jobus multatus est, silere

Et Joannem Clericum, in *speciali Diatriba de Lepra Judæorum*, quæ exstat ad calcem *Tom. III. in Biblia*.

(a) In Adnotationibus in *Jobi Lib. Cap. 2. vers. 7.* margini Biblior. appositis.

(b) *Comment. in Jobi Lib. Cap. 2.*

(c) *Comment. in Job. Cap. 2. vers. 7. & 8.*

(d) *Comment. in Lib. Jobi, cap. xxx. vers. 30. Tom. 1.*

(e) *Dissertation sur la Maladie de Job.*

(f) De morbi Gallici curatione per administrationem ligni Guajaci, *Cap. 1.*

(g) Vid. infra *Lib. V. ad annum 1520.* ubi de Joanne le Maire, Belgæ. Molanus in *Diario Medicor. Ecclesiastico* ad diem 10. Maii, quæ Joboscra est.

Baillet, *Vies des Saints de l'ancien Testament*, 10. Mai.

lere cum Joanne (a) Mercero, vel cum (b) Origene, S. Joanne (c) Chrysoſtomo, (c) Polychronio & (c) Apolinario, Ulcus illud ad Elephantiaſim referre, quæ in Arabia ad Euphratem, ubi degebat (d) Jobus, frequens erat, quam commenta iſtiusmodi temere effutire nullo auctore & auctoritate plane nulla.

3. Neque potiori jure licet colligere (e) Davidem lue eadem venerea infectum fuiſſe, quod *Pſalm. VI. verſ. 2. & 3. Pſalm. XXXII. verſ. 3. & præſertim Pſal. XXXVIII. verſ. 4. 6. & 8.* referat *ſe infirmum eſſe conturbata eſſe oſſa ſua, putruiſſe & corruptas eſſe ſuas cicatrices, lumbos ſuos impletos eſſe illuſionibus, & non eſſe ſanitatē in carne ſua.* Inde quidem liquet Davidem, dum ea ſcriberet, gravi morbo tentatum fuiſſe, at non ideo ſequitur ut morbus ille lues venerea fuerit: Quod ſane etiamſi certo conſtaret luem veneream Davidis ævo graſſatam fuiſſe, ut hodierno tempore, temere & inconſulte diceretur, cum ſymptomata quæ a Davide referuntur, notis ſuis ſymptomatis ſatis vicina non ſint, ut ſuſpicioni locum facere poſſint. Quod inſuper contra apertam rei veritatem crederetur, etiamſi ſymptomata a Davide recensita a ſymptomatis ſuis venereæ minus abhorrerent, cum certiffimis rationum momentis comprobetur luem veneream priſcis ſeculis in orbe noſtro omnino ignoratam fuiſſe.

4. Denique hallucinantur quoque & oſcitanter quidem, quicumque luem veneream locis ex Eccleſiaſtico ſupra adductis argui contendunt, cum nihil appareat maniſeſtius quam hic agi de ignominia, probro, paupertate, ægitudine, cæterisque malis, quæ fornicarios & ſcortatores meretriciis amoribus turpiter deditos manere ſolent. Similis exiſtat in Proverbiis locus. *Cap. 5. verſ. 8. & ſeq.* ubi Sapientia alumnum

mo-

(a) Comment. in Job. Cap. 2. verſ. 7.

(b) Contra Celſum, Lib. VI. pag. 503.

(c) In Catena Græcorum Patrum in B. Jobum, collectore Niceta.

(d) Friderici Spanhemii, Hiſtoria Jobi, Cap. 3.

(e) Gui Patin, Lettre 368.

monens. *Longe fac, inquit, fili mi, a Meretrice viam tuam, & ne appropinques foribus domus ejus, ne des honorem tuum alienis & annos tuos crudeli, ne forte impleantur extranei viribus tuis, & labores tui sint in domo aliena, & gemas in novissimis quando consumpseris carnes tuas & corpus tuum. Neque rara sunt apud Auctores etiam * profanos monitoria consilia de re eadem. Sed de his *ἐκ παρρησίας*. Nunc redeundum est in viam.*

II. Explicantur in *Secundo* Libro veneni venerei natura, indoles, propagatio, & efficacia; ac deinde historice quaeritur quo tempore & quo auctore remedia singula quæ in Luem faciunt, ut Hydrargyros, Guaiacum, radix Chinæ, Sarsæ-parillæ, lignum Sassafras, & præparata Mercurialia in usum inducta fuerint, & quanta animorum contentione de singulorum præstantia diu decertatum sit, donec tandem victoria hydrargyrosi cesserit.

III. Sic expeditis semel nodis omnibus historicis, discussisque physiologicis & pathologicis tricis, quasi gradus quidam atque aditus jactus esse videtur ad rem ipsam, cujus Medicorum est potissimum satagere, nempe ad tractationem morborum venereorum omnium, tum localium, quæ sunt velut prolationes invadentis luis, & de quibus Libro *Tertio*; tum universalium, quæ sunt confirmatæ luis indicia, & de quibus Libro *Quarto* fuscè disseritur. Quocirca expositis in utroque singulorum effectuum natura, causa, symptomatis, signisque tum diagnosticis tum prognosticis, speciales afferuntur curationis methodi, quæ singulis morborum generibus ac diversis singulorum gradibus adhibenda sunt.

Id autem egi omni meo studio, ut hæc universa ordine digesta breviter ac dilucide explicarentur. Sed de his iudicium æquis Lectoribus facile permitto. At certe, quam laudem

* Sic apud plautum in *Truculento*, *Act. II. Scen. 7.*

Meretrix meum verum miserum sua blanditia impulit in Pauperiem; privavit bonis, luce, honore atque amicis.

dem propriam peto, quam præcipuam ambio, cuncta proposui fide qua potui optima, suppressi nihil quod utile, nihil omisi quod necessarium esse videretur; remedia protuli omnia, quæcumque certa, egregia, usu maxime comprobata novi; de dubiis, incertis, infidis, si qua forte attulerim, caute monui; ut nihil omnino reticui dolo malo, sic nihil jactantius prædicavi vaniloquentia. Sed omnia tractavi ubique ingenuus, ubique de ægrotantium (ut Medicum & concivem decet) incolumitate vere sollicitus. Quamobrem spes est Librum huncce nostrum, si minus diligenter elucubratus, atque adeo laude parum dignus esse videatur, tamen quia benevolenti animo conscriptus, nobis apponendum esse gratiæ.

Remediorum formulas protuli, quotcumque usu vulgo receptæ sunt, & in multos ex æquo quadrare possunt. Cæteras, quas pro morbi natura & gradu, aut pro ægrotantium viribus & ætate variare necessum est, prudens omisi, ne junioribus Medicis essent offendiculo, a quibus in obviis quibuscumque ægris, nullo discrimine plerumque adhiberentur. Sed præcipua & præsentissima remedia diligenter recensui, quæ ad singula morborum genera valent, ab infirmioribus ad vehementiora progrediendo apposita singulorum dosi; unde nihil negotii futurum est formulas, si usus fuerit, ex re, & ex tempore conficere: At monitos velim juniores Medicos, ut *mixturæ & compositiones ex paucis* semper consentur (a) *remediis ex causa non ex conjectura assumptis*. Indigesta enim & promiscua remediorum farrago, qua nonnulli formulas (b) *inexplicabiles* offerciunt, non modo, ut Plinius (c) ait, *ostentatio artis & portentosa scientiæ venditatio est*; quin etiam, ut idem alibi dicit, (d) *impudentia*, (e) *fraus*, (f) *perfidia est*, quæ ægrotantibus fere numquam non nocet, cum semper nimia & inutilia, sæpiissime proposito scopo contraria remedia ea ratione inculcentur & oggerantur.

(a) Plin. Hist. natur. Lib. 22. c. 24.
(b) Ibid. Lib. 29. cap. 1.
(c) Ibid. Lib. 24. cap. 1.
(d) Ibid. Lib. 22. cap. 24.

(e) Ibid. Lib. 24. cap. 1.

(f) Ibid. Lib. 29. cap. 1.

V. & VI. Videbatur manus extrema Operi jam imposita, cum optimum fore judicavi, & Chronologicam Auctorum omnium, qui de eodem argumento scripsere, Bibliothecam subjungi, ut uno quasi intuitu cognoscere liceret, quid de luis venereæ origine, natura, remediis varii varie senserint diversis temporibus; quid in promovenda illius curatione a singulis præstitum sit; uno verbo ex quibus ambagibus & quorum potissimum studio morborum illorum therapeia, qualis nunc usu viget, ad eum perfectionis apicem pervenerit, quo nunc stare videtur?

Eo itaque consilio Auctores istiusmodi, quotquot nancisci datum est, diligenter evolvi, legi, perlegi; quæcumque nova, singularia, rara, notatione digna visa sunt, sedulo e singulis excerpti; cuncta membratim digessi, suis quæque temporibus reddidi, ac in duos alios Libros distribui, *quintum sextumque*, quorum alter quidem de Auctoribus omnibus agit, qui ab ingressu morbi ad annum usque 1600. alter vero de cæteris, qui abhinc ad hanc usque diem speciales de morbis venereis Libros edidere. Hinc panditur series & ordo curarum, quæ Medicos anxios habuere sollicitosque; hinc intelligitur quanta consternatione sub ingressum luis obstupuerint, rei novitate mire perculsi; quam diffidenter & infelicius attentaverint initio morbi curationem; quanta trepidatione exploraverint usum remediorum; per quotuplices *mortes egerint experimenta*; quo progressu tandem, quibusve periculis cognitionem ceperint sequentium Theorematum, Dogmatumve, quæ improvisa & inexpectata experientibus adfuerunt, quæ diu multis dubia visa sunt quia nova, quæ dudum apud omnes in confessum venerunt quia compertissima.

1. *Lucem veneream morbi speciem esse, quæ nec errore dicta, nec ullo rerum non-naturalium vitio possit unquam sponte generari in orbe nostro, sed ibi vigeat fomite quodam alienigena sed perenni, seu potius semper redivivo; quod ante notam lucem veneream de nullo alio morbi genere unquam affirm-*

ma-

matum, imo nec excogitatum prius fuerat; quod de lue ipsa venerea nondum certo liquebat anno ab ingressu morbi sexagesimo; quod jam pridem compertum est certissima experientia; quod tandem nunc opinantur nonnulli & cum Lepra Arabum quandiu in Europa grassata est, olim commune fuisse, & etiamnum commune esse cum Peste Asiatica, quæ Europam identidem depopulatur.

2. *Seminium illud morbificum sive morbi seminem, quem virus venereum dicunt; licet in orbe nostro nulla unquam ratione generari possit, attamen si quocumque modo, minimis etiam & inconspicuis guttulis in sanguinem transfundatur, ibidem facile plerumque augeri, multiplicari, invalescere; quod de veneno venereo exploratissimum est; quod videtur & de seminio Elephantiaco sive Leproso verum olim fuisse; quod de contagio quoque pestifero haud inepte conjicitur, quamvis non desint qui non assentiantur.*

3. *Contra vero virus idem clam aliquando latere ad multos annos in ipso sanguine sine noxa, quæ manifesta sit, atque adeo sine ullo sui indicio: Verumtamen integrum & illibatam ibidem permanere, ita ut ex occasione facile possit confestim erumpere & ea quidem plerumque vehementia, quæ datas inducias fœnerari videatur; quod sane de hydrophobico contagio Antiquiores jam subodorati fuerant, sed quod de veneno venereo certius compertum est exemplis frequentissimis.*

4. *Usum Mercurii & præparatorum mercurialium ad extirpandum luis venereæ seminium unice valere, & modo cause adhibeatur, semper tutum, innocuum & efficacem esse: quem tamen cuiquam adhibere nefas olim fuisset ante natam luem veneream; contra quem primo seculo ab ingressu luis Medicos nonnullos non puduit temere niti ex vana erga Antiquos credulitate, a quibus Mercurius veneni falso damnatus fuerat; quem demum experientia rerum magistra monstravit præsentissimum esse morbi remedium.*

5. *Illito mercuriali unguento, aut exhibitis præparatis mercuria-*

curialibus pyralismum perinde moveri, quod novum purgationis genus ab antiquioribus Medicis plene ignorabatur; quod nunc certissima est luis venereæ medicina; quod & ad alios morbos non paucos egregie facere compertum fuit.

6. Tandem hæc omnia ut plurimum præstari solo supra cunctum illius unguenti mercurialis, unde patet summa utilitas & efficacia Jarraliptices, Medicationis genere novæ, quam mirari subit ad alias remediorum species præter Mercurium; & ad alia morborum genera præter veneream luem nondum traductam fuisse.

Liquet ergo lue venerea in orbem nostrum irrepente humanum quidem genus *magno atque solido multatum* fuisse *infortunio*, at simul artem Medicam novis Theorematis auctum, novisque remediis amplificatam fuisse; quasi vero nostris tantum periculis discere datum esset. Sic ut exemplis rem illustrem, nunquam magis promovetur militaris scientia quam bellis internecinis, quæ sunt communis populorum perniciës. Sic nunquam reperiuntur felicius, aut diligentius adhibentur novæ munitionum formæ, quæ sint ad defensionem urbium opportuniore, nisi cum ulus invexit arma nova & ad oppugnandum efficaciora.

Cæterum ne Tirones Auctorum nomine vel fama delusi commentis fidem adjungerent, lubuit de plerorumque Operum pretio, ac opinionum quæ in iisdem referuntur valore judicium interponere, non æquum modo, sed modestum ut me decebat, imo etiam verecundum, nisi forte de Circulatoribus & Agyrtis quæstio inciderit, quorum impudentiam & imperitiam retegere, ac fraudes proferri tum Reipublicæ, tum rei Medicæ perinde interesse censeo.

Restabat quoque sermone Librum conscriberem an latino, an patrio? Placebat aliis quidem isto, ut a Chirurgis nostratibus intelligeretur, quorum plerique latine nesciunt: Aliis vero illo scribi, ut & exteris quoque prodesse posset, quibuscumque latini sermonis communio est. Sed vicit latini ser-

mo-

monis virtus, ac dubitationem omnem sustulit honestatis ratio, quippe puduit de morbis, de partibus, de rebus obscenis Gallice dicere. Apud Latinos, ut de Græcis referebat

(a) olim Celsus, horum omnium vocabula & accepta jam usu sunt, cum in omni fere Medicorum volumine atque sermone ja-
tentur. Apud nos vero sœdiora verba ne consuetudine quidem aliqua verecundius loquentium commendata sunt, ut difficilis hæc explanatio futura fuisset, simul & pudorem & artis præcepta servansibus.





INDEX CAPITUM.

L IBER I. De Origine, Propagatione, & Periodis Morborum Venereorum.	
CAPUT I. <i>Luem ventream nec Græcis, nec Romanis olim notam fuisse.</i>	pag. 1.
CAPUT II. <i>Explicantur aliquot Veterum loca, quæ detorqueri solent, ut de lue venerea intelligantur.</i>	
CAPUT III. <i>Diluuntur argumenta cætera, quæ pro stabilienda luis venereæ antiquitate proferuntur.</i>	11
CAPUT IV. <i>Luem veneream ab anno 1494. ad annum 1496. Europæ primùm immotuisse.</i>	17
CAPUT V. <i>Expenduntur loca aliquot Medicorum-Chirurgorumve anno 1494. antiquiorum, quæ allatæ epochæ videntur contradicere.</i>	22
CAPUT VI. <i>Explicantur testimonia a Gulielmo Becketto pro luis venereæ antiquitate nuper producenda.</i>	28
CAPUT VII. <i>Confutantur argumenta reliqua, quibus nonnulli antiquitati luis venereæ patrocinari conantur.</i>	37
CAPUT VIII. <i>Fabulæ de origine luis venereæ referuntur & refelluntur.</i>	46
CAPUT IX. <i>Luem veneream in Insulis Antillis a Christophoro Columbo detectis, ac præsertim in Insula Hispaniola, quæ nunc Insula Sancti Dominici appellatur, endemiam antiquitus fuisse, & inde in Europam transmissam esse.</i>	54
CAPUT X. <i>Luem veneream, quæ ex Hispaniola oriunda est, ab Hispanis ad Neapolitanos, ab utrisque ad Gallos, demum ab his tribus ad cæteros Europæ, imo plerisque Asia & Africae populos quæst ex traduce propagatam fuisse. Reperiri tamen sub Zona Torrida regiones alias, quibus lues eadem vernacula & endemia fuisse videatur.</i>	59
CAPUT XI. <i>Conjectura de causis cur in Hispaniola, cæterisque Insulis Antillis lues venerea olim familiaris & endemia fuerit.</i>	67
CAPUT XII. <i>De periodis, quas lues venerea in Europa in hunc diem habuit.</i>	74
CAPUT XIII. <i>De periodis, quas præagire licet luem veneream in posterum habituram esse.</i>	80
CAPUT IV. <i>De Legibus olim sancitis in eos, qui lue ventræ laborabant.</i>	85
LIBER II. De Contagione, Natura & Therapeia Morborum Venereorum.	
CAPUT I. <i>Qua ratione lues venerea contrahatur.</i>	95
CAPUT II. <i>Quid sit virus venereum & quale sit?</i>	101
CAPUT III. <i>Quibus viis virus venereum introducat & qua norma æstimanda sit suscepti quantitas?</i>	106

CAPUT IV. <i>Qua causa virus venereum intro admissum multiplicetur, & quanam sit multiplicationis ratio?</i>	111
CAPUT V. <i>Quo pacto virus venereum tam diu aliquando lateat in sanguine sine noxa?</i>	114
CAPUT VI. <i>De diversis methodis therapeuticis, quæ in curanda lue venerea a primo morbi ingressu in hanc usque diem adhibita sunt.</i>	117
CAPUT VII. <i>De diverso Mercurii & Mercurialium usu ad luis venereæ curationem ab ipso morbi ingressu ad hæc usque tempora.</i>	124
CAPUT VIII. <i>Qualis sit Mercurii & Mercurialium vis & efficacia, & quæ illius efficacis causa?</i>	148
CAPUT XI. <i>De eligenda facillima, tutissima, efficacissima medendi Methodo.</i>	158
LIBER III. <i>De Aetologia, Diagnosi, Prognosi & Therapeia Morborum Venereorum localium, sive de Lue venerea incipiente.</i>	
CAPUT I. <i>De Gonorrhœa virulenta.</i>	172
§. I. <i>Descriptio.</i>	ibid.
§. II. <i>Sedes, Differentiæ, Causæ.</i>	172
§. III. <i>Symptomata.</i>	180
§. IV. <i>Diagnosî & Prognosis.</i>	184
§. V. <i>Curatio.</i>	191
CAPUT II. <i>De Empiricis gonorrhœæ curandæ Methodis, ac de commentitiis ejusdem prophylaxi.</i>	198
§. I. <i>De Empiricis Gonorrhœæ curandæ Methodis.</i>	ibid.
§. II. <i>De Commentitiis Gonorrhœæ Prophylaxi.</i>	207
CAPUT III. <i>De duabus aliis gonorrhœæ speciebus, quæ rarius occurrunt.</i>	211
§. I. <i>De gonorrhœa virulenta sicca, sive Dysuria venerea sicca.</i>	ibid.
§. II. <i>De gonorrhœa spuria, sive de venereo stillicidio è balano.</i>	216
CAPUT IV. <i>De morbis, qui gonorrhœæ virulentæ solent succedere.</i>	219
§. I. <i>De Tumore Testium venereo, sive Hernia venerea.</i>	ibid.
§. II. <i>De venereo Perinæi abscessu.</i>	224
§. III. <i>De feminis stillicidio, sive de gonorrhœa, quam habitualement dicunt.</i>	229
§. IV. <i>De stranguria contumaci frequentioris gonorrhœæ pedisequa.</i>	232
CAPUT V. <i>De Bubonibus venereis, vulgo Poulains.</i>	248
§. I. <i>Definitio, Descriptio & Differentiæ.</i>	ibid.
§. II. <i>Causæ.</i>	249
§. III. <i>Symptomata.</i>	251
§. IV. <i>Diagnosî & Prognosis.</i>	253
§. V. <i>Curatio.</i>	255
CAPUT VI. <i>De Morbis qui Buboni male curato superveniunt.</i>	262
§. I. <i>De Bubone fistuloso.</i>	ibid.
§. II. <i>De Bubone Skirrhotico.</i>	266
§. III. <i>De Bubone Carcinomatode.</i>	269
CAPUT VII. <i>De Ulcusculis cancrofis sive carie pudendorum, vulgo Chancres.</i>	275
§. I. <i>Descriptio & differentiæ</i>	ibid.
§. II. <i>Causæ.</i>	277

§. III. Symptomata.	280
§. IV. Diagnofis & Prognofis.	283
§. V. Curatio.	285
CAPUT VIII. De Affectibus variis, qui ab Ulcusculis venereis genitalium dependent vel iisdem superveniunt.	289
§. I. De Tumoribus præputii & Balani, ubi de Phimofi, Paraphimofis & Crystallinis.	ibid.
§. II. De Phymatis & Tuberculis callofis, Chordisve skirrroidibus Balani & Præputii.	300
§. III. De gangræna & sphacelo genitalium.	309
CAPUT IX. De Porris, Verrucis & Condylomatibus genitalium.	317
§. I. Descriptio.	ibid.
§. II. Causæ.	318
§. III. Symptomata.	320
§. IV. Diagnofis.	ibid.
§. V. Prognofis.	321
§. VI. Curatio.	ibid.
CAPUT X. De Criftis, Moris, Ficis, Marifeis & rhogadiis Ani.	323
§. I. Descriptio.	324
§. II. Causæ.	ibid.
§. III. Symptomata.	325
§. IV. Diagnofis.	326
§. V. Prognofis.	327
§. VI. Curatio.	328
LIBER IV. De Ætiologia, Diagnofi, Prognofi & Therapeia Morbi Venerei univerfalís, five de Lue Venerea confirmata.	
CAPUT. I. Descriptio Luis venereæ confirmatæ.	332
CAPUT II. Causæ Luis venereæ confirmatæ.	337
CAPUT III. Symptomata Luis venereæ confirmatæ.	342
§. I. Morbi genitalium.	ibid.
§. II. Pittia Cutis.	344
§. III. Morbi oris & narium.	346
§. IV. Dolores venerei.	348
§. V. Morbi offium.	349
§. VI. Tumores glandulofi lymphatici.	355
§. VII. Oculorum morbi.	356
§. VIII. Morbi aurium.	358
§. IX. De Læfionibus functionum.	360
Animalium.	ibid.
Vitalium.	361
Naturalium.	362
Univerfalium.	363
Mulieribus propriarum.	364
CAPUT. IV. Diagnofis Luis venereæ confirmatæ.	366
§. I. An æger Lue venereæ vere labores?	ibid.
§. II. Quali Lue venereæ æger labores, & an labores foli hæ?	380

CAPUT V. Prognosis Luis venereae confirmatae.	383
§. I. Quae gravior, & quae gravissima?	ibid.
§. II. Quae curatu facilior, aut difficilior?	387
CAPUT VI. De Praeparatione ad hydrargyrosim.	393
§. I. An praesens aegri status ferendo remedio par sit?	ibid.
§. II. Quae anni tempestas eligenda sit?	394
§. III. Qualis praeparatio ad hydrargyrosim adhibenda sit?	395
§. IV. Quae sit compositio unguenti mercurialis seu Neapolitani?	400
CAPUT VII. De Administratione unguenti seu potius linimenti Mercurialis si- ve de hydrargyrosi.	401
§. I. De hydrargyrosi pleniore.	402
§. II. De parciore hydrargyrosi.	407
CAPUT VIII. De Infortuniis, quae in hydrargyrosi pleniore quandoque eveniunt, & de eorundem remediis.	411
§. I. Infortunia primi stadii.	412
§. II. Infortunia secundi stadii.	417
§. III. Infortunia tertii stadii.	421
CAPUT IX. De Infortuniis, quae in parciore hydrargyrosi interdum accidunt & de eorundem medicina.	425
§. I. De infortuniis huic methodo cum praecedente communibus.	ibid.
§. II. De infortuniis huic methodo quasi propriis.	428
CAPUT X. De Affectibus, qui post hydrargyrosim reliqui sunt, sed quibus me- dicina reperiri potest.	434
§. I. Quales sunt Gonorrhoea.	436
§. II. Porri venerei.	438
§. III. Phimosis & paraphimosis habituales.	439
§. IV. Condylomata & crista.	441
§. V. Fistula ani, aut fistula lacrymalis.	ibid.
§. VI. Dolores Rheumatici & arthritici.	ibid.
§. VII. Herpetes & Lichenes.	443
§. VIII. Rhegades manuum.	ibid.
§. IX. Ulcera contumacia.	444
§. X. Caries ossium.	446
§. XI. Scorbutus.	448
§. XII. Struma, sive scrofula.	449
CAPUT XI. De Affectibus pene desperatis, qui post hydrargyrosim aliquando su- persunt.	450
§. I. Tumores testium.	ibid.
§. II. Penis distortio.	452
§. III. Impotentia ad venetrem.	453
§. IV. Nodi, ganglia, tubercula, gummata.	455
§. V. Exostoses.	ibid.
§. VI. Dolor osteocopus.	456
§. VII. Carcinomata.	457
§. VIII. Ulcus uteri.	458
§. IX. Paralysis.	461

INDEX CAPITUM.

xxi

§. X. Tremor artuum.	ibid.
§. XI. Alopecia.	462
§. XII. Depressio nasi.	463
CAPUT XII. Appendix de rarioribus aliquot remediis, quæ ad morbos venereos præclare faciunt, vel creduntur facere.	464
I. Panacea de la Vigne, seu potius Mercurius præcipitatus ruber, Solaris, & Lunaris.	465
II. Præcipitatus Solaris Gervasii Ucay.	466
III. Æthiopes Minerales varii.	ibid.
IV. Panacea de la Brune.	467
V. Modus saturandi præparatis Mercurialibus pitisanam sudorificam.	468
VI. Mercurius violaceus diaphoreticus.	469
VII. Solutio Marcurii per deliquium.	ibid.
VIII. Medicamina Anti-cæradica de Retrou.	470
Tinctura aurifica.	ibid.
Elixirium aurificum.	ibid.
Pulvis liquans.	471
Pilule Alexiteriæ, seu potius purgantes.	ibid.
Præcedentium remedium administratio.	472
IX. Aqua Rabelii.	474
X. Tinctura Ambre griseæ cum aqua Rabelii.	ibid.
XI. Aqua Menthe Quercetani.	ibid.
XII. Lapis medicamentosus Crollii.	475
XIII. Pilule de Creta Palmarii.	ibid.
XIV. Pulvis astringens de Verny.	476
XVI. Unguentum ad Strumas.	ibid.
XVII. Opinata ad dentes firmandos, ac gingivas detergendas.	477

LIBER V. Index Chronologicus Auctorum, qui de Lue venerea scripserunt eb ingressu morbi ad exitum usque seculi decimi sexti, cum brevi plerorumque Operum Analyfi & Epicrisi.

SECVLUM DECIMUM QUINTUM.

Marcellus Cumanus.	1495.	480
Nicolaus Leoniceus, Vicentinus.	1497.	482
Ceradinus Gilinus.		483
Joannes VVidman sive VVcidmann dictus etiam Salicetus & Meibinger.	1498.	485
Natalis Montefaurus, Veronenfis.		486
Antonius Scanarolus, Mutinensis.		487
Simon Pihor, Lipsiensis.		ibid.
Sebastianus Aquilanus.		488

b 3

Ga-

SECVLVM DECIMVM SEXTVM.

1500.

Comradus Schelling, Heidelbergensis, 494

1501.

Martinus Polichius, Mericestadius. ibid.

1503.

Josephus Grundbeckius. ibid.*Joannes de Vigo*, Genuensis. 495

1507.

Antonius Benivenius, Florentinus. 496

1514.

Vendelinus Hock de Brackenu. ibid.

1516.

Jacobus Cataneus de Lacu-Marcino, Genuensis. 497*Joannes Almenar*, Hispanus. 499*Collectio Papiensis*, sive omnium prima. ibid.*Georgius Vella*, Brixienfis. 450

1518.

Petrus Magnardus, Veronenfis. ibid.*Leonardus Schmai*, Salisburgenfis. 451

1519.

Ulrichus de Hutten, Germanus. ibid.

1520.

Joannes Manardus, Ferrariensis. 503*Benedictus Rinius*, Venetus. 505*Joannes le Maire*, Belga. ibid.

1524.

Desiderius Erasmus, Roterodamus. 507

1525.

Bartolomeus Siliber. 508

1627.

Jacobus a Bethencourt, Rotomagenfis. ibid.

1530.

Hieronymus Fracastorius, Veronenfis. 510

1532.

Laurentius Frisus vel Thrisus. 512

1534.

Joannes Paschalis, Sueffanus. ibid.*Augustinus Niphus*, dictus *Eutichus Philothemus*, Sueffanus. ibid.

1535.

Gundisafvus Hernandez de Oviedo, Matritensis. ibid.*Collectio prima Veneta*, quæ numero secunda. 513

Ni-

	1536.	
Nicolaus Poli.		514
Nicolaus Massa Venetus.		ibid.
Petrus Andreas Matthiolus, Senensis.		516
Colledio Basileensis, five tertia.		517
Aureolus Philippus Theophrastus Paracelsus Bombast ab Hohenheim.		ibid.
	1537.	
Joannes Voets, Colonienfis.		522
Joannes Antonius Roverellus, Bologninus.		ibid.
	1538.	
Alfonfus Ferrus vel Ferrius, Neapolitanus.		523
Thomas Rangonus, dictus Philologus, Ravennas.		ibid.
	1540.	
Josephus Struthius, Pofnanienfis.		524
Dionysius Fontanonus, Professor Montepellulanus.		ibid.
Antonius Gallus, vulgo le Coq. Parisienfis.		525
	1541.	
Remaclus Fuchfus, Limburgus.		ibid.
	1542.	
Andreas Vesalius, Bruxellenfis.		526
Bartholomaeus Montagnana Junior, Patavinus.		527
Leonardus Fuchfus, Rhævus.		528
Michael Angelus Blondus, Italus.		529
	1544.	
Aloysius Lobera, Abulanus.		530
	1548.	
Hieronymus Cardanus. Mediolanenfis.		ibid.
	1550.	
Joannes Rodriguez de Castello-Bianco, five <i>Albo</i> , alias <i>Amatus</i> , Lusitanus.		531
Joannes Baptista Montanus, Veronenfis.		532
Bartholomaeus Maggius, Bononienfis.		ibid.
Joannes Benedictus, Germanus.		533
	1552.	
Antonius Musa Brassavolus, Ferrariensis.		534
Benedictus Vistorius, Faventinus.		535
	1552.	
Theodericus de Hery, Parisinus.		537
	1554.	
Joannes Langius, Lambergius.		538
Petrus Haschardus vel Hassardus, Insulanus vel Armenterius Flander.		ibid.
	1555.	
Nicolaus Machellus, Mutinensis.		539
Rodericus Diaz de Isla.		ibid.
	1556.	
Joannes Fernelius, Ambianus.		540

<i>Joannes Fernelius, Ambianus.</i>	1556.	34
<i>Petrus de Bayro, Taurinensis.</i>	1557.	341
<i>Joannes Sylvius, Insulanus in Flandria.</i>	1558.	ibid
<i>Petrus Laurus, Italus.</i>		ibid
<i>Franciscus Frizimelica vel Frigimelica, Patavinus,</i>		ibid
<i>Hieronymus Montuus.</i>	1560.	342
<i>Gabriel Fallopius, Mutinensis.</i>		343
<i>Guillelmus Rondeletius, Monspessulanus.</i>	1561.	344
<i>Dominicus Leo, Lunensis.</i>	1564.	345
<i>Antonius Fracastianus, Vicentinus.</i>		ibid.
<i>Antonius Chalmeteus, Vergefacus apud Anicienses.</i>		346
<i>Augerius Ferrerius, Tolofas.</i>	1565.	ibid.
<i>Leonardus Botallus, Astenfis.</i>		347
<i>Alexander Trajanus Petronius, Cittacastellanus.</i>	1566.	ibid.
<i>Petrus Trapolinus, Patavinus.</i>		348
<i>Marinus Brocardus, Venetus.</i>		ibid.
<i>Bernardinus Tomitanus, Patavinus.</i>		349
<i>Michael Joannes Paschalis, Valentinus Castellonenfis.</i>		ibid.
<i>Prosper Borgeutius.</i>	1567.	350
<i>Collectio, quarta, five Veneta secunda.</i>	1568.	351
<i>Victor Trincavellius, Venetus.</i>		353
<i>Georgius Dordonus, Placentinus,</i>	1570.	354
<i>Antonius Saporta, Monspeliensis.</i>		355
<i>Ludovicus de Isla, Lusitanus.</i>	1575.	356
<i>Andreas Alcacar vel Alcazar, Guadalaxarenfis.</i>		ibid.
<i>Ambrosius Paræus, Lavallensis.</i>	1577.	358
<i>Laurentinus Joubertus, Valentinus apud Delphinates.</i>	1578.	ibid.
<i>Julius Palmarius, Constantienfis apud Normannos.</i>	1580.	359
<i>Joannes Schenkius a Graffenberg, Friburgensis apud Brisgoios.</i>		361
<i>Joannes Crato a Graffheim, Vratislaviensis.</i>		ibid.

Joan-

INDEX CAPITUM.

XXV

<i>Joannes Zecchini</i> , Bononienfis.	1586.	ibid.
<i>Hieronymus Mercurialis</i> , Foroliviensis.	1587.	562
<i>Lucas Gbinus</i> , Bononienfis.	1689.	563
<i>Hieronymus Capivaccius</i> vel <i>Capo di Vacca</i> , Patavinus.	1590.	564
<i>Felicianus Betera</i> , Brixianus.	1591.	565
<i>Petrus Forestus</i> , Alcmarianus.	1596.	ibid.
<i>Villelmus Clouwer</i> , Anglus.		566
<i>Aurelius Minadous</i> , Rhodiginus.		ibid.
<i>Hercules Saxonia</i> , Patavinus.	1597.	568
<i>Franciscus de Villalobos</i> , Hispanus.	1598.	570
<i>Editio altera Collectionis Venetæ secundæ.</i>	1599.	ibid.

LIBER VI. Index Chronologicus Auctorum, qui de Lue venerea scripserunt ab ineunte seculo decimo septimo ad hanc usque diem, cum brevi ple-
rorumque Operum Analyfi & Epicrisi.

SECVLUM DECIMUM SEPTIMUM.

<i>Joannes Saporta</i> , Monspeliensis.	1600.	572
<i>Petrus de Torrez</i> , Darocensis in Aragonia.		573
<i>Alexander Massari</i> , Vicentinus.	1601.	574
<i>Andreas Laurentius</i> , Arelatenfis.	1602.	ibid.
<i>Josephus Quercetanus</i> , Armeniacus.	1603.	575
<i>Eustachius Rudius</i> , Bellunenfis.	1604.	576
<i>Fabius Pacius</i> , Vicentinus.		ibid.
<i>Ludovicus Mercatus</i> , Vallisoletanus.	1605.	578
<i>Andreas de Leon</i> , Hispanus.		579
<i>Bartolomeus Perduclis</i> , Helvius seu Vivariensis.		ibid.
<i>Joannes Varandæus</i> , Nemaufenfis.	1610.	ibid.
<i>Henningus Arnifaus</i> , Halberstadiensis.		580

b 5

Ta-

<i>Tanequius Guillaument</i> , Nemaufensis.	1611.	ibid.
<i>Horatius Guarguantus</i> , Soncincensis.	1613.	581
<i>Joannes Macollo</i> Scotus.	1616.	Ibid.
<i>Eitel Joacbinus Kruppelms</i> .	1620.	582
<i>Franciscus Ranchinus</i> , Monspeliensis.		ibid.
<i>Daniel Sennertus</i> , Vratislaviensis.		583
<i>Viktor Manggus</i> , Schattenlacenensis.		584
<i>Mattias Unzerus</i> , Hallensis.		ibid.
<i>Joannes Colle</i> , Bellunenensis.	1621.	ibid.
<i>David de Planis Campy</i> .	1633.	585
<i>Petrus Rokinius</i> .		586
<i>Tobias Knoblochius</i> , Marcobrettanus.	1624.	ibid.
<i>Zacutus</i> , Lusitanus Olyssipponensis.	1629.	587
<i>Joannes Antonides Vander Linden</i> , Enchufanus.	1630.	588
<i>Joannes Hartmannus</i> , Ambergensis.		ibid.
<i>Cyprianus Marexa</i> , Hispanus.	1641.	590
<i>Joannes Baptista Van-Helmont</i> Bruxellensis.	1644.	ibid.
<i>Theodorus Turquetus de Mayerne</i> , Genevensis.	1650.	595
<i>Antonius Everbardus</i> , Medioburgensis.	1661.	598
<i>Joannes Vinell</i> , Anglus.	1670.	ibid.
<i>Franciscus de la Bos Sylvius</i> , Hanoyiensis.	1672.	599
<i>Eduardus Maynwaringe</i> , Anglus.	1673.	600
<i>Nicolaus de Blegny</i> , Parisinus.		ibid.
<i>Joannes Casparus Sparr</i> .		602
<i>Richardus Wiseman</i> , Anglus.	1676.	ibid.
<i>Bernardinus Christinus</i> , a Juvellina Cyrenæus.		603
<i>Antonius Menjotius</i> , Parisinus.	1677.	ibid.
		Theo-

<i>Thophilus Bonetus</i> , Genevensis.	1676.	605
<i>Stephanus Blanchardus</i> , Batavus.		ibid.
	1680.	
<i>Thomas Sydenham</i> , Anglus.		ibid.
<i>Paulus de Sorbait</i> , Hispano-Belga.		606
	1682.	
<i>Joannes Michaut</i> .		607
	1584.	
<i>David Abercrombyus</i> , Anglus.		ibid.
<i>Carolus Thuillier</i> , Rothomagensis.		609
	1689.	
<i>L..... le Monnier</i> .		610
	1690.	
<i>G. B. de Saint Romain</i> .		ibid.
	1694.	
<i>Martinus Lister</i> , Eboracensis.		ibid.
	1698.	
<i>Carolus Mustanus</i> , Calaber.		612
	1699.	
<i>Gervasius Ueag</i> , Tolofanus.		613
<i>Petrus Garnier</i> , Lugdunensis,		614

SECULUM DECIMUM OCTAVUM.

<i>N..... Boirel</i> .	1702.	1710
	1710.	
<i>Adrianus Helvetius</i> , Batavus.		ibid.
	1711.	
<i>Joannes Devaux</i> , Parisiens.		ibid.
	1714.	
<i>Richardus Boulton</i> , Anglus.		618
<i>Gualterus Harris</i> , Anglus.		ibid.
	1716.	
<i>Jacobus Vercellonus</i> , Pedemontanus.		620
	1717.	
<i>Guillelmus Cockburne</i> , Anglus.		621
<i>Gervardus Gora</i> .		622
	1722.	
<i>N..... Bouez de Sigogne</i> .		623
	1724.	
<i>Rogerus Diban</i> .		ibid.
<i>Antonius Deidier</i> , Monspeffulanus.		624
<i>Antonius Benevolus</i> , Florentinus.		625
		Pe-

xxviii INDEX CAPITUM

<i>Petrus Violette du Bois.</i>	1725.	ibid.
..... <i>Pointet.</i>		626
<i>Editio Lugduno-Batava Collectionis Venetæ secundæ.</i>	1728.	627
<i>Hermannus Boerhaave, Vianensis Batavus.</i>		628
	1731.	
<i>Carolus Barbeirac, Cæsaristensis.</i>		632
	1732.	
<i>Daniel Turner, Anglus.</i>		ibid.
	1733.	
<i>Petrus Default, Burdigalensis.</i>		634
	1734.	
<i>Henricus Haguenot, Monipessulanus.</i>		635
	1735.	
..... <i>de la Mettrie.</i>		638





INDEX ALPHABETICUS. AUCTORUM,

Qui de Morbis venereis speciales Libros
scripserunt.

A

D avid	Abercrombyus, <i>Anglus.</i>	pag. 607
Jacobus	Abethencourt, <i>Rotbomagensis.</i>	508
Petrus Angelus	Agathus, <i>Matheras, cum Fallopio.</i>	543
Andreas	Alcazar, <i>Gundalavenensis.</i>	516
Joannes	Almenar, <i>Hispanus.</i>	499
	Amatus, <i>Luxitanus.</i>	531
Andreghettus	Andreghettius cum Saxonia.	568
Sebastianus	Aquilanus.	488
Henningus	Arnicaus, <i>Halberstadiensis.</i>	580

B

Carolus	Barbeirac, <i>Cesarisensis.</i>	632
Collectio	Basileensis.	517
Editio Lugduno-	Batava Luisini.	627
Petrus de	Bayro, <i>Taurinensis.</i>	541
Joannes	Benedictus, <i>Germanus.</i>	534
Antonius	Benevolus, <i>Florentinus.</i>	625
Antonius	Benivenius, <i>Florentinus.</i>	496
Felicianus	Beterra, <i>Brixianus.</i>	569
Jacobus a	Bethencourt, <i>Rotbomagensis.</i>	508
Stephanus	Blancardus, <i>Batavi.</i>	605
Nicolaus de	Blegny, <i>Parisiensis.</i>	600
Michael Angelus	Blondus, <i>Italus.</i>	529
Franciscus Sylvius de le	Boe, <i>Hanoviensis.</i>	599

Hec

Hermannus	Boerhaave, <i>Vianensis Batavus</i> .	628
N.	Boirel.	615
Petrus Violette du	Bois.	625
Phil. Aur. Theoph. Para.	Bombast, <i>Eremita</i> .	517
Theophilus	Bonetus, <i>Genevensis</i> .	605
Prosper	Borgarutius.	550
Leonardus.	Botallus, <i>Astensis</i> .	547
N.	Bouez de Sigogne.	623
Richardus	Boulton, <i>Anglus</i> .	618
VVendelinus Hock de	Brackenau.	456
Antonius Musa	Brassavolus, <i>Ferrariensis</i> .	534
Marinus	Brocardus, <i>Venetus</i> .	548

C

Hieronymus	Capivaccius, <i>foe Capitaurus, Patavinus</i> .	564
Hieronymus	Cardanus, <i>Mediolanensis</i> .	530
Joannes Rodericus de	Castello Bianco, <i>Lusitanus</i> .	531
Jacobus	Cataneus a Lacumarcino, <i>Genuensis</i> .	497
Antonius	Chalmeteus, <i>Vergesacus apud Aniciensis</i> .	546
VVillelmus	Clovves, <i>Anglus</i> .	566
Guillelmus	Cockburne, <i>Anglus</i> .	621
Joannes.	Colle, <i>Bellunensis</i> .	584
	Collectio Papiensis, <i>quæ prima</i> .	499
	———— Veneta prima, <i>quæ secunda</i> .	513
	———— Basileensis, <i>quæ tertia</i> .	517
	———— Veneta altera, <i>quæ quarta</i> .	551
Joannes	Crato a Grafftheim, <i>Vratislaviensis</i> .	561
Marcellus.	Cumanus.	480

D

'Antonius	Deidier, <i>Montepessulanus</i> .	624
Joannes	Devaux, <i>Parisiensis</i> .	635
Petrus	Default, <i>Burdigalensis</i> .	624
Rodericus	Diaz de Isla.	539
Rogerus	Dibon.	534
Georgius.	Dordonus, <i>Placentinus</i> .	554

E

	Editio prima Veneta Collectionis Luifininx.	551
	———— Altera Veneta.	570
	———— Tertia Lugduno-Batava.	513
Desiderius	Erasmus, <i>Roterodamus</i> .	507
Antonius	Everhardus, <i>Medioburgensis</i> .	598

Ga-

F

Gabriel	Fallopìus, <i>Mutinenfis</i> .	542
Gundisalvus	Fernandez, <i>Matritensis</i> .	512
Joannes	Fernelius, <i>Ambianus</i> .	540
Augerius	Ferrerius, <i>Tolosus</i> .	546
Alionfus	Ferrus, <i>Neapolitanus</i> .	523
Dionysius	Fontanonus, <i>Montepessulanus</i> .	524
Petrus	Forestus, <i>Alcmarianus</i> .	565
Antonius	Fracantianus, <i>Vicentinus</i> .	545
Phieronymus	Fracastorius, <i>Veronensis</i> .	510
Franciscus	Frigimelica, <i>Patavinus</i> .	541
Laurentius	Frilius.	512
Leonardus	Fuchsius, <i>Rhatus</i> .	528
Remacius	Fuchsius <i>Limburgus</i> .	525

G

Antonius	Gallus, <i>Parifinus</i> .	535
Petrus	Garnier, <i>Lugdunensis</i> .	614
Lucas	Ghinus, <i>Bomanensis</i> .	563
Coradinus	Gilinus,	483
Gherardus	Goris.	622
Josephus	Grundbeckius.	494
Horatius	Guargantus, <i>Soncinenfis</i> .	581
Tannequinus.	Guilhaumet, <i>Nemausensis</i> .	580

H

Henricus	Haguenot, <i>Montepessulanus</i> .	635
Gualterus	Harris, <i>Anglus</i> .	612
Joannes	Hartmannus, <i>Ambergensis</i> .	588
Petrus	Haffardus, <i>Insulanus vel Armenterius Flander</i> .	538
Joannes Baptista ven	Helmont, <i>Bruxellensis</i> .	519
Adrianus	Helvetius, <i>Batavus</i> .	615
Gundisalvus.	Hernandez, <i>Matritensis</i> ,	512
Theodoricus de	Hery, <i>Parifinus</i> .	537
VVendelinus	Hock de Brackenau.	496
Phil. Aur. Th. Par. B. ab	Hoenheim, <i>Eremita</i> .	517
Ulcicus de	Hntten, <i>Eques Germanus</i> ,	452

I

Laurentius	Joubertus, <i>Valentinus apud Delphinates</i> .	558
Ludovicus de	Isla, <i>Lufitanus</i> .	556

Ro-

Rodericus Diaz de Isla.	539
Bernardinus Christinus à Juvellina, <i>Cyrneus</i>	603

K

Tobias	Knoblochius, <i>Marcobrettanus</i> .	586
Eitel Joachimus	Kruppelius.	582

L

Jacobus Cataneus a	Laco-Marcino, <i>Genuenfis</i> .	497
Joannes	Langius, <i>Lembergus</i> .	538
Andreas	Laurentius, <i>Arelatenfis</i> .	574
Petrus	Laurus, <i>Italus</i> .	541
Dominicus	Leo, <i>Lunenfis</i> .	545
Andreas de	Leon, <i>Hispanus</i> .	579
Nicolaus	Leoniceus, <i>Vicentinus</i> .	482
Joannes Antonid. Vander	Linden, <i>Enchufanus</i> .	588
Martinus	Lifter, <i>Eboracensis</i> .	610
Aloyfius	Lobera, <i>Abulanus</i> .	530
Editio	Lugduno-Batava Luisini.	627
Aloyfius	Luisinus, <i>Utinensis</i> .	551
Amatus	Lufitanus.	531
Zacutus	Lufitanus, <i>Olyfipponensis</i> .	587

M

Nicolaus	Machellus, <i>Mutinenfis</i> .	539
Joannes	Macollo, <i>Scotus</i> .	581
Bartholomæus	Maggius, <i>Bononienfis</i> .	532
Joannes le	Maire, <i>Bagacensis</i> .	505
Joannes	Manardus, <i>Ferrariensis</i> .	503
Victor	Mangus, <i>Schattencalenfis</i> .	584
Cyprianus	Maroxa, <i>Hispanus</i> .	590
Nicolaus	Massa, <i>Venetus</i> .	514
Alexander	Massarias, <i>Vicentinus</i> .	574
Petrus Andreas	Matthiolus, <i>Senensis</i> .	516
Theodorus Turquetus de	Mayerne, <i>Genevensis</i> .	595
Petrus	Maynardus, <i>Veronensis</i> .	450
Eduardus	Maynvaringe, <i>Anglus</i> .	600
Joannes	Meichinger.	485
Martinus	Melleritadius.	494
Antonius	Menjotius, <i>Parifinus</i> .	603
Ludovicus	Mercatus, <i>Vallifoletanus</i> .	578
Hieronymus	Mercurialis, <i>Feroltrienfis</i> .	562
Scipio ex	Mercuriis, cum Zecchio.	561

de la

	de la Mettrie.	638
Joannes	Michaut.	607
Aurelius	Minadous, <i>Rhodiginus</i> .	566
L.....le	Monnier.	610
Bartholomæus	Montagnana, <i>Patavinus</i> .	527
Joannes Baptista	Montanus, <i>Veronensis</i> .	532
Natalis	Montefaurus, <i>Veronensis</i> .	486
Hieronymus	Montuus.	542
Carolus	Mufitanus, <i>Calaber</i> .	612

N

Augustinus	Niphus, <i>Sveffanus</i> .	612
------------	----------------------------	-----

O

Concales Hernandez de	Oviedo, <i>Matritensis</i> .	512
-----------------------	------------------------------	-----

P

Fabius	Pacius, <i>Vicentinus</i> .	576
Julius	Palmarius, <i>Constantiensis Normannus</i> .	559
Collectio	Papiensis.	499
Phil. Aureol. Theophr.	Paracelsus, <i>Eremita</i> .	517
Ambrosius	Paræus, <i>Lavallensis apud Cenomanos</i> .	558
Joannes	Paschalis, <i>Sveffanus</i> .	512
Michael Joannes	Paschalis, <i>Valentinus Castellonenfis</i> .	549
Bartholomæus	Perdulcis, <i>Helvius sive Vivariensis</i> .	579
Alexander Trajanus	Petronius, <i>Cittacastellanus</i> .	547
Thomas Rangonus	Philologus, <i>Ravennas</i> .	523
Augustinus Niphus	Philotheus, <i>Sveffanus</i> .	512
Laurentius	Phrisius.	512
Simon	Pistor, <i>Liphsensis</i> .	487
David de	Planis Campy.	585
Martinus	Polichius, <i>Merveftadius</i> .	494
Nicolaus	Poll.	514
	Pointet.	626

Q

Josephus	Quercanus, <i>Armeniacus</i> .	575
----------	--------------------------------	-----

R

Franciscus	Ranchinus, <i>Monspessulanus</i> .	572
Thomas	Rangonus, <i>Ravennas</i> .	523

Be-

Benedictus	Rinius, <i>Venetus</i> .	505
Joannes	Rodericus de Castello-Bianco, <i>Lufitanus</i> .	532
G.... B.... de Saint.	Romain.	610
Guillelmus	Rondeletius, <i>Montepellulanus</i> .	544
Petrus	Rostinius.	586
Joannes Antonius	Roverellus, <i>Bologninus</i> .	522
Eustachius	Rudius, <i>Bellunenſis</i> .	576

S

G.... B.... de	Saint Romain.	610
Joannes	Salicetus.	485
Antonius	Saporta, <i>Montpelienſis</i> .	555
Joannes	Saporta, <i>Montpelienſis</i> .	572
Hercules	Saxonia, <i>Patavinus</i> .	568
Antonius	Scanarolus, <i>Mutinenſis</i> .	487
Conradus	Schelling, <i>Heidelbergienſis</i> .	494
Joannes	Schenckius, <i>Friburgenſis</i> .	651
Leonardus	Schmai, <i>Salisburgenſis</i> .	451
Philippus	Schophus cum Capivaccio.	564
Daniel	Sennertus, <i>Uratſlavienſis</i> .	583
N.... Bouez de	Sigogne.	623
Bartholomæus	Sileber.	508
Paulus de	Sorbait, <i>Hiſpano-Belga</i> .	606
Joannes Caſparus	Sparr.	602
Joſephus	Struthius, <i>Polonus Poſnaniienſis</i> .	524
Franciſcus	Sylvius de la Boe, <i>Hanozienſis</i> .	599
Joannes	Sylvius, <i>Inſulanus in Flandria</i> .	541
Thomas	Sydenham, <i>Anglus</i> .	616

T

Philippus Aureolus	Theophrastus Paracellus, <i>Eremita</i> .	517
Carolus	Thuillier, <i>Rorbomagenſis</i> .	609
Bernardinus	Tomitanus, <i>Patavinus</i> .	549
Gaſpar	Torella, <i>Valentinus apud Hiſpanos</i> .	489
Petrus de	Torrez, <i>Davocenſis in Aragonia</i> .	573
Petrus	Trapolinus, <i>Patavinus</i> .	548
Victor	Trincavellius, <i>Venetus</i> .	558
Daniel	Turner, <i>Anglus</i> .	632
Theodorus	Turquet de Mayerne, <i>Genevenſis</i> .	595

V

Joannes Antonius	Vander Linden, <i>Encheſanus</i> .	588
Joannes Baptiſta.	Vanhelmont, <i>Bruxellenſis</i> .	590

Joan-

INDEX AUCTORUM.

xxxī

Joannes	Varandæus, <i>Nemaufensis</i> .	579
Gervasius	Ucay, <i>Tolosæ</i> .	613
Georgius	Vella, <i>Brixienfis</i> .	450
Collectio	Veneta, <i>prima</i> .	513
Collectio	Veneta Aloysii Luisini, <i>quæ secundæ a</i> .	551
Jacobus	Vercellonus, <i>Pedemontanus</i> .	620
Andreas	Vesalius, <i>Bruxellenfis</i> .	526
Benedictus	Victorius, <i>Faventinus</i> .	535
Joannes de	Vigo <i>Genuensis</i> .	495
Franciscus de	Villalobos, <i>Hispanus</i> .	570
Petrus	Violette du Bois,	625
Marthias	Untzerus, <i>Hallenfis</i> .	584
Joannes	Vochs, <i>Colonienfis</i> .	522

VV

Joannes	VVeidmann.	485
Joannes	VVinell, <i>Anglus</i> .	598
Richardus	VVifeman, <i>Anglus</i> .	602

Z

Joannes	Zacutus, <i>Lufitanus, Olyppo nenfis</i> .	587
	Zecchius, <i>Bononiensis</i> .	561



NOI

Benedictus	Rinius, <i>Venetus</i> .	505
Joannes	Rodericus de Castello-Bianco, <i>Lufitanus</i> .	531
G.... B.... de Saint.	Romain.	610
Guillelmus	Rondeletius, <i>Montepellulanus</i> .	544
Petrus	Rostinius.	586
Joannes Antonius	Roverellus, <i>Bologninus</i> .	522
Eustachius	Rudius, <i>Bellunenſis</i> .	576

S

G.... B.... de	Saint Romain.	610
Joannes	Salicetus.	485
Antonius	Saporta, <i>Montepellienſis</i> .	555
Joannes	Saporta, <i>Montepellienſis</i> .	572
Hercules	Saxonia, <i>Patavinus</i> ,	568
Antonius	Scanarolus, <i>Mutinenſis</i> .	487
Conradus	Schelling, <i>Heidelbergienſis</i> .	494
Joannes	Schenckius, <i>Friburgenſis</i> .	651
Leonardus	Schmai, <i>Salisburgenſis</i> .	451
Philippus	Schopſius cum Capivaccio.	564
Daniel	Sennertus, <i>Uratſlaviensſis</i> .	583
N.... Bouez de	Sigogne.	623
Bartholomæus	Sileber.	508
Paulus de	Sorbait, <i>Hispano-Belga</i> .	606
Joannes Caſparus	Sparr.	602
Joſephus	Struthius, <i>Polonus Poſnaniensſis</i> .	524
Franciſcus	Sylvius de la Boe, <i>Hanovienſis</i> .	599
Joannes	Sylvius, <i>Inſulanus in Flandria</i> .	541
Thomas	Sydenham, <i>Anglus</i> .	616

T

Philippus Aureolus	Theophrastus Paracellus, <i>Eremita</i> .	517
Carolus	Thuillier, <i>Rotbomagenſis</i> .	609
Bernardinus	Tomitanus, <i>Patavinus</i> .	549
Caſpar	Torella, <i>Valentinus apud Hispanos</i> .	489
Petrus de	Tortez, <i>Davocensſis in Aragonia</i> .	573
Petrus	Trapolinus, <i>Patavinus</i> .	548
Victor	Trincavellius, <i>Venetus</i> .	558
Daniel	Turner, <i>Anglus</i> .	632
Theodorus	Turquet de Mayerne, <i>Genevenſis</i> .	595

V

Joannes Antonius	Vander Linden, <i>Enchuſanus</i> .	588
Joannes Baptiſta.	Vanhelmont, <i>Bruxellenſis</i> .	590

Joan-

INDEX AUCTORUM.

xxxii

Joannes	Varandæus, <i>Nemaufensis</i> .	579
Gervasius	Ucay, <i>Tolosæ</i> .	613
Georgius	Vella, <i>Brixienfis</i> .	450
Collectio	Veneta, <i>prima</i> .	513
Collectio	Veneta Aloyfii Luifini, <i>quæ fecund a</i> .	551
Jacobus	Vercellonus, <i>Pedemontanus</i> .	620
Andreas	Vefalius, <i>Bruxellenfis</i> .	526
Benedictus	Victorius, <i>Faventinus</i> .	535
Joannes de	Vigo <i>Genuenfis</i> .	495
Franciscus de	Villalobos, <i>Hispanus</i> .	570
Petrus	Violette du Bois,	625
Matthias	Untzerus, <i>Hallenfis</i> :	584
Joannes	Vochs, <i>Coloniensis</i> .	522

VV

Joannes	VVeidmann.	485
Joannes	VVinell, <i>Anglus</i> :	598
Richardus	VVileman, <i>Anglus</i> .	602

Z

Joannes	Zacutus, <i>Lufitanus, Olyffoponenfis</i> .	587
	Zecchius, <i>Bonomienfis</i> .	561



NOI

NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, e Approvazione del *P. Fra Paolo Tommaso Manuelli Inquisitore di Venezia*, nel Libro intitolato: *De Morbis Venereis Libri sex Auctore Joanne Astruc*, non v'esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi; concedemo Licenza a Gio: Maria Lazzaroni Stampatore di Venezia, che possa esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. 25. Luglio 1738.

(Gio: Francesco Morosini Cav. Riffor.

(Pietro Grimani Proc. Riffor.

(

Agostino Gadaldini Segr.

1738. primo Ottobre.

Registr. nel Magistr. Eccell. contro la Bestemmia.

Vettor Gradenigo Segr.



DE MORBIS VENEREIS.



LIBER PRIMUS.

De Origine, Propagatione & Periodis Mor-
borum Venereorum.

CAPUT PRIMUM.

Luem veneream nec Græci, nec Romanis olim notam fuisse.



RECTÆ rationi consentaneam esse censemus eorum senten-
tiam, qui luem veneream orbi nostro Deo providente eo
fine inductam fuisse existimant, ut tanquam fræno vaga
hominum libido coërceretur, vel vindicaretur tanquam
flagello. *Neque enim, quod de re alia dicit (a) Tullius, sine* (a) Tusculanarum Question. Lib. 4.
magna utilitate constitutum esse videtur, ut homines castiga-
tionibus affici se in delictis dolerent. Noluerimus tamen inde concludi hunc
morbum, qualis nunc viget, antiquitus viguisse, quoniam impurissi-
ma hominum flagitia vindice pœna, quæ coæva esset, semper indigue-
re. Pium quidem est Dei consilia, cum manifesta sunt & certa, suspi-
ce-

A

ce-

cere & reverenter adorare; sed nefas est eadem, cum latent, scrutari curiosius, aut quod pejus est, Dei providentiam arctis rationis nostræ cancellis definire, & infinitam ejusdem sapientiam pro sapientiæ nostræ modulo metiri. Semota igitur tam vana temeritate, non quid Deus olim facere debuerit, sed quid olim fecerit; non utrum pravæ hominum libidines lue venerea punire quondam debuerit, sed utrum quondam punierit inquirere opus est.

Luem veneream nec Græcis, nec Romanis olim cognitam fuisse probatur.

Positam sub eo conspectu quæstionem dirimere facile est non conjecturis aut indiciis longe quæsitis, sed ex historiarum fide, qua manifestissime liquere arbitramur veneream luem Græcis Romanisque nec re, nec nomine unquam innotuisse, sed ab utrisque plenissime & perfectissime ignoratam fuisse.

Porro tamen haud æquum foret, a nobis, qui negantium partes sustinemus, argumenta affirmantia, aut testimonia diserta expeti, quæ nondum aperte relescent, & veneream luem Veteribus ignotam fuisse directe comprobent. Sufficit negantibus rationibus, quas solas fert quæstionis conditio, rem evinci, ut nos præstituros esse confidimus sequentibus, quæ sane potentissimæ & omni exceptione majores esse videntur.

II. Silentio Medicorum omnium.

Prima petitur a silentio Medicorum, qui ab Hippocratis ævo, hoc est a primis Medicinæ incunabulis apud Græcos Romanosque florere, & in quorum Scriptis ne verbum quidem legere est, quod ad luem veneream possit ulla ratione accommodari. Vix ab orta juxta nos in Europa lue venerea numerantur anni 240. & abhinc tamen editas novimus ultra 200. Diatribas de morbo venereo data opera scriptas, quin imo abhinc vix ullum Opus est de Medicina conscriptum, in quo expressa morbi ejusdem mentio non habeatur. Sane tam contraria agendi ratio abunde probat veteres Medicos, quorum cæteroquin diligentia comperta est in enumerandis singulis tumorum speciebus; in distinguendis vel levissimis oculorum morbis; uno verbo in explicandis morbis omnibus, quos cognovere, de lue venerea, affectu scilicet ita gravi, ita communi, ita singulari tam constanter omnes tacere non potuisse per annos bis mille, si affectus ille ipsorum ætate quondam sæviisset, qualis jam sævit altero abhinc sæculo.

II. Silentio Historicorum veterum.

Altera dicitur ex silentio Historicorum veterum, qui neminem morbo ex genere contracto affectum fuisse memorant, licet vaga stupra & flagitia plurima Imperatorum, Regum, & aliorum passim referant. Certe vivitur jam cæsius, nec tam effrægate in venerem effusa ætas nostra. Nihilominus tamen constat aperto Historicorum testimonio a primo luis venereæ ingressu, haud longo scilicet temporis intervallo, Principes viros non paucos eo morbo jam laborasse, nempe Carolum V. Imperatorem, qui idcirco decocto tum Guajaci, tum Radicis Chinæ sæpius usus

usus est, testibus Andrea Vesalio Medico Cæsareo, in *Epistola de Radice Cibiæ*, Gabriele Fallopio, *Traſſat. de Morbo Gallico*, cap. 60. Antonio Fracantiano, *Lib. de Morbo Gallico*: Franciscum I. Gallorum Regem, qui luem ab uxore Mercatoris ferrarii contraxit, unde diu male habitus supremum diem tandem obiit. Mezerai, *Abrégé Chronolog. ad ann. 1538*. Bayle, *Dictionnaire Critique*, in verbo *François I. ad notam D. Carolum IX.* qui caruncula virgæ ex virulenta gonorrhœa ægrotavit, & cathæreticis curationem accepit opera Gothofredi Giannati, ut liquet ex Aëtis Mospeliensis Computorum Cameræ: Vide Lazarum Riverium, *Observat. Medicar. Censur. 2. Observatione 14.* Henricum III. qui dum e Polonia in Gallias rediret post mortem fratris Caroli IX. a Scorio, quocum Venetiis rem habuit, gonorrhœam virulentam concepit: Vide Mezerai, *Abrégé Chronologique, ad annum 1574.* Demum, ut exempla cæteris Europæ Nationibus desumpta nunc omittam, Carolum a Lotharingia Duces Meduanensem, famosum Caput Fœderatorum, seu potius perduellium adversus Henricum III. & Henricum IV. qui & ipse morbo eodem infectus fuit. Mezerai, *Abrégé Chronolog. ad ann. 1589.*

Quæ ergo idonea & iusta erit veterum Historicorum excusatio, apud quos per bis mille annos nullum proſtat exemplum istiusmodi? An neminem inter tot Græcorum Duces, inter tot Romanorum Imperatores, omnes effrenatæ & impurissimæ libidinis, morbo ullo venereo unquam laborasse credemus, de quo mentionem facere potuerint? Sed tam felix, tam diuturna, tam constans tot hominum incolumitas, qui in periculis venereis sine delectu versabantur, prodigio similis esset. An vero Historicos veteres non ausos fuisse turpes & dedecorosos Ducum aut Imperatorum morbos reterege? Sed profecto qui hæc animo ita concipiunt, antiquos Historicos male norunt. Tacitus scilicet, qui Imperatorum vitia tam acri stylo perstringit: Svetonius, qui Cæsarum vitas eadem prorsus licentia scribit, qua vixerunt ipsi: cæterique antiquiores Scriptores, qui maxima cum libertate quoslibet notant, Principum infamiam & dedecus adulatione pessima de industria omnes celaverunt? Minime omnium. Quid restat igitur, nisi ut ex silentio veterum Historicorum concludamus quod ex veterum Medicorum silentio modo collegimus, luem scilicet veneream antiquitus numquam observatam fuisse?

Demum Tertia desumitur ex silentio Poetarum veterum, tum Satiricorum, tum Epigrammaticorum, cæterorumque Auctorum, in quorum Operibus locus nullus exſtat, qui de huc venerea possit intelligi. Sane parem desideramus modestiam in Poetis, qui ducentis abhinc annis in Galliis nostris florere, ut nunc de alienigenis sileamus. Ignorat enim nemo apud Regnerium in Satiris; Marotum, Bayſium, Theophilum,

III. Si-
lentio
Poeta-
rum, cæ-
terorum-
que Scri-
ptorum
antiquo-
rum,

lum, Sigognium, Berthelorum, Sanctum Amandum, Roussellum &c. in Epigrammatis, aut Poematis; Rabelæsum in Satira, cui *Gesta Gargantue & Pantagruelis* titulum fecit, liberos jocos in luem veneream, aut lue venerea infectos passim prostare, quos excusatos ipsi noluerimus. Quorsum ergo discrimen tam manifestum veteres inter & recentiores Poetas, Scriptoresque alios? Putandum forsitan Horatium, Juvenalem, Persium, qui tam obscæna sæpe proferunt, qui tot convitia, tot scommata passim congerunt, Regnerio Satirico; aut Catullum & Martialem, qui de rebus venereis tot disticha dicunt in omnes, Maroto, Bayfio, Theophilo, Sigognio, Bertheloto, Sancto Amando, Roussello; aut demum Petronium turpissimæ obscænitatis Scriptorem, Rabelæso verecundiores fuisse, vel minus maledicos? Nequaquam profecto; sed inde colligendum est, ut jam sæpius dictum fuit, luem veneream, quæ posteriorum ætate viguit, incognitam fuisse priorum ævo, qui alioquin nunquam abstinere potuissent a prurigne multa in libidinosos jocandi, tum de natura, tum de causa morbi quem nequitii sibi comparavissent.

Ut ergo Lucretius mundi *novitatem & naturam recentem* recte probat sequenti ratiocinio, de rerum natura, Lib. 5.

*Præterea si nulla fuit genitalis origo
Terrarum & cali, semperque æterna fuere;
Cur supra bellum Thebanum & funera Trojæ,
Non alias alii quoque res cecinere Poetæ?*

Sic nobis quoque argumento simili, neque minus firmo novitatem luis venereæ confirmare licet; nempe si recens non fuit *genitalis origo* hujus luis, si impurus ille morbus antiquitus viguit, ut nunc, cur Medici, Historici, Poetæ veteres, qui de levioribus & rarioribus morbis multa habent, immanem illum & communissimum affectum quasi ex compacto omnes siluissent?

IV. Testimonio
Medicorum omnium,
qui Carolo VIII.
supperes vixerunt,

Tandem possumus in probationem adducere auctoritatem Medicorum omnium, qui sub ingressu luis venereæ vixere, & quorum unanimi testimonio constat morbum hunc in Europam primum inductum fuisse exeunte sæculo decimo quinto; cum nullo alio morbo, qui olim cognitus fuerit, aut antiquitus observatus, ullo modo convenire; a Regno Neapolitano, ubi primum Gallos & Neapolitanos invasit, in cæteras Europæ oras contagione longe lateque propagatum esse; deum a militibus Hispanis, qui in Indiis sub Christophoro Colombo meruerant, malam hanc mercem Neapolim traductam fuisse: sed de his singulatim & fuse in sequentibus.

CAPUT II.

Explicantur aliquot Veterum loca, quæ detorqueri solent, ut de lue venerea intelligantur.

QUAMQUAM rationes, quas modo proposuimus, maximum momentum habere videantur, haud desunt tamen qui in contrarium pugnent auctoritatibus & argumentis: auctoritatibus quidem, ut ostendant luem veneream ab Antiquis olim cognitam fuisse; argumentis vero, ut probent ab iisdem olim cognosci debuisse. Itaque exigit instituti operis ratio, ut utrisque satisficiamus, auctoritatibus isto, argumentis sequente capite; Inde sane, ubi semel manifestum fiet, quam futili fundamento objectiones nitantur, nova neque profecto exigua confirmatio veritati, quam propugnamus, accessura est.

I. Proferunt varia Hippocratis loca, potissimum ex *tertio Epidemiorum* sect. 3. quibus putant luem veneream graphice describi, cum ibi varia recenscantur symptomata, quæ in lue venerea solent observari, ut fluxiones ad pudenda, exulcerationes, tubercula circa inguina, pustulæ magnæ, serpentia ulcera maligna, sacer ignis cum valde parvis ulcusculis, abscessus & suppurationes, ossium & nervorum ex decidentia magnæ mutilationes, fluxio collecta puri non similis sed deterior pure, glabrities capitis & menti cum febre vel sine febre, abscessus circa dentes, &c.

Sed 1. Videntur qui talia adducunt, causam suam vel ideo prode- re, quod audeant Hippocratis testimonio tam captiose abuti. Nullum enim locum integrum producunt, qui una & continente serie legatur, & unde veram Hippocratis mentem liceat eruere: sed ex disceptis, mutilisque periodis, hinc & illinc membratim collectis centonem confarinant, ut Hippocratem ad suam sententiam possint detorquere. Sane, si ea probentur, de Scriptorum auctoritate actum est. Quid est enim cur de vero eorundem sensu frustra contendatur, si liceat eisdem pro lubitu sensum quemlibet affingere?

2. Quod si remotis præjudiciis consulantur loca ipsa indicata, li- quebit inde luce meridiana clarius Hippocratem ne somniasse quidem de lue venerea, sed pestilentiam descripsisse. Morbi nempe, de quibus loquitur, acuti, epidemici, cum febre conjuncti, & a tempesta- te humida & austrina inducti fuerunt, cum e contra lues venerea chro- nica & sporadica sit, sine febre invadat, & solo veneris usu propagetur. Adde morbos illos curatos fuisse vel sponte, quod lui veneræ non con- venit, vel saltem methodo, quæ ad lui veneræ curationem plane in- efficax esset.

3. Ideo Galenus ipsemet *Commentario* 3. laudata Hippocratis loca intelligit de morbis pestilentibus, vicio aeris epidemice grassantibus, qua de re consentientes habuit ceteros fere omnes Interpretes, qui ab illius ævo sive ante luis venereæ ingressum in Europam, sive post eundem scripsere.

4. Neque scrupulus ullus idcirco residere potest, quod ab Hippocrate recenseantur symptomata quædam, ut fluxiones ad pudenda, exulcerationes, tubercula circa inguina, &c. Hæc enim, quamvis prima fronte luem veneream adumbrare videantur, ad eam tamen nullo modo pertinere evidens est, si diligentius attendantur, sed designari iisdem vel bubones pestilenciales, quales solent inguina peste insectorum obsidere, & si exulcerentur, depasce; vel saltem abscessus aut ulcera in sphacelum abeuntia, quæ in pestilentia neque nova, neque inaudita. tunc erant, cum jam in peste illa Atheniensi, quæ paulo ante contigerat, anno secundo belli Peloponnesiaci, morbi vehementia decubuisset, teste Thucydide, *Lib. 2.* in pudenda, summas manus, pedesque extremos, quibus amissis & decidentibus, ægrotantium non pauci evaserunt; quod a Lucretio notatum quoque fuisse legimus in pestis ejusdem descriptione, *Lib. 6. De rerum natura.*

*Frofluvium porro qui terri sanguinis acre
Exierat, tamen in nervos huic morbus, & artus
Ibat & in partes genitales corporis ipsas,
Et graviter partim metuentes limina leibi
Vivebant ferro privati parte virili.*

II. Ex
Histori-
cis,
nempe
Herodo-
to,

II. Producent Historicos quosdam, quos putant luis venereæ antiquitati suffragari.

1. Herodotum, qui *Historiar. Lib. 1. Clío dicto*, refert "Scythas, cum in Palæstinam irrupissent, Fanum Veneris Uraniæ, quod erat Ascalone, "depeccatos fuisse. Unde Deam Templi violatoribus, eorumque "posteris morbum immisisse fœmineum, *Ἐπὶ λίσσαν νῦσον* eoque "morbo affectos à Scythis vocari *ἐναπρία* sive *ἐναπρία*."

Suetonio,

2. Suetonium, qui de Octavio Cæsare Augusto scribit *artic. 80. corpore ipsum fuisse maculoso, dispersis per pectus atque alvum genitivis notis in modum & ordinem ac numerum stellarum cælestis Urse, sed & callis quibusdam ex prurigine corporis, assiduoque & vehementi strigilis usu plurisariam concretis, ad impetiginis formam.*

Tacito,

3. Tacitum, qui *Annalium lib. 4.* inter alias causas secessus Tiberii, recenset non defuisse quoque, *qui crederent in senectute corporis habitum pudori fuisse, quippe illi prægracilis & incurva proceritas, nudus capillo vertex, ulcerosa facies, ac plerumque medicaminibus interstincta.*

4. Eu-

4. Eusebium Pamphili Cæsariensem Episcopum, qui *Histor. Ecclesiastic. lib. 8. cap. 16.* memorat Galerium Maximianum absumptum fuisse abscessu difficili & ulcere fistuloso in mediis occultiorum corporis partium locis, (credo perinæuræ designari) utroque insanabili, & intima viscera depascēte cum incredibili vermium multitudine, & fœtore ita letali ac intolerando, ut Medicorum alii Imperatoris iussu capite damnati fuerint, quod odoris gravitatem sustinere non possent, alii quod nescirent morbo mederi.

5. Demum Palladium, Evagri discipulum, æqualem & amicum & Palladii. Rufini, Episcopum Helenopolitanum, qui in *Historia Lausiacâ, Vita 32.* narrat Eronem quemdam cum gulæ deditus esset & ebrietati, incidisse in cænum fœminæ cupiditatis, & peccasse cum mima congressum, unde divino quodam consilio enatus est ei anthrax in glande, & tempore semestri usque adeo egrotavit, ut ejus virilia venerea computruerint & sua sponte ceciderint; sed illum, cum postea convalescisset, reversum esse ad hoc ut ea sentiret quæ Dei sunt, & venisse in solitudinem hæc omnia confitentem Patribus.

Ex his autem undique corrasis credunt posse evinci fœmineum morbum Scytharum apud Herodotum; maculas, notas & callos Augusti apud Suetonium; ulceroſam faciem Tiberii apud Tacitum; ulcus perinæ sordidum & depascens Galerii apud Eusebium; tandem anthracem Eronis apud Palladium, vel ipsam luem veneream fuisse, vel præcipua saltem luis venereæ symptomata, atque adeo morbum illum Veteribus olim notum fuisse.

Sed hæc omnia ruinoso vel potius nullo stant fundamento: nam 1. Frustra urgetur Herodoti locus, quasi fœmineus ille Scytharum morbus pro gonorrhœa venerea deberet accipi, siquidem jam abunde demonstratum est ab Hieronymo Mercuriali, *Variar. Lectiom. lib. 3. cap. 7.* fœmininum hunc morbum, quem ideo putant impune posse alio detorqueri, quod de ejusdem natura Herodotus fileat, ab Hippocrate ita enucleate expositum esse, *Lib. de aere, aquis & locis*, ut ignorari non possit, *Plurimi Scythæ*, inquit ille, *Eunuchi fiunt, & induti vestem muliebrem muliebria officia obeunt, instarque fœminarum omnia faciunt & loquuntur, vocanturque hi ἀρσενίς*, hoc est effeminati. Et regionis quidem incolæ causam ad Deum referunt, coluntque hos ipsos homines & adorant, sibi ipsis timeantes ne quid tale accidat. Gensebat autem Hippocrates Scythas ad venerem impotentes reddi, seu in fœmininum morbum incidere frequenti festione venarum pone aures, quod an satis recte creditum sit hic non quæro, cum sufficiat annotasse fœmininum illum Scytharum morbum a gonorrhœa venere contracta toto cœlo discrepasse. Cæterumque quæcunque de Scytharum more & usu ab Herodoto & ab Hippocrate traduntur, vigeant hæc eadem ducentis abhinc annis, vigentque etiamnum apud plerosque Americæ populos; unde licet colligere Americanos plerosque

que communem cum Scythis originem habuisse, qua de re vide Joannem de Laet, *De Origine Gentium Americanarum*: sed hæc per transennam.

2. Nulla prorsus ratione assequor, unde conjecturæ locus esse poterit ex laudato Suetonii loco, Augustum lue venerea infectum fuisse, cum Suetonius ipse disertissimis verbis referat *maculas notasque*, quibus in *pelle & alvo* insignitus erat, *genitivas fuisse*, nævos scilicet totidem ab utero materno: *callos vero plurisariam concretos ad impetiginis formam, assiduo & vehementi strigilis usu* inductos fuisse instar duriorum cicatricum, quæ sane nedum luem veneream sapiunt, sed eandem potius excludunt.

3. Neque minus feliciusve videntur abuti Taciti verbis, ut inde colligant Tiberium lue venerea laborasse. Notum sane ex Suetonio, *art. 68.* fuisse Tiberium facie quidem haud inelegante, sed varis sive jonthis deturpata, vel ut ipse Suetonius ait, *facie honesta, in qua tamen crebri & subtiles tumores*. Haud mirum ergo, si ingravescente ætate & aucta humorum acrimonia, vari in guttam rosaceam abierint, seu in pustulosa tubercula, quæ nisi *medicaminibus interstingerentur*, in *ulcerosas* pustulas seu herpetem exulceratum degenerarent, qualis a Tacito describitur. Exstat sane apud Galenum, *Lib. 5. De compositione medicamentorum secundum genera, cap. 12.* unguenti formula ad Herpetas Tiberii Cæsaris olim præscripta, quæ potest & Suetonio, & Tacito fidem facere. Sed ut ad quæstionem revertamur, manifestum est ea, quantacunque supponantur, ad luem veneream nullomodo referri posse.

4. Quod ad locum Eusebii spectat, fatemur ex illo patere Galerium Maximianum mortuum esse ex abscessu & ulcere perinæi sordido, maligno, cacoethe, fistuloso, imo ut videtur, carcinomatode, quod sensim introrsum penetraverit cum fœtore maximo. Sed quid inde? Ulcus venereum fuisse? Minime; neque enim ea consecutio adeo temere admittenda est, cum abscessus, ulcera & carcinomata citra omnem luis suspicionem, & olim genita sint in pudendis, & etiamnum frequenter gignantur: constat nempe morbos istiusmodi a Veteribus describi, qui tamen luem veneream plenissime ignorabant; constat quoque morbos eosdem, licet hac nostra ætate, qua lues venerea in Europa infestos plerosque habet, soleant a veneno venereo sæpe dependere; interdum tamen produci a causa simplici, vel in ipsis genitalibus, haud dispari ratione quam in cæteris corporis partibus.

5. Idem dicendum est de morbo, quo Ero ille apud Palladium laborasse dicitur, & quem ab ulcere venereo diversum fuisse constat. 1. Quod Palladius ipse morbum illum vocet *anthracem*, sive carbunculum, morbi scilicet genus notum & antiquum, cui veretri glans obnoxia esse potest sine ullo contagio venereo; non minus quam reliquæ corporis par-

partes, ut liquet testimonio Joannis Gorræi, *Definition. medic. in verbo Αἰδραξ*. 2. Quod videatur Palladius indicare morbum illum, non solis naturæ legibus, sed *divino quodam consilio* obvenisse: id scilicet de anthrace, morbi genere in glande rariore, nec quod venere vulgo contraheretur, poterat pie credi; at vero nulla ratione finzi potuisset de ulcere venereo, quod in Scottatoribus frequens & quotidianum olim esse debuisset, ut nunc est, si lues venerea olim grassata fuisset, ut nunc grassatur, & quod proinde a speciali Dei providentia arcessere nimis credulum fuisset. 3. Quod Palladius referat Eronem illum *post semestre spatium convalescente*: ea quidem optime quadrant in anthracem, cujus therapeja olim cognita & efficax erat; neutiquam vero in ulcus venereum, quod crediderit nemo curari potuisse, virulque venereum admissum extirpari, eo tempore, quo nec Guajaci nec Mercurii usus notus esset.

III. Denique conantur in partes trahere veteres nonnullos Poetas, quos volunt ad luem veneream alluisse.

1. Horatium, qui *Lib. 1. Od. 37.* temeraria Cleopatraz consilia adversus Romam describens, sic ait:

*Dum Capisolia
Regina dementes ruinas,
Funus & Imperio parabat
Contaminato cum grege turpium
Morbo virorum.*

2. Horatium eundem, a quo *Lib. 1. Satira 5.* dum narrat *Sarmentis scurræ pugnam Messique Cicirri*, quorum posteriori

*Fæda cicatrix
Setosam lævi frontem turpaverat oris,*
dicitur inter alias scurriles inficitias Sarmentus.

3. Juvenalem, qui *Satira 2.* sic in vanum probitatis simulatorem invenitur:

*Castigas turpia, cum sis
Inter Socraticos notissima fossa Cinædos:
Hispida membra quidem, & dura per brachia seta.
Promittunt atrocem animum, sed podice lævi
Cæduntur tumide, Medico ridente, marisæ.*

4. Denique Martialem, qui passim in ficos & ficosos jocatur; sed præsertim *Lib. 1. Epigramm. 66.* ubi sic irridet Cæcilianum quemdam.

*Cum dixi ficos, rides quasi barbara verba.
Es dici ficos, Cæciliane, jubes.*

Dice-

III. Ex
Poetis,
nempe
Horatio,

Juvena-
le,

& Mar-
tiale.

Dicemus ficus, quas scimus in arbore nasci,

Dicemus ficos, Cæciliane, tuos.

Hinc sibi videntur posse colligere apud Horatium tum morbo quo turpes erant Cleopatra æscleæ, tum campano morbo; apud Juvenalem mariscis; demum apud Martialem fisis ipsissimam luem veneream, vel præcipua luis venereæ symptomata debere intelligi.

Sed 1. Frustra torquent priorem Horatii locum, quasi luem veneream intellexisset ille eo morbo, quo Cleopatraz gregem contaminatum, & quo turpes fuisse ait ejusdem æscleæ. Egregia sane conjectatio, quæ luem videat non in Scottatoribus, non in viris, sed in eviratis & Eunuchis: de Eunuchis enim ibi quæstio est, ut fidem facit locus similis, imo ejusdem argumenti, *Epod. 9.* ubi *Romanis militibus* probro vertitur *rugosis Cleopatraz Spadonibus servire*. Allatis itaque versibus Poeta false irridet vanos Reginz dementis furores, quæ ruinas *Capitolio & Imperio* funus pararet, & quæ tanta facinora moliretur *cum grege contaminato*, hoc est impuro, virorum morbo turpium, hoc est virorum morbosorum, seu castratione mutilorum & Eunuchorum, quales in Aulis Regum frequentes erant in Oriente, quales in comitatu Cleopatraz plurimos fuisse certum est, *Epod. 6.* sed qui apud Romanos invisi semper fuere, & ea præsertim ætate. Certe nobiscum facit Commentatorum turba. Demus tamen morbum illum, quo Cleopatraz æscleæ turpes erant, non vitium corporis virilium excisione illatum, sed morbum fuisse proprie dictum; quid inde? An ideo continuo futurum est ut morbus ille lues venerea fuerit? Logi ac meræ nugæ. Quasi vero Cleopatraz Eunuchi obnoxii non fuerint morbis omnibus, quibus cæteri homines subjacent; morbis plurimis spurcissimisque, qui a mutilatione proveniunt; morbis denique non paucis atque turpissimis, qui generari solent muliebri patientia, Spadonibus olim nimis familiari, qui, teste Gregorio Nazianzeno in *Epitaphio Basilii Magni*, *inter viros mulieres erant.*

2. Similiter quantumvis vexent posteriorem locum Horatii, nunquam efficient, ut duo verba, quæ de morbo campano per ridiculum dicuntur; quorum significatio potuit forsitan olim nota esse, sed quæ nunc obscura, incerta, ambigua sunt, & tanto quidem magis, quod nunquam alibi legantur, antiquitatem luis venereæ evincant, in quam pugnant tot evidentiæ rationum argumenta. Desudent, ut lubuerit, Grammatici in eruendo loci sensu: credant alii cum Dionysio Lambino morbum animi ab Horatio exprobari nimis familiarem Campanis, qui habitati sunt ore impuro atque incesto: putent alii cum Lavino Torrentio morbum corporis designari in Campania communem, quem lichenem Græci, impetiginem Latini dicebant; caparum ipse curo, modo liceat cum doctissi-

ma

mo Dacerio concludere meras esse ineptias, si locus ille de lue venerea intelligatur.

3. Multo minus anceps est sensus loci, quem e Juvenale laudant, sed eapropter tanto certior in adversarios Liquet enim vel oscitanti non ideo a Juvenale Medicum subridendum induci, dum tumida mariscæ cæduntur, quod luem veneream inde argueret, de qua ne quidem, sed quod probe intelligeret mariscas ægro muliebri patientia obortas esse, ut ipsa *podicis levitas* satis indicabat. Quocirca Poeta non dedecorosum morbum, ut illi putant, sed turpissimos mores & improbiissimæ nequitiz plenos carmine perstringit.

4. Nec alio sensu accipienda sunt Martialis dicta in ficosos, quos passim infestatur tanquam pathicos & muliebria pati solitos. Hinc ergo profecto concludendum est melioribus auctoritatibus omnino destitui, qui opinionem tam callis conantur statuminare.

CAPUT III.

Diluuntur argumenta cetera, quæ pro stabilienda luis venereæ antiquitate proferuntur.

Primo. Contendunt luem veneream ab Elephantiasi Græcorum, seu Lepra Arabum nullatenus differre, & subelephantiascos aut lepræ nomine olim notam fuisse, adeoque hunc morbum in orbe nostro non re novum esse, cum jam dudum vulgatissimus fuerit, sed solo nomine cum nunc lue venerea infecti dicantur, qui quondam leprosi aut elephantiaci nuncupabantur. Existimant autem huic opinioni suffragari cessationem lepræ, quæ in Europa sub ingressum luis venereæ visa est evanescere; unde putant posse colligere lepram jam ignorari, quia cum lue venerea confunditur, sicut ante lues venerea ignorabatur, quia confundebatur cum lepra.

Sed hæc, quamquam Achillea videantur, mox concidunt, si attendatur.

I. Luem veneream, etsi diceremus cum lepra Arabum & elephantiasi Græcorum eandem esse, ut illi contendunt, inde tanto magis vel hoc ipso nomine in Europa novam censendam esse, cum certum sit ex Historicorum & Medicorum fide lepram ipsammet morbum esse (a) Syriæ & Ægypto endemium, & in Europa nostra novum & alienigenam, in qua bis invaluerit; semel quidem ante Christum natum, (b) advectus scilicet ab exercitu Pompeii Magni, cum post subactas Syriam & Ægyptum in Italiam regredere tur, sed qui tunc brevi cessavit; iterum vero sæculo a Christo nato duodecimo, tempore Expeditionum quæ Religionis causa

Argumentum primum. Luem veneream cum elephantiasi Græcorum seu lepra Arabum eandem esse. Refellitur.

(a) Lucret. De rerum natura, Lib. 6. Galenus. Lib. ad Glauconem 2. cap. 12.

(b) Pli- suscipiebantur, vulgo *Croisades*, ut Terra sancta a Mahummedanorum
 nius, tyrannide liberaretur, qua de re pleni sunt Historicorum recentiorum
 Hist. Na- Libri.
 tur. Lib.
 26, c. 1.

Revera tamen temere nunc objici ab hodiernis Medicis, quibus le-
 pram videre nunquam contigit, luem veneream cum lepra eandem esse,
 quandoquidem unanimi Medicorum testimonio, qui sub ingressum luem
 veneræ vixere, & quibus lepra notissima tunc fuit, constat e contrario
 lepram a lue venerea penitus discrepasse, ut collatis utriusque morbi signis
 & symptomatis evidenter olim probavere, Coradinus Gilinus, in *Opus-
 culo de morbo Gallico*, anno 1497. Nicolaus Leonicens, Vincentinus,
Lib. de Epidemia, quam Itali morbum Gallicum vocant, anno 1497. Gas-
 par Torella, Medicus Alexandri VI. & dein Episcopus Sanctæ Justæ in
 Sardinia, *Consilio* 5, anno 1500. Jacobus Cataneus de Lacu Marcino, Ge-
 nuensis, *Tractat. de Morbo Gallico*, anno 1516. Petrus Maynardus, Vero-
 nensis, *Tractat. 1. de Morbo Gallico*, anno 1518. Joannes Manardus, Ferra-
 riensis, *Epist. 2. de Morbo Gallico*, anno 1533. Aloysius Lobera, Abulanus,
 Medicus Cæsareus, in *Lib. de quatuor aulicis Aegritudinibus* Hispanice scrip-
 to, anno 1534. Petrus Andræas Matthiolus, Senensis, in *Opuscul. de Morbo
 Gallico*, anno 1536. Joannes Baptista Montanus, Veronensis, *Tract. de
 Morbo Gallico*, anno 1550. Antonius Musa Bratsavolus, Ferrariensis, in
Lib. de Morbo Gallico, anno 1552. Gabriel Fallopius, Mutinensis, *Tract.
 de Morbo Gallico, cap. 3.* anno 1560. &c.

III. Quod si oculatorum tot testium auctoritate dubitatio non tollatur
 omnis, quamquam leprosi nunc raro obvii sint, quos cum infectis lue
 venerea liceat conferre, posse tamen a quovis facile colligi luem vene-
 ream a lepra plurimum differre, si signa lepræ omnia, quæ ab Avicenna,
Lib. 4. Fens. 3. Tract. 3. cap. 2. a Gordonio, *Philon. particul. 1. cap. 22.* a Guido-
 ne de Cauliaco, *Magnæ Chirurg. Tract. 6. Doctrin. 1. cap. 2.* & a plerisque an-
 tiquioribus Auctoribus passim recensentur & quæ omnia a Conrado Ges-
 nero in *Examine leproso*rum accuratissime collecta sunt, cum notis luis
 veneræ symptomatis comparentur: inde enim patebit ambos affectus in
 paucis & accidentalibus signis convenire; in multis & essentialibus aper-
 tissime differre.

Sic exempli gratia, juxta Guidonem de Cauliaco, loco laudato, sunt
 sex univoca lepræ signa, nempe „ *Oculorum & aurium rotunditas; Depi-
 latio, & grassities seu tuberositas superciliorum; Dilatatio & tortura navium
 ab extra, cum interiori strictura; Labiorum satiditas, vox rauca ac si cum na-
 ribus loqueretur; Fator anbelius & totius personæ; Aspektus fixus & horribi-
 lis ad modum Satyri.* Equivoca vero sunt sexdecim: Primum, durities &
 tuberositas carnis, specialiter juncturarum & extremorum; Secundum, „

color morpheatus & tenebrosus; Tertium, casus capillorum & renascitio subtilium; Quartum, consumptio mulculorum, præcipue pollicis; Quintum, insensibilitas & stupor, atque crampa extremorum; Sextum, scabies & impetigines, gutta rosa & ulcerationes in corpore; Septimum, grana sub lingua, sub palpebris & retro aures; Octavum, ardores & puncturæ acuum, in corpore sensibilitas; Nonum, cutis eorum ad aerem ad modum anseris displumatæ crispitudo; Decimum, quando projicitur aqua super ipsos, videntur unctui; Undecimum, raro febricitant; Duodecimum, sunt astuti & dolosi, furiosi, & nimis se ingerere volunt super populum; Decimum tertium, habent somnia ponderosa & gravia; Decimum quartum, habent pulsum debilem; Decimum quintum, habent nigrum sanguinem, plumbeum & tenebrosum, cinerulentum, arenosum & thrombosum; Decimum sextum, habent urinas lividas, albas, subtiles & cinerofas.

Inter hæc reperies quidem varias cutis affectiones, quarum proxime similes in Syphiliticis aliquando observantur; sed reperies nunquam gonorrhœas, ulcuscula balani, inguinum bubones, exostoses, hyperostoses, &c. quæ in lue venerea, si non essentialia, saltem frequentissima sunt; reperies numquam genitales partes præ cæteris male habitas fuisse in leprosis, quod tamen in lue venerea perpetuum est; sicut vicissim nec reperies quoque in Syphiliticis stuporem illum aut sensus amissionem in extremis, quæ elephantiacorum propria est, & unde venit in consuetudinem proverbii, ut in eos qui sensum rerum non habent, obijciatur *ipso non magis sentire quam leproso*.

IV. Elephantiasim, lueque veneream, non natura modo, sed etiam causa & therapeja inter se discrepavisse. Illam sine contagio ullo, sed solo diætæ errore plerumque contractam fuisse Medici omnes prisca uno ore testati sunt; hanc contra diætæ vitio numquam produci constar, sed sola contagione propagari. Illam Medici omnes, si confirmata esset, incurabilem esse statuerunt; hanc contra etiam confirmatam curari posse certum est. Illam adhibitis mercurialibus exasperari & ingravescere, curari vero minime experientia compertum fuit; hanc contra mercurialium usu semper mitigari, ac si legitima fuerit mercurii administratio, radicitus extirpari certo certius est, quæ sane abunde arguunt causam, naturam, indolem plane dissimilem.

V. Proinde minime mirum videri, si antiquiores illi Medici, qui morbi venerei primordia viderunt, etsi probe nossent remedia omnia, quæ leprosis conducebant, & quæ in Libris Medicorum Græcorum, Arabumve obvia erant, ita tamen ignoraverint, ut ipsi consentiant, curatorem methodum, quæ morbo de novo ingruenti competeret, ut quo se

ver-

verterent diu nescii & ancipites nova auxilia atque pharmaca investigare necessum habuerint, a remediis lepræ plane diversa: qua de re consule Gasparem Torellam, *Tract. de Doloze in Pudendagra*, anno 1500. Wendelinum Hock de Brackenaw, *Oper. de Morb. Gallic. cap. 1.* anno 1514. Ulrichum de Hutten, *Tract. de Morb. Gallic. curatione per administrat. lign. Guaiaci*, anno 1519. Joannem de Vigo, *Genueensem, Practic. Chirurg. Lib. 3. cap. 1.* anno 1513. Laurentium Phrisium, *Opusc. de Morbo Gallico, cap. 1.* anno 1532. Gonsalvum Fernandez de Oviedo, *Lib. 11. Histor. natural. & general. Indiarum Occidentalium*, Hispanice scriptæ, *cap. 14.* anno 1535. Gabrielem Fallopium, *Tract. de Morbo Gallico, cap. 20.* anno 1560.

VI. Inde itaque patere, cur leprosi tanto studio abstinerint ab usu cum iis, qui lue venerea inficiebantur, teste Laurentio Phrisio, *loco supra citato*, ubi refert *ingruisse tum miram tumultuationem in plebe, quod leprosi volebant habitare cum hoc morbo (venereo) infectis*. Unde colligitur leprosos pro persuasissimo habuisse novam hanc affectionem a lepra, qua ipsi jam ægrotabant, omnino differre, atque adeo posse se, si cum illis contubernio uterentur, novo morbo contaminari. Et sane ideo Syphiliticos, cum Decretis Senatus Parisiensis in ipsis luis venereæ primordiis a sanorum commercio arcebantur, visum fuit ad ædes ære multo conductas ablegare, non vero ad elephantiacorum nosocomia, vulgo *Maladeries & Leproseries*, quæ tamen multa præsto aderant, scilicet ne leprosis infectione coinquinatis morbus morbo adderetur; qua de re plura infra *cap. 13.*

VII. Demum nullo fundamento affirmari lepram in Europa sub ipsum lue venereæ ingressum derepente evanuisse, ut inde liceat concludere lepram cum lue venerea seu Gallica nomen tunc temporis commutasse. Siquidem contrarium liquet ex certissimis Medicorum monumentis, quæ testantur toto sæculo decimo sexto lepram in Europa frequentem fuisse. Fatemur quidem jam ab ipso sæculo decimo quinto lepram debilius sævisse, & mitigata sensim ferocia ita extenuatam fuisse per sæculum sextum decimum, ut tandem penitus evanuisse videatur initio præteriti sæculi. Sed quid tum? Id nempe commune habuit cum morbis plurimis in Europa nostra adventitiis, qui ibidem sensim habescunt & languent, dum cessant. Sic prius lepra ipsamet jam cessaverat in Italia tempore Pompeii Magni, teste Plinio, *Histor. natural. Lib. 26. cap. 1.* & quidem citius, quia tunc paucior fuerat numerus infectorum. Sic (a) restinctus est morbus ille, quem Genuensem appellavere Prisci, inter digitos pedum nascens, oblitterato etiam nomine. Sic ignis ille sacer sancti Antonii, sive ardentium morbus, qui olim nono & decimo sæculo tanta strage in Galliis grassatus est; sic sudatoria febris, quæ

(a) Plin.
ibid.

An-

Angliam toties vastavit, jam pridem evanuer. Sic luem veneream ipsam tandem aliquando cessatura ire confidimus, nec inani forsan conjectura, ut probabitur infra.

Cæterum quibus de causis affectiones novæ nunc irrepant, nunc vero desinant, difficilis est & perobscura quæstio, quam pro modulo explicandam aggressi sumus, in Tractatu Gallice scripto, *De l'Origine des Maladies Epidemiques, & principalement de l'origine de la Peste, où l'on explique les causes de la propagation & de la cessation de cette maladie*, quem adeat, qui plura volet; hæc enim non sunt hujus loci.

Secundo. Obijciunt luem veneream sponte oriri ex venere vulgivaga & pandemia, quoties scilicet mulier etiam sana cum plurimis viris, qui ipsi quoque sani sunt, promiscue concumbit. Inde nempe semina diversa misceri in utero, ibi pro innata partium heterogeneitate, loci calore & uligine fermentari, putrescere, corrumpi & in virosum liquamen converti, contagii venerei haud dissimile; imo vero cum contagio venereo plane idem; unde inferunt luem veneream non antiquam modo, sed mundo fere eozvam esse, cum a mundo fere condito homines vagis libidinibus semper dediti fuerint, cum scemina plurimæ tentigine vulvæ quasi æstro pericitz plurium virorum amplexibus se prostiterint, saltem cum numquam defecerint scorta diobolaria.

Argumentum
alterum
Luem
veneream
sponte
oriri
ex vene-
re vulgi-
vaga.

Quæ permixerunt Calones atque Caballi.

Sed vanissima est hæc arguendi ratio. 1. Id sibi assumunt confidentissimi, me luem veneream natam olim esse, & quotidie nasci ac pullulare pura etiam venere, si vaga sit, hoc est si plures viri sani cum eadem muliere etiam sana corpora misceant, quasi scilicet experimento certo id didicissent, quasi quotidiano usu compertum haberent. At hæc nec ulla stant auctoritate idonea, nec ulla experientia unquam confirmata fuere. Ruit ergo conclusio de antiquitate luis veneræ, quæ tam infirmo fundamento tota nititur, & abit in merum sophisma, quod Logici dicunt *a petitione principii*, seu *ignoratione elenchi*.

Horat.
Sermon.
Lib. 1.
Satira 3.
Resellit-
tur.

2. Multo potiore jure nobis licet inverso propositionum ordine conclusionem directe contrariam elicere. Fuere nempe olim scemina impurissimæ libidinis, quæ licet plurium virorum concubitus pertulerint, lassari quidem, sed satiari non potuerunt, fuere lupanaria plurima, ubi mercenariæ stipis ancillæ obvis quibuscumque sui copiam facerent. Numquam tamen legimus veneream luem olim observatam fuisse. Ergo colligendum est veneream luem vulgivaga venere, modo pura fuerit, numquam generari, ac proinde sceminam, quæ bene valeat, morbo alio quocunque placuerit; lue vero venerea numquam posse affici, quamquam virorum plurimorum concubitu sese permittat frequentissime, modo ipsi quoque valeant.

3. Fovit olim Aurelius Minadous, Rhodiginus, opinionem prima facie ab ea quam refellimus haud abfimilem, in *Tractatu de virulentia venerea*, Venetiis edito anno 1596. ubi tradit *cap. 29.* hanc virulentiam ex scædissimis impurissimarum meretricum uteris primum erupisse, commixtis ibi & putrescentibus seminibus diversis. Nam, inquit ille, *sicut unus cibus sano ventriculo sanitatis est causa, varietas vero ciborum ventriculum premit, & acres ac nidores excrementaque pessima congeris, ita semen unum utero familiare & sanum est, & fecunditatem promovet; contra multitudo & varietas seminum unicum uterum ita afficit, ut prava, imo pessima excrementa sui corruptione producat.*

At vero cum ille probe intelligeret vagas libidines antiquitus semper viguisse, attamen luem veneream numquam observatam fuisse ante annum 1494. sententiam suam non de quibusvis mulieribus accipiendam esse ipse monuit, sed de *Indicis solum, quæ mediantibus celo, aere, aquis & locis illis ex peculiari vietus forma, & actionum suarum sordidæ atque impura materie, contrahunt, vel rectius sibi adgenerant hoc venenum, quod deinde ad nos delatum est tempore Columbi, & mediantibus exercitiis Hispanis & Gallis per contagium serpsit:* quæ, ut liquet, non in nos, sed nobiscum faciunt.

Argu-
mentum
tertium,
Ductum
a morbo
canibus
familiari.

Tertio. Tandem opponunt exemplum morbi in canibus frequentis: nempe familiare est canibus, cum ad senium vergunt, potissimum in calidioribus Provinciis, & æstivo tempore, scabie scæda & quæ herpeti miliari congener est, affici, qua non modo cutis eroditur & exasperatur, sed etiam pilorum defluvium sive alopecia infertur. Solet plerumque una conjungi multiplex ulcusculorum progerminatio in genitalibus cum manifesto tumore, qui phimosis in maribus refert. Jam autem volunt hunc morbum, qui canibus semper infestus fuit, a lue venerea, quæ homines inficit, non differre; quod tanto potiore jure videntur sibi posse assumere, quod mercurialis unguenti illitu pari successu curetur ac ipsa lues venerea; unde colligunt luem veneream in hominibus æque antiquam esse ac memoratum affectum in canibus, adeoque utrumque morbum utrique animalium generi cœvum.

Refelli-
tur.

Sed hæc omnia meræ sunt argutiæ, cum liquido constet scabiem hanc caninam cum lue venerea nullomodo convenire.

Nam 1. Scabies illa canibus sponte accidit ex naturali vitio, quo eorum sanguis ex se acrior inquinatur, sine ullo contagio extrinsecus inducto, saltem sine prævia cum aliis canibus copulatione, ut non semel observavi.

2. Scabies illa copulatione non traducitur; alioquin jam universum genus caninum tali labe inquinatum foret, cum canes ita vaga utantur venere, ut debeant morbos quoscunque patiantur cito invicem communicare, si ea ratione cum cæteris communicari possint.

3. Sca-

3. Scabies illa sponte plerumque celsat sine remediis sola tempestatis aut nutritionis mutatione, ut experientia compertum est, quæ singula abunde demonstrant hanc canum scabiem a lue venerea hominum absolute disparem esse.

4. Demum neque in contrarium quidquam potest argui vel ex eruptione ulcerum in genitalibus canum scabidorum, cum experientia notum sit, ne in hominibus quidem pudendorum ulcera perpetuo virulenta & venerea esse; vel ex curatione morbi illitu mercurialis unguenti, cum certo certius sit mercurium mederi plurimis affectibus a lue venerea plane diversis, & scabiei præsertim contumacissimæ, ad quam curandam mercurium adhibere quotidianum est.

CAPUT IV.

Luem veneream ab anno 1494. ad annum 1496. Europæ primum innotuisse.

CAROLUS Octavus Francorum Rex arma movit in Italiam mense Augusto anni 1494. & feliciter peragratis Insubria, Etruria, Statuque Ecclesiastico, invasit mense Februario anni insequentis Regnum Neapolitanum, quod hereditario jure sibi vindicabat. Inde digressus sub finem mensis Maji, & pugna superatis ad Forum novum mente Julio hostilibus Venetorum copiis, in Gallias gloriose rediit mense Octobri anni 1495. Gilbertus Dux Montispenferii, e stirpe regia, qui cum præsidio 6000. militum relictus fuerat, Regnum sub ditione retinere conatus est, quandiu vixit; sed tandem Galli post illius obitum in partes distracti, Neapolitanorum perfidia proditi, & Arragonensium copiis, quæ a Sicilia transfretaverant, pulsî, Regno decedere coacti sunt ad finem anni 1496.

Carolus VIII. Francorum Rex Regnum Neapolitanum armis invasit ann. 1494.

Hac epocha luem veneream Europæ primum innotuisse constans fama est, nec inani sane fundamento, cui hac de re consentientes habemus Scriptores Medicos omnes, qui in Italia eo tempore vixerunt & de primis morbi natalibus scripserunt. Igitur ut difficilis & agitata diu questio certo & æquo judicio tandem dirimatur, satis est si potissima illorum testimonia nude congeramus ex Chronologiæ ordine, ut inde manifeste liquet, 1. Luem veneream eo tempore in Italia primum apparuisse, unde in cæteras Europæ regiones brevi disseminata sit. 2. Morbum hunc ab antiquis quibuscumque morbis disparem, a nemine tunc cognitum fuisse. 3. Imo contra Medicos morbi novitate percussos, & remediorum, quæ in similibus affectibus usui esse solebant, inefficaciam expertos, quo se verterent plane nescivisse, & tam diræ luis curationem Circulatoribus & Empiricis aliquandiu permisisse.

Quo tempore Luem veneream in Europa primum innotuit.

1. Coradinus Gilinus, Artium & Medicinæ Doctor, in *Opusculo de Testibus Mor.*

Coradino
Gilino .
1497.

Morbo Gallico, quod ad Sigismundum Ducem Estensem, Herculis I. Ducis Ferrariensis filium scribebat, sic præfatus: "Cum anno elapso 1496. morbus quidam sævissimus mortales quamplurimos invaserit tam in Italia, quam etiam ultra montes, hunc Itali morbum Gallicum appellant, Neapolitanum morbum nominant, eo quod in Italia, & maxime Neapoli se hac truculenta peste affectos esse dicant; vel quia iste morbus tempore transitus Gallorum citra montes in Italia visus est. Et quia hic morbus apud Modernos INCOGNITUS est, varizque de eo disceptationes inter Physicos (Medicos) habitæ fuerunt & habentur, decrevi aliquid de eo pro exiguis ingenioli mei viribus scribere, quam brevissime poterò.

Nicolaus
Leonice-
no.
1427.

II. Nicolaus Leoniceus, Vincentinus, Professor Medicus Ferrariensis celeberrimus Medicinæ Græcæ instaurator, in Libello *De Morbo Gallico*, quem ad Joannem Franciscum Mirandulensem Concordiæ Comitem, scripsit anno 1497. probat statim *novos Italia advenisse morbos prioribus sæculis ignotos*, exemplo Lichenum, quos ante Claudii Principatum incognitos fuisse testatur Plinius, *Historiæ naturalis Lib. 26.* Inde vero sic pergit: Simile quoddam hoc nostro ævo accidit, jam enim INSOLITÆ naturæ morbus Italiam & multas alias regiones invasit. ... Huic tamen morbo nondum nostri temporis Medici verum nomen impoluerunt, sed vulgato nomine morbum Gallicum vocant, quasi ejus contagio a Gallis in Italiam importato, aut eodem tempore & morbo ipso & Gallorum armis Italia infestata Ego cogor existimare (neque mihi potest in captum mentis aliter pervenire) natam hanc repente luem nostram ita infecisse ætatem, ut NULLAM superiorem.

Gaspare
Torella.
1500.

III. Gaspar Torella, Valentinus apud Hispanos, Alexandri VI. Summi Pontificis, Cæsarisque Borgiæ ejusdem filii olim Medicus, tunc vero ab annis decem Episcopus Sanctæ Justæ in Sardinia, sic loquebatur in Tractatu *De Dolo in Pudendagra*, scripto anno 1500. "Gallis manu forti Italiam ingredientibus, & maxime Regno Parthenopæo occupato, & ibi commorantibus, hic morbus detectus fuit. Idcirco ab Italis morbus Gallicus cognominatus fuit, arbitrantibus ipsum Gallis connaturalem esse. In Gallia vero, quia in reversione Regis Caroli cum suis in Galliam hic morbus apparere incepit, credentes Galli se eum ex Neapoli apportasse, hanc ob causam morbum Neapolitanum vocarunt Et cum nostris temporibus talis monstruosa ægritudo a NULLO fuerit visa, idcirco a nullo quantumcunque perito, experto, & senio confecto canonice & recte curari poterat. Addiderunt medius fidius calcaria equo sponte currenti rudes, pertinaces, illiterati, & ut ita loquar vulgus, qui totis viribus conabantur publice prædicare & asserere scientiam Medicinæ esse vanam seu imperfectam, eo quia huic ægritudini nullus opitulabatur.

tur... Et non sine causa hoc divulgabant eo quia litterati ab hac cura "fugebant, in hoc morbo se nihil scire confidendo, quare aromatarii, "herbarum collectores, ceterique mechanici ac vagabundi & impostores his temporibus hujus morbi veros & perfecte curatores se ipsos esse "profitentur."

IV. Joannes de Vigo, Genuensis, seu potius *Rapalligena*, in ditione Genuensi, Chirurgus Julii II. summi Pontificis, in *Practica Chirurgica*, quam *capiosam dixit*, & cui scribendæ incubuit ab anno 1503. ad annum usque 1513. sic ait *Lib. 3. cap. 1.* "Anno 1494. de mense Decembris, quo anno Serenissimus ille Carolus Francorum Rex, magna comitante ca- "terva, versus Italiz partes iter accepit; ad Regnum Neapolitanum re- "cuperandum, apparuit utique eodem anno quoddam morbi genus quasi "per totam Italiam INCOGNITÆ naturæ, quem variis & diversis no- "minibus diversæ Nationes appellarunt.... Pro ejus curatione operæ "pretium fuit nova auxilia & pharmaca indagare: & in rei veritate si "quid salutis inventum fuerit in isto morbo, fuit potius ex novis experi- "mentis, quam ex antiquis auxiliis ratione & auctoritate multoties in "eorum scripturis approbatis."

Joanne
deVigo.
1503.

V. Antonius Benivenius, Florentinus, in *Libro de abditis rerum causis*, Florentiæ excuso anno 1507. hæc habet de ortu luis venere: "NOVUM morbi genus anno salutis nonagesimo sexto supra mille quadringentos a "Christiana salute, non solum Italiam, sed fere totam Europam irrepfit. "Hoc ab Hispania incipiens, per Italiam ipsam primum, tum Galliam, "cæteralque Europæ Provincias late diffusum mortales quamplurimos "occupavit."

Antonio
Benive-
nio.
1507.

VI. Wendelinus Hock de Brackennav, Artium & Medicinæ in Gymnasio Bononiensi Professor, in Opere *De Morbo Gallico*, cap. 1. hæc habet: "Sic etiam in Medicina contingit, quod per admirationem alicujus ægritudinis nobis ignotæ pervenire possumus ad cognitionem ipsius. Sicut "evenit hoc tempore, scilicet ab anno Domini 1494. usque ad præsentem "annum 1514. quo morbus quidam contagiosus, qui Gallicus appellatur, "satis efferebuit.... De hoc morbo, aut de causa ejus efficiente, formali, "ac materiali NEC Antiqui, NEC Moderni certam cognitionem dede- "runt, nec de nomine & quidditate ejus aliquid veridice dixerunt aut "scripserunt... Et non sine causa etiam litterati (sicut isti temporibus "a Doctoribus sæpe videmus) ab hoc crudeli morbo fugiunt, se nihil "scire confidendo. Quare aromatarii, herbarum collectores, ceterique "mechanici, ac vagabundi, & trufatores (ut ita loquar) hujus morbi "veros & perfectos curatores seipsos esse profitentur."

Wende-
lino
Hock de
Bracke-
nav.
1514.

VII. Jacobus Casaneus de Lacu Marcino, Genuensis, in Tractatu *De Morbo Gallico*, circa annum 1516. conscripto, cap. 1. sic narrat luis vene-

Jacobo
Catanéo
de La-
cu Mar-

cino. rez ingrefsum. „ Anno virginei partus 1494. invadente Carolo Octavo
1516. „ Francorum Rege Regnum Parthenopæum, Alexandro vero Sexto &
„ tempeftate fumum Pontificatum gerente, exortus eft in Italia mon-
„ ftuofus morbus, NULLIS ante ſæculis viſus, totoque in orbe terra-
rum INCOGNITUS.

Petro „ VIII. Petrus Maynardus, Veronenſis, Tractatus duos de Morbo Gat-
Maynar- lico conſcripſit circa annum 1518. in quorum priore, *cap. 1.* ſic ait :
do. 1518. „ Hoc noſtro tempore detectus quidam morbus epidemialis ſive fatalis
„ ... Apud homines Gallicus appellatur, quoniam de eo NULLA eſt me-
„ moria, niſi ex quo Carolus Francorum Rex cum ſuo exercitu in Ita-
„ liam ſe contulit, anno ſcilicet virginei partus 1496.

Ulricho „ IX. Ulrichus de Hutten, Eques Germanus, cum lue venerea infectus,
de Hut- & vulgarem ſui temporis curationem undecies intra novem annos incaſ-
ten. ſum expertus, tandem uſu ligni Guiaci perfectæ ſanitati reſtitutus eſſet
1519. circa annum 1519. eruditum Tractatum *De Morbi Gallici Curatione per ad-
miniſtrationem ligni Guiaci* conſcripſit hoc eodem anno ad Albertum Bran-
„ deburgenſem, S. R. E. Cardinalem, Moguntinum & Magdeburgen-
ſem Archiepiſcopum & Electorem, in quo ſequentia legere eſt *cap. 1.*
„ Viſum Deo eſt & noſtra ætate morbos oriri Majoribus, ut exiſtimare
„ licet, INCOGNITOS. Annus fuit a Chriſto nato poſt milleſimum &
„ quadringentefimum nonageſimus tertius aut circa, cum irrepiſt peſti-
„ ferum malum, non in Gallia quidem, ſed apud Neapolim primum :
„ Nomen vero inde fortitum eſt, quod in Gallorum exercitu, qui illic
„ Caroli Regis ſui auſpiciis belligerabat, apparuit prius quam uſquam
„ alibi Medici fugiebant ejus porro aſpectum, nedum contactu ab-
„ ſtinebant, ut morbi præterea nullius. (Et *cap. 2.*) Hoc præcipue in
„ morbo quantum noſtra ætate labore Medicinæ compertum eſt, ſile-
„ lebant ab ejus ortu totum in Germania biennium Medici. ... Demum
„ c. 4. In hac Medicorum conſternatione, his erroribus ingeſſerunt ſe
„ Chirurgici manum admolientes.

Lauren- „ X. Laurentius Phriſius, Germanus, in Opusculo *De Morbo Gallico*,
tio Phri- quod Baſileæ editum fuit anno 1532. ſic ait *cap. 1.* „ Anno Chriſti Salva-
ſio. toris noſtri 1496. eſſerbuit quidam morbus atrociffimus, irruens in ho-
1532. „ mines ſævo morſu ulcerum, glandularum & duriffimorum dolorum,
„ adeo notabili cruciatu, quod ſinguli videntes obſtupere : nam INCO-
„ GNITUS & INVISUS erat iſte peſtifer morbus non tantum vulgo,
„ verum etiam Doctis & in ſacra Medicina eruditis Pauperes hoc ma-
„ lo laborantes expellebantur ab hominum converſatione tanquam pu-
„ rulentum cadaver, dereliſti a Medicis, (qui ſe nolebant in tromittere
„ in curam tam ſpeculando & conſulendo, quam viſitando.) Habitabant
„ in arvis & ſylvis. Quum igitur homines in tantum diſcederent ab illis

mi-

miseris, attamen Sublimis & Gloriosus nolens derelinquere illos, quos „ suo pretioso sanguine diraque morte redemit, misit ex Gallia & Nea- „ poli nonnullos Empiricos vel Medicos, qui potius temeraria audacia „ quam industria cœperunt curare homines hoc malo laborantes.

XI. Petrus Andræas Matthiolus, Senensis, in Opusculo sive Dialogo *De Morbo Gallico*, circa annum 1536. conscripto, asserit diseritis verbis „ Deum memoria patrum, ut incitrænata mortalium luxuriam debitis afficeret pœnis, aut propofitis contineret suppliciis, morbo, qui Gallicus „ vocatur, Italiam bellorum procellis concussam confecisse, qui postea „ contagione vulgatus est. . . . *Et paulo infra*: Hoc unum scias, inquit „ ante Caroli Francorum Regis adventum, nec morbum NOVISSE Ita- „ liam, nec nomen AUDIVISSE. „

XII. Alphonfus Ferrius, Neapolitanus, Artium & Medicinæ Doctor, Alphon-
fo Ferrio. 1539.
Medicus Pauli III. summi Pontificis, in Tractatu *De Morbo Gallico*, & *ligni sancti natura*, usuque multiplici, Parisiis edito anno 1539. sic diserit *Lib. 3. cap. 1.* „ De morbo, quem Gallicum appellant, NEMINEM ex antiquis Scriptoribus aliquid in specie atoma scripsisse comperio. In ge- „ nere vero nonnullos ex Veteribus recentiores autumant aliquid artigis- „ se conjectura quadam, non quod res ita se habeat. . . . Sed crucient se „ juniores quantumlibet in interpretanda nominis significatione, ac verbi „ vim, quatenus pro eis facit, interpretentur, NEMO tamen speciale „ capitulum de ejus morbi genere editum demonstrabit. „

XIII. Hieronymus Fracastorius, Veronensis, *Lib. 2. De Morbis conta- Hierony-
mo Fra-
castorio. 1549.*
giosis, cap. 1. typis excusulo Venetiis anno 1549. hæc proponit de Syphi- lide: „ NOVUM & diu orbe nostro INCOGNITUM morbum inter „ alia miranda nostra tempestas vidit, qui Europam fere omnem, Asiæ „ vero atque Africæ partem non parvam occupavit: In Italia vero fere iis „ temporibus erupit, quibus Galli sub Rege Carolo Regnum Neapolita- „ num occupavere, annos circiter decem ante 1500. „

XIV. Antonius Musa Brassavolus, Ferrariensis, initio *Libri de Morbo Antonio
Musa
Brassavo-
lo. 1553.*
Gallico, qui Venetiis excusus fuit anno 1553. enarrata vulgari Historia de ortu luis veneræ, cum Carolus Octavus Francorum Rex Regnum Nea- politanum armis invaderet anno 1495. in hæc demum verba concludit: „ Res vero summa est lucem hanc TUNC cœpisse, cum Galli Italiam in- „ festarunt, & Carolus Octavus Francorum Rex Neapolim sub ditionem „ posuit. „

XV. Joannes Sylvius, Insulensis apud Belgas, in Tractatu *De Morbo Joanne
Sylvio. 1556.*
Gallico, quem ab ipso conscriptum esse constat anno 1556. confutatis variis opinionibus, fatetur, „ Saniorem ipsi videri eorum sententiam, qui anno abhinc sexagesimo secundo (*hoc est anno 1494*) quo tem- „ pore Carolus Octavus Gallorum Rex, cognomine Gibbosus, Neapolim „

„ opugnaturus in Italiam exercitum introduxit, hunc morbum suppul-
 „ lulasse arbitrati sunt.

Gabiele
 Fallopio.
 1560.

XVI. Gabriel Fallopius, Mutinensis, in *Traſtatu De Morbo Gallico*, quem conſcribebat circa annum 1560. prolatis in *primo capite* exemplis variis morborum, qui orbi noſtro de novo incubuere, ſic inde pergit,
 „ Noviffimum eſt, quod præ manibus habemus, & morbum Gallicum
 „ ſeu Gallicam ſcabiem appellamus..... Nec dubitandum eſt ſi novus
 „ ſit necne, quoniam temporibus noſtrorum patrum NONDUM reper-
 „ tus NONDUM auditus, tunc temporis elephantia graſſabatur.....
 „ Hæc ſcabies invaſit nos anno 94. ſupra 1400. cum Carolus Imperator
 „ ſummæ auctoritatis atque ingenii ardentiffimi, (Imperatorem voco
 „ exercitus Ducem) cum glifceret animus ejus in bellum convocato
 „ eo anno maximo exercitu invaſit Italiam, & ſub ejus imperio ſubaſto
 „ Mediolanenſi Ducatu, Hetruria tota, & cedentibus Rebulpublicis Flo-
 „ rentinis, &c. Romam invaſit; inde Neapolim, de jure hæreditario ſi-
 „ bi putans competere, cum exercitu maximo octuaginta mille militum
 „ aggredi tentavit. Tunc temporis apparuit hic morbus.

Aliifque
 Numero
 multis.

Sed quid opus eſt in re manifeſta plura cumulare teſtimonia? Pote-
 runt, ſi lubeat, conſuli Leonardus Schmai, Salisburgenſis, *Traſt. De*
Morbo Gallico, cap. 1. Nicolaus Maſſa, Venetus, *Lib. De Morbo Gallico,*
Traſt. 1. cap. 1. Antonius Gallus, *Oper. de ligno ſanſto non permifcendo, c.*
1. Aloyſius Lobera, Abulanus, Medicus Caroli V. Imperatoris, *Lib. De*
quatuor aulicis agri tudinibus. Joannes Baptiſta Montanus, Veronenſis,
Traſtat. de Morbo Gallico, cap. 1. Leonardus Fuchſius, Germanus, in *Ap-*
pendice ad Lib. 5. De curandi ratione. Proſperus Borgarutius, Paravinus,
Meibod. De Morbo Gallico, cap. 1. Nicolaus Macchellus, Mutinenſis,
 initio *Traſtatus De Morbo Gallico.* Alexander Trajanus Petronius, *De Mor-*
bo Gallico, Lib. 1. cap. 1. Demum Guillelmus Rondeletius, in Schola
 Monſpelienſi Profeſſor regius & Cancellarius, initio *Lib. De Morbo Ita-*
lico, qui ab ineunte ſæculo decimo ſexto ad annum 1566. ſcripfere om-
 nes, ac omnes uno ore referunt luem veneream & NOVUM in Europa
 morbum eſſe, & cum apparuit deſinente decimo quinto ſæculo coætaneis
 Medicis plane IGNOTUM fuiſſe.

C A P U T V.

Expenduntur loca aliquot Medicorum Cbirurgorumve anno 1494. antiquio-
rum, quæ allatæ epochæ videntur contradicere.

CUM loca omnia, quotquot ex variis Auctoribus corradi ſolent, ut
 probetur luem veneream data epocha antiquiorem eſſe, ſimillima
 vel potius plane eadem ſint, ea ſimul colligere viſum eſt, ut in reſpon-
 den-

dendo tautologiæ tædium effugeremus. Inde sane nullus dabitur adversariis querendi locus, cum si quid auctoritates illæ valeant, inde tanto magis valituræ sint luce mutuo collata.

Harumce auctoritatum aliarum quidem dudum notæ sunt, & apud Scriptores plerosque, qui luis veneræ antiquitati favent, passim obviæ; aliarum vero novæ & a Guillelmo Becketto, Chirurgo Londinensi, qui nuperimus est ejusdem opinionis propugnator, recens objectæ. Ideo ne quid dolo malo confudisse vel omisisse videremur, placuit auctoritates illas utriusque generis separatim, articulatim, distincte proponere, propositasque diluere: priores isto, posteriores vero sequente capite.

Multi sunt Scriptores, quos in luis veneræ novitatem militare vulgo obicitur.

Oppo-
nuntur
loca va-
ria ex va-
riis Au-
ctoribus
excerpta,
qui ante
annum
1494. vi-
xerunt.

Guillel-
mo de
Saliceto.
1270.

I. Guillelmus de Saliceto, Placentinus Medicus, *Chirurgia Lib. 1. cap. 42. De Apostemate in inguinibus. Hæc agritudo*, inquit, *vocatur bubo vel dragencelli inguinis, vel apostema inguinis, & ut plurimum fit ex materia frigida, quæ ab hepate expellitur ad loca illa, quæ debilia, vacua; & aliquando ex materia calida; & aliquando cum accidis homini in virga corruptio propter concubium cum sæda muliere, aut ob aliam causam. Itaque corruptio multiplicatur & retinetur in virga, unde non potest natura mundificare virgam aut locum, primo propter multam plicaturam partium illarum & propter strictam viam illius loci, unde redit & regurgitat materia ad locum inguinum propter habilitatem loci illius ad recipiendum superfluitatem quamlibet, & propter affinitatem quam habent hæc loca ad virgam.*

Idem agit ibidem cap. 48. *De Pustulis albis vel rubeis, & de milio, & de scissuris & de corruptionibus vel hujusmodi, quæ sunt in virga vel circa præputium propter coitum cum sæda muliere, aut cum meretrice, aut ab alia causa.*

II. Lanfrancus Mediolanensis, Medicinæ Doctor, *Practica seu Artis complete Chirurgia Tract. 3. Doctrin. 2. cap. 11. ait sæpe provenire apostema in* Franco. *inguine propter ulcera virgæ & pedum, propterea quod locus est descensus humorum ad illa loca, & tunc non est ita timendum, propterea quod venire tunc potest sine multa corporis plenitudine, & absque eo quod decursus humorum maxime ibi fiat; Ibidem Tractat. 3. Doctrin. 3. cap. 11. De fici & cancro & ulcere in virga virili. Ficus, inquit idem, est quedam excrementia, quæ nascitur supra præputium virgæ, & aliquando super caput, quæ quidem aliquando est mollis, ut de plegmatica generata materia, aliquando dura, ut de melancholica, quæ si corrumpatur transit in cancerum. Cancer fit in virga, sicut in aliis diximus fieri membris: ulcera veniunt ex pustulis calidis virgæ supervenientibus, quæ postea crepantur; vel ex acutis humoribus locum ulcerantibus; vel ex commistione cum sæda muliere, quæ cum agro talem habente morbum de novo cojerat.*

Lan-
franco.
1290.

Bernar-
do Gor-
donio.
1300.

III. Bernardus Gordonius, in Universitate Monspeliensi Medicinæ Professor, *Lilii Medicinæ Particul. 7. cap. 5. De Passionibus virgæ.* *Passiones virgæ*, inquit, sunt multæ, sicut sunt apostemata, ulcerationes, cancri, inflatio, dolor, pruritus. *Causæ sunt exteriores aut interiores.* Exteriores, sicut casus, percussio, & jacere cum muliere cujus matrix est immunda, plena sanie, aut virutanta, aut ventositate & similibus corruptis. Si autem causa fuerit intrinseca, tunc sunt sicut humores corrupti & mali descendentes ad virgam & ad partes inferiores, inducentes prædictas passiones.

Joanne
de Gad-
desden.
1310.

IV. Joannes de Gaddesden, Chirurgus Anglicus, in *Rosa Anglica cap. De cura ulcerum virgæ.* Ulcera, inquit, virgæ viriliter contingunt vel ex coitu cum juvencula, vel ex coitu cum menstruata, vel ex retentione urinæ & spermatis.

Guidone
de Cau-
liaco.
1360.

V. Guido de Cauliaco, Gabalitanus, Chirurgiæ & Medicinæ Doctor in Universitate Monspeliensi, in *Chirurgia magna Tract. 6. Doctrin. 2. cap. 7. §. 9. differit de Calesatione & satiditate in virga propter decubitus cum muliere satida.*

Valesco
de Ta-
ranta.
1400.

VI. Valescus de Taranta, Professor Monspeulanus, *Pbilonii Lib. 6. cap. 6. De ulceribus & pustulis virgæ.* Causæ, inquit, possunt esse primitivæ aut accedentes aut conjunctæ. Primitivæ, ut est vulnus, vel attritio vel coitus cum sætida, vel immunda, vel cancrosa muliere; alia causa potest esse portasse femoralia nigra, sætida & immunda; alia Causa potest esse materia spermatica vel corrupta retenta inter caput virgæ & præputium, vel mali humores ibidem retenti, qui ibi retenti & non evacuati corrumpunt locum quem tangunt, vel ulcerant. Et ibidem in fine, *Pustula virgæ sunt, si quis coeat cum fæmina habente ulcus in Matrice, quæ contagiositate sua inficit virgam & in ea facit ulcus.*

Petro
de Arge-
lata.
1470.

VII. Demum Petrus de Argelata, Bononiensis, Artium & Medicinæ Doctor, *Chirurgia Lib. 2. Tract. 30. cap. 3. De Pustulis, quæ adveniunt virgæ propter conversationem cum sæda muliere, quæ albæ sunt vel rubæ.* Ex materia venenosa, inquit, quæ retinetur inter præputium & pellem virgæ causantur istæ Pustule tales per hunc modum, quoniam ex retentione illius materie, quæ remanet inter pellem & præputium ex actione viri cum sæda muliere, quæ non respirat, putrescit: deinde ille locus denigratur & mortificatur substantia virgæ, quæ restorationem non recipit, nisi corruptione illa remota, & loco abstergo. Deinde propositis ad eas pustulas lotionibus detergentibus, stypticis, erodentibus, &c. sic ille pergit. Unum recorder vobis quod antequam ista balnea dicta (lotiones) ex vino illo styptico fiant, fiat purgatio: aliter illis bubo supervenires in inguine, quoniam materia quæ venit ad locum illum retro pellitur a balneo isto (seu potius lotionem) & inveniens concavitate inguinis illic morari facit; quare bubo generatur & ad exitum pluries deveniet. Quare purgationem universalem facias; & imperiti Medici sperantes

indifcrete vel incautela non faciunt purgationem, quare duplici modo lucrantur, quoniam de virga & bubone. Iterum viri sales debentes materiam venientem ad locum resolvere, querunt illam sanare (saniare) ut aliquid lucrentur, & hoc non debet fieri a discreto viro & magistro.

Sed qui ea loca ex variis Auctoribus rudioris ætatis tam studiose conquisita obijciunt, & de veneris penis ulcusculis & inguinum bubonibus existimant esse intelligenda, nã inde arguunt se in eorumdem Auctorum lectione & doctrina plane hospites esse, cum certum sit Auctores illos de veneris ulcusculis sive bubonibus, qualia nunc observantur, ne somniasse quidem laudatis locis, sed de bubonibus & ulcusculis a causa simplici oriundis, qualia olim observari potuere, loqui, ut liquet multis, copiosis, variisque rationibus.

Sed ea loca non debent accipi de ulcusculis aut bubonibus veneris.

1. Quod ea virgæ ulcera, sique bubones inguinum tam paucis describantur, ut inde nulla ratione verisimile sit laudata loca de ulcusculis aut de bubonibus veneris accipi posse, quæ sane non potuissent tam perfunctorie exponi a Medicis, quos in describendis cæteris affectibus multo levioribus diligentes, imo verbosus fuisse notum est.

Ut multis probatur.

2. Quod antiquiores illi Medici, si bubones aut ulcera, quæ describunt, luis veneris incipientis vel confirmatæ symptomata fuissent, ex notis morbi signis debuissent in morbi notitiam deduci, atque adeo de lue veneris, a qua dependerent, fuisse & ex professo differere, ut ferebat quæstionis dignitas ac manifesta utilitas, de qua tamen ne verbum quidem unum prostat in illorum Operibus.

3. Quod ea penis ulcera non tantum veneris usui cum scæda muliere adscribantur, sed etiam causis aliis, ut a Lanfranco, *pustulis calidis virgæ, vel acutis humoribus ulcerantibus*, ut a Gordonio, *casui vel percussioni*; ut a Gaddesden, *coitui cum juvenicula aut menstruata, vel retentioni seminis & urinis*; demum ut a Valesco de Taranta, *vulnere, attritioni, spurcitiei & squallori femoralium, materia acriori sub præputio collectæ, pravis humoribus ulcerantibus*, &c. Unde sequitur veneris ea nequaquam fuisse, quippe quæ nisi ab impuro cum infecta concubitu numquam producantur.

4. Quod pari quoque ratione bubo dicatur produci, non modo ab ulceribus virgæ, quod cum bubone venereo quadrare videretur, dato semel hæc ulcera veneris fuisse, sed etiam a *materia frigida aut calida, quæ ab hypate expellatur*, juxta Guillelmum de Saliceto; aut, *ab ulcere pedum*, juxta Lanfrancum, quod buboni tantum simplici convenire potest, atque adeo omnem amovet luis veneris suspicionem.

5. Quod ad curationem ulcerum præscribantur tantum ab Auctoribus laudatis ablutio balani cum oxycrato, unguentum album camphoratum, aliaque hujuscemodi, aut ad summum collyrium vulgato collyrio Lanfranci plane congener, sine ullo medicaminum interiorum usu; unde

manifestum fit de ulcusculis venereis minime agi, quæ sane tam facile sanari non possunt.

Sed de ulcusculis, bubonibus & a venereo seminio alienis: ut multa apertissime demonstrant.

6. Denique quod similiter proposita bubonum illorum therapeia tota sit in procuranda maturatione, apertione, deterfione tumoris, neglecto penitus remedium internorum apparatu; quod evidenter demonstrat mentionem non esse de bubone venereo, quem tam facili methodo radicitus non curari notissimum est.

Ex his sequitur 1. Ea virgæ ulcera, quorum a laudatis Auctoribus habetur mentio, videri cutaneas tantum aut superficiarias glandis aut præputii excoriationes fuisse, quales sæpissime solent accidere ex levi & multiplici causa, & quæ vulgo *Calefactiones* appellantur, ut ipse Guido de Cauliaco easdem vocat.

2. Ad summum qualiacunque fuerint, saltem causa venerea genita non fuisse, sed alia quavis causa communi; neque enim negaverit quisquam ulcera penis sine lue venerea produci unquam posse, cum non experientia modo, sed ipso etiam laudatorum Medicorum testimonio contrarium comprobetur; siquidem Guillelmus de Saliceto, Lanfrancus, Bernardus de Gordonio, Joannes de Gaddesden, Valescus de Taranta præter concubitum cum sœda muliere, assignant ipsi alias causas ulcerum & pustularum virgæ a concubitu omnino diversas.

3. Idcirco nomine sœtidæ mulieris, cujus commercio prædicti Auctores ulcera virgæ contrahi dicunt, non debere intelligi mulierem lue venerea infectam, de quo morbo ne quidem in somnis illi cogitabant, sed *mulierem, cujus matrix esset imunda, plena sanie, & virulenta*, ut ait Gordonius, hoc est cujus uterus semine nimio ante admisso & mora corrupto fœteret, vel fluore muliebri acriore aut ulcere inquinaretur; vel mulierem, *que de novo coivisset cum homine talem habente morbum*, ut Lanfrancus dicit, hoc est cum homine cujus penis ulceribus exederetur; vel *mulierem menstruatam*, ut loquitur Gaddesden; vel demum *mulierem cancerosam*, ut loquitur Valescus de Taranta, hoc est in cujus utero carcinoma lateret; vel ut idem ait, *fœminam habentem ulcus in matrice, quæ contagiositate sua infectat virgam & in ea faciat ulcus*. Cæterum minime mirum est a prædictis Auctoribus observari ulcera & pustulas in pene interdum enasci ex copulatione cum muliere, cui menstrua virulenta fluant, aut quæ fluore albo acriore, vel ulcere cancrove uteri laboret, quandoquidem similis observatio neque nunc rara est in praxi, sine ulla tamen luis venereæ suspitione.

4. Imo probabile esse nomine *sœtidæ* mulieris ab Auctoribus illis designari quandoque mulierem leprosam, quarum magnus erat ipsorum ætate numerus & nota impurissima libido. Id sane suadere videretur auctoritas Medicorum Arabum, qui referunt non uno loco ulcera in pene suboriri consuevisse ex copulatione cum muliere, quæ lepra infecta esset; quod

quod a Joanne de Gaddesden Chirurgo Anglo olim notari quoque meminimus, in *Rosa sua Medicina, seu Rosa Anglica*, capite *De concubitu cum muliere leprosa*. Porro tamen minime putandum est similibus exemplis posse fidem elevari eorum, quæ supra dicta sunt capite tertio de discrimine, quod inter lepram & luem veneream intercedit. cum si hoc unum symptoma excipiat, quod tamen in utroque affectu nullatenus idem est, ex cæteris omnibus quæ a venere cum leprosis imminabant, nullum fuerit quod ad nota luis venereæ symptomata accedat.

5. Posse quæcumque dicta sunt confirmari auctoritate Joannis de Vigo, qui scripsit initio sæculi decimi sexti, lue venerea jam plane divulgata. Ille enim probe distinguit *calesfactiones* & *carolos*, ut loquitur, qui solent evenire juvenibus inter pellem & præputium virgæ, imo etiam pustulas carbunculosas, quæ ibidem oriri solent ex causa simplici, de quibus supra recensita antiquiorum Medicorum loca intelligenda esse censemus, a pustulis seu ulcusculis aliis ejusdem partis ex causa venerea, de quibus ne verbum quide mapud Veteres reperire est. Alserit enim *Practica Lib. 2. Tract. 5. cap. 9. carolos accidere propter coitum calidæ mulieris & noviter menstruatae*. Ibidem vero cap. 8. *Pustulas carbunculosas causari in hominibus coitum habentibus cum muliere sæda, habente vulvam ulceratam ulcere putrido vel maligno, vel quia fuerit noviter menstruata, circa quæ cum Antiquioribus manifeste consentit*. At vero dicit ibidem *Lib. 5. c. 1. Pustulas venereas ex contagioso concubitu nasci in partibus genitalibus, videlicet in vulva in mulieribus, & in virga in hominibus, & esse interdum lividi coloris, aliquando nigri, nonnumquam subalbidi, cum callositate eas circumdante*.

6. Hæc eadem a Fallopio olim animadversa fuisse in *Tractatu de Morbo Gallico*, nec in uno tantum loco. *Viderant antiqui suis temporibus*, inquit ille cap. 7. *oriri ulcera circa pudenda, quæ calesfactiones vocantur: nam ante morbi Gallici ortum, Scriptores, ut Guido, &c. locuti sunt de his, vel cum juvenis non mundat glandem, vel quia habet rem veneream cum muliere menstruata, & tunc oriuntur calesfactiones istæ At ego dicam*, pergit ille, *esse maximam differentiam inter caviem (Gallicam) & calesfactiones. Antiqui Scriptores, ait idem c. 81. Græci & Arabes, veluti Paulus Aetius & Avicenna locuti sunt de ulceribus depaſcentibus colis: sed differunt illa a caviæ (Gallica seu ulcusculis venereis.) Similiter Chirurgici posteriores loquuntur de his, sed non sunt eadem cum his quorum curationem dare intendimus. Superiores Chirurgici loquentes de depaſcentibus, dicunt duplici de causa fieri, vel ex turpitudine alba vel nigra, collecta inter glandem & præputium: hanc turpitudinem sordem appellant. Volunt igitur quod quoties sordes ista continetur inter præputium & glandem, bulliens faciat hujusmodi caviem Nos non loquemur, addit ille, de omnibus his, sed de veris Gallicis Tavelis dictis, sive Carolis, qui sunt ab aliis distinguendi, calesfactiones, sexcoriationes, &c. facile sanantur sed non caviæ ita facile*.

7. Pari ratione ea, quæ de bubone in inguine Guillelmus de Saliceto, Lanfrancus, Petrus de Argelata dicta habent, non de venereo, sed de simplici bubone accipienda esse, qualis simplici lymphæ vitio accidit, aut ulceribus penis solet supervenire, quæ a causis ordinariis & a lue venerea plane alienis inferantur: Tunc enim puris guttulæ valis lymphaticis, quæ ab ulceratis penis partibus sobolefcunt, ad inguinales glandulas quo ipsa tendunt delatæ lympham, cui commilcentur, ita inficiunt inspissantque, ut in glandularum cellulis hæere cogatur, ubi panum, phygethlon, vel ut vulgo ajunt, bubonem excitat. Sic observamus quotidie simili prorsus ratione glandulas lymphaticas collo vel maxillæ inferiori aditas toties tumefieri, imo vero quandoque suppurari, quoties capitis exteriora tinea aut ulcusculis descedantur, facta scilicet materiz morbosicæ metastasi cum limpha inde redeunte.

8. Proinde tandem ex illis Medicorum Chirurgorumve locis, qui anno 1494. superiores vixerunt, si æquo animo & sine præjudicio perpendantur, posse nihil prorsus colligi, quod allatam de novitate luis venereæ sententiam evertere valeat, aut fidem Historicorum infirmare, qui morbum hunc orbi nostro tempore belli Neapolitani a Carolo VIII. Francorum Rege gesti inductum fuisse uno ore omnes affirmant.

C A P U T VI.

Explicantur testimonia a Guillelmo Becketto pro luis venereæ antiquitate nuper producta.

Becket-
tus nu-
perrimus
propu-
gnator
opinio-
nis de
antiqui-
tate luis
venereæ.
I. Con-
tendit
Arsuram
genita-
lium
eamdem
fuisse
cum go-
norrhœa
venerea.
Quod

OPINIONIS de antiquitate luis venereæ patrociniū nuperrime suscepit Guillelmus Beckettus, Chirurgus Londinensis, Dissertationibus tribus quas edendas curavit in XXX. & XXXI. Voluminibus Transactionum Philosophicarum, & in quas concessit diligentia summa quæcunque ex editis, ineditisve Magnæ Britannicæ monumentis potuit corraderè, quæ viderentur opinioni suæ suffragari.

Primo Contendit in prima Dissertatione, quæ prostat in XXX. Volumine Transactionum Philosophicarum, n. 357. ann. 1718. gonorrhœam veneream sæculis aliquot ante annum 1494. notam fuisse in Anglia nomine *ardoris, arsuræ, incendii* &c. Anglice *Buring* sive *Brenning*, de quibus sane mentio frequens fit ab Historicis Magnæ Britannicæ; Et in opinionis confirmationem auctoritates adducit multas quarum nonnullæ hoc anno 1494. antiquiores sunt, pleræque anno eodem recentiores.

Antiquiores excerptæ sunt 1. Ex Opere manuscripto Joannis Ardern, Chirurgi Anglici, sua ætate hoc est exeunte sæculo decimo quarto haud in-

multis
auctori-
tatis
probare
conatur.

incelebris, ubi multa sunt de *arsura*, quam definitille, ut refert Beckettus, *calorem interiore cum excoriatione uretræ*, unde ardor.

2. Ex collectaneis quibusdam Medici circa annum 1390. & 1440. scriptis, ut Beckettus arbitratur, in quibus legere est formulas quasdam ad *arsuram* tum virorum, tum mulierum.

3. Ex antiquis regulis Lupanarium Londini olim publice prostantium in suburbio *Santovvark* dicto, quæ circiter anno 1430. constitutæ creduntur, quæ manuscriptæ extant, & quarum articulo uno agitur de *bis*, qui *custodiunt mulieres habentes nefandam infirmitatem*; vetatur vero alio gravi mulctâ, ne *qua in Lupanari prostet famina arsuræ morbo infecta*.

Recentiores depromptæ sunt 1. Ex Libello, quo certus quidam Simon Fish, novarum in Religione opinionum impotens assectator & Catholicorum osor accerrimus Henrico VIII. Anglorum Regi supplicavit anno 1530. in quo refertur *Presbyteros in Angliæ Regno omnia vitare: ipsos a faminis uri*, hoc est *arsura affici*, *ac alias faminas vicissim urere: ipsosque a meretricibus lepram contrahere, quam contractam cum aliis faminis deinde communicent*.

2. Ex Libro, quem anno 1546. edidit Andræas Boord, Doctor Medicus & Presbyter, quem inscripsit *Compendium Sanitatis*, & in quo initio Capituli cujusdam his verbis præfatur, *Agemus capite 19. de arsurâ prostibulorum*; additque postea, *si quis post contractam a prostibulo arsuram, rem habeat eadem die cum sana muliere, arsuram eandem cum illa communicaturum esse*.

3. Ex Epistola, quam Michael VVood præposuit Orationi de *vera obedientia* a Stephano Gardiner scriptæ & Rhotomagi æditæ anno 1553. in qua fit *arsuræ* mentio.

4. Ex Opere quodam manuscripto Joannis Balzi, quod est penes ipsum Beckettum, & in quo Balzus de Doctore VVeston verba faciens quem Reginaldus Polus Cardinalis, regnante Maria, Decanatu VVindforii abdicavit ob adulterii crimen, ait Canonicum illum *in curanda arsurâ magis exercitum fuisse, quam scortum, quod in ullo Lupanari prostaret*; adjicitque *mulierem aliquam in Paræcia Sancti Botolph ab eo nuper usitam fuisse*.

5. Ex Tractatu Guillelmi Bulleyn, Doctoris Medici, anno 1562. edito, cujus inscriptio est *The Bulvark &c.* ubi Auctor ille de *meretricum arsurâ* disserit.

Ea sane numero multa sunt, sed re pauca, imo potius nulla, cum ruinoso fundamento constant. Omitto jam objecta testimonia ex Operibus, Legibus, Tabulisve ineditis, aut Libris perraris deprompta esse, quæ idcirco nec ea qua par esset diligentia scrutari & excutere, imo ne inspicere quidem licitum fuit, ut de manuscriptorum ætate, verborumve inde excerptorum sententia constaret. Sed lubenter concessero Be-

Expli-
cantur
auctori-
tates a
Becketto
objectæ.

ketto

Ketto hac in re, ne vitiligare videar quasi causæ diffiderem, eique ultro dederò singula rectissime se habere, quod sane maximum est; at vero pernègo inde sequi *arsuram* illam, de qua quæstio est, eandem fuisse cum gonorrhœa venerea, atque adeo gonorrhœam ab impura venere oriundam *arsura* nomine olim grassatam fuisse. Verum ut cogitationes meas dilucide explicem, res paulo altius repetenda est.

Itaque I. Lepra Arabum, quæ in Anglia sicut in cætera Europa, olim frequens erat, non solum convictu sed congressu etiam contagiola fuit quapropter lege constitutum erat, interposita etiam gravi pœna, ut leprosi seu elephantiaci destinatis locis coerciti consuetudine cum sanis interdicerentur.

Lepram
concupi-
tu centi-
grosam
fuisse.

II. Proinde lepra concubitu, quo non est contactus alter intimior, quasi præsentissima contagione propagari debuit, si quis impudens vel perditissimæ libidinis cum leprosis veneri indulgeret. Et sane ea ratione propagatam fuisse testantur uno ore cœtanei fere omnes Medici, ut Forestus, *Observationum Chirurgicarum Lib. 4. Observ. 8.* Palmarius, *de elephantiasi*, c. 2. Paræus, *Operum Lib. 20. cap. 8.* Fernelius, *De partium morbis & symptomatis*, Lib. 6. cap. 19. Valescus de Taranta, *Philonii Lib. 7. cap. 39.* Gordonius, *Lilii particula 1. cap. 22.* ubi refert quamdam Comitissam venisse leprosam in Montem pessulanum, & fuisse in fine in cura ejus; & quemdam Baccalarium in Medicina ministravisse ei, & jacuisse cum ea, & impregnasse eam, & perfectissime leprosum factum fuisse, cujus Historiæ similem alteram profert Philippus Schopffius, *Lib. de Lepra*, scilicet Fabri cujusdam lignarii, qui ex concubitu cum leprosa lepram brevi contraxit.

Saltem
ex concu-
bitu cum
leprosis
genitalia
arsura af-
fecta
fuisse.

III. Quod si quando res melius forsan cederet, aut saltem ex usu veneris cum leprosis mulieribus, imo etiam cum illis quæ cæteroqui sanæ cum leprosis paulo ante rem habuissent, genitalia plerumque affecta fuerunt, phlogosi, erysipelate, exulceratione cenchriade sive miliari, phlyctænis, &c. unde dysuria, sive ut tunc loqui mos erat, ardor, arsurum, incendium, calefactio, Anglice *Brenning*.

IV. Possunt in confirmationem produci testes oculati & multi & idonei.

1. Theodoricus, Chirurgus & Episcopus Cerviensis anno 1290. qui *Chirurgia Lib. 6. cap. 55.* ait morbo *infici*, qui post coitum leprosi ad mulierem accedit.

2. Auctor Tractatus Chirurgici manuscripti, Rogerinæ dicti, ideoque Rogerio Baconi a quibusdam adscripti, sed qui videtur doctissimo Joanne Freind, *Histor. Medicin. part. 3.* Rogerio parmensi potius adscribendus, ubi diserte explicatur, teste eodem Freind, *ibidem*, quot quantisque malis pateret ille, cui contingeret cum muliere rem facere, quæ a leproso recens compressa fuisset.

3. Gilbertus Anglicus, qui in *Compendio medicinae, tam morborum universalium quam particularium* eadem profert cap. 345. quæ in Rogerina legi modo diximus.

4. Bartholomæus, vulgo Glanville dictus, cujus *Breviarium Medicinæ*, quod manuscriptum extat cum *Compendio Medicinæ Gilberti Anglici* ita convenit, ut idem opus esse videatur. Sane in *Breviario illo, Lib. 2. cap. 4.* verba eadem legere est, teste Freind, de periculis imminentibus ex coitu cum muliere a leproso recens vitata, quæ prostant in *Compendio*.

5. Denum Joannes de Gaddesden, Chirurgus Anglicus, qui in *Practica Medicina seu Rosa Anglica* agit capite peculiari, de infectione ex concubitu cum leproso aut leprosa, ubi ait illum, qui concubuit cum muliere, cum qua corvis leprosus, puncturas intra carnem & corium, hoc est inter balneum & præputium, & aliquando calefactiones in toto corpore sentire.

V. Hinc ergo facile explicari possunt testimonia illa tria a Becketto obijcta, quæ anno 1494. antiquiora sunt. *Arsura* nempe illa, 1. de qua loquebatur Joannes Arden circa annum 1370. 2. adversus quam extant formulæ manuscriptæ circa annum 1390. & 1440. 3. de qua verba fiunt in *Regulis manuscriptis Lupanarium Londinensium* circiter anno 1430. eadem plane est cum affectione illa, quam probavimus concubitu cum muliere leprosa, vel quæ leproso sui copiam recenter fecisset, olim contrariam fuisse. *Nesanda vero infirmitas*, cujus mentio est in *Regulis* iisdem, videtur ipsamet lepra fuisse.

Hinc patere cau-
sam arsu-
ræ genita-
lium, quæ olim
in Anglia
frequens
erat.

VI. Porro nullatenus mirum esse debet a leprosis mulieres non raro contaminari olim potuisse. Cum enim inter eos qui lepra tenebantur, multi inexplorati essent, vel male explorati, & quibus ideo usu cum sanis interdictum non erat; cum inter sepositos multi forent quibuscum indulgentius agebatur & quibus ideo copia esset aliquando divagandi, facile erat iis omnibus libidini, in quam ex morbi natura leprosos effrænatos fuisse constat, sese totos dedere, eo quidem tempore quo Lupanaria publice prostabant, & præsertim in populosis Civitatibus, ubi cuilibet ignoto latere nullo negotio licitum est. Mirum est tantummodo videri eam morbi speciem in Anglia olim communiorem fuisse quam in reliqua Europa, & ab Historicis, Medicisque Anglicis maxime celebratam; sed inde forsitan hoc repetendum est, quod Leges in leprosos sancitæ in Anglia leniores olim fuerint, vel remissius observatæ; qua de re videant quibus antiqua Angliæ disciplina notior est.

VII. Cæterum arsura illa cum gonorrhœa venerea neutiquam confundenda est, a qua plane diverfam fuisse liquet multis argumentis.

1. Quod etsi manus Becketto daremus, concedere musque luem veneream multo antiquiorem fuisse quam putamus, nulla tamen ratione credi posset

Arsuram
illam a
gonor-
rhœa ve-
nerea
plane di-

versam
fuisse.

posset gonorrhœam satis antiquam fuisse, ut cum arsurâ illa, quæ decimo tertio & decimo quarto sæculo grassabatur, eadem fuerit. Compertum est enim silentio omnium Auctorum, qui de lue venerea scripsere ante annum 1545. & disertio Fallopii testimonio, *Traff. de Morbo Gallico, cap. 23.* gonorrhœam veneream prius ignotam inter luis symptomata primum apparuisse anno 1545. aut 1546. hoc est quinquaginta annis ab ingressu quem lue venereæ assignamus, atque adeo multo tardius quam arsurâ illa; sed de his fusius infra *cap. 11.*

2. Quod in gonorrhœa venerea, ut vox ipsa innuit, perpetuo cum dysuria addit, vel eidem brevi succedat effluxus purulenti seminis uber & diuturnus; nullus vero olim observaretur in antiqua illa arsurâ, nullus saltem memoretur ab Auctoribus qui de arsurâ scripserunt, quos omnes tam grave symptoma siluisse, si adfuisset, verisimile non est, unde datur colligere arsuram meram fuisse glandis & urethræ phlogosim erysipelato-dœam.

3. Quod gonorrhœa, quoniam contumacior est, curatione plerumque diuturna, ac certe semper difficili opus habeat: contra vero arsurâ, quæ fugacior erat, sanaretur totu solo, vel ad summum injectione anodyna, teste vel ipso Becketto, qui in Dissertatione laudata profert sequentia verba Joannis Ardern: *Contra incendium virgæ virilis interius ex calore & excoriatione fiat talis syringa (id est injectio) lenitiva: accipe lac mulieris masculum nutriendis & parum zuccarium, oleum violæ & prisanæ, quibus commixtis, per syringam infundatur; & si prædictis admiscueris lacamygdalarum melior erit medicina.* Quod remedii genus congener est cum remedio ad labiorum arsuram & puncturam proposito a Rogerio, *Chirurgiæ Lib. 1. c. 35.* & a Rollando, *Chirurgiæ Lib. 1. c. 21.*

4. Quod mulier quæ cum Syphilitico venerem exercuit, unde male habet, gonorrhœam inferat non solum eadem die qua Syphilitico sui copiam fecit, sed etiam nisi sanata sit, post quantumlibet temporis intervallum: non solum illota & semine virulento adhuc in utero reside, sed etiam probe lota, & post excusum totum semen: ac e contra nullum immineret arsuræ periculum a Consuetudine cum scæmina quæ leproso succubisset, nisi de novo, ut ait Lanfrancus, *Prætic. Traff. 3. Doctrin. 3. cap. 11.* vel de proximo, ut ait Valefcus de Taranta, *Philonii Lib. 7. cap. 39.* succubisset; imo nisi semen leprosi in utero adhuc restitaret, semine adhuc in matrice existente, juxta Gordonium, *Lilii Particul. 1. c. 22.* & Valefcum de Taranta, *ubi supra.* Et inde est quod Joannes de Gaddefsden, in *Rosa Anglica, capite de infectione ex concubitu cum leproso vel leprosa*, hac tamen in re Gordonium ducem sequutus, mulierem ab omni labe securam fore affirmet, si post coitum cum leproso saltet & descendat retro fortiter per gradus, & sternutet cum pulvere pipæris, vel cum penna cum aceto in navibus ita,

in quod sperma prius receptum descendat; & tunc lavet se in decoctione rosarum vel plantaginis decoctarum in vino. & sursum.

5. Demum quod ex veneris usu cum muliere leprosa, vel quam leprosus recens stupraverat, multa præter arsuram symptomata alia inferrentur, quorum nulla aut cum gonorrhæa venerea conjungi, aut in lue venerea observari unquam solent. Hæc de re audiendus idem Joannes de Gaddelden, ubi supra. „Ille, inquit, qui concubuit cum muliere cum qua coivit leprosus, puncturas intra carnem & corium sentit, & aliquando calefactiones in toto corpore, & postea frigus & insomnietates, & circa faciem quasi formicas currentes, si sit de causâ calida. Color variatur de rubedine in album & e converso, & frequenter habent calorem lentum interius, & præsumpit aliquando exterius, quando est post coitum cho-lerici. Si sit post coitum phlegmatici vel melancholici, tardius percipitur, & facies statim discoloratur & subumescit, & est aggravatio omnium membrorum, quod vix se movere potest, & habet frigus subcutaneum, cum fornicatione faciei post, deinde totius corporis. Quæ singula ipsissimis verbis leguntur in *Chirurgia Theodorici*, loco jam laudato: in *Ragerina*: & in *Compendio Medicinæ Gilberti*.

VIII. De arsurâ illâ, quæ a lepra degenerat, possunt intelligi, si ita lubeat, cætera testimonia a Becketto adducta, quæ anno 1494. recentiora sunt, quamquam, ut libere dicam, videntur ea omnia potius accipienda esse de morbis vere venereis. Omnium enim antiquissimum ad annum 1330. pertinet, quo tempore lepra jam rarior fuit, quo vero lue venerea non in Italia tantum & Gallia, sed in Angliâ quoque frequens erat & divulgata, ut constat ex testamento Doctoris Collet, Decani Ecclesiæ Cathedralis Sancti Pauli Londinensis, anno 1418. scripto, de quo J. Freind, *Hist. Med. part. 3*. Neque obstat sermonem esse in allaris locis de arsurâ genitalium, non de gonorrhæa penisve ulcusculis. Debuerunt nempe novis illis affectibus nomina accommodari usu recepta aliarum affectionum natura quidem diversarum, sed ad quas tamen viderentur quadamtenus alludere, quod & alibi factum scimus in denominanda lue venerea: quod exemplo summi, quamquam in re dispari a Romanis olim facitatum legimus, cum Pyrrhi Elephantos Boves seu Lucanos appellavere: quod ab omnibus semper facitabitur, quoad homines a notis notarum rerum ideis ad ignotas ignorarum cogentur procedere.

Secundo. In altera Dissertatione, quæ extat in Volumine XXXI. *Transactionum Philosophicarum*, n. 365. ann. 1720. Beckettus totus in eo est, ut probe antiquitatem lue ipsius veneræ, & in hunc finem præter rationes nonnullas, quibus jam abunde satisfactum est in præcedentibus, duo adducit testimonia, quæ notatione digna esse videntur.

Unum excerptum est ex Manuscripto quodam, quod asservatur Oxonii

II, Contendit Beckettus lue veneream ipsammet olim cognitam fuisse.

Quod co-
natur pro-
bare ma-
xime ar-
gumentis
duobus.

in Collegio Lincolniensi, ubi sic loquens inducitur Thomas quidam * Galcoigne, quem Beckettus ait Universitatis Oxoniensis Cancellarium tunc fuisse, „Novi enim ego Magister Thomas Galcoigne, licet indignus, sacre Theologie Doctor, qui hæc scripsi & collegi, diversos viros, qui mortui fuerant ex putrefactione membrorum suorum genitalium & corporis sui; quæ corruptio & putrefactio, ut ipsi dixerunt, causata fuit per exercitium copulæ carnalis tam mulieribus. Magnus enim Dux in Anglia, scilicet Joannes de Gaunt mortuus est ex tali putrefactione membrorum genitalium & corporis sui, causata per frequentationem mulierum; magnus enim fornicator fuit, ut in toto Regno Angliæ divulgabatur, ante mortem suam jacens sic infirmus in lecto, eandem putrefactionem Regi Angliæ Ricardo II. ostendit, cum idem Rex eundem Ducem in sua infirmitate visitavit; & dixit mihi, qui ista novit, unus fidelis sacre Theologie Baccalaureus. VVillus etiam longe vir maturæ ætatis & de Civitate Londonii, mortuus est ex tali putrefactione membrorum suorum genitalium & corporis sui, causata per copulam carnalem cum mulieribus, ut ipsemet pluries confessus est ante mortem suam, cum manu sua propria eleemosynas distribuit, ut ego novi anno Domini 1430. Hactenus Thomas ille Galcoigne, ex cujus verbis credit Beckettus posse colligi tum Joannem Ducem Lancastrie, quem Angli de Gandavo sive Gaunt vocant, tum VVillum illum Londinensem lue venerea laborasse ante annum 1430. atque adeo morbum hunc olim observatam fuisse ante detectas Occidentales Indias.

Alterum vero testimonium depromptum est ex quibusdam locis Operum manuscriptorum Joannis Arden, Chirurgi in Anglia celebris circa annum 1370. ubi agitur de phimosis, paraphimosis, carunculis urethræ ac bubone; unde videtur Becketto inferendum esse ea symptomata venerea fuisse, ac proinde luem veneream in Anglia ætate illa jam grassatam esse.

Sed miror Beckettum opinione sua usque adeo occupari, ut luem veneream nullibi non videat; videat certe ubi nulla est, imo etiam ubi nulla prorsus adiunt luis indicia, si res attentius introspectiatur.

Nam I. Indicavimus jam supra cap. 2. genitales partes gravibus morbis semper obnoxias fuisse, non minus quam cæteras totius corporis, ut quæ iisdem causis morbificis paterent, nec ulla gauderent prærogativa, ut a morbis immunes essent. Constat sane Medicos fere omnes a primis Medicinæ temporibus & longe ante notam luem veneream, uberrime differruisse de genitalium abcessu, ulcere, carcinomate, putrefactione gangrenæ; de quibus vide Galenum, Lib. 6. De locis affectis cap. 6. & Cornelium Celsum, Lib. 6. cap. 18. ut cæteris nunc parcam: imo vero veteres Historicos de affectionibus istiusmodi haud raro mentionem facere. Sic narrat

* Claruit circa annum 1460. J. G. Jossius, De Historicis Latinis Lib. 3. cap. 9.

Expli-
cantur ar-
gumenta
a Becket-
to oppo-
sita. Ge-
nititalia
variis
morbis
semper
obnoxia
fuisse.

Flavius Iosephus, *Lib. 2. contra Apionem*, improbum illum Iudæorum calumniatorem ulcere penis laborasse, quo post incisiones frustra adhibitas putrefactis genitalibus in magnis doloribus expiraverit. Sic refert idem *Histor. Judaice Lib. 17. cap. 8.* Herodem Iudæorum Regem genitalibus quoque putrefactis & vermicibus scatentibus tabe confectum & spasmo convulsulum interiisse. Sic constat Eulebii testimonio, *Histor. Ecclesiastic. Lib. 3. cap. 16.* Galerium Maximianum mortem miserrimam oppetiisse ex abcessu & ulcere circa media occultiorum corporis partium loca, nempe ut arbitror in perinæo, qui uterque morbus insanabilis erat, cum incredibili vermium multitudine & fœtore intolerando. Sic notissima est Novocomensis illius viri historia, quam Plinius memorat, *Epistolæ. Lib. 6. Epistol. 24.* Maritus, inquit, ex diutino morbo circa velanda corporis „ ulceribus putrescebat; uxor ut inspiceret exegit, neque enim quemquam „ fidelius iudicaturum possetne sanari. Vidit, sanari desperavit, *hortata est ut moreretur, comesque ipsa mortis, dux, imo exemplum & necessitas fuit; nam secum maritum ligavit, & abiecit in lacum Larium.* Sic demum testatur Paladius, in *Histor. Lausiaca, vita 32.* Eroni cuidam cum Mima congresso enatum esse anthracem in glande, quo sex mensibus usque adeo ægrota-
vit, ut ejus virilia computruerint & sua sponte ceciderint. Ex his ta-
men omnibus sive Medicorum, sive Historicorum locis, nemini nisi qui in rebus medicis plane hospes fuerit, non in meatum dico, sed ne in sus-
picionem quidem venire potuit eas affectionum species a lue venerea olim
inductas fuisse, quæ ne ætate quidem nostra, qua dira illa perniciēs ma-
xime grassatur, ab impura venere semper ortum habeant.

II. Censemus morbos istiusmodi genitalium maxime frequentes fuisse in mulierosis, scortatoribus & in venerem effrænitibus, cum enim libidine & salacitate conciti meritoriiis fœminis maxime uterentur, quæ semper impurissimæ fuere; cum a nullis abstinere flagitiis, sed quasi admissarii promiscue concumberent cum mulieribus quibuscumque, & sæpius cum male habentibus cancro, ulcere, abcessu uteri &c. cum liquescentibus fluore albo, acri, virulento &c. cum lepra infectis, aut quæ leprosis sui corporis uloram recenter permisissent &c. inde debuerunt procul dubio cæteris frequentius arsuras, phlogoses, inflammationes, abcessus, ulcera, carcinomata genitalium experiri.

III. Quin imo, etsi daremus eos qui in venerem proniores erant, sanis purisque tantum mulieribus usos esse, quod sane maximum, debuerunt tamen ex ipso opere coitionis nimium repetitæ in eisdem morbos fre-
quentius incidere, quam ii qui si non caste, saltem temperanter viverent. Organis enim genitalibus acriore, saliore, fervidiorē semine turgentibus; sæpius & diutius attrectatis, compressis, sanguine æstuante, qui influeret, aut qui retineretur, distentis; imo quod pessimum est; aphrodisiacorum

Maxime
in scorta-
toribus
& mulie-
rosis.

Quod conatur pro-
bare ma-
xime ar-
gumentis
duobus.

in Collegio Lincolniensi, ubi sic loquens inducitur Thomas quidam *
Gascoigne, quem Beckettus ait Universitatis Oxoniensis Cancellarium
tunc fuisse, „Novi enim ego Magister Thomas Gascoigne, licet indignus,
sacrae Theologiae Doctor, qui hæc scripsi & collegi, diversos viros, qui
mortui fuerant ex putrefactione membrorum suorum genitalium &
corporis sui; quæ corruptio & putrefactio, ut ipsi dixerunt, causata
fuit per exercitium copulae carnalis cum mulieribus. Magnus enim Dux
in Anglia, scilicet Joannes de Gaunt mortuus est ex tali putrefactione
membrorum genitalium & corporis sui, causata per frequentationem
mulierum; magnus enim fornicator fuit, ut in toto Regno Angliæ di-
vulgabatur, ante mortem suam jacens sic infirmus in lecto, eandem
putrefactionem Regi Angliæ Ricardo II. ostendit, cum idem Rex
eundem Ducem in sua infirmitate visitavit; & dixit mihi, qui ista no-
vit, unus fidelis sacrae Theologiae Baccalaureus. VVillus etiam longe
vir maturæ ætatis & de Civitate Londonii, mortuus est ex tali putrefa-
ctione membrorum suorum genitalium & corporis sui, causata per co-
pulam carnalem cum mulieribus, ut ipsemet pluries confessus est ante
mortem suam, cum manu sua propria elemosynas distribuit, ut ego novi
anno Domini 1430. Hactenus Thomas ille Gascoigne, ex cujus verbis
credit Beckettus posse colligi tum Joannem Ducem Lancastriæ, quem Angli-
de Gandavo sive Gaunt vocant, tum VVillum illum Londinensem lue
venerea laborasse ante annum 1430. atque adeo morbum hunc olim ob-
servatam fuisse ante detectas Occidentales Indias.

Alterum vero testimonium depromptum est ex quibusdam locis Ope-
rum manuscriptorum Joannis Ardern, Chirurgi in Anglia celebris circa
annum 1370. ubi agitur de phimosis, paraphimosis, carunculis urethrae ac bu-
bone; unde videtur Beckettro inferendum esse ea symptomata venerea
fuisse, ac proinde luem veneream in Anglia ætate illa jam grassatam esse.

Explican-
tur ar-
gumenta
a Becket-
to oppo-
sita. Ge-
nitalia
variis
morbis
semper
obnoxia
fuisse.

Sed miror Beckettum opinione sua utque adeo occupari, ut luem ve-
neream nullibi non videat; videat certe ubi nulla est, imo etiam ubi nulla
prorsus adsunt luis indicia, si res attentius introspectiatur.

Nam I. Indicavimus jam supra cap. 2. genitales partes gravibus morbis
semper obnoxias fuisse, non minus quam cæteras totius corporis, ut quæ
iisdem causis morbificis paterent, nec ulla gauderent prærogativa, ut a
morbis immunes essent. Constat sane Medicos fere omnes a primis Medi-
cinæ temporibus & longe ante notam luem veneream, uberrime disce-
ruisse de genitalium abcessu, ulcere, carcinomate, putrefactione gangra-
na; de quibus vide Galenum, *Lib. 6. De locis affectis cap. 6.* & Cornelium
Celsum, *Lib. 6. cap. 18.* ut cæteris nunc parcam: imo vero veteres Histo-
ricos de affectionibus istiusmodi haud raro mentionem facere. Sic narrat

* Clarus circa annum 1466. J. G. Jossius, *De Historicis Latinis Lib. 3. cap. 9.*

Flavius Iosephus, *Lib. 2. contra Apionem*, improbum illum Iudæorum calumniatorem ulcere penis laborasse, quo post incisiones frustra adhibitas putrefactis genitalibus in magnis doloribus expiraverit. Sic refert idem *Histor. Judaica Lib. 17. cap. 8.* Herodem Iudæorum Regem genitalibus quoque putrefactis & vermibus scatentibus tabe confectum & spasmo convulsum interiisse. Sic constat Eulebii testimonio, *Histor. Ecclesiastica. Lib. 8. cap. 16.* Galerium Maximianum mortem miserrimam oppetiisse ex abscessu & ulcere circa media occultiorum corporis partium loca, nempe ut arbitror in perinæo, qui uterque morbus insanabilis erat, cum incredibili vermium multitudine & fœtore intolerando. Sic notissima est Novocomensis illius viri historia, quam Plinius memorat, *Epistolæ. Lib. 6. Epistol. 24.* Maritus, inquit, ex diutino morbo circa velanda corporis „ ulceribus putrescebat; uxor ut inspiceret exegit, neque enim quemquam „ fidelius iudicaturum possetne sanari. Vidit, sanari desperavit, *hortata est ut moreretur, comesque ipsa mortis, dux, imo exemplum & necessitas fuit; nam secum marito ligavit, & abiecit in lacum Larium.* Sic demum testatur Paladius, in *Histor. Lausiaca, vita 31.* Eroni cuidam cum Mima congresso enatum esse anthracem in glande, quo sex mensibus usque adeo ægrotauit, ut ejus virilia computruerint & sua sponte ceciderint. Ex his tamen omnibus sive Medicorum, sive Historicorum locis, nemini nisi qui in rebus medicis plane hospes fuerit, non in mentem dico, sed ne in suspicionem quidem venire potuit eas affectionum species a lue venerea olim inductas fuisse, quæ ne ætate quidem nostra, qua dira illa pernicies maxime grassatur, ab impura venere semper ortum habeant.

II. Censemus morbos istiusmodi genitalium maxime frequentes fuisse in mulierosis, scortatoribus & in venerem effrænis, cum enim libidine & salacitate conciti meritoriis fœminis maxime uterentur, quæ semper impurissimæ fuere; cum a nullis abstinere flagitiis, sed quasi admittarii promiscue concumberent cum mulieribus quibuscumque, & sæpius cum male habentibus cancro, ulcere, abscessu uteri &c. cum liquecentibus fluore albo, acri, virulento &c. cum lepra infectis, aut quæ leprosis sui corporis uluram recenter permisissent &c. inde debuerunt procul dubio cæteris frequentius arsuras, phlogoses, inflammationes, abcessus, ulcera, carcinomata genitalium experiri.

III. Quin imo, et si daremus eos qui in venerem proniores erant, sanis purisque tantum mulieribus usos esse, quod sane maximum, debuerunt tamen ex ipso opere coitionis nimium repetitæ in eisdem morbos frequentius incidere, quam ii qui si non caste, saltem temperanter viverent. Organis enim genitalibus acriore, saliore, fervidiore semine turgentibus; sæpius & diutius atrectatis, compressis, sanguine æstuante, qui influeret, ut qui retineretur, distentis; imo quod pessimum est, aphrodisiacorum

Maxime
in scorta-
toribus
& mulie-
rosis.

remediorum usu, ut venus acrius sollicitaretur, non raro irritatis, oportuit inde frequentius quoque oriri arsuram, phlogosim & phlyctenas in balano; inflammationem, abscessum, tumorem in prostaticis, vesiculis seminariis, testibus, &c. Ut ergo qui intensius declamant, pulmonibus; qui minoribus objectis dispiciendis intenti sunt, oculis male habent; sic eos quoque qui libidinibus intemperantibus sese debebant, genitalibus male affici consequens fuit, atque adeo, ut Poeta dicit, sed alio sensu, *artifices arte perire sua*. Quod & a Stoicis probe intellectum fuisse videtur, qui teste (*) Cicerone, Epicuro dysuriam, qua se laborare confessus erat; vitio vertebant, quasi *surpis intemperantiae morbum*.

(*) *Epist. ad Famili-
liar. Lib.
7. Ep. 27.*
Hinc er-
go ruit
primum
Becketti
argumen-
tum.

IV. Itaque licet olim hic contendere aut *περί τῆς γυναικείας* Manuscripti quod in collegio Lincolnensi latere perhibetur, aut de auctoritate Thomæ illius Gascoigne, a quo scriptum dicitur anno 1430. & qui proinde auditione tantum acceperat, ut ipse ultro faretur, quæcumque narrat de Joanne de Gandavo, utpote jam ante annum 1399. fato fundito; nihilominus tamen nisi certiora afferantur, a nemine cum Becketto putari arbitrer inde sequi Joannem de Gandavo, aut Villum Londinensem lue venerea olim laborasse, quod *illi mortui sint ex putrefactione membrorum suorum genitalium & corporis sui*, aut quod *illa corruptio & putrefactio, ut ipsi dixerunt, causata fuerit per exercitium copulæ carnalis cum mulieribus*. Ex prædictis enim abunde liquet. corruptiones & putrefactiones istiusmodi genitalium circa omnem contagem veneream, vel ab impura venere cum mulieribus quarum uterus gravi malo affectus esset, cum leprosis aut leprosoforum contubernio contaminatis induci potuisse, vel a venere etiam pura cum sanis mulieribus, sed nimia & immodica accidere olim potuisse, sicut etiam nunc possunt eadem ratione contingere.

Neque al-
terum va-
lidius est.

V. Haud meliore jure, neque adeo successu feliciore attentavit Becket- tus loca illa, quæ ex Chirurgicis Operibus Joannis Ardern affert, & ubi agitur de phimosi, paraphimosi, urethræ hyperfarciosi sive caruncula &c. ut ad suam detorquet sententiam. Sane quidem certo certius est, quod a nemine negari putō; affectiones illas, ut Græca nomina satis indicant, a Græcis Medicis olim cognitæ & descriptas fuisse, ac deinde a Latinis, ab Arabibus & ab iis qui in Europa Medicinam. scitavere ab Arabum tempore usque ad renata litterarum studia. Præter Galenum & Celsum; quos supra laudavimus, in promptu esset, si ita videretur, sexcentos alios laudare, apud quos singula enucleate & dilerte explicantur. At vero affectiones illæ genitalium ab ordinaria causa olim dependebant; ut eorundem Auctorum lectione satis liquet, nullatenus vero a causa venerea, hoc est seminio venereo; neque adeo ullō modo confundendæ sunt cum affectionibus venereis ejusdem speciei, quales hodie grassantur; ut quæ, licet cum iisdem natura & læsionis modo congeneres sint, unde

simi-

similem quoque appellationem sortitæ sunt, ab iisdem tamen causa & origine toto genere differant.

Demum *Tertio* Dissertatio Beckettii tertia, quæ exstat in eodem Volumine *Transactionum Philosophicarum*, n. 396. versatur circa lepram Arabum, quam putat ille duplcis generis olim fuisse, ceu in præcedente Dissertatione jam indicaverat; unam scilicet, quæ lepra vere esset; alteram vero, quæ falso nomine lepræ cum hodierna lue venerea eadem foret. Sed hæc meræ sunt fabulæ, quas Beckettus ad libidinem fingit, ut opinioni suæ patrocineretur, sed quæ jam abunde confutatæ sunt supra *cap. 3.*

Huc ergo recidit rationum summa, quibus Beckettus sententiam de novitate luis venereæ, quæ nunc fere omnium est, & quæ invalescit in dies, impugnandam aggressus est; nempe putat rem a se plenissime confectam adductis testimoniis aliquot, quæ ex obscuris & plerumque ineditis Scriptis conquisita, mutila, dubia, æquivoca sunt; imo etiam quæ ad alios morbos manifeste spectant. Næ egregia ad tantum molimen argumenta, quæ si apud æquos rerum æstimatores valitura essent, spondere ausim me haud dispari methodo probaturum Americam, quartam illam Orbis partem, a Priscis olim ante Christophori Columbi tempora & cognitam & navigatione petitam fuisse, quod tamen falsissimum esse puto; imo vero probaturum esse auctoritatibus pluribus & validioribus, quam eæ sint quæ pro luis venereæ antiquitate opponuntur.

CAPUT VI.

Confutantur argumenta reliqua, quibus nonnulli antiquitati luis venereæ patrocinari conantur.

FORTE jam multis video nimius esse in astruenda luis venereæ novitate. Nondum tamen confeci, & ut perdifficilis ille nodus expediatur, supersunt infirmenda vel diluenda potius aliquot alia argumenta, quæ contrariæ opinioni favere creduntur, quæ saltem in probationem contrariæ opinionis premi solent.

I. Petitur primum ex Statutis sequentibus, a Joanna I. utriusque Sicilia Regina & Provinciæ Comitæ, de disciplina Lupanaris publici Avenionensis anno 1347. sancitis, & Lingua vernacula scriptis, qualis tunc in Provincia usu vigeat, & quæ sane ab hodierna parum diffidet.

Statuta antiqua Lupanaris Avenionensis Lingua Provinciali scripta.

Statuta eadem Latine reddita.

I.

I.

*L'an mil trës cent quarante Or
st, au buet dau mës d'Avous*

Anno M. CCCXLVII. & die
8. mensis Augusti, Optima Re-

C 3

gina

I. Primum argumentum petitur ex Statutis Lupanaris Avenionensis.

Nostro bono Reino Jano à permès lou Bourdeou dins Avignon; Et vol que toudos las fremos debauchados non se tengon dins la Cioutat, mai que sian fermados din lou Bourdeou, & que per efre counhegudos que porton uno agullietto rougeou sus l'espallou de la man escaïro.

II.

Item. Se qualcuno à sach sauto & volgo continua de mal faire, lou Clavairé ou Capitané das Sargeans la menara soutou lou bras per la Cioutat, lou tambourin batten, embi l'agullietto rougeou sur l'espallou, & la lougeara din lou Bourdeou ambé las autros; ly defendra de non si trouba foro per la villo à peno das amarinos la promieiro vegado, & lou foré & bandido la secontó sés.

III.

Nostro bono Reino commando que lou Bourdeou singe à la carriero d'ou pon traucat, proché lous Fraïres Augoustins, jusqu' au Pourtau Peiré; Et qué siego uno porto d' au mesmo cousta, dou todos las géas intraran, & sarvado à clau per garda que gis de jounesso non vejeoun las dendas sensou la permissieou de l'Abadesso ou Baylouno, qué sara toudos lous ans nommado per lous Consouls. La Baylouno gardava la clau, aversira la jounesso de nen faire gis de rumour; ni d'aiglaye eis filios abandonnados; Autremen la mendra plagno que y ajo, noun sortiran pas que lous Sargeans noun lous menoum en priso.

gina nostra Joanna concessit ut Lupanar publicum esset Avenione; sed vetuit meritorias mulieres per Civitatem evagari, jussitque omnes Lupanari concludi, & ab iis, ut cognosci possunt, * ligulam rubram, ab humero sinistro gestari.

II.

Item. Si qua puella, quæ jam culpæ succubuerit, corpus vulgare velit, à Clavigero seu Capitaneo Apparitorum brachio prehensa per Civitatem ducatur ad tympani cantum, ligula rubra ab humero dependente, & in Lupanari collocetur cum cæteris, denuntiata, si primum inde exierit in Civitatem, virgarum in secretiore loco: si iterum, flagri & exilii pœna.

III.

Edicit optima Regina nostra ut Lupanar constituatur in vico Pontis pertusi, juxta Conventum Fratrum Augustinorum usque ad portam Peiré. (Petri) Et in eandem partem porta pateat, qua omnibus ingredi liceat, sed quæ clave referetur, ne quis juvenis mulieres adire possit sine venia Abbatisæ sive Bavlivæ, quæ quotannis à Consulibus eligetur. Bayliva clavem servet, moneatque juvenes ne turbas cieant, aut timorem ullum incutiant mulieribus meritoriis; sin secus, si qua fuerit expostulationis causa, non exituros esse, nisi ut ab Apparitoribus in carcerem conjiciantur.

* Sic lege cautum erat ut meretrices, quæ in Tolosano Lupanari prostabant, ligula ab humero dependente insignes essent. Palquier, *Recherches de la France* Liv. 8. chap. 13.

IV.

*La Reino vol que toudés lous sam-
dès la Baylouno & un Barbier depu-
tas das Consouls visistoun todos las fil-
lios debauchados, que seran au Bour-
deou; Et si sen trobo qualcuno qu'abia
mal vengut de paillardise, que talos
fillios sian separados & lougeados à
part, afin que non las counougoun per
evita lou mal que la juvinesse pourrid
prendre.*

V.

*Item. Sè sè trobo qualco fillio, que
sigo istado empregnado din lou Bour-
deou, la Baylouno nen prendra gar-
de que l'enfan noun se perdo, & n'
avertira lous Consouls per pourvesteu
à l'enfan.*

VI.

*Item. Que la Baylouno noun per-
mettra à gés d'amos d'intra dins lou
Bourdeou lou jour Vendré & Sandé
san, ni lou benbeura jour ve Pasques,
à peno d'estre cassado & d'avè lou
foré.*

VII.

*Item. La Reino vol que todos las fil-
lios debauchados, que seran au Bour-
deou, noun sian en gés de dispuo &
jalousié; Que noun se derauboun, ne
battoun, mai que sian commo sorés,
qué quand qualco carello arribo, que
la Baylouno las accordé & que caduno
sen stid à ce que la Baylouno nen
jugeara.*

VIII.

*Item. Se qualcuno a rauba, que
la Baylouno sisso rendré lou larrecin
à l'amiable; Et sè tatarrouno noui
lou sai, que ly sian donnados las
amarinos per un Sargeau dins uno*

IV.

*Jubet Regina Sabbato quolibet
a Bayliva una cum Chirurgo a Con-
sulibus præpositio mulieres merito-
rias singulas lustrari, quotcumque
in Lupanari prostant; Et si qua
scortatione ægritudinem ullam
contraxerit, a cæteris seponi ut seor-
sim habitet, ne sui copiam facera
possit, ut morbi præcaveantur, qui
a juvenibus possent concipi.*

V.

*Item. Si qua mulierum, quæ
in Lupanari prostant, gravidata
fuerit, caveat Bayliva ne quid de-
trimenti embryoni accidat, mo-
neatque Consules ut futuro partui
provideant.*

VI.

*Item. Caveat diligenter Bayliva
ne quis omnino in Lupanar admittat
diebus Veneris & Sabbati
Hebdomadis sanctæ, aut beata die
Paschatis; sin aliter faxit, exaucto-
randa & flagro cædenda.*

VII.

*Item. Imperat Regina, ut omnes
meritoriz mulieres, quæ in Lupanari
prostabant, nec rixa nec invidia
invicem contendant; a mutuis
furtis & jurgiis abstineant; & so-
rorum instar amice inter se vivant;
Et si quid dissidii intervenerit, a
Bayliva controversia dirimatur, cu-
jus judicio standum erit.*

VIII.

*Item. Si quid furto subreptum
fuerit, restitutio a Bayliva bona
gratia procuretur. Sin vero quæ
rea est, refractaria sit, primum
plectatur virgis ab Apparitor in
cam.*

*cambro, & la seconda lou foud per lou
Bouvreou de le Cioutat.*

IX.

*Item. Que la Baylouno nouu donna-
ra intrado à gis de Jusfious; Que se per
finesso se trobo que quaterusie intras,
& ago agu conneiffence de calcuno
dondo, que sia emprifounnat per avé.
lou foud per touto la Gioutat.*

conclavi; & si iterum eadem culpa
teneatur, flagro a Carnifice per sin-
gula Civitatis compita cædatur.

IX.

Item. Ne Bayliva Judæum ullum
in Lupanar receperit. Quod si vero
Judæus quidam clam & astutia in-
trogressus cum mulierum quapiam
rem habuerit, in carcerem conjici-
atur * flagro per Urbis compita
molestandus.

Quænam
sit illo-
rum Sta-
tutorum
auctori-
tas? Et
quænam
Joannæ
Reginæ
causa
fuisse vi-
deatur il-
la san-
ciendi?

Dicuntur Statuta illa reperta fuisse in veteri quodam Manuscripto, quod
exscriptum fuerat ex Actis Magistri cujusdam Tamarinini, Notarii Aven-
nionensis & Tabellionis Apostolici, anno 1392. Memini certe notationem
illam Apographo adscriptam fuisse, quod ab amico acceptum habui.
Ipse quidem in id sedulo incubui, ut omni ratione in Auctoritatem & *την
γνησιότητα* illorum Statutorum inquireretur, ac egregios doctissimosque
Viros tum Avenione, tum Aquis Sextiis consulendos curavi, num de No-
tario illo Tamarino, ipsive Statutis nescirent quidpiam, sed de neutro ni-
hil hætenus comperire datum fuit. Placuit tamen Statuta illa hic appo-
nere, tum quod aliquam veri speciem præ se ferant, tum maxime ne quid
sciens dissimulasse viderer, quod in meam opinionem torqueri posset.

Quod si ea Statuta vera sint & genuina, mirum forte videbitur Regi-
nam, annos tantum viginti tres natam, in instruendo legibusque infor-
mando Lupanari publico tam sollicitam fuisse, eo potissimum tempore,
dum gravioribus curis abstinere debuisset; ut quæ e Regno suo Neapoli-
tano ejecta fuerat a Ludovico Hungariæ Rege, Andræ fratris sui ac Joannæ
Mariti violentam mortem ulciscente, cujus ipsa conscia fuisse crede-
batur, & in Provinciam, quæ suæ ditionis erat, profugere coacta, Cle-
mentis VI. summi Pontificis Avenione commorantis præsidium implora-
tura. Hinc probe sentio Reginam illam venire in suspicionem vitæ dis-
solutoris & a modestia non parum alienæ, tanto quidem potiori jure quod
Historicorum testimoniis palam sit illam libidinis nomine male au-
diisse.

Nihilominus tamen, ut vere dicam, videtur Joanna non tam ingenio
sua, quam sui temporis consuetudini morem gessisse in Lupanari illo Aven-

* Profertur a Petro de Marca in *Appendice Marca Hispanica*, pag. 1038. Charta anni
1024. qua constat Hebræum quemdam, nomine Isaac, bonis molestatum fuisse, quod
adulterium exercuisset cum quadam Christiana.

nione instituendo. Constat similia prostibula, non in præcipuis modo * Italiz urbibus jam tum a longo tempore constituta fuisse, sed Romæ etiam juxta ipsummet summi Pontificis Palatium, unde tributum capiebat Murefcallus Curiz Romanæ, quod Exemplum Guillelmus Durandi commendari cupiebat in Concilio Viennensi. Vid. *Tractatum de modo celebrandi Concilii Generalis*, Part. 2. Titul. 10. Vidimus *precedenti capite* quid in Anglia constitutum fuerit anno 1430. de Lupanari publico suburbii Londinensis *Souburwarck* dicti. Aderant demum & in Regno Franciæ Lupanaria publica, præsertim in Occitania, quæ Provinciæ confinis est, ut liquet ex rationibus Curiz Computorum Montpelienfis redditus & quæ in ejusdem Actis extant, & ut maxime confirmatur exemplo Lupanaris publici Tolosæ instituti (a) jam ante annum 1201. atque privilegiis variis decorati a (b) Carolo VI. anno 1389: & a (c) Carolo VII. anno 1424. quod ab anno 1500. in deterius paulatim tendens, (d) circa annum 1566. penitus dilapsum est, nempe quod ex eo tempore quo morbi venerei vulgati fuerant, sumptus faciendi in curanda scorta, quæ lue inficiebantur, meretricios quæstus non æquarent modo, sed etiam plerumque superarent.

Neque vero putabant Principes, qui Lupanaria istiusmodi olim instituebant aut tuebantur a majoribus instituta, se ullius culpæ reos esse; imo contra se cum de Religione, tum de Republica mereri optime, ut qui eo pacto homines libidine perditos a pejore flagitio revocarent, matronarum virginumque pudicitiz consularent, ac graviora mala malis levioribus præverterent opportune. Verum an satis recte Principes illi senserint olim? An satis recte sentiant etiamnum, qui in ditione sua Lupanaribus publicis favent, aliis judicandum permitto.

Hinc certe consequitur Joannæ; qualitercumque morata ipsa fuerit, crimini vertendum non esse, quod pro more sua ætate recepto publicum Lupanar Avenione instituerit; sed laudi potius, quod institutum Lupanar, præ cæteris omnibus Principibus, præclarissimis, æquissimis, optimisque legibus informaverit. Cætera quidem legum illarum sive Statutorum capita parum moror, quibus nihil inest difficultatis. Hic expendendum tantum habeo articulum quartum, in quo cavetur de morbis venereis contagiosis, quem ideo putant Adversarii de morbis venereis intelligendum esse, & unde credunt horumce morborum antiquitatem certo argui.

Verum ut id conficiant, ipsis probandum prius incumbit nullos alios morbos olim fuisse, præter venereos quales nunc usu vigent, qui a scortis meretricio quæstu corpus vulgando contrahi, & ab iisdem usu rei venereæ in concumbentes propagari potuerint. Sin aliter enim, satius est de

mor-

(a) Catel. *Memoires de l'Histoire de Languedoc*, pag. 187.
(b) Trefort des Chartres.
(c) Catel ubi supra.
(d) La Fz. ille, *Annales de Toulouse*, Tom. 1. ad ann. 1424.

Ex art. 4. Statutorum probari non posse morbos venereos olim grafatos fuisse.

* De Lupanari publico, quod Venetiis ante annum 1500. institutum fuit Senatus de cæto; vide Niccolo Doglioni *L. 1. Delle cose Maravigliose e notabili della Città di Venetia*.

morbis illis olim vulgo obviis objectum articulum intelligi, quam contra aperta Auctorum omnium testimonia inde concludi venereos morbos to conflet olim viguisse, ut nunc vigent.

obvios Proinde argumentum, quod inde petitur, fundamento stat ruinoso, olim fuit. nisi prius probetur morbos venereos, qui nunc vagantur, solos esse, de se morbos alios, de quibus accipi possit quartus ille Statutorum articulus, quod adversarios quibus ar- numquam prastituros esse certi sumus. Concidit vero, ruitque funditus articulus il- si semel probetur præter venereos morbos nunc quidem vulgo obvios, le possit, sed olim plane incognitos, affectus alios quondam fuisse, qui promiscua debeatque & immoderata venere concipi, qui concepti semel in scortatores manare intelligi. Nempe 1. potuerint, & de quibus proinde articulus ille intelligi debeat, quod nos Vultur sequentibus testimoniis luculente confecturos esse confidimus.

rhagadia Nempe constat 1. Mulieres, quæ resupinæ multorum absorbent ictus & vaginæ etiam sanorum, vulvæ rhagadiis, aut superficialiis vaginæ ulcerationibus ulceratio- nes phly- affici: neque enim muliebres loci in venere immoderata & promiscua, ætænoide- jugi, concito, valido affricu distrahi, succuti, perfricari possunt; nisi as in me- suo incommodo ac detrimento, in iis sæminis potissimum, quæ juniores rettricibus, aut natura debiliores, molliore partium solidarum contextu præditæ sunt; unde ser- pebat in quibus uterus in sede male coercitus versus vulvam nimium descendit; scortato- res, quibus quæ cum viris mutoniat, aut quibus semen acrius est rem habent; de- cum cor- mum quæ locos, ubi collecta semina fracescunt, negligentius rariusque poracom colluunt &c. Hinc ergo palam est a vulgaribus meretricibus, quæ plerique recentis periculis maxime objectæ erant, similes paræque affectiones misce- frequentissime olim contrahi debuisse, semel contractas causæ ejusdem bant la- similisve iteratione, aut meretricia socordia in dies invalescere, ac tan- bes mul- tigena. dem cum scortatoribus communicari per diffusum in actu venereo tabum, 2. Fluor- rem mu- non secus ac scabies, herpes, furunculi &c. contagione propagantur, liebrem unde sobolescebant in viris virgæ erysipelata, herpes cenchriades, acrem & phlyctænæ, ulcuscula in balani superficie ac coronæ ambitu, qualia ante sætidum, uteri ul- notam luem veneream a Medicis describi supra vidimus Cap. 5. & 6.

Constat 2. Mulieres libidinosas, quæ frequentius subagitantur, si qua & carci- nativa uteri imbecillitas adfuerit, fluore muliebri uberi, acri, sætido; noma in imo vero ulcere uteri, aut quod pessimum est, carcinomate inde plerumque laborare. Fiunt nempe in utero, dum iterato, validoque erethismo percussitur ab erotico pathemate, stases anomalæ tum sanguinis tum limphæ, quibus colla uterina relaxari, unde fluor muliebris; uteri flamina ducindi, unde ulcera; demum limphaticos decubitus generari necessum est, unde skirrhi, qui in carcinomata plerumque desinunt. Haud mirum si meritorix mulieres, quæ publicæ parebant libidini, iisdem affectibus olim obnoxie fuerint, unde effectum sit ut præ acrimonia tabi vel phlyctænæ, ulcus. puris ab utero manantis, concumbentibus morbos varios intulerint, ut cula &c. bala-

balani, præputii, virgæ erysipelata, herpes cenchriades, phlyctenas, ulcuscula &c. qualia ab impuris meretricibus concipi narrant Auctores ipsi, qui primo luis venereæ ingressu antiquiores vixere, quæ de re vide supra cap. 5. & 6.

Constat 3. Ex iis, quæ præcedente capite dicta sunt, mulieres, quæ cum leprosis rem habeant, phlogosi erysipelatodæa vaginæ atque urethræ plerumque affectas fuisse, cum gravi & molesta dysuria, quod morbi genus *arsura* sive *incendium* dicebatur; virosque ipsos, qui cum iisdem concumberent sic infectis, imo etiam sanis, sed nondum lotis post admissum leprosum, simili parique affectione ut plurimum ægrotasse, quasi per contagionem contracta. Aderat ergo quandiu lepra viguit, morbus, qui venere a meretricibus contrahi; qui a meretricibus venere cum scortatoribus communicari potuit; qui olim quidem frequens esse debuit, sed qui cum abeunte lepra ipse quoque jam pridem abiit: vidimus enim supra cap. 6. cum gonorrhœa venerea nullomodo confundi posse.

Constat 4. Ex iis quæ eodem capite adducta sunt, lepram, ut convictu & conuberno, sic maxime venereo congressu ab infecto in sanum propagatam fuisse. Non est ergo dubium quin ea ratione prostibula in Lupanaribus lepram sæpissime contraxerint; quin contractam eandem afflaverint sæpissime sanis plerisque, quos non pudebat in Lupanaribus libidinari. Proinde antiquitus adfuit, quandiu lepra viguit, quarta morbi species nempe lepra iplamet, quæ venere concipi a meretricibus, quæ venere in scortatores manare potuerit.

Probe quidem novi (a) legibus olim cautum fuisse, ne leprosi cæterorum hominum consortio uterentur, sed nullibi credo lege huiusmodi ea diligentia observatas fuisse, ut leprosi nulli potuerint ex lege vagari & in Lupanaria clam irrepere. Certe constat Judæos omnibus semper invisos, & insigni nota a cæteris (b) discretos quam detrahere vetabantur gravi mulcta, in Lupanar ipsum Avenionense, quo illis interposita flagri poena cautissime interdictum erat articulo Statutorum ultimo, sese aliquoties innuasse, ut in Actis ejusdem Magistri Tamarinii narratur de Judæo quodam

C 4

Car-

(a) Voyez La Martre, *Traité de la Peste*, Liv. 4. Titre 12. Et scripta plerorumque Medicorum decimi tertii & decimi quarti sæculi, ubi de juridico leproforum examine.

(b) Divus Ludovicus jussit anno 1269. Rotam de seuto seu panno erocio a Judæis in superiori veste consui ante pectus & retro, cujus rotæ latitudo esset in circumferentia quatuor digitorum, concavitas autem contineret unam palmam. Prostant Edicta similia de re eadem Philippi III. dicti Audacis, anno Ludovici X. Hutini dicti, anno 1335. Joannis I. annis 1362. & 1365. Vide *Ordonnances des Rois de France par M. Secus* ff. ad illos annos.

Idem quoque constitutum erat in Provincia de Judæis ibi degentibus a Carolo II. Provincie Comite anno 1293. a Conciliis Avenionensibus annis 1326. & 1327. a Rege Ren-
Joanno 1454. Vide *Mémoires de Littérature & d'Histoire*, Tom. 2. part. 2. p. 362.

la verole sine epitheto, quæ sane denominatio variolarum in plerisque Galliarum Provinciis etiamnum usu valet. Hinc, ut obiter moneam, haud inanis suspicio est Carolum Thuillier, Doctorem Medicum, ignoratione præfati sermonis deceptum perperam omnino intellexisse, *Observations sur les Maladies Veneriennes, seconde edition, pag. 10.* quæ leguntur in Actis Senatus Parisiensis ad annum 1521. de N. Pouillot inter Magistros libellorum supplicum admissio die 25. Junii anni dicti, deinde in eodem Senatu Præfide, ac tandem mortuo *de la verole*, quasi scilicet significaretur postremis hæc vocibus dictum Pouillot lue venerea extinctum esse, cum significetur tantum variolis illum fuisse sublatum.

2. Constat e contrario lue veneream initio non *variola*, *la verole* simpliciter, sed *magnam variolam*, *la grosse verole* vocatam fuisse a Gallis, in cuius rei testimonium sufficit adduxisse. 1. Senatus Parisiensis Decretum anno ipso 1496. sancitum de disciplina erga eos observanda qui lue venerea infecti forent, quod infra proferetur *ultimo bujusce Libri capite*, & ubi morbus ille dicitur *la grosse verole*: 2. Galparum Torellam, qui in *Dialogo de dolore in pudendagra*, scripto in Gallia anno 1498. Petrum Angelum Agathum, qui in *adnotatione ad caput 2. Libri Gabrielis Fallopii de Morbo Gallico*, & Joannem de Maire; Poetam Gallum, qui in Carmine allegorico, dicto *Compte second de Cupido & d'Airopos*, scripto anno 1520. testantur diserte lue veneream a Gallis *grossam variolam la grosse verole* nuncupari: 3. Denique Laurentium Joubertum, Medicum Montpensensem, Theodoricum de Hery, & Ambrosium Paræum Chirurgos Parisienses, qui in Operibus *de lue venerea* scriptis annis 1577. 1552. & 1575. morbum illum nunquam dicunt *la verole*, sed semper *la grosse verole*.

3. Hinc ergo tantum abest ut lue venerea variolis antiquior censenda sit, ut contra inde consequatur vel ipso Adversarium judicio lue veneream, quæ olim *variola magna* sive *grossa* dicta fuit, variolis, quæ *variola* simpliciter appellabantur, recentiorum esse, ut a quibus adjecto epitheto distingui debuerit, quemadmodum in nobilium familiis stirpes, quæ gradu posteriores sunt, gentilitiam tesseram adscititio quodam symbolo distinguunt, quod Gallice dicitur *porter des armes brisées*, ut a primogenitis dignoscantur, quorum plena est ac pura tessera, quod Gallice dicitur *porter des armes pleines & sans brisure*.

4. Quod si vero jam ab aliquo tempore usu receptum sit lue veneream Gallice vocari *variola*, *la verole* simpliciter, sine appposito epitheto, id ideo factum est, quod cum ii, qui variolis ægrotabant, aut qui de ægrotis istiusmodi verba faciebant, diligenter caveret, & adjecto epitheto morbum illum a lue veneræ, turpi scilicet & probroso affectu, distinguere, *parvam variola*, *la petite verole* semper dicendo, usus tandem

las gallice olim dictas fuisse verole seu potius varirole sine ullo epitheto.

2. Contra vero lue veneream initio gallice nuncupatam fuisse *la grosse verole* ou *vaïrole* cum epitheto.

3. Inde proinde consequi ipso adversarium judicio lue veneream variolis recentiorum esse.

4. Usuramen factum fuisse, ut epithetum ad varias jam designan-

das iam
adhibea-
tur.

5. Quæ
singula
confir-
mantur
exemplo
cætera-
rum Eu-
ropæ na-
tionum.

dém invaluerit ut variolæ jam non amplius *la vèrole* simpliciter, sed semper *la petite verole* appellarentur, quocirca lues ipsa venerea, omisso jam epitheto quasi plane otioso, nuncupata fuit simpliciter *variola*, *la vèrole*.

5. Possunt allata egregie confirmari exemplo cæterarum Europæ nationum, quibuscunque lues venerea cum variolis homonyma est perinde ac nobis. Sic ab Anglis variolæ, *the pox* simpliciter, hoc est *variola*; raro *the small pox*, hoc est *parva variola* dicuntur; contra vero lues venerea semper vocatur *the great pox* vel *the french pox*, *magna variola* vel *variola Gallica*. Similiter a Belgis Germanisque variolæ appellantur plerumque simpliciter *die pocken*, variolæ, vel *die blattern*, pustulæ, aut ad lummum sed raro *die kinder pocken*, pueriles variolæ: ab iisdem vero lues venerea dicitur semper *die frankosische pocken*, variolæ Gallicæ, vel *die grossen blattern*, magnæ pustulæ.

III. Ter-
tium ar-
gumen-
tum peti-
tur ex eo
quod
Græca
sint plera-
que no-
mina, qui-
bus mor-
bi veneri
designan-
tur.

III. Denique sunt nonnulli, inter quos numerandus est (a) Fabius Pacius, Vicentinus, qui credant luis veneræ antiquitatem inde posse as- trui, quod Græca sint pleraque nomina, ut gonorrhœa, phimosis, para- phimosis, bubo, rhagadia &c. quibus morbi veneri designantur. Sed næ illi in re tum litteraria, tum medica plene hospites esse videntur, qui nesciant gonorrhœam, phimosim &c. a Græcis quidem Medicis olim observatas & descriptas fuisse, sed quæ causa & origine plene diversæ, nullomodo veneræ essent; inde vero eadem nomina, postquam apparuit lues venerea, deducta esse ad affectiones significandas genere quidem pa- res, sed causa disparces, ut quæ a seminio venereo, novo & prioribus sæculis inaudito veneni genere, oriantur. Quidni etenim licuisset in me- dicina, quod in alia quavis materia semper licuit, scilicet antiqua nomi- na & ad res quasdam designandas usu recepta rebus novis, si qua interce- deret convenientia, accommodare? Sic *un Regiment*, phalangem; *un mousquet*, catapultam; *la Poudre a canon*, pulverem pyrium; *la Boussole*, pyxidem nauticam; *l'Imprimerie*, Typographiam &c. Græcis vocibus di- cimus, quamvis certo certius sit hæc omnia a Græcis olim ignorata fuisse, ut quæ quam maxime.

(a) In
*Tractatu
de Morbo
Gallico*.
Sed nihil
futilius
excogita-
ri potest.

Quasi
vero non
licuerit
antiqua
nomina
ad mor-
bos no-
vos signi-
ficandos
accom-
modare.

C A P U T VIII.

Fabula de origine luis veneræ referuntur & refelluntur.

UT Medicorum omnium, qui decimo quinto desinente & ineunte decimo sexto sæculo vixerunt, constans & unanimis fuit senten- tia, novam esse luem veneream; sic eorundem variz & discordes fuere opiniones de eisdem origine. Plerasque, cum fictæ & vanæ essent, tem- poris diuturnitate extabuisse videmus: Commenta enim delet dies. E re- ramen

Luem ve-
neream
falso de-
ductam
fuisse.

tamen fore visum est potissimas paucis referre ordine chronologico, & refellere paucioribus, ut saniori, quam mox proponemus sequente capite, viam planiorem & faciliorem patefaciamus.

I. Antiquiores Medici, ut temporum ferebat conditio, seu potius supersticio, Astrologorum nugis aniliter creduli diræ suis originem a maligno Astrorum influxu, aut a malefica Planetarum coitione deducendam certatim credere, sed ut error sibi male constet, a variis variorum Planetarum coitionibus varii deduxere.

I. A maligno siderum influxu.

Sic anno 1497. Coradinus Gilinus, in Opusculo de Morbo Gallico, quod jam supra laudavimus, aserebat ortum morbi adscribendum esse conjunctioni Saturni & Martis, quæ fuit 16. Januarii 1496. circa meridiem, quæ significabat corporum humanorum mortalitates; aut conjunctioni Jovis & Martis, quæ fuit die 17. Novembris 1494. in signo calido & humido, vapores a terra & aqua elevando, quas Mars calidus & siccus inflammat & ignit, quibus postea aer immutatur & corrumpitur, humoresque corruptos & addultos generans harum ægritudinum causa est.

Sic anno 1500. Caspar Torella aiebat Trah. De Pudendagra, hunc morbum evenire a constellatione corporum superiorum, eo quod effectus universalis in causas universales resolvi debet; & hoc propter Saturnum existentem in Ariete: nam in Ariete & in Piscibus sunt quædam stellæ habentes virtutes generandi monstra.

Sic anno 1514. VVendelinus Hock de Brackennavv, qui, ut supra vidimus capite 4. suis venerex ingressum refert ipse ad annum 1494. ex præjudicio tamen cum seipso pugnans contendebat Operis de Morbo Gallico cap. 2. hunc morbum verius cepisse exordium anno Domini 1483. quia eo anno mense Octobris fuerunt quatuor Planetæ, videlicet Jupiter, Mars, Sol, & Mercurius in Libra in domo ægritudinis & significat ægritudinem ex corruptione sanguinis & cholæræ: Et fuit ibi combustus Jupiter eodem signo: Fuitque ibidem conjunctio Jovis & Martis & Mercurii: Et Martis & Veneris, Jovis & Mercurii, & Jovis & Veneris de mense Octobris die prima Novembris. Fuit præterea his eclipsata Luna eo anno, tam in scorpione in domo ægritudinis, quam in ejus opposito. Fuit præterea in eodem Scorpione in ipsa domo ægritudinis combustus Saturnus & Mercurius, conjunctus Saturnus & Venus, fuitque conjunctus Saturnus & Mars in ultima Novembris, & sic significaverunt corruptionem sanguinis & cholæræ, & conjunctiones omnium humorum, & abundantiam humoris melancholici tam in viris quam in mulieribus.

Sic demum anno 1532. Laurentius Phrisius, Opuscul. De morbo Gallico, cap. 3. putabat Sciendum esse ad causæ morbi primitivæ evidentiam, quod in anno Christi 1483. fuerunt nonnullæ Planetarum congressiones, die videlicet 25. mensis Octobris hora 2. post meridiem. Ut autem clarius intelligas, aiebat ille

ille, scito, tempore præfato Jovem, Martem, Solem & Mercurium simul coisse in Libra, in octava domo quæ agnitudinis est significativa. Fuit quoque humana nature amicus Jupiter combustus.... Præterea advertendum est furiosum fuisse hunc annum, quia prima die Novembris corroboratæ sunt illæ impressiones conjunctionibus scilicet Martis & Veneris, Jovis & Veneris in domo agnitudinis præfata. Luna quoque duas passæ est eclipses, unam videlicet in Tauro, alteram in Scorpione.

Similia legere est apud Petrum Maynardum, Veronensem, *Traſſatu de Morbo Gallico*, c. 3. anno 1518. Nicolaum Massam, Venetum, *Traſſ. de Morbo Gallico*, cap. 6. anno 1533. Ulrichum de Hutten, Equitem Germanum, *Lib. de Morbi Gallici curatione per administrationem ligni Guaiaci* cap. 2. anno 1519. Hieronimum Fracaſtorium, Veronensem, *Lib. 2. de Morbis contagiosis*, cap. 2. anno 1540. Joannem Benedicum, Germanum, *Libell. de Morbo Gallico*, cap. 2. anno 1550. &c.

Sed ea propoſuiſſe, præſenti quali vivimus ætate, abunde reſellere eſt. Nunc enim cordatioribus phyſicis certo liquet: 1. Planetas in corpora noſtra nullo influxu agere, quo poſſint naturalem œconomiam ullatenus ſovere aut pervertere: 2. Utcumque agere poſſent, nullo niſi cæco fundamento niſi diſcrimen, quo diverſos Planetas placuit Aſtologis diſtinguere in benignos & malignos: 3. Demum etiam admiſſa vana hæc diſtinctione nec Planetas nec Planetarum concuſus ulla ratione conferre ad morbi generationem, a quo ſibi cavere, quem ſibi procurare unicuique licet pro lubitu.

II. Ab acciſis vitiis
ſa intem-
perie.

1497.

Puduit Medicorum nonnullo vanis Aſtologorum aſſertionibus nimium conſidere; unde factum eſſe videtur, ut quidam neglectis Aſtologorum judiciis, de quaſtione media juxta certa artis axiomata convenientius ſenſerint, morbi novi cauſam ad peculiarem aeris intemperiem referendo. Sic verbi gratia anno 1497. Nicolaus Leoniceus, Vincentinus, in *Libello de Morbo Gallico*, poſtquam expoſuit hunc morbum aut divina ira, ut Theologi ſentiunt; aut *vi Aſtrorum*, ut Aſtologi opinantur; aut ex certa aeris intemperie, quemadmodum Medici arbitrantur, evenire; ita inde pergebat: Nos Medicos hæc in parte ſequentes cauſas naturæ proximiores aſſignabimus. Illud ſatis conſtat eo anno, quo Morbus Gallicus cepit pullulare, magnam aquarum per univerſam Italiam fuiſſe exuberantiam. Teſtis eſt Roma, quæ prima id malum ſenſit, in qua Tybris ita intumuit, ut tota ſit ſæſta navigabilis.... Non aliter quam in Romano Tybris, in agro etiam Bononiæ Rhenus, in Ferrarienſi & Mantuano Padus, in Venetia Aſbeſis extra ſolitos limites exundarunt. Tantis denique imbribus annus ille ubique maduit, ut terris exinde humentibus atque ſtagnantibus, minus mirandum ſit æſtivum aerem, ad illam veniſſe intemperiem calidam ſcilicet & humidam quam Medici atque Philoſophi omnium putredinum matrem eſſe conſtituntur..... Scabies vero Gal-

lica,

lica, si scabies est appellanda, per universam tunc apparuit Italiani, & adhuc perstat adeo fœda, ut plerique Medici quadam decepti similitudine elephantiasim esse putaverint.

Cum Leonicensi hac in re consenserunt Natalis Montesaurus, Veronensis, in *Traſſatu de Diſpoſitionibus: quas vulgares Mal. Frânzeſo appellant*, edito anno 1498. c. 4. quanquam ab eodem de cæteris diſſentiat: Antonius Scanarolus, Mutinensis, in *Diſputatione de Morbo Gallico & opinionis Nic. Leonicensi confirmatione, contra Natal. Montesaurum, Veronenſem*, eandem opinionem oppugnante m; quæ typis vulgata ſuit anno 1498. Demum Leonardus Schmaj, Salisburgensis, *Traſſatu de Morbo Gallico*, c. 1. quem ſcribebat anno 1518.

Sed patet huiusce opinionis vanitas 1. Ex eo quod ſi lues venerea a pluvio cœli ſtatu ortum duxiſſet, debuiſſet jam ante annum 1494. ſæpius in orbe noſtro apparere, cum procul dubio ſæpius ante recurrerint tempeſtates æque humide calidæque: 2. Ex eo quod debuiſſet jamdudum lues venerea evaneſcere, ſi ab allata cauſa unice penderet, quæ contraria aeris temperie, calida nempe & ſicca, pridem diſſipata foret, quorum tamen neutrum verum eſt. Sed quid opus pluribus conſodere opinionem, quæ ſponte ruit? Satiuſ eſt annotare hanc ſicut præcedentem opinionem ex mero præjudicio acceptam videri, nempe cum morbi natura nondum ſatis perſpecta, & ægrotantibus modum, quo luem contraxerant, caute diſſimulantibus, falſo crederetur Morbum Gallicum epidemicum eſſe peſtis inſtar, & peſtilentium effectuum, etque adeo a cauſa univerſali & communi dependere, quæ ſingulos, niſi nativa temperies obſtaret, poſſet inſicere; quod ſane tum a Leonicensi, tum a cæteris quos hætenus præſenti capite laudavimus, creditum olim fuiſſe ſcriptis liquet. Neque enim purandum eſt ſanos alioquin viros potuiſſe unquam, luem veneream cauſæ communi, aeris ſcilicet vitio aut Planetarum aſpectibus tribuere, ſi compertum habuiſſent hanc morbi ſpeciem non ab aere duci, ſed contagione tantum & contagione præſertim venerea propagari.

III. Sed ubi primum melius innotuit morbi natura, & contagionis ratio, neceſſe ſuit cauſas alias comminiſci, quæ morbo iſtiusmodi producendo aptiores viderentur: Inde ortæ variæ & multiplices ſabulæ, prout quique ad comminiſcendum ſuit ingenioſior.

Sic 1. Joannes Manardus Ferrarienſis, *Epistoſta 2. Lib. 7. quam ad Michaelem Sanctannam Chirurgum ſcribebat circa annum 1525. aſſerit Quosdam eſſe, & hanc eſſe antiquiorem ſententiam & majoribus ſultam teſtimonium, qui caſiſſe hunc morbum per id tempus dicunt, quo Cæſar Francorum Rex expeditionem Italicam parabat: Caſiſſe autem in Valentia Hiſpaniæ Tarraconenſis inſigni civitate a nobili quodam ſcorto, cujus noctem elephantioſus quidam ex equeſtri ordine miles quinquaginta aureis emiſit; & cum ad mulieris concubitum*

D

fre

1525.

III. Ab aliſcauſis quibusdam ſpecialioribus.

1. A Scorto quodam Valentino, quocumque leproſus rem habuerat.

frequens juvenus accurreret, intra paucos dies supra quadringentos infectos, e quorum numero nonnulli Carolum Italiam petentem sequuti præter alia, quæ adhuc vigent importata mala, & hoc addiderunt inter minima non deputandum. Similem, si non eandem, historiam narrat Petrus Andreas Matthioli, Senensis in Opusculo de Morbo Gallico, sed mutatis tum persona, tum scena, quod dubiam & incertam famam arguit. Nonnulli, inquit, Morbum Gallos, cum per montem Salvium iter facerent, a faminis leprosis per coitum primitus contraxisse.... memorie prodiderunt.

2. A Scorto alio quodam in Gallorum castris, cuius in utero abscessus lateret.

1551.

Sic 2. Antonius Musa Bralsavolus, Ferrariensis, Lib. De Morbo Gallico narrat in Gallorum castris scortum adfuisse nobilissimum ac pulcherrimum, in uteri ore putrefactum gerens abscessum. Viri, inquit, qui cum illa coibant, adjuvante etiam humiditate ac putredine, dum membra virilia per uteri cololum perfricabant, ob loci etiam putredinem in eorum virilibus membris pravam quamdam affectionem contrahabant, qua exulcerabantur..... Hæc lues unum primo infecit hominem, postea duos & tres & centum; quia illa erat publica meretrix & pulcherrima; & ut procax est humana natura in coitu, multe mulieres cum his vitiatas viris cocuentes lue ista infectæ sunt, quam deinde aliis viris sunt impartitæ.

3. A Puteis, Hispanorum perfidia venenatis, aut a gypso cum farina misto.

1560.

4. A vino veneno infectis.

1602.

Sic 3. Gabriel Fallopius, Mutinensis, Traët. de Morbo Gallico, cap. 1. contendit Hispanos, callidissimos atque cautos milites, qui gladiis hostes, dolis & arte offendunt (nam, inquit, dolus an virtus quis in hoste requiratur?) cum ipsi essent pauci, Gallorum vero numeros propemodum infinitus, nocte egressos esse relinquentes propria præsidia & puteos venenasse. Nec satis hoc fuisse, Italos pistores in exercitu adverso degentes pretio corrupisse, qui gypsum pani admiscerent.

Sic demum 4. Andreas Cæsalpinus, Aretinus, Clementis VIII. summi Pontificis Medicus, gloriatur Artis Medicæ Lib. 4. cap. 3. Aliam historiam se habere veriore, ab iis traditam qui interfuerant, ex milite Aretino qui in eo bello militabat cum Hispanis. Is, inquit, referebat oppidum in Monte Vesuvio, quod Somma dicitur, ubi copia est vini generosi, quod Græcum appellatur, clam noctu ab Hispanis derelictum obsidentibus Gallis, sed vino infecto sanguine, quem extraxerant ex iis, qui in Hospitali sancti Lazari laborabant. Ingressos igitur Gallos atque eo vino expletos capisse laborare comparentibus severissimis symptomatis elephantiasim referentibus.

Sed hæc gerræ germanæ sunt, & profecto gerræ maxumæ: Nam 1. Miles ille elephantiacus Manardi scortum Valentinum, & leprosæ mulieres Matthioli Gallos, quibuscum miscebantur, non lue venerea, qua immunes erant, sed lepra qua laborabant, debuerunt inficere. Sicut enim canis canem, sic morbi contagiosi quilibet, dum in sanos propagantur, affectus sui similes & ejusdem naturæ progenerant. Adde in dubio nullatenus esse posse, quin jam ante Caroli VIII. tempora, & post eadem

eadem, quandiu lepra Europæ inolevit, leprosi aut leprose cum bene valentibus furtiva aut permissa venere usi fuerint, neque tamen comperit fuit quid monstri unquam inde prodiiisse.

2. Idem sentiendum de meretrice Bratsavoli, in cujus utero abscessus aut potius ulcus latebat. Facile equidem crediderim puris aut ichoris inde manantis acrimonia scissuras, phlyctænas ulcerationes leviores & facile curabiles in balano, præputio, totoque pene excitari potuisse; at vero luem veneream minime, affectionem scilicet ita peculiarem, quæ a cæteris morbis causa, symptomatis, contagionis modo plane dispar sit. Profecto, ut humanum genus in venerem primum est, contigit plures viros cum mulieribus, quarum uterum ulcus depalcebatur, rem habuisse sine ullo luis venereæ contrahendæ periculo, modo ipsæ essent talis labis plane expertes.

Sed incidit in animum suspicio, nec vana forsan, Elephantiacum Mandardi leprosas fœminas Matthioli, meretricem ulcere uteri laborantem Bratsavoli, luem veneream, quam jam contraxerant, pudore, malitia, aut ignorantia falso nomine celavisse, ut per morbi initia facillimum erat; quæ si ita sint, haud sane mirum erit contaminata venere morbum propagatum fuisse, sed mirum erit tantummodo Medicos sui ævi celeberrimos id nequaquam subolsescisse.

3. At saltem mirari satis non possumus aut Fallopium, qui aqua puerorum Hispanis venenata, vel gypso a pistoribus Italia pani addito; aut Cæsalpinum, qui vino, cui sanguis a leprosis eductus mixtus esset, crediderunt luem veneream in Gallorum exercitu excitari potuisse. Inde sane & graves & lethales affectus induci certo certius est: Sic C. Proculejus Augusti Cæsaris familiaris gypso poto in maximo stomachi dolore mortem sibi olim conscivit, teste Plinio, *Histor. Natural. Lib. 36. cap. 24.* Sic quondam misere periit fere totus Germanorum exercitus, qui duce Conrado III. Imperatore Germanico, Iconium obsidebat anno 1148. cum perfidia Emanuelis Imperatoris Constantinopolitani farinæ gypso adulteratæ subministrarentur. Vid. Funccium in *Chronolog.* Sic anno 1321. regnante in Gallia Philippo V. qui Longus cognominabatur, leprosi Judæorum suasu & Mahumetanorum, ut fama ferebat, Granatenfis & Thuhetani Regum infligatione puteos veneno infecerunt, unde plurimi Christiani misere interiunt. Vid. Mezerai *Abr. Chronolog.* ad ann. 1321. Sed hæc exempla ipsamet, utcumque ratio conticesceret, abunde probant talium venenorum haustu morbum nunquam invehiri posse sporadicum, novæ indolis & naturæ, cæteris morbis notis dissimilem, qui impura & vulgivaga venere propagetur; demum qui eos nunquam attingat, qui nulla vel qui, pura tantum venere utuntur.

IV. Ab
humana
carne in
escam
apparata.
1564.

IV. Novam de hujus morbi origine historiam, & ad sua usque tempora plane inauditam Leornardus Fioravanti, famosus suo tempore in Italia Empiricus retulit in Tractatu Italice scripto & anno 1564. edito, cui titulus est, *Capricci Medicinali de M. Leonardo Fioravanti*. Hanc ut omnem mendacii suspicionem amoliretur, se accepisse ait a quodam Paschali Gibilotto, sene Neapolitano, & annos jam nato 98. cujus pater, a quo filius rem tenebat, annonarius præbitor, (vulgo *Vivandier*) olim fuerat circa annum 1456. in exercitu Alfonfi V. Regis Arragoniz, qui de Regno Neapolitano cum Joanne Renati Ducis Andium filio bello contende-
bat.

Narrat ergo, cum diuturno illo bello obsonia tum Hispanis tum Gal-
lis defecissent, utriusque exercitus præbitores lucri causa sed scelere pes-
simo humanorum cadaverum carnes clam succisas in varia escarum gene-
ra apparasse, quæ militibus esurientibus care divendebantur: Inde brevi
quotcunque tam feralibus escis vesci contigit, pustulis, doloribus, alope-
cia, uno verbo lue venerea ad unum fere omnes correptos fuisse: Gallos
quidem morbo afflictos, cum ab incepto bello cogerentur desistere & in
patriam redire, luem, quam in Regno Neapolitano conceperant, Nea-
politani nuncupasse: Hispanos, vero, Italosque, cum ignorata morbi
causa persuasum haberent morbum novum, quam patiebantur, a Gallis
devectum & communicatum fuisse, Gallicum eundem appellavisse, qua-
le nomen etiamnum retinet non modo in Italia, sed in tota Africæ ora,
totoque Turcico Imperio, præsertim in cunctis Asiæ portubus, qui mari
adstant Mediterraneo.

Addit ille dein se allatam morbi Gallici originem veram esse experi-
mentis compertum habuisse: Suam scilicet domi aliquandiu nutritivisse
carne porcina cæteris cibariis admista, unde brevi sus pustulis oblita,
lapsisque fetis glabra fuerit: Pariter canem duos menses canina carne alu-
isse, qui simili successu pustulis plenus pilos amiserit: Demum accipi-
tri circuri escam ex carne avium ejusdem speciei aliquandiu obrulisse, un-
de cito evaserit pustulatus & deplumis: Hinc concludit animalia quævis,
si carne animalium sui generis nutriantur, Morbo Gallico, vel qui Galli-
co plane congener sit, correptum iri.

Sed hæc credulum aut vanum & mendacem Fioravanti animum, qualis
Empiricum decet, manifeste arguunt. Nam 1. Aferit falso luem Gallicam
Italiz innotuisse circa annum 1456. quo quidem tempore Joannis Renati
Ducis Andium filius & Alfonsus V. Arragonum Rex de Regno Neapoli-
tano bello diuturniore certare, cum, ut supra vidimus, Medici qui de-
finente sæculo decimo quinto in Italia florere, luem veneream in Ita-
lia ante annum 1494. plenissime ignoratam fuisse omnes uno ore confi-
teantur.

2. Temere credit lue veneream, morbum scilicet chronicum, sporadicum, qui venere contrahitur, qui lenta tabe corpus vitiat, esu carnis humanæ & potissimum morticinæ inferri, cum e contra acutos tantum, epidemicos, pestilentes affectus hinc induci posse manifestum sit.

3. Fallaciter concludit animalia quævis, si carne animalium ejusdem speciei nutrantur, doloribus & pustulis brevi corripri, & pilorum defluxu glabrescere ex lue venerea, cum mihi certo constet in cane, quem sex mensibus carne canina olim nutriti, nihil quidquam simile unquam observatum fuisse.

Valeat ergo fallax fabulator cum suo Paschali Gibilotto, teste ignoto, teste unico, teste tantum aurito, teste minus idoneo, qui de re jam ante centum annos peracta testimonium ferat, teste qui cum nota rei veritate aperte pugnat, demum teste decrepito & dubio procul deliro.

Mihi profecto dolet quod Franciscus Baco de Verulamio, vir doctissimus & in rebus physicis pro sua ætate apprimè versatus tam insulso commento deceptus fuerit. Nihilominus tamen non dissimulandum censeo eum ita deceptum esse, ut non modo huic tabellæ fidem ipse adhibuerit, sed eidem apud alios fidem facere voluerit; eoque consilio illam operibus suis interere non dubitavisse, sed prius quodammodo resectam & interpolatam, ut credibilior esset. Galli, inquit; *Sylva Sylvarum sive Historiæ Naturalis*, Centur. 1. adie. 26. a quibus morbus Neapolitanus denominationem accepit, referunt fuisse in Neapolitana obsidione improbos mercatores, qui carnem hominum recens occisorum in Mauritania vasis conditam, loco rhyngorum divenderent; atque tam fixo & gravi nutrimento adscribi hujus morbi originem. Neque a vero abluendis: Constat enim Cannibales ad Occidentem vesci carne humana; eaque India, primum detecta cum esset, plurimum laboravit hoc morbo. Quæ sane appertissime probant, ut a Cicerone dictum meminimus, *Lib. 2. de Divinatione*, nihil tam absurde dici posse, quod non dicatur ab aliquo Philosophorum.

V. Videntur mox adducta Ciceronis verba verissime quadrare in Joannem Baptistam Vanhelsmont, qui de origine luis venereæ novam & omnium maxime monstruosam fabulam narravit: auctoritate quidem nulla bulloque fundamento nixam, sed visione tantum somniali ut ipse ait, Fanatici cujusdam parum sani, imo ne visione quidem, sed conjectura commentitia, quæ ex vana & inani visione deducitur. Nempe narrat (a) Helmontius Laico cuidam quem ille virum sanctum dicit, quem lymphatum verius dixisset, animo apud se indaganti cur ita lues præterito seculo, & non antea erupisset. Unde, si non ab Indis, in Europam devenerit, visum fuisse in visione intellectuali jumentum, quod pene diffueret ulcere fastidioso, qui morbus equinæ spei proprius a nostratibus (Belgis) den VVorm

V. A nefando congressu cum jumento scabido. 1640. (a) In Tumulo Pestis, artic. 1. scribitur. Petegri-na lues nova.

a Gallis vero le Farcin vocatur. Unde ille suspicatus est quod in obsidione Medapolitana, (qua primum dira hec lues emerfit) nefando aliquis peccato congressum cum ejusmodi jumento habuisset unde suum fermentum (permitte Deo vindice) in humanam familiam naturaliter transplantaverit. Cui conjecturæ Helmontius aniliter credulus totis viribusiple suffragatur. Sed pudet otio abuti in iis tractandis quæ turpia, aut confutandis quæ absurda sunt. Si quis tamen plura cupiat, adeat infra Lib. v. t. Caput de Helmontio ad annum 1640.

CAPUT IX.

Luem veneream in Insulis Antillis a Christophoro Columbo detectam, ac præsertim in Insula Hispaniola, quæ nunc Insula Sancti Dominici appellatur, endemiam antiquitus fuisse, & inde in Europam transmissam esse.

Quo tempore Insula Antille a Christophoro Columbo detectæ fuerint?

CONSTAT Historiæ monumentis novum orbem auspiciis Isabellæ Reginæ Castiliarum & Legionis, consilio & ductu Christophori Columbi, Genuens, detectum fuisse sub finem sæculi decimi quinti. Hic cum navibus tribus, militibusque vel nautis numero 120. solvit e portu Bæticæ, quem *Palos* nominant, die 3. Augusti, anno 1492. Post errores laboreque varios appulit 6. Decembris ejusdem anni ad Insulam Indigenis *Haiti* dictam, quam Columbus *Hispaniolam* vocavit, quæ nunc Insula Sancti Dominici appellatur. Inde, constructo prius propugnaculo, cui Nativitatis nomen dedit, & ubi 38. milites reliquit, discessit die 6. Januarii anno 1493. & tempestate æstus ostium Tagi in Lusitania invitus subiit die 6. Martii ejusdem anni. Hinc cum 82. sive militibus sive nautis & novem Indis, quos secum adducebat, incolumis rediit die 15. ejusdem mensis ad eundem Bæticæ portum, qui *Palos* dicitur, & inde pedestri itinere Barcinonem perrexit, ubi Rex & Regina Hispaniarum tunc aderant, susceptæ navigationis rationem redditurus.

Quæ fuerit mutui commercii reciprocatio inter Hispaniolam & Hispaniam ante annum 1495.

Christophorus renovato apparatu navali a Gadibus vela denuo fecit die 25. Septembris ejusdem anni 1493. cum navibus septemdecim, militibus volonibusque 1500. multisque nautis ac operis, & ad portum Regium in Insula Hispaniola, a propugnaculo, quod Nativitatis dictum fuerat, haud longe distantem, reversus est die 27. Novembris; unde in eunte anno sequente 1494. naves quatuor & decem in Hispaniam remisit, quibus ducem præfecit Antonium de Torrez.

Mense Aprili ejusdem anni 1494. Bartholomæus Columbus, Christophori Frater, Hispaniolam adivit cum navibus tribus; & sub ejusdem anni finem iisdem navibus in Hispaniam rediere P. Boyl, Catalanus, Mo-

na-

nachus Benodictinus, & Petrus Margarit, nobilis Catalanus, qui jam lue venerea graviter ægrotabat.

Anno eodem mense Augusto quatuor alia naves ab Hispania ad Insulam Hispaniolam appulere, duce eodem Antonio de Torrez, quæ procul dubio cito quoque ad Hispaniam remissæ sunt, ut de præcedentibus dictum est. Imo tunc, ut mense quolibet navis una ab Hispaniola in Hispaniam, navisque altera ab Hispania in Hispaniolam solveret reciproci commercii causa constitutum est.

Demum mense Octobris anni 1495. Joannes Aguado Regum Catholicorum Legatus navibus quatuor in Hispaniolam decessus est, ut de objectis Christophoro criminibus auctoritate Regia inquireret; & inde subsequente anno cum navibus duabus Gades repetiit, quo appulit die 11. Junii anno 1596. cum Christophoro, & ducentis militibus, qui lue venerea infirmabantur.

Versamur scrupulosius in enumeratione itinerum, quæ inter Hispaniolam & Hispaniam primis annis instituta sunt, ut inde liceat colligere, etsi daremus nulla alia confecta fuisse præter ea quæ ab Historicis memorantur, frequenti tamen noti commercii reciprocatione Hispanorum & Indorum nationes jam mixtas fuisse ante annum 1495. aut 1496. adeoque luem veneream potuisse facile ab Hispaniola in Hispaniam jam tum derivari, ut fert communis opinio, si constiterit semel eam luis speciem indigenis Hispaniolæ antiquitus propriam fuisse & endemiam.

Sed controversiam, ubi semel ad eam quæstionem adducta est solutam jure possumus dicere, cum luculentissima adsint tum Medicorum tum Historicorum testimonia, qui primo morbi ingressui in Europam cœtanei vixere; unde aperte demonstratur non modo 1. Luem veneream in Insula Hispaniola ac cæteris vicinis endemiam fuisse; sed etiam 2. In Hispaniam navium commercio inde traductam esse; ac demum 3. Ex eadem Insula aut ex vicinis talis morbi genitricibus quæsitum morbo remedium, & indigenarum exemplo indicatum fuisse, cum nulla in Europa suppeterent satis efficacia.

Primo. Inter Medicos, qui possunt in testimonium adduci, potissimi sunt.

1. Antonius Musa Brascavolus, qui in *responsione ad primam quæstionem Alexandri Fontane*, de ligno indico sive Guaiaco verba faciens sic loquitur. „Cum Gallicus affectus, vel similis quidam sit fere peculiaris incolis, qui indicas nuper repectas Insulas inhabitant, Lusitani viri ingenio perspicaces, qui frequenter illuc appellant, homines Indicos videntes tali affectu præditos, talibusque symptomatibus, qualibus in Hispania ac Lusitania illi afficiuntur, qui lue Gallica laborant, quomodo indi illi curarentur ac facile in sanitatem restituerentur animadvertent, &

Luem veneream antiquitus endemiam fuisse in Hispaniola.

Probatur testimonio Medicorum. 1. Anton. Musæ Brascavo. li.

„ curandi modum in Lusitaniam ac Hispanias attulerunt, & una secum
 „ lignum hoc Indicum comportarunt cujus decoctum, *pergis ille*,
 „ ego primus Ferrariz præbui illustri Ænez Pio in dulci aqua. 1526. cum
 „ omnibus aliis Medicis novum ac inauditum videretur (ut vere erat)
 „ medicamentum, multique idipsum deridebant, quousque videre illu-
 „ stre Virum sanitati restitutum esse.

II. Rodericus Diaz
 de Isla.

II. Rodericus Diaz (vulgo Rui-Diaz.) de Isla, Medicus Hispalensis,
 in *Libro singulari* Hispanice *Lripto contra las Bubas*, quem Joanni III.
 Lusitaniz Regi nuncupavit, & quem ideo scriptum fuisse necesse est ante
 annum 1557. quo Joannes III. mortem obiit, sequentia habet *cap. 1. a*
Georgio Hieronymo Velschio sic Latine reddita in Annotatione ad Obser-
vationem 4. Marcelli Cumani. „ In Hispaniis morbus ille vilis est anno
 „ 1493. Barcinonæ, quæ primum infecta est, & sic deinceps Europa cum
 „ reliquo orbe universo, cujus partes hodie innotuerunt. Originem traxit
 „ in Insula Hispaniola, quod satis longa certaue experientia compertum
 „ fuit. Cum enim a Christophoro Colono (sive Columbo) Thalassarcha
 „ reperta & detecta esset, militibus cum incolis conversantibus, quod af-
 „ fectus contagiosus esset, facile communicatus est, & quam citissime in
 „ exercitu gralsabatur, cumque dolores ejusmodi numquam ab illis con-
 „ specti aut cogniti essent, causam in maris labores & navigationum mo-
 „ lestias referebant aliasque occasiones, ut cuique probabile visum erat.
 „ Et cum eodem tempore, quo Colonus Stolarcha appulerat, Reges Catho-
 „ lici Barcinonæ degerent, quibus itineris rationem reddebat, nuper-
 „ que adeo reperta denarrabat, mox tota urbs eodem morbo corripi cæ-
 „ pit latissime se diffundente, sed quia incognitus hætenus valde-
 „ que formidabilis videbatur, jejunia, religiosæ devotiones aliz & elee-
 „ mosynæ institutz sunt, ut Deus illos a morbo tueretur. At sequente mox
 „ anno 1494. cum Rex Galliarum Christianissimus Carolus, qui tum re-
 „ rum potiebatur, ingentem exercitum in Italiam duxisset, multi Hispano-
 „ rum, qui hostes illorum erant, ibidem hac lue infecti vivebant, adeo
 „ ut mox Regiæ copiz inficerentur; ignarz tamen quis qualisve morbus
 „ esset, auquo nomine appellandus, credebant ex ipso aere regionis
 „ subortum. Vocarunt igitur *Malum Neapolitanum*: Itali autem & Neapo-
 „ litani, quibus nulla ejus hucusque notitia, *Gallicum* nominabant. Dein-
 „ ceptus vero, prout acciderat, quisque pro lubitu aliud nomen impone-
 „ bat inde delumptum, unde originem subnasci putaret: Castellani *Boas*,
 „ in Lusitania autem *Malum Castellanicum*, in India Lusitanica *Morbum Lu-*
sitanicum.

III. J. B.
 Montani

III. Joannes Baptista Montanus, in *Traſſatu de Morbo Gallico*; „ A.
 „ Christi. inquit, Navitate 1492. quidam Columbus miles una cum
 „ multis Hispanis accessit in Indias illas novas, quas Calicut appellant,
 „ qui

„ quiquidem morbus (*Gallicus*) quia ibi familiarissimus est, quemad-
 „ modum scabies apud nos, accidit tunc ut multi ex illis Hispanis, dum
 „ ibi morarentur, infecti sint tali morbo, qui deinde ad suas regiones,
 „ & ad nos revertentes multos ex nostris infecere Apud Indias illas
 „ novas, *subijcit idem*, viget morbus iste contagiosus, illis tamen fami-
 „ liarissimus, & ideo repertum est etiam apud ipsos antidotum ejus, quod
 „ lignum Guaiacacum dicitur. Morbus itaque iste illis est, sicuti apud nos
 „ scabies, familiaris, & acquiritur per contagionem sicuti & scabies.

IV. Gabriel Fallopius, *Tractatu de Morbo Gallico*, c. 1., „ Inter Ja-
 „ nuenses, *inquit*, nobili ingenio fuit Christophorus Columbus, qui Co-
 „ lonus a Petro Martyre diligenti rerum Indicarum Scriptore vocatur ...
 „ Huic Ferdinandus, & Elizabeth subministrarunt liburnicam unam &
 „ celoces tres, cum quibus Indiam Occidentalium salutavit
 „ Inventum est certe pretiosissimum metallum, inde delata est copia, &
 „ ingens margaritarum magnitudo, sed est etiam adjuncta spina, atque
 „ aloes melli admista. Detulit enim Columbus triremes Gallica lue re-
 „ fertas; Ibi mitis est morbus & instar scabiei, sed ad nostrum veniens
 „ orbem ita ferus, ita immitis factus, ut caput, oculus, nasum, palatum,
 „ cutim, carnem, ossa, ligamenta, viscera tandem omnia infesteret, infi-
 „ ciat, corrumpat.

IV. Ga-
 brielis
 Fallopi.

Si quis plura Medicorum testimonia desideraverit, consulat Leonar-
 dum Schmai, *Tract. de Morbo Gallico*, cap. 1. Joannem Manardum,
Epist. ad Michaelem Sanctannam, Chirurgum; Alfonso Ferrium, *in Prae-*
satione Librorum quatuor de Morbo Gallico & ligni sancti natura, usuque
multiplici; Antonium Gallum, *Oper. de ligno sancto non permiscendo* c. 1.
 Antonium Fracastanum, *Lib. de Morbo Gallico*; Prosperum Borgarum,
Method. de Morbo Gallico, cap. 1. &c. qui omnes testantur vene-
 ream luem in Insulis Antillis, quæ Mexicanum Archipelagus occupant,
 antiquitus propriam & endemiam, ac specificis remediis huic regioni
 peculiaribus curatam fuisse, priusquam Hispanis advenis innotesceret;
 imo vero Hispanis nec morbum nec morbi remedium innotuisse, nisi ab
 Insularum indigenis.

Secundo. Paucos seligemus ex Historicis sed omni exceptione majores,
 & qui de prima luis veneræ origine, tanquam de re sibi apprime co-
 gnita oculati testimonium dicant.

1. Gonsalvum Fernandez ab Oviedo, qui in Hispaniola ipsa, quo a Re-
 ge Ferdinando missus eras anno 1513. ut metallorum fusioni præset,
 diu commoratus est, & scripsit ibidem circa annum 1535. naturalem &
 generalem Historiam Indiarum., „ Narrat autem ille *hujus Historie Sect. 1.*
 „ *Lib. 10. cap. 2.* Morbum hunc, qui dicitur, *de las Buas*, (*Hispani sic vo-*
 „ *cant suam veneræ*) esse omnibus his regionibus communem, ideoque
 „ pla-

Et Testi-
 monio
 Histori-
 corum.
 I. Gonsal.
 vi Fer-
 nandez.

„ placuisse miserationi divinæ quod auxilium item omnibus communi-
 „ cetur, atque pro eo tollendo ubique in promptu sit. Licet vero *pergit*
 „ *ille*, lues ista alibi etiam grassetur & vigeat, principio tamen Christianis
 „ malum hoc cognitum, necnon experimento arboris *Guaican* appellatæ
 „ curari visum in hac Insula Hispania dicta Apud Indos haud est
 „ adeo sævum malum, nec tantum affert discrimen, sicut in Hispania &
 „ frigidioribus climatibus, sed parvo negotio hujus arboris ope incolæ
 „ curantur. Demum interjectis quibusdam verbis fatetur. In illis regio-
 „ nibus Indicis paucos esse ex Christianis, paucos, *inquit*, admodum, qui
 „ congressum venereum cum mulieribus indigenis experti sævum hunc
 „ morbum effugerint, quoniam profecto est hujus soli proprius affectus,
 „ & Indicis hisce hominibus adeo frequens, sicut alibi sunt aliæ commu-
 „ nes ægritudines. „ Similia legere est generalis ejusdem *Historiæ Lib. 2.*
 „ c. 14. sicut & *Capite 76. Summarii*, quod anno 1525. idem Consalvus
 „ Toleti jam ante conscripserat, dum in Regia negotiorum causa versaba-
 „ tur; sed de his fusius capite sequente.

II. Guic-
ciardini.

II. Franciscum Guicciardinum, civem Florentinum, qui in Historia sui
 temporis Italice scripta summa diligentia narrat quæcumque in Italia suo
 tempore contingere, ab anno 1494. ad annum 1532. Is autem in fine *lib.*
 2. postquam dixit luem veneream passim Gallicam appellari, sic pergit
 „ ex *Versione Cæli Secundi Curionis*. „ Verum æquum est hanc ignomi-
 „ niam a Gallico nomine remove: Nam post eam luem, scabiemque sæ-
 „ dissimam ex Hispania Neapolim importatam fuisse constitit. Nec tamen
 „ ejus gentis fuit propria, sed eo quoque ex illis Insulis allata, quæ Chri-
 „ stophori Columbi, Genuensis, navigatione manifestari iisdem fere annis
 „ in nostro orbe cœperunt: quibus tamen in Insulis hic morbus naturæ
 „ benignitate præsentissimum habet remedium: quippe tantum cujus-
 „ dam nobilissimi atque aliis multis doloribus memorabilis ligni, quod
 „ ibi nascitur, succi haustu facillime curantur; *Guaicum* id vocant. „

III. P. du
Terre.

III. Demum R. P. Joannem Baptistam du Tertre ex Ordine Fratrum
 Prædicatorum, testem quidem recentiorum, sed veritatis amantem & re-
 rum Physicarum gnarum, atque in Insulis Antilis diu commoratum. Hic
 autem postquam asseveravit *Hist. General. Insular. Sancti Christophori*,
Guardalupa. Martinica & aliarum Gallicæ scriptæ Parte 5. cap. 1. §. 11.
 „ Harum Insularum indigenis turpem eum morbum, quem *Epiam* di-
 „ cunt, & qui ipsissima lues venerea est, quasi hæreditarium esse, & ab
 „ iisdem contrahi non solum venere, sed etiam sponte concipi, pessimo
 „ vivendi more quo utuntur, pravisque cibariis quibus vescuntur; mox
 „ addit se novisse certissima scientia milites Hispanos, qui cum Christo-
 „ phoro Columbo in Hispaniam inde rediere primo itinere, ab indigenis
 „ morbum hunc contraxisse, quem Neapolim traduxere, unde conta-
 „ gium

gium ad Gallos propagatum fuit, & hinc in universam Europam diffusum. Quæ dicta idem non semel repetit in *Generali Historia Antillarum*, Tom. 2. Traité 7. §. 12.

Eadem vel similia leguntur apud Marcum Antonium Coccium Sabellium, virum Doctum & Historicum egregium, qui ipse (*a tabe Gallica ex vaga venere quasita septuagenarius obiit anno 1560. Rhapsod. Historic. Enneade 10. Lib. 9.*) Apud Franciscum Lopez de Gomara, Presbyterum Hispanensem, *Historia General de las Indias* cap. 29. Apud Paulum Jovium, qui ex Medici professione ad Episcopatum Nucerinum eversus a Clemente VII. fato functus est anno 1552. *Historiarum Lib. 4.* Apud Franciscum Eudes de Mezeray, *Abbrégé Chronologique de l'Histoire de France*, ad annum 1466. &c. Sed ea sigillatim describere supervacaneum esse duximus, in re jam satis manifesta, & cui lux nova mox accessura sit sequente capite.

(*) Paul Jovius in Elogiis.

CAPUT X.

Lues veneream, quæ ex Hispaniola oriunda est, ab Hispanis ad Neapolitanos, ab utrisque ad Gallos, demum ab his tribus ad ceteros Europæ, imo plerosque Asiæ & Africæ populos quasi ex traduce propagatam fuisse. Reperiri tamen sub Zona Torrida regiones alias, quibus lues eadem vernacule & endemia fuisse videatur.

EXEUNTE decimo quinto sæculo Ferdinandus & Isabella communibus auspiciis Hispanias regebant: Hæc erat suo nomine Regina Castilianum & Legionis; Ille vero jure paterno potiebatur Regnis Arragoniæ, Valentiniæ, imo etiam Siciliæ, quam jure an injuria, jam non quæro, sed pessimis saltem artibus Petrus III. Arragonensium Rex olim invaserat, Gallis ad internecionem casus teterrimo & perfidioso facinore, quod in historia famosum est *Vesperarum Sicularum* nomine.

Jam a morte Ludovici XI. Ferdinandus ille, Carolusque Octavus Francorum Rex de Comitatu Ruscinonensis & Cæritaniæ dominio inter se decertabant; sed pacem componere Carolo visum est anno 1462. ne quid obfisteret expeditioni quam in Italiam parabat, ut Neapolitanum Regnum, quod hereditate Caroli Cenomanensium Ducis sibi obvenerat, armis vindicaret. Fœdus itaque Narbone ictum est mense Januarii anni 1492. seu potius 1493. ut hodierna fert computandi ratio, & inter cætera fœderis capita expresse sancitum fuit: Ferdinandum se in hostium numero habiturum quoscunque Carolus hostes sibi facturus esset, qua

Carolus VIII. Francorum Rex de invadendo Regno Neapolitano cogitans pacem componit cum Ferdinando Rege Arragonensium.

con-

conditionem Carolus Ferdinando de Comitibus, de quibus erat controversia volens & ultro decessit.

Cujus
conditio-
nibus Fer-
dinandus
male fle-
tit.

Sed pacis conditionibus, quanquam sibi æquissimis, Ferdinandus non stetit, nec a partibus Regum Neapolitanorum, quibus Carolus bellum inferebat, unquam abstinuit. Eos quidem Regibus Arragonensium sotos, & ipsi consanguinitate propinquos fuisse notum est, spuria tamen origine; sed potior ratio Ferdinandum movebat. Metuebat scilicet ne Galli, si Regno Neapolitano quiete semel potirentur, Siciliam non minore fortuna, nec minore jure invaderent, & jure postliminii repeterent.

Hæc animo volvens Ferdinandus, ut erat callidissimus fraudum artifex, nec Neapolitanos Reges consiliis & copiis clam juvare, nec Gallorum impetum, hostes concitando sociosve avocando, clam retundere unquam cessavit. Tandem, cum Carolus fortuna artibus majore usus in Neapolitanum Regnum arma victricia illaturus esset, jussit Ferdinandus abjecta dissimulatione Antonium de Fonseca Legatum injustæ, ut aiebat, quam Carolus meditabatur, usurpationi suo nomine intercedere, quod a Legato Velitris haud longe ab urbe Roma, die 29. mensis Januarii anni 1494. tam insolenti arrogantia præstitum fuit, ut tabulas isti Narbone fœderis, cujus conditiones objiciebantur a Carolo, palam dilacerare non dubitaverit.

Donec
tandem a-
perto
marte di-
micatum
est inter
Gallos &
Hispanos

Abhinc aperto Marte dimicatum est inter Gallos Hispanosque. Ferdinandus duce Gonfalvo Hernandez Cordubensi, qui deinde *Magnus Capitanus* cognominatus fuit, copias in Siciliam jam ante miserat. Huc Ferdinandus II. sive junior Regno Neapolitano exutus ex Ischia Insula, Ænotridum altera, se receperat paulo ante Caroli discessum, ut cum Gonfalvo consilia communicaret. Hinc ambo exeunte Majo anni 1495. paucis diebus a discessu Caroli Rhegium invaserunt cum sex millibus militum, unde viciniore civitates & prævincias occupavere. Diu ancipiti belli eventu utrimque pugnatum est, sed recepta per traditionem Neapoli; præfidiariis militibus, qui castella Neapoli circumjecta occupabant, fame ad deditionem coactis; mortuo Duce Montipenserii, quo stabat præcipua regni tutela; Gallos de decessione pacisci necesse fuit sub finem sequentis anni 1496. ut dictum est c. 3.

Hujusce
belli tem-
pore luem
veneream
ab Hispani-
is ad
Neapolita-
nos; ab
utrisque
ad Gallos

Merebant in Neapolitano, vel potius Hispano exercitu, milites non pauci aut qui primo itinere cum Christophoro Columbo mense Martio anni 1493. vel secundo cum Antonio de Torrez principio anni 1494. vel tertio cum Petro de Margarit exitu ejusdem anni 1494. ab Indiis reduces, lue venerea quam in Hispaniola susceperant adhuc infecti erant, aut saltem qui eandem luem, quæ ab aliis in nostrum orbem traducta fuerat, in Hispania jam contraxerant. Igitur minime mirum esse debet labe simili Neapolitanos plurimos, quibuscum sub eisdem signis militabant

tabant, brevi contaminatos fuisse, meretricum communione, quæ in caltris vel ab utrisque in Gallos derivari cito debuit eadem de causa; cum enim toto biennio varia & incerta fuerit belli fortuna, ac civitates eadem ab adversis partibus sæpius & vi captæ & receptæ sint, manifestum est easdem meretrices, quæ cum Hispanis & Neapolitanis jam consueverant, cum Gallis quoque consuevisse, unde venerei morbi semina ultro citroque communicata sunt & distracta.

Sed ne quis forsitan autemet hos quæcumque diximus temere comminisci, aut conjectura tantum augurari, Auctorem possumus laudare vere idoneum, Gonsalvum Fernandez ab Oviedo, qui in aula Regum Hispaniarum astitit Barcinone anno 1493. cum Christophorus Columbus ab Insula Hispaniola, quam detexerat, primum reversus est; qui amicitia vel consuetudine cum plerisque Columbi comitibus, cæterisque qui annis sequentibus ab Antillis redire, junctus fuit; qui ab iisdem sæpius audivit, ut quæque in primis illis navigationibus gesta essent; qui meruit in Neapolitana expeditione adversus Gallos; qui a Ferdinando Hispaniarum Rege missus est in Hispaniolam anno 1513. ut fusionibus auri argenteve e terra effossi præset; qui omnia demum quæcumque per id tempus in Hispanis, in Regno Neapolitano, vel in Insula Hispaniola contingere, præsens ipse vidit & observavit, vel a testibus oculatis accepit.

Is autem in *Summario Naturalis & Generalis Historie Indiarum Occidentaliæ*, quod ab Hispaniola, ubi annos 12. jam commoratus fuerat, in Europam reversus negotiorum causa Hispanice conscripsit Toleti anno 1525. sic Carolum V. Imperatorem & Hispaniarum Regem, cujus jussu scribebat, alloquitur c. 76. Potest, inquit, Cæsarea Majestas pro certo tenere hunc morbum, qui in orbe nostro novus est, in Insulis Antillis recens detectis antiquitus familiarem fuisse, atque etiamnum ita communem esse, ut ab Hispanis ibidem contractus fuerit, quotquot fere cum Indicis mulieribus rem habere non pudit: Inde ergo in Hispanias primum traductum fuisse a Christophori comitibus, qui primo vel altero itinere hinc redire: Demum anno 1495. cum Gonsalvus Fernandez Cordubensis, magni Capitanei cognomine dein notissimus, copias in Italiam trajecisset auspicio & imperio Regum Catholicorum Ferdinandi & Isabellæ, ut Ferdinando II. Neapolis Regi opem ferret adversus Carolum Gallorum Regem, quem a capitis modo Capitonem vocabant, stipendia in eo bello meruisse Hispanos non paucos eadem labe jam inquinatos, qua Neapolitanos & Gallos celeri contagione infece-
re ex promiscua cum iisdem meretricibus communione.

Similia sed fusius refert Auctor idem *Lib. 2. cap. 14. Historie Naturalis & Generalis earundem Indiarum*, quæ Summario jam laudato altero tanto major est, & decem post annis, hoc est anno 1513. Hispanice scripta. Ibi testes

contagio.
ne dimi-
nasse.

Qua de
re lucu-
lentum
est Con-
salvi Fer-
nandez
ab Oviedo
testimo-
nium.

testes nominatim adducit plurimos, eximios, oculatos, qui primis in Insulam Hispaniolam navigationibus interfuerant, & a quibus singula quæ tradit se accepisse profitetur. Potissimum vero nititur auctoritate & testimonio Petri Margaritæ, Catalani, testis quidem ea de re maxime idonei, ut qui cum Christophoro Columbo secundo itinere in Hispaniolam profectus anno 1493. inde redierit anno subsequente 1494. venera lue inquinatus, qua ipsum nondum perfecte revelatum fuisse Auctor suspicabatur, dum scribebat, quoniam doloribus continuo angebatur. Itaque re probe cognita laudatus Auctor disertissime asserit luem veneream ab Hispaniola ad Hispanias devectam ante annum 1495. a militibus Hispanis, qui sub Gonsalvo Fernando meruere in Italia, ad Gallos & Neapolitanos venire vulgivaga traductum fuisse.

Ab Italis, Hispanis & Gallis ad cæteras Europæ Nationes commercio traductam fuisse.

[a] Rodericus Diaz de Isla, Lib. contra las bubas Hispanice scripto, c. 1.

Jam porro, ut e diverticulo in viam redeamus, contaminatis semel ea ratione tribus præcipuis Europæ Nationibus, contagium ad certas debuit brevi disseminari commercio, quo invicem utuntur Europæ populi: Ad quod accessit illius temporis fortuna atque conditio, quo Germani & Belgæ cum Italis & Hispanis ejusdem Caroli V. imperio parebant, quo Galli cum Anglis ætissimo fœdere jungebantur, demum quo a Ludovico XII. cum Ferdinando Catholico, & a Francisco I. cum Carolo V. terra marique pugnabantur, diuturno bello, quæ singula debuere certe morbi propagationem magnopere accelerare.

Sic constat luem veneream mansisse a Castellanis in confines Lusitanos, a quibus ideo *Morbus Castellanus* (a) dicitur; & ab iisdem anno 1496. cum Joanna Ferdinandi & Isabellæ filia ad sponsum Philippum Archiducem deduceretur, in Belgium traductam fuisse, ubi *Morbus Hispanicus* appellatur, teste Beverovicio, *Idea Medic. veterum, Part. 3. cap. 8.* Sic constat a Gallia in Angliam, ubi *Morbus Gallicus* sive *Lues Gallica* vocatur, transfretasse & maxime quidem e Burdigalensi portu, cum olim *Morbus Burdigalensis* ibidem dictus fuerit.

Ac vero debuit tamen ea lues, quantumvis celeri passu propagata videatur, ab Hispania, Italia, & Gallia, ubi prima fuere nascentis morbi incubula, ad cæteras Europæ oras progressu gradario diffundi, atque adeo in variis regionibus, quo a primario morbi fomite remotiores erant, eo tardius sævire. Id sane circa annum 1632. de Saxonia superiore etiam tum testabatur Daniel Sennertus, qui *Operum Lib. 6. part. 4. cap. 1.* postquam retulit Capivaccium in Italia e solius Gallicæ luis curatione ultra decem & octo millia coronatorum lucratum esse, ingenute fatetur se a 34. annis, quibus Wittebergæ nec benedictione divina sine lucro Medicinam faciebat, non tot coronatos, quot Capivaccius eorum millia, lucratum esse ex bujus morbi curatione, ob eorum, qui hoc morbo laborent, hoc loco penuriam.

Imo ad

Cæterum, quo tempore morbosum luis veneræ feminium ab Hispania Ita-

Italiam, & Galliam, & hinc cætera Europæ Regna contagione pervadebat eodem quoque ab Europa in Asiæ & Africæ oras, quæ mari Mediterraneo adjacent, contagione simili prorepisse certum est, quod gemina via factum credimus.

omnes
Asiæ &
Africæ
oras, quæ
mari Me-
diterra-
neo adia-
cent.

1. Quidem Mahumetanorum & Judæorum exilio, qui temporibus illis Hispania cedere jussit sunt a Ferdinando & Isabella post occupatum Regnum Granatense, & qui in Africam quo profugerunt, luem veneream secum detulere, quam in Hispania ante contraxerant. Qua de re luculentum testem habemus Joannem Leonis, Mahumetanum & Granatæ natum, qui & ipse cum cæteris exul Felsam in Mauritania petiit, ubi literis Arabicis operam dedit, sed qui dein a Piratis captus & Leoni X. Pontifici maximo dono datus Christianam Religionem amplexus est. Is autem in Descriptione Africæ, quam Romæ Arabice scripsit, & quam Joannes Florianus Latine vertit, sic ait L. 1. *Hujus mali ne nomen quidem ipsis Africanis notum erat ante ea tempora, quam Hispaniarum Rex Ferdinandus Judæos omnes (& Mahumétanos) ex Hispania prostrigasset, qui ubi in patriam jam rediissent ceperunt miseri quidam ac sceleratissimi Æthiopes, cum illorum mulieribus habere commercium, ac si tandem velut per manus pestis hæc per totam se sparsit regionem, ita ut vix sit familia, que ab hoc malo remansit libera. Id autem sibi firmissime atque indubitate persuaserunt ex Hispania ad illos transmigrasse; quamobrem & illi morbo ab Hispania Malum Hispanicum, (ne nomine destitueretur) indiderunt. Tunesi vero, quemadmodum & per totam Italiam Morbus Gallicus dicitur; Idem nomen in Ægypto atque Syria ascribitur, unde male imprecantis proverbium, te morbus male perdat Gallicus.*

2. Vero maritimo commercio: mercatores enim nautæque, qui ab Italiæ, Galliæ, aut Hispaniæ portubus ad Asiæ aut Africæ portus, quos *gradus* vocant, merces quotidie ultro citroque convhebant, mercem pessimam, luem veneream scilicet, una simul convexere, quæ dein ab oris mari Mediterraneo proximioribus ad interiores tractus sensim traducta fuit. Hujus sane originis fidem manifestam facit ipsa nomenclatura morbi, qui testibus Joanne Leonis loco jam *Laudato*, & Leonardo Fioravanti, *Capricci Medicinali*, Lib. 1. c. 26. in Asiæ & Africæ portubus, sicut in Italia & Hispania, *Gallicus appellatur, Asiæ scilicet & Africæ nationibus novum nomen cum novo morbo ab Europæis simul mutuantibus.

Sed neque hic substitit contages ab Europæis diffusa, ast latius opinione disseminata irrepsit in remotissimas Asiæ plagas, iteratisque navi-

ga-

Ac de-
mum ad
Turcas
Persasque
& ad ip-
sorum
Japonios

* Forfan in oris maris Mediterranei lues venerea appellatur, non *morbus Gallicus*, sed etiam *sed morbus Francorum*, hoc est Christianorum, quos omnes Mahumetani *Frances* dicunt nullo discrimine.

gationibus ad Indias Orientales sensim penetravit. Sane constat a Turcis ad finitimos Perlas contagione dimanasse, apud quos morbus *Turcicus* dicitur Vid. Joann. Gorbosfredum Habn, de *Antiquit. variolarum*, in *Prefatione*. Constat similiter a Lusitanis, quorum res in Orientalibus tractibus diu florere, regiones & urbes singulas Indiarum, quas commercii causa frequentabant, morbis veneris dudum infectas fuisse. Ab his prima mali semina non modo in urbes Goam & Macaum, ubi etiamnum rerum potiuntur, sed in ipsum etiam Imperium Japonicum, unde jam pridem exulant, defecta sunt: Testatur enim Engelbertus Kæmpferus in *Historia naturali, civili & ecclesiastica Imperii Japonici*, *Lib. 2. cap. 4.* luem veneream, quam in Japonia haud infrequentem esse passim dicit, a Japonensibus *Nambakassan* appellari, hoc est *morbum Lusitanorum*, manifesto sane indicio morbum a Lusitanis cum Japonensibus transiitione communicatum fuisse.

Præter
Hispa-
niolam
tamen,
multi-
tudo fuisse
luis vena-
rez fo-
cos.
In Regno
Peruvia-
no.

Nihilominus tamen, quantacumque celeritate lues venerea Europæorum commercio quoquoque spargi visa sit, multa sunt quæ persuadeant præter Hispaniolam Insulam, ubi morbum venereum endemum fuisse diximus, & unde vidimus primum in Europam prodiiisse, reperiri loca alia non pauca quæ infestentur morbo eodem, ipsis quidem proprio & inquilino, nec aliunde accepto, quæque adeo ipsa sint veluti totidem alii luis ejusdem veneris foci,

In nova
Hispa-
nia.

1. Sic narrant testes oculati Franciscus Lopez de Gomara *Historia general de las Indias*, c. 110. & Pedro de Ciac de Leon, *Chronica del Peru*, c. 46. Morbum olim fuisse Regno Peruviano peculiarem, tuberculis verrucosis, porris exulceratis & carcinomidæis, pustulis sordidis, & livescensibus insignem, non modo faciem sed totum corpus plerumque obsidentibus; quem Hispani, qui duce Francisco Pizarro Peruvianis armis occupaverunt, contraxere ex contubernio cum mulieribus indigenis; qui decocto sarsæ-parillæ ibidem crescentis sanabilis erat; demum qui cum lue venerea Insulæ Hispaniolæ idem plane fuisse videtur.

In Flori-
da.

2. Sic constat testimonio sæpius laudati, Gonsalvi Fernandez ab Oviedo, *Lib. 10. Historia naturalis Indiarum*, c. 2. luem veneream vulgarem fuisse in reliqua Americæ continente fere tota, ut in nova Hispania, & præsertim in illis novæ Hispaniæ Provinciis, quæ Nicaragua & Nagrando appellantur.

3. Sic refert Jacobus le Moine, cui cognomen de Morgues, in præludio breviss narrationis eorum, quæ in Florida Americæ Provincia Gallis acciderunt secunda in illam navigatione, duce Renato de Laudonniere, anno 1564. Hujusce regionis indigenas lue venerea antiquitus laboravisse, quod confirmari novimus a Julio Palmario in *Tractatu de lue venerea* anno 1578. edito, *Lib. 1. c. 2.* ubi memorat Nortmannos, qui eam Americæ partem,

quam

quantam Flavidam nuncupant, nuper lustraverunt, lucem veneream illie endemicum esse testari; quemadmodum exaustemata & elibymata hic nobis, san-
tumque illie esse ad hunc morbum proclivisatem affirmare, ut si quis cum mu-
liere, cui menses profusant jungatur, statim vel venercum bubonem vel veram
luem contrahat.

4. Sic aliter Theverus, *Cosmograph. Universal. Lib. 3. cap. 2.* quod In interiore & equino-
etiam in Historia Plantarum Lugdunensi legitur *Lib. 18. cap. 132.* „ In A-
interiore Africa ad utramque oram fluvii Senega, in Regno Meli,
quod meridiem, & in Regno Tambouët, quod septentrionem spe-
ctat, morbum reperiri endemicum, cum lue venerea simillimum, vel
potius plane eundem, qui Ætiopice Borozail vel Zail dicitur, qui
genitales partes virorum feminarumque occupat, qui oritur ex nimia
venore, cui medentur indigenæ Medici decocto herbæ cujusdam Acha-
nace dictæ, aut fructus ejusdem herbæ quem Alford vocant, eadem me-
thodo, qua nos in Europa decocto ligni Guaiacini. „ Huic relationi
asperse suffragatur Sydenhamius in *Epistola secunda responsoria*, ubi testa-
tur se ab *Anglorum plurimis*, usque fide dignis, qui insulas Caribes distas
incolunt, didicisse mancipia necens e Guinen allata, etiam antequam in terram
descenderint, sum alia ibidem degentia, hoc morbo tentari, nulla copula impura
pregressa, ita ut non raro universam aliquam eorum familiam, viros scilicet,
mulieres, liberosque male mulctet. Neque ista luer, pergit ille, quæ affissi-
mos hosce sapius inuadit, vel hilum a venerea nobis dista, quantum ego
quidem intelligo, quod symptomata scilicet, ulcera, &c. habita nempe di-
versorum climatum ratione, videtur discrepare, licet nomine profus ablutat.
cum The Yavvs ab illis dicatur. At nec medendi methodus, qua utuntur illi,
nostra abhorret; utrobique enim salustio ex bydrargyro utramque facit pa-
ginam.

5. Sic morbus idem Malobaris notus dudum erat, si fides adhibenda Apud
sit Julio Cæsari Scaligero. *Exercitat. de subtilitate ad Cardanum, Exercit. rus.*
181. artic. 19. apud quos alserit *Pua nominatum* fuisse.

6. Sic testatur Thuanus, *Historiar. sui temporis Lib. 17.* In Java In insula
majore homines lue venerea valde infestari, quam ea ratione curant; a
decima hora dici usque ad secundam pomeridianam ardentissimo soli se ex-
gri exponunt, & ita peccantem & malignum bubonem desiccando exbau-
runt.

7. Sic constat testimonio Jacobi Bontii, in Indiis olim inter Batavos In Insulis
Medici, in Tractatu qui inscribitur, *Methodus medendi, qua in In- Insulis
Orientalibus oportet uti in cura morborum illie vulgo ac populariter grassan- Moluccis*
tium, cap. 19. „ Endemium seu populare quemdam morbum in Am-
boyne, & Moluccis Insulis oriri, quem Batavi d'Amboynse pocken vo-
cant: Symptomatis suis admodum similem morbo venereo: in hoc ta-

men diversum quod hic sine congressu venereo quoque nasci solet:
 „ In hoc morbo erumpere in facie, brachiis ac cruribus tophos seu tu-
 „ mores, duos primum ac skirrhusos, ac tam crebros per universum cor-
 „ pus, quam clavi ac verrucæ oriuntur in manibus ac pedibus in patria;
 „ (in Batavia) si vero eos exulcerari contingat, materiam lentam ac gum-
 „ mosam a se reddere, attamen tam acrem ac mordacem, ut profunda
 „ ac cava ulcera inde oriantur, cum labiis callosis ac inverfis: Fœdum ac
 „ deforme malum esse, & cum lue venerea conveniens, nisi quod hic
 „ tanti dolores non adsint, nec caries in ossibus tam facile oriatur, nisi
 „ per curantis incuriam. . . . Porro morbum iisdem fere remediis cedere,
 „ quibus lues venerea. . . . Decoctis e Chinæ radice, sarfa-parilla, Guaja-
 „ co, & corticibus ejusdem. . . . Et si his non cedit ad chimica & mi-
 „ neralia deveniendum esse, ut sunt mercurius vitæ seu buryrum anti-
 „ monii, turbith minerale, tum mercurius præcipitatus albus. Unguenta
 „ quoque mercurialia secundum artem parata hic externe adhibenda esse

In Impe-
 rio Si-
 nensi.

8. Sic demum refertur a Theveto jam laudato, *Cosmograph. Lib. 11. cap. 25.* „ luem veneream in Sinarum Imperio communem esse & curari
 „ solitam decocto radicis Chinæ. Quod totidem fere verbis legere est apud
 „ Carolum Mustanem, *Tractat. de Morbo venereo, Lib. 3. cap. 1.* ubi affir-
 „ matur radicem Chinæ, quæ in Europa morbis venereis efficaciter condu-
 „ cit, & quæ a Sina seu China, unde primum deventa est, nomen traxit,
 „ specificum esse luis venereæ remedium apud Sinas. Possum ipsa eadem
 „ certissimo confirmare testimonio. Nuper enim accepi a Presbytero e So-
 „ cietate Jesu, recens e Sinarum Imperio reduce, ubi jam a triginta annis
 „ Christi fidem annuntiaverat, luem veneream Pequini inter Sinas non
 „ modo notam, sed etiam haud raram esse. Frustra ab eodem quæsi-
 „ vi quid de ea lue Sinenfes Medici censerent? An morbum novum, vel antiquum
 „ an indigenam vel alienigenam crederent? Num illum sola contagione
 „ propagari censerent, an contra sponte quandoque generari sine prævio
 „ contagio, ut plerisque cæteris morbis commune est. Ille hæc omnia se
 „ planissime ignorare professus est: Neque sane mirum, cum ab instituto
 „ tam aliena essent.

Hæc omnia felicior nepotum ætas olim forsan reteget, quæ nos ne-
 „ scire, nunc dolemus: Multa enim, ut ait Seneca, *Question. Natural. Lib. 6. cap. 31. seculis tunc futuris, cum memoria nostri exoleverit, reservantur.* In-
 „ terim tamen, sicuti neque censere licet ab Hispanis vel ab ullis Europæo-
 „ rum ad Mediterraneam Americæ & Africæ loca modo recensita delatam,
 „ aut cum Malabaribus communicatam fuisse luem veneream, quæ in illis re-
 „ gionibus, ubi primum occupatæ sunt, inquilina antiquitus observata fuit
 „ lic nec facile quoque credi potest affectum eundem ad Sinas traductum
 „ esse vel a Lusitanis, qui Macaum ad Sinæ littora tenent, vel a Japoniis,
 „ quos

quos a Lusitanis morbo contaminatos fuisse vidimus, dum nullum vel saltem rarissimum commercium semper interfuerit Europæis Japoniis- que cum Provinciis Imperii Sinici interioribus, potissimum vero cum Pequino, quod Imperii caput est, & quod a Macao, quam Lusitani occupant, & a Cantono, quo naves cæterorum Europæorum appellant, multo distat itinere.

Itaque putarem potius, ut nunc ad propositum revertar, ex collatis pensatisque testimoniis colligendum esse præter Insulam Haiti sive Hispaniolam, ubi fuit notissimus & Europæ maxime exitialis luis venereæ focus, morbum eundem loca alia pleraque, imo forsan omnia, quæ in America, Africa, & Asia Zonæ Torridæ subjacent, tanquam peculiaries totidem focos, infesta antiquitus habuisse ex causa communi, de qua inferius, unde in viciniore regiones grassari quidem potuerit mutuo commercio, si quod fortasse intercesserit, sed Europæ nostræ nunquam innotuisse, quandiu *media terrarum pars, quæ solis orbita est*, ut cum Plinio loquar, *Histor. Natural, Lib. 2. c. 68.* & ubi latebant morbi incubula, *exusta flammis & cremata cinis vaporis torreretur credita est*, atque adeo *inaccessa fuit*.

CAPUT XI.

Conjectura de causis cur in Hispaniola, cæterisque Insulis Antillis, luis venereæ olim familiaris & endemia fuerit.

DIFFICILIS & perobscura quæstio jam incidit, nempe unde prima fuerit origo luis venereæ in Insulis Antillis, ac præsertim in Insula Haiti, sive Hispaniola, quæ nunc Sancti Dominici dicitur. Utcunque enim certum sit morbum ab ægroto in sanum contagione serpere, atque ea ratione in plures disseminari, attamen nisi successivus ille contagionis progressus in infinitum retrogradi crederetur, quod ineptum & absurdum foret, ad aliquos tandem deveniendum est, qui sine ullo prævio contagio aut labe ulla extrinsecus communicata morbum primitus conceperint peculiari humorum dyscrasia & depravatione, unde cumque ea advenerit.

Luem veneream in Insulas Antillas ex Guinea deductam non fuisse, ut visum est Sydenhamio.

Credidit quidem Sydenhamius *Epistola secunda Responsoris*, luem veneream in ipsis quoque Insulis Antillis hospitem esse & alienigenam, & illuc advectam fuisse a Nigritis, qui ex Guinea aut aliis quibusdam Mediterraneis Africæ Provinciis Guineæ conterminis ad novas Amariæ Colonias ab Hispanis primum deducti fuerunt, & apud quos morbus ille endemius erat.

Sed 1. Sydenhamius, licet vera essent, quæcunque dicit, inde quæ-

E 2 Njo.

sionem solveret minime, sed ad summum versuram faceret. Superesset enim explicandum cur Nigritæ ipsi luem veneream primum conceperint, quam deinde in Hispaniolam deportaverunt: Neque ille nodus de Nigritis facilius expediri potest quam de Americanis.

2. Ea Sydenhamii opinio cum veritate Historica aperte pugnat, si quidem constat Nigritas ab Hispaniolam nullos de vestis fuisse ante annum 1503. At vero compertum est jam anno 1493. morbum ab Hispanis in Hispaniola contractum, in Hispaniam vel eodem vel sequente anno traductum, atque inde anno 1494. vel 1495. in Italiam transmissum esse, ubi Neapolitanos & Gallos infecit, a quibus in totam Europam brevi dimanavit.

Sed in illis Insulis antiquitus endemic. narium fuisse.

Itaque posthabita Sydenhamii conjectura præstat credere Gonfalso Fernandez ab Oviedo hac de re testi maxime idoneo, ut qui plures annos in Hispaniola commoratus fuerit, qui cum indigenis domesticam habuerit consuetudinem, qui adeo ipsorum morbos vel ab illis discere, vel ipse præsens observare potuerit. Is autem constanter asserit variis locis *Historia Naturalis & generalis Indiarum Occidentalium*, quæ supra laudavimus, c. 9. & 10. Luem veneream in Insula Haiti sive Hispaniola, ad quam primum appulit Christophorus Columbus, indigenis antiquitus familiarem, sine prævio, ullo contagio sponte generari, uno verbo vere endemiam esse, quod confirmatur unanimi testimonio Medicorum & Historicorum qui circa eadem tempora florere, aut qui de re eadem recentius scribere.

Novimus sane exempla non pauca morborum istiusmodi, qui uni cuidam peculiari regioni addicti sint & cujus fines raro transgrediantur. Sic in Europa plica Polonis, scorbutus accolis maris Baltici, bronchocele subalpinis gentibus propria sunt. Sic in Asia vena Medinensis sive dracunculus Arabibus, Andron hoc est oscheo-hydrocele, & Pircal seu Perical, hoc est ulcerosus tibiæ tumor Malabaribus endemia sunt. Sic in Africa elephantiasis *Ægypti* semper peculiare malum fuit, teste Plinio *Historia Natural. Lib. 26. cap. 1.*

Est Elephas morbus, qui propter flumina Nili

Gignitur Ægypto in medio, neque præterea usquam. Lucret. Lib. 6.

Itaque, si quæ hæcenus dicta sunt, vera sint, ut sane vera esse lubens credo, debet lues quoque venerea in eodem censu numerari respectu Insularum Antillarum ac potissimum Hispaniolæ.

Adeoque ibidem productam fuisse a causa quadam com.

Solent autem morbi istiusmodi regioni cuidam peculiariter addicti sive endemii a causa quidem, quæ huic regioni peculiaris sit, induci, sed simul a causa quæ communis sit & quæ indigenarum plurimos possit indifferenter afficere. Hujusce generis tres tantum causas agnoscimus; 1. Aerem nempe qui spirando ducitur, si æstu nimio, pluvii immo-

cis

cis, tetrīs halitibus pestifer sit; 2. Esculenta & potulenta quibus vita ^{muri, que} sustentari solet, si qualitate vel condimento peccent; 3. Demum antiquos & assuetos gentis mores, si valetudini quomodocumque noceant. ^{illis Insularis pecu-} Debet ergo inde colligi veneream luem vel ab una aut altera ex illis causis, vel ab omnibus simul in Insula Hispaniola, ubi endemia erat, olim sponte genitam fuisse.

Recte hucusque; jam vero ultra pergere difficillimum est, cum cætera obscuritate involuta lateant. Nescimus enim quid Barbari illi, quid illorum Medici vel potius Medicaſtri, quos *Butios* vocabant, de luis veneræ origine aut iteratis observationibus compertum habuerint, aut conjecturis perceperint. Imo vero neque naturam aut qualitatem cibarium, quibus vefcebantur, neque condimentorum rationem, quibus cibaria præparabant, neque mores aut consuetudines, quibus utebantur satis recte novimus, ut inde liceat collatis pensatisque omnibus primam luis veneræ causam augurari. Majorem vero lucem frustra jam speremus ab indigenis, cum omnes jam pridem deleti sint immani Hispanorum crudelitate, atque adeo rei notitia, si qua forſan quondam fuerit, cum ipsis jam dudum contumulata sit.

At vero causam illam ignorari.

Hæc olim commode scire potuisset Gonſalvus Fernandez ab Oviedo, si veritatis inquirendæ satagisset, ut virum cordatum decebat. Ille enim ab anno 1513. per annos ferme quindecim cum indigenis, quorum plures adhuc supererant, commoratus est, a quibus proinde de prima luis veneræ causa & sciscitari multa & multa doceri potuisset. Sed merito dolemus supinam viri cæteroquin haud indiligentis obſecantiam restatur ipse luem veneream in Insula Hispaniola antiquitus endemiam fuisse & ibidem sine prævio contagio, suo etiam tempore, sponte generari: Ipse tamen & cur endemiam eſſet, & qua causa sponte generaretur investigare neglexit. Sane suam culpam agnoviſſe videtur, dum eam in cæteros Hispanos conatur conjicere, quos fatetur de religione, uſibus, moribusque indigenarum Insulæ Hispaniolæ nihil fere compertum ideo habuisse, quod de horumce inquisitione serius cogitaverint, scilicet cum gentis primores, qui rerum domesticarum gnari erant, tristi fato jam occubuissent, nec ulla poſſet certa cognito obtineri ab infima & cæca plebe, quæ pauca supererat.

In ea tamen caligine, ubi cæteri hæſitant, Leonardus Fioravanti Empiricus Italus nodum a se solutum eſſe olim credidit, sed vanitate majori quam ſucceſſu. Contendebat nempe, hinc quidem veneream luem sponte concipi ab hominibus etiam ſanis & ſine ullo contagio, si humana carne vefcantur, ſicut & ab animalibus quibuſcumque, si carne animalium ejuldem ſpeciei nutriantur: Inde vero, incolas Insulæ Hispaniolæ Anthropophagus fuiſſe & humana carne vefci ſolitos, unde colligebat il-

Neque inde re-
peti poſ-
ſe, quod
Antilla-
rum indi-
genæ car-
nchuma-
na vefce-
rentur.

lo victus genere eisdem in luem veneream necessario brevi incidisse; quæ, licet, intrinseco humorum vitio & sine contagio ulla primum orta esset, potuerit tamen contagione in alios ibidem disseminari, quos proinde & contagiosæ & spontaneæ lui veneræ potuisse consequens est.

Sed hæc utroque pede claudicant. Nam 1. Vidimus jam supra capite 6. canem quem per duos menses canina carne nutritimus, nullis lui veneræ symptomatis affectum fuisse, unde sequitur nec in hominibus etiam luem veneream excitari posse esu carnis humanæ. 2. Constat Historicorum testimonio indigenas Insulæ Haiti sive Hispaniolæ Anthropophagos nequaquam fuisse, imo contra a cæteris plerisque Americæ gentibus in eo dissimiles ab humana carne abhorruisse.

Concidit itaque futilis hæc & commentitia Fioravanti opinio, atque adeo proposita quæstio de prima lui veneræ origine, sin minus intractata, saltem integra superest. Quocirca ne difficultate deterriti officio defuisse videamus, ejusdem explicationem tentare cogimur, & si non veras proferre, ac saltem maxime probabiles rei causas seligere ex triplici causarum classe supra indicata,

I. Uidetur quidem aer e numero causarum expungendus, qui in Hispaniola morbos alios forsan inferre potuit, at vero luem veneream minime. Utiq; constat Europæos, qui eam Insulam jam a ducentis annis incolunt, luem veneream ibidem numquam contraxisse, nisi contagione: Europæi tamen aerem ibidem ducunt & eundem quem olim ducebant indigenæ, & dubio procul eodem modo temperatum & constitutum; neque enim posset facile concipi aeris qualitates in regione eadem uno aut altero sæculo ita mutatas fuisse, ut qui olim luem veneream indigenis inferre poterat, jam nullomodo posset eandem advenis pari ratione inducere.

II. Haud licet idem sentire de cibariis aut cibariorum condimentis, quibus indigenæ utebantur. Moris quidem communis fuit, ut vescerentur patatis seu batatis, farina tritici Indici quod *Mayz* dicitur, cassava, variisque fructibus horæis, quos silvæ suggerunt. Sed si illorum penuria esset, ut esse debuit sæpissime apud ignavos, pigros, incuriosos, laboris impatientes homines, haud detrectabant vermibus, araneis, serpentibus, vespertilionibus, aliisque id genus inquinamentis vesci.

Largitate utebantur condimento quodam acriore, quod *Yraea* nominant, ex radicibus & foliis ari, quod *caulis Caribarum* dicitur, succulis patatarum & *mombini*, cum larga copia capici seu piperis Indici, quod *axi* vocabant, confecto, quo cætera cibaria intingebant.

Sæpissime una conveniebant, ut tabaci fumum haurirent, non quem arte eadem qua Europæi, ore acciperent redderentque, sed quem peculiari instrumento in nares fortiter attraherent, donec sopore gravi obruti & semi mortui humi procumberent.

De.

Sicut nec a temperie aeris quem ducebant.

Imo vero neque a qualitate escarum, quibus victabant.

Demum in cibo & quidem expetito illis erat lacertus quidam amphibius, infulæ peculiaris, *Ivana* vel *Igana* dictus, saporis quidem gratissimi, sed quo dolores venereos præsentés augeri, aut male sopitos tam vehementer recrudescere observatum fuit a Gonfálvo Fernandez ab Oviedo, *Histor. Indiar. Lib. 13. c. 3.* ut crediderit inde Listerus, *Exercitat. de lue venerea*, luem veneream ab indigenis primitus ideo conceptam fuisse, quod lacerto, seu ut ille ait, serpente illo vescerentur.

Forſan ea leviora eſſe videbuntur, nec affectui graviffimo qualis eſt venerea lues, producendo fatís comparata. Nihilominus tamen ſanguinem inde corrumpi & vitiari manifeſtum eſt; ſanguine vero ſemel vitiató in calidioribus hiſce plagis, acríá, abnormia, virulenta fermenta generari poſſe certum eſt, quæ a fermentis venereis haud abundant. Sane nec graviora ſunt, quæ Galenus ipſe proferit, *Metbod. medend. Lib. 2. cap. 12.* ut rationem reddat cur lepra, quæ morbo venereo ita congener eſt, ut a multis eadem eſſe credatur, Alexandriæ frequenter oriatur: *Vefcuntur*, inquit, *Alexandrini pulſe, lente, cochleis, ac ſaſamentis multis; quidam etiam carne afinina, & aliis ejuſmodi, quæ craſſum & melancholicum ſuccum pariunt.* Sic quoque hodierno tempore notum eſt ſcorbutum, qui a lue venerea tam parum diſcrepat, ut cum eadem ſæpe confundatur, ſolo victu parvo ſponte generari.

III. Sed quantacumque ea ſint, poſſunt multo efficaciora proponi. Sed forſan ex va. Solent nempe fæminæ in calidioribus regionibus menſtruis laborare acerrimis & quaſi virulentis, potiſſimum vero dum pravo utuntur ciborum genere. Sic Grotius ait in adnotatis *ad Caput. XV. Levitici, in Syria & locis vicinis impura habere aliquid contagione nocens.* Sic Tavernier *Voyage des Indes, Liv. 3. chap. 27.* refert mulieres apud Caſros, præſertim vero in ora Melindenſi, tam virulenta eſſe, cum menſtruantur, ut Europæi, ſi urinæ quam illæ recenter tunc emiſerint, propiores adſtent aliquandiu, non tantum febre cum cephalæa, ſed etiam peſte quandoque corripiantur. men-
ſtruorum
acrimo-
nia.

Sic demum, ſi modo vera ſint, videntur de menſtruis mulierum quæ calidiores regiones incolunt, poſſe ea tantum intelligi, quæ Plinius ait *Lib. 7. Hiſtor. Naturalis, cap. 15.* cum notæ menſtruorum naturæ in regionibus magis temperatis tam male conveniant. „Nihil, inquit, facile reperiatur mulierum profluvio magis monſtrificum; aſceſcunt ſuper ventu muſta, ſterileſcunt tactæ fruges, moriuntur inſita, exuruntur hortorum germina, & fructus arborum, quibus inſedere, decidunt: Speculorum fulgor adſpectu ipſo hebetatur, acies ferri præſtringitur eboriſque nitor, alvei apium emoriuntur, æs etiam ac ferrum rubigo protinus corripit, odorque dirus æra; & in rabiem aguntur guſtato eo canes, atque inſanabili veneno morſus inſicitur: Quin & bituminum

„sequax alioquin ac lenta natura in lacu Judææ, qui vocatur Asphaltites certo tempore anni supernatans nequit sibi avelli ad omnem contactum adhærens præterquam filo quod tale virus infecerit: Etiam fortassis, animalis minimo, inesse sensum ejus fuerunt, abjicique gustas fruges nec postea repeti.

Jam vero si tanta sit menstrualis sanguinis virulentia in calidioribus regionibus, minime tutum esse debet ad mulieres ibi accedere, cum menstruantur. Sane constat in hac nostra Europa, quæ magis temperata est, si cum menstruatis res habeatur, balanum & præputium levioere phlogosi aut superficiei pustulis, quæ tamen brevi cessant, plerumque affici. Quanto graviora ergo iis impendere credendum est, quos in calidioris & æstuante climate misceri cum sæminis non pudet, dum illis menses æstu fluunt natura acerrimi & quasi virosi. Ideo forsân factum est, ut Medici Arabes, qui regiones calidiores incolebant, quam Græci & Latini, & primi & sæpe differuerint de pustulis & ulceribus virgæ oriundis ex coitu cum *sæda muliere*, hoc est cum muliere menstruata; sicut enim apud Judæos, sic apud Arabes etiam, qui jam tum erant Mahumetani, menstruata mulier pro immunda seu sæda habetur. Quin imo ideo videtur Judæis Lege vetitum esse omne cum menstruatis commercium & contubernium, ne venere hujuscemodi, quæ tunc plærumque impura erat, se contaminando, graves affectus inde contraherent; Mose nempe, aut potius Deo Legis Mosaicæ auctore, eo interdicto sicut aliis plebisque Israelitarum incolunitati sollicitè providente.

Multis ergo & gravissimis morbis indigenæ Insulæ Haiti affici olim debuerunt, ubi nemo a menstruatis mulieribus se continebat, ubi viri libidine impotentes in venerem obviam belluarum ritu agebantur, ubi mulieres, quæ impudicissimæ erant, viros promiscue admittebant, ut testatur Gonçalvus Fernandez ab Oviedo, *Histor. indiarum, Lib. 5. cap. 3.* imo eisdem & plures & impudentius provocabant menstruationis tempore, cum tunc incalcescente utero libidine magis insanirent pecudum more. Quid igitur mirum varia, heterogenea, acria multorum virorum semina una confusa, cum acerrimo & virulento menstruo sanguine mixta, intra uterum æstuantem & olidum spurcissimarum mulierum coercita, mora, heterogeneitate, calore loci brevi computruisse, ac prima morbi venerei semina constituisse, quæ in alios, si qui forsân continentiores erant, contagione dimanavere?

Cui opinioni favet notus vivendi mos ceterarum.

Propositæ conjecturæ favet consideratio cæterarum regionum Americæ, Africæ, & Asiæ, de quibus præcedente capite dictum fuit & ubi suspicio est totidem alios luis venereæ focos antiquitus latuisse. Cum enim singulæ intra Zonam Torridam sitæ sint, in singulis idem fuit aeris fervor & æstus ac in Hispaniola: Compar quoque fuit in singulis impudicitia

citia, æque spurca & in venerem promiscuam æque prona. Jam abunde notum quid de calidioribus Americæ climatis referant Auctores, qui de America primi scripsere. Liquet similiter nec continentiores olim fuisse Africanos, qui interiora incolebant, cum testetur Plinius *Hist. Lib. 5. cap. 3. Garamantas matrimoniorum exortes passim cum feminis degere*. Sic narrat Pomponius Mela, *De situ orbis Lib. 1. cap. 8. Apud Garamantas ... nulli certam uxorem esse: Ex his qui tam confuso parentum coitu passim incertique nascuntur, quos pro suis colant, formæ similitudine agnoscunt*. Idem ibidem ait *Augilarum feminis solemne esse, nocte qua nubunt, omnium stupro patere, qui cum munere adveniant*. Demum de indigenis, qui plagarum aut Insularum Orientalium Asiæ, quæ Zone Torridæ subiectæ sunt, iudicium ferre licet ab exemplo eorum, qui in Insulis, Marianis dictis, inhabitant, & qui teste R. P. le Gobien, *Histoire des Isles Mariannes, Liv. 2. complures, inrita contubernii societate, communi & eadem muliere uti solent*. Cum ergo in omnibus terræ locis, ubi lues venerea antiquitus endemia fuisse videtur, eundem aeris fervorem cum pari incolarum impudicitia conjunctum fuisse manifestum sit, haud inanis inde locus est colligendi morbum natura eundem, quo regiones longissime diffusæ, & inter quas nulla fuit commercii communio, simili modo infestabantur, a simili causarum earundem concursu, in quo tantum convenirent, generatum olim fuisse, & generari etiamnum, si indigenæ iisdem moribus vivant.

Videbitur forsan allata opinio objectioni patere, nempe quod debuisset in hac hypothesi lues venerea in Europa antiquitus sponte generari, sicut in Insula Haiti sive Hispaniola, cæterisque locis modo propositis, quandoquidem neque in Europa novum est cum menstruatis rem habere. Sed esto; demus in Europa venerem æque impuram exerceri; neque enim contra pugnare placet, quanquam ea tamen nimia videantur. Quid tum inde? Luem veneream debuisse in Europa perinde generari & æque antiquam esse ac in Hispaniola? Neutiquam sane: neque enim in Europa, cum temperatior sit, adest eadem in virorum semine acrimonia, eadem in menstruo sanguine virulentia, idem in utero mulierum fervor, quales in Insula Haiti adfuisse probatum est, unde nec eadem utrobique symptomata simultaneo causarum concursu suboriri unquam potuerunt. Proinde; ut rem paucis comprehendam, de morbis & morborum causis dici debent eadem quæ de animalium ortu, aut plantarum germinatione sub diverso cælo. Sicut ergo in Europa nec leones generant, nec simiæ prolem ferunt, nec psittaci nidificant, nec pleraque plantarum Indicarum aut Americanorum semina, etsi solo mandentur, ex terra erumpunt, aut saltem adolescunt; sic nec lues venerea potuit unquam in Europa nasci ex iisdem causis, quibus olim in Hispaniola genitam fuisse conjicimus, quia unicuique climati sua inest singularis proprietas, quia quæ in uno sponte

regionum, in quibus lues venerea creditur endemia fuisse.

Neque adversatur Europæ exemplum ubi ex similibus moribus simile malum nunquam prodit.

te veniunt, nulla arte possunt in altero provenire, uno verbo, ut cum Poeta concludam, *quia non omnis fert omnia tellus.*

CAPUT XII.

De periodis, quas lues venerea in Europa in hunc diem habuit.

Varias mutationes, quibus lues venerea ab ingressu obnoxia fuit, ad varias periodos revocari posse.

QUIBUS venerea lues, postquam Europæ primum incubuit, sibi semper similis eandem formam & eundem tenorem constanter retinuisse videtur, in rerum natura æque hospites sunt & peregrini, ac qui regna oppidaque, quæ nunc vident & potentissima & opulentissima, pari ratione semper stetisse arbitrantur. Ut enim Historicorum fide compertum est variam olim fuisse rerum vices & regnorum conversiones; sic quoque evidens est nuda collatione descriptionum, quæ prostant inter rerum medicarum monumenta, veneream luem symptomatum, quæ intulit, diversa vehementia & natura, ac circuituum, quos habuit, varietate & dissimilitudine faciem jam sæpius mutasse.

Sed ut ea quæstio dilucide atque perspicue possit enucleari, opus est luis veneræ tempora in periodos distinguere, quarum unaquæque nova ejusdem symptomatis accessione vel decessione, seu suo caractere, conspicua sit.

Primam ab anno 1594. ad annum 1516. per quam morbus maxime sæviit.

I. Primam quidem periodum ab anno 1494. ubi primus morbi exortus, ad annum 1516. numeramus. Constat autem symptomata omnia, quæ a Nicolao Leonicensi ad calcem *Libri de Morbo Gallico*, anno 1497. Calpare Torella, in *Consiliis particularibus adversus pudendam*, anno 1500. Joanne Almenar, *Libello de Morbo Gallico*, cap. 3. anno 1516. ac demum Jacobo Cataneo, *Tractatu de Morbo Gallico*, cap. 3. anno 1516. recensita sunt, tanquam luis veneræ eo tempore propria, diligenter & accurate collecta esse & eleganter expressa ac Hieronymo Fracastorio, *Lib. 2. de Morbis contagiosis*, cap. 11. *de Morbo Gallico*, ubi sic ait: „Principio cum is apud nos apparuisset, hæc fere notæ conspiciebantur in eo morbo..... Animum tristitia quædam detinebat, corpus lassitudo, pallor faciem; tandem quod in majori parte inerat, ulcuscula quædam circa pudenda oriebantur..... hæc & emori contumacia erant, & victa una parte, alia regerminabant immortali propagine. Posthæc crustosæ quædam pustulæ per cutem erumpebant, in quibusdam quidem a calvaria incipientes (quod ut plurimum erat) in quibusdam in aliis locis; parvæ primum eæ apparebant, mox augebantur paulatim ad magnitu-

* Ipse Guicciardinus testatur *Histor. Lib. 2.* iam suo tempore, hoc est ante annum 1540. quo diem obiit, morbum post aliquos annorum curricula..... multis nationem esse capisse: in plures etiam species, atque a prima diversas suaspe naturam commutatum.

„gnitudinem cooperculi glandis & similitudinem etiam, iis non ab-
 „miles quæ in pueris achores vocantur: Differentiæ earum multæ vise-
 „bantur, quibusdam parvæ & sicciore, quibusdam majores & pingui-
 „res, nonnullis lividæ, aliis exalbidæ leviter pallentes, aliis duriore &
 „subrubentes. Omnes autem paucis post diebus aperiebantur, ac mu-
 „core quodam mucilagineo sætido manabant; nec dici potest quantus
 „ille mucor perpetuo efflueret, quanta sordities. Exulceratæ deinde
 „exedebant more eorum ulcerum, quæ phagædemica appellantur, atque
 „interdum non solas carnes, sed & ossa etiam ipsa inficiebant. Quibus
 „autem circa superiora vigeat malum, iis distillationes pravæ continge-
 „bant, quæ modo palatum, modo gargareonem, modo fauces, & tonsillas
 „erodebant: labia quibusdam consumpta sunt, quibusdam nasus, quibus-
 „dam oculi, aliis pudenda tota. Ad hæc autem magna ex parte gummosita-
 „tes quædam per membra concredebant magna deformitate, nam sæpe o-
 „vi, sæpe panis magnitudinem æquabant, quibus apertis mucor suberat al-
 „bus, mucilagineus: Tenax is callus maxime in brachiis & cruribus acci-
 „debat, qui interdum ulcerebatur, interdum integer usque ad mortem per-
 „severabat. Præter prædicta omnia, quasi parva illa forent, ingentes
 „lacertorum dolores accedebant, sæpe cum ipsis pustulis, interdum ante,
 „nonnumquam post, & ipsi quidem diuturni, quibus nihil crudelius ad-
 „erat. Affligebant præcipua noctu; dolor autem non proprie in junctu-
 „ris inerat, sed circa lacertos ipsos & nervos, Verum nihilominus sine
 „dolore ullo oriebantur pustulæ, quibusdam sine pustulis dolores, ma-
 „jor pars utriusque affligebatur. Interea languebant membra omnia, ma-
 „cies corpus detinebat, nullum aderat desiderium cibi, nullus somnus
 „sed mæror & iracundia assidua, & amor decubitus; facies & crura
 „turgebant; quandoque & febricula quædam concomitabatur, sed raro;
 „dolebat quibusdam caput, dolor is erat diuturnus & nullis medicami-
 „nibus parens.

II. Periodus altera ab anno 1516. ad annum 1526. annos decem com-
 „plectitur, quo temporis intervallo videntur memorata symptomata, quæ
 „pari vehementia pervigebant, duobus novis symptomatis aucta fuisse,
 „quorum ante nullibi mentionem factam fuisse legimus.

Præter erant exostes cum ossis carie plerumque junctæ, quas Joannes
 „de Vigo anno 1519. primus omnium sic describebat, *Præctica Chirur-*
 „*gica Lib. 5. 1.* „Similiter quoque cum dictis pustulis vel saltem post ea-
 „rum ortum inde ad mensem cum dimidio vel circa, patiens labora-
 „vit doloribus clamosis interdum circa frontem, interdum in spatulis
 „& humeris & brachiis, & aliquando in tibiis, coxis & anchiis. A qui-
 „bus doloribus aliquando multum post tempus, videlicet post annum &
 „ultra quædam oriebantur skirrholitates ad instar offitum, a quibus ægro-
 „tan-

Secun-

dam ab

anno

1516. ad

annum

1526. per

quam ab

venere

duo nova

sympto-

promata

exostoses

& verru-

cæ seu

porri ge-

nitalium

„ tantes doloribus clamosis vexabantur, præsertim tempore noctis & se-
 „ dabantur in die cujus doloris finis fere semper fuit os & almo-
 „ chatin corrumpere, & vitiare, quemadmodum in ventositate spinæ
 „ accidit.

Posterius vero fuere verrucæ & porri circa genitalia progerminan-
 tes, de quibus sequentia legimus apud Petrum Maynardum, *Tracta-
 tu de Morbo Gallico, cap. 4.* quem circa idem tempus scriptum fuisse
 haud inanis est conjectura, „ Propterea, inquit, dicimus quod signum
 „ potissimum hujus morbi Gallici, ut experientia vidimus, sunt pu-
 „ stulæ apparentes in extremitate mentulæ in viris, & in ore vulvæ
 „ in mulieribus sive in collo matricis, & pruritus in partibus semi-
 „ nis. Quæ pustulæ ut plurimum ulcerantur. Et ut plurimum dico,
 „ quia nonnullos vidi habentes has pustulas induratas, ut sunt verru-
 „ cæ, clavi, & porri.

Tertiam
 ab anno
 1526. ad
 annum
 1540. per
 quam
 morbo
 quod ad
 cætera
 mitescen-
 ti, super
 venere de
 novobu-
 bo in in-
 guine &
 alopecia.

III. Tertia periodus, ab anno 1526. ad annum 1540. luem veneream
 jam mitescere incipientem prima vidit, teste Hieronymo Fracastorio, qui
 in Opere de Morbis contagiosis anno 1549. Venetiis edito *Lib. 1. cap.*
11. refert: *tametsi nunc quoque suo scilicet tempore) ea contagio vigeat,*
post tamen prima illa tempora immutatam videri: ab inde enim annis fere vi-
ginti cæpisse pauciores videri pustulas, gummositates vero plures, cum e con-
trario prius annis fuisset: Factas item fuisse pustulas (si quæ apparebant) sic-
ciiores, ac dolores (si qui accidebant) esse acerbiores.

Sed eadem periodus accessu duorum novorum symptomatum infama-
 ta fuit, phymatis scilicet aut pani in glandulis inguinalibus, quem *bubo-*
nem dixere, & alopeciz seu capillorum defluvii.

De priore quidem audiendus est Nicolaus Massa qui ad annum 1534.
 scribebat, *Libro 1. de Morbo Gallico cap. 7.* Aliquando, inquit, est febri-
 cula, & sæpiissime apparent ulcera virgæ, quæ sunt mala cum duritie callosa
 quæ tarde sanantur; & pustulæ fiunt circa pectinem Et sequuntur aposte-
 mata inguinum, quæ si suppurantur remouent ægritudinem, maxime a prin-
 cipio.

Similia expresso bubonis nomine narrat Alysius Lobera, qui Medi-
 cus Imperatoris. Caroli V. floruit circa annum 1540. Interdum, inquit,
Tractatu de Morbo Gallico, cap. 2. in virga nonnulla ulcera cum duritie &
 callositate, quæ sanari exacte nequeunt, perperitur, quod morbi Gallici certum
 signum est, maxime vero cum in inguine præcesseris apostema, quod bubonem
 dicunt.

Videtur & ipse Paracelsus de bubone venereo mentionem fecisse circa
 annum 1536. in *Chirurgia magna, Part. 4. Lib. 3. cap. 9.*

Sed expressius Antonius Gallus, *cap. 1. Opusculi de ligno sancto non per-*
miscendo, Lutetiz editi anno 1540. Jam vero adlito affricatoque ad pedem
 malo

malo nonnumquam usu venit, ut virulenta colluvies ad inguina vomica durioris erumpat imagine, quæ glandia, quas adēras vocant, obsidione velut ambias & circumvalles: hæc si suppurat, frequenter bono est.... Hoc morbi genus cancrosum vocant bubonem, alii pulinum, dicaci etiamnum seommate notantes velut equuleo insidentes, quando divaricatis incedunt cruscus qui eo malo implicantur.

De posteriore vero consulendus Fracastorius, qui in *Opere de Morbis contagiosis* Venetiis edito anno 1546. & quod proinde paulo ante confectum fuisse credere est, *Lib. 2. cap. 11.* hæc habet. Porro & annis labentibus annis jam fere sex, (hoc est anno circiter 1534. aut 1535.) in quibus nunc sumus, magna rursus mutatio facta est ejus morbi; quippe cum in valde paucis pustula jam visantur, & dolores fere nulli aut multo leviores, gummositates vero multe; & quod mirum omnibus visum est, capillorum & reliquorum pilorum casus homines fere ridiculos facit, aliis sine barba, aliis sine superciliis, aliis glabro capite in conspectum venientibus; quod infortunium prius putabatur ex medicaminibus evenire, præsertim ex argento vivo; mox certiores facti omnes sciunt ex ipso morbo immutato procedere; quin imo (& quod pejus est) jam nunc multis videntur labefacti dentes, quibusdam etiam cadere.

VI. Quarta periodo ab anno 1540. ad annum 1550. hinc quidem in dies temperari visa sunt pleraque symptomata, quæ a morbi exortu affligebant, ut pustulæ, gummata, dolores, partium erosiones, &c. illinc vero simul accessit novum symptoma, cæterorum mitigationem compensaturum, quod nondum observatum fuerat, quod abhinc in incipiente lue venerea frequentissimum fuit, si non perpetuum, gonorrhæam dico virulentam, de qua * primi mentionem fecere Bralsavolus *Lib. de Morbo Gallico*, quem anno 1551. confectum publici juris fecit anno 1553. Fernellius anno 1556. *Lib. 2. de abditis rerum causis, cap. 14.* & *Lib. 6. de partium morbis & symptomatis, cap. 20.* & Fallopius, *cap. 23. Tractatus de Morbo Gallico*, quem circa annum 1560. aut 1561. scriptum fuisse conjicimus.

V. Quinta periodo, quæ anno 1562. terminatur, novum luis ejusdem symptoma a Fallopio observatum legimus, *Tractatus ejusdem cap. 23.* Tinnitum scilicet aurium. *Ultra decem annos, inquit, numquam audiivi ab aliquo mentionem factam de hoc Tinnitu: ego primus observavi, jam octavus agitur annus: rari sunt qui hujusmodi tinnitum non habeant in valde confirmato Gallico. Observatis, pergit ille diligentissime hoc, cum scriptum non repetitis ab aliis. Hic tinnitus solet ob alia suboriri, sed etiam fit ex Gallico.*

VI. Demum debet & sexta periodus circa annum 1676. præcedentibus

Quartam ab anno 1540. ad annum 1550. per quam remittenti morbo novum tamen accessit symptoma, nempe gonorrhæa. Quintam ab anno 1550. ad 1562. per quam tinnitus aurium primum observatus dicitur.

* Vide infra lib. 5. capita, ubi de Jacobi a Beihemcourt, & Theoph. Paracelso. Hic enim videtur gonorrhæam veneream descripsisse circa annum 1536. Ille vero ante annum 1527. eandem certissime descripsit.

tibus forsan addi, in qua primum apparuerint limphaticæ sive crystallinæ vesiculæ in genitalibus. Sane non memini de illo symptomate mentionem ullam fieri a Scriptoribus, qui hoc anno antiquiores sint: Narratque præterea Carolus Mustitanus, *Traët. de Morbis Veneris, Lib. 3. cap. 10.* crystallinas in Italia frequentes non fuisse, nisi postquam classis Hispana ad Neapolim appulit defectionis Messanenensis tempore, atque adeo post annum 1675.

Harumce
periodo-
rum di-
scrimina
magnis
Auctori-
bus aiti.

Videbor forsan gradarias luis veneræ accessiones verbis exaggerare, & leviora quædam symptomata ignoratione vel incogitantia omissa pro novis venditando morbi periodos nimis amplificare. Sane nec ipse, ut ingenue dicam, ab eadem suspicione multum alienus sum, saltem de secunda periodo, in qua exostoses & verrucas porrosque primum observata fuisse dixi, quippe ea symptomata in morbi nondum satis noti descriptione vel omitti potuere, vel nomine gummatum & pustularum comprehendere.

At verò idem iudicium nulla ratione proferre licet 1. De bubone venereo, qui tertia tantum periodo prodiit; neque enim credere est Medicos, qui ante annum 1538. de lue venerea scripsere, omnes ad unum tam oscitantes fuisse, ut alte silere potuerint de bubone, tam insigni scilicet luis veneræ symptomate, de quo Medici eodem anno posteriores ad unum omnes tam copiose disserunt, si bubo jam ante annum 1533. observatus fuisset.

2. Saltem nulla potest subesse suspicio circa alopeciam, de cujus novitate constat idoneis & oculatis testibus.

Sic Fracastorius *Lib. 2. cap. 1.* Operis de Morbis contagiosis, quod circa annum 1540. confectum esse dicimus, diserte refert *jam a sex annis*, (hoc est anno ipso 1534.) *capillorum & pilorum omnium defluvium accidisse, imo quibusdam labefactorum dentium casum.*

Sic Brassavolus in Libro de Morbo Gallico, qui Venetiis anno 1553. editus est, asserit *jam a viginti annis citra* hoc est jam ab anno 1533.) *alias quasdam species ortum habuisse, quæ an declinanti morbum sequantur, an aliquo modo immutatum sit genus ambigendum esset. Quinque sunt potissimum, modi, pergit ille, quos referre non pigebit. Unus est, qui vulgo pellarola vocatur, vel defluvium pilorum, qui modus homines ridiculos reddit, cum capilli deciderint, barba, cilia, supercilia & palpebrarum pilis; nullus enim est qui cum hoc videat ita depilatos, non rideat. Alius modus est, qui vulgo dicitur dentarola, quoniam dentes patienti decidunt. Tertius modus est unguium casus, qui plerumque defluvium pilorum sequitur.... vulgus hunc modum vocat unguariola. Quartus modus, in qua homines oculos amittunt, & ocelliarolam vulgo nuncupant.... Quintus modus est gonorrhœa.*

Sic omnium disertissime Fallopius *cap. 23. Traët. de Morbo Gallico*, quem

quem circa annum 1560. aut 1561. scriptum esse liquet ex capitibus 7. & 23. *Primis illis diebus, inquit, per spatium 40. annorum (hoc est ante annum 1533.) non erat defluxum pilorum, agitur jam trigessimus annus, quo hoc defluxum incipit* Et paulo infra, *jam est transactus quadragesimus annus, quo non radimur ob visuperium nostrum: Antea non erat defluxum pilorum & radebamur. Hispani inducere tyrannidem in Italiam, Gallicum & barba longa usum.*

3. Neque minus indubia est tum gonorrhææ veneræ accessio, tum accessionis epocha. Testatur enim *ibidem* idem Fallopius anno 1560. aut 1561. scribens, *non esse quidem annos, quibus observata est gonorrhæa Gallica. Ex quo colligimus, pergit idem, variam esse naturam morbi & possumus expectare nova symptomata.* Inde liquet ergo calculo subducto gonorrhæam veneræ circa annos 1545. aut 1546. primum observatam fuisse. Certe Bratsavolus primus fuit omnium, quos sciam, qui in *Tractatu* anno 1553. typis edito Venetijs, gonorrhæam inter cætera luis veneræ symptomata retulerit, sed quem Fernelius locis supra laudatis brevi temporis intervallo securus fuisse videtur.

4. Demum luculento Fallopii testimonio, *ubi supra* novitas symptomatis, quod luis veneræ quinta periodo accessit, tinnitus nempe aurium, abunde confirmatur. Refert enim ipsissimis verbis *ultra 10. annos se nunquam audivisse ab aliquo mentionem factam de hoc tinnitu, quem ipse primus observavit jam ab octo annis, (hoc est circiter anno 1552.)*

Post ultimam modo recensitarum periodorum omnia in melius semper abiere in hunc usque diem, sed progressu tardiore & magis gradario.

1. Nulla symptomata accesserunt de novo a Fallopii tempore: Neque enim nova dicenda censeo vel phimosim, quam accuratissime describere ipse Fallopius *Tractatu de Morbo Gallico, cap. 83. 84. & 85.* & Alexander Trajanus Petronius *De Morbo Gallico, Lib. 7. cap. 2. & 3.* vel stranguriam gonorrhææ pedissequam, de qua idem Petronius, *ibidem cap. 13.*

2. Ex symptomatis, quæ olim sæviebant, quædam prius evanuerunt; ut prolapsus oculorum, dentium, unguium, &c. quæ jam dudum a nemine contingit ut observentur.

3. Symptomata cætera pleraque jam rariora sunt & remissiora, ut gummata sciatomatosa, vel atheromatosa; alopeciz; pustulæ crustosæ; caries ossium; ulcera maligna palati, columellæ, faucium, narium & dolores nocturni, &c.

4. In summa super sunt quatuor tantum symptomata, quibus tota lues videtur nunc comprehendi, nempe gonorrhæa, bubo, ulcuscula cancrolosa penis, & porri seu verrucæ, cum quibus solis lues constanter incipit, cum quibus solis solet non raro terminari.

5. Imo vero morbus in sola gonorrhæa ut plurimum consistit, nec cætera

tera ulla symptomata plerumque accidunt, nisi negligant gonorrhœæ cû ratio.

6. Demum gonorrhœa ipsa jam curatu facilior est, ac sæpe sine remediis sponte sanatur, modo dicta servetur conveniens. Cætera quoque tria symptomata, etsi operosiore methodo opus habeant, jam multo remissiora sunt.

C A P U T XII.

De periodis, quas præagere licet luem veneream in posterum habituram esse.

MORBI novi & in Europam aliunde advecti, cum alimalibus alienigenis aut plantis exoticis videntur jure merito conferri posse, ut supra indicatum fuit, *cap. 11.* Ut enim animalium, quæ a ievigenz sunt, alia in Europa commode vivunt & generatione multiplicantur, ut bombyces a Sinarum Imperio oriundi, aut Gallinæ indicæ ab Indiis Occidentalibus delatæ: Alia vero brevi intereunt vel cito degenerant; Ut plantarum aut arborum, quæ sunt exoticæ, aliæ læte fruticant vigintque in Europa, ut hippocastanum, vulgo *Maronnier d'Inde* ex India, aut *Acacia* ex Ægypto devec̃ta aliæ vero celeriter pereunt aut mutata natura degeneres fiunt; sic quoque morborum, qui novi sunt & in Europam aliunde advecti, alii sunt, qui ab ingressu idem constanter permanent, eadem sæviunt vehementia, ideoque perennes futuri videntur, ut variolæ & morbilli, quos ab Arabibus jam a mille annis acceptos habemus: Alii vero sunt, qui a priore ferocia paulo post degeneres tandem sensim evenerunt, ut lepra, quæ in Europam bis inducta, ut supra vidimus *cap. 3.* bis in eadem sponte cessavit.

Proinde ad alterutram classem luem veneream pertinere.

Itaque dum in futuras luis venereæ periodos inquiritur, id unum versatur in quæstione, quibusnam alienigenarum animalium, aut plantarum exoticarum comparanda sit, utrum scilicet cum animalibus & plantis quibusdam Europæ climati ita assuecat, ut apud nos propria & perennis fieri videatur, quemadmodum de variolis futurum esse conjicimus? An vero cum animalibus aut plantis aliis, adversa aeris temperie aut corporum quibus insidet constitutione fracta jam ita langueat, ut sensim ad interitum vergat tandem aliquando futurum, ut lepræ jam contigisse notum est.

Ad quam tamen pertineat temere non esse pronuntiandum.

Sane tam difficilis nodus expediri non potest nec conjecturis inanibus & cæca quasi divinatione, ut dum Fernelius *Lib. 2. de abditis rerum causis*, *cap. 14.* Hieronymus Reuſnerus, *Lib. de Scorbuto*, Carolus Musitanus, *Tractat. de Morbo Venereo*, *Lib. 1. cap. 6.* temere prælagiunt luem veneream in perpetuum duraturam esse; nec futilibus Astrologiæ placis

vis, quæ non sunt divinatione minus fallacia, ut cum Petrus Maynardus *cap. 3. Tract. de Morbo Gallico* anno 1518. editi falso olim tradidit hunc morbum anno 1584. cessaturum esse; sed augurio quod de futuris morbi periodis ex periodis jam præteritis ducatur, & quo nihil certius esse posse credimus in quæstione præsentis. Profecto si lues venerea jam a 240. annis, a quibus in Europam introductam fuisse probavimus, sensim in dies mitescere visa sit, & si ætate nostra in dies magis ac magis mitescat, haud inanis spes inde affulgere videtur, fore ut progressu simili in posterum decrescens ad interitum tandem aliquando perveniat.

Vidimus quidem supra in *præcedenti capite* testimonia multa, unde liquet primigenia luis venereæ symptomata, quæ initio sævissima erant, sensim in leniora mutata fuisse intra primos sexaginta annos. Videbimus modo *præsentis capite* testimonia alia, quibus evidens erit secundaria luis ejusdem symptomata, quæ prioribus successerunt, etsi a 180. annis eadem fere naturam retineant, atamen ipsa quoque non eadem ac olim vehementia nunc sævire. Proinde cum utroque probationum genere perinde manifestum sit veneream luem, aut mutata in melius primitivorum symptomatum natura, aut imminuta præsentium intensio, de pristina ferocia multum remississe, videmur jure merito assentiri posse sequentibus Medicis, eruditione & fama celeberrimis, qui a 200. annis, quasi successiva traditionis catena futurum luis venereæ interitum non speraverunt modo, imo etiam, ut ea quæ placent citius expectare commune est, multo promptiorem speraverunt, quam tarda morbi declinatio aut præsens ejusdem status pollicerentur.

I. Hieronymus Fracastorius, postquam fuse exposuit *cap. 11. Libro 2. de Morbis contagiosis*, mutationes, quæ jam suo tempore symptomatis plerisque luis venereæ acciderant, & quas supra indicavimus *præcedente capite*, concludit inde *cap. 12. existimandum esse senium jam bujus morbi incæpisse, nec longe post futurum ut ne per contagem quidem se propaget, quoniam materia in dies frigidior fit & terrestrior, in qua & seminaria tum pauciora, tum & debiliora in dies gignuntur. Quam eandem conjecturam jam ante ipse expresserat sequentibus versibus in Lib. 1. Syphilidis editæ ann. 1530.*

Namque iteram cum fata dabunt labentibus annis;
Tempus erit, cum nocte atra sopita jacebit
Interitu data.

Hac methodo multis jam pridem videri lucem veneream ad interitum sensim tendere.

1546.

II. Antonius Musa Bratsavolus ex mutationibus luis venereæ, quas ipse etiam sedulo annotavit, collegit pari ratione in *Tactatu de Radicis Chine usu, Morbum Gallicum esse in declinatione universali, nam, inquit, semuti capit, & adeo remittetur, ut penitus abeat, neque amplius aliquem vexabit.*

1552.

bit. Satis enim, pergit ille, per octuaginta fere annos vagatus est; hoc nimirum modo morbi omnes navi & qui nonnullis solum temporibus visi sunt, deinceps diluenerunt & aboliti sunt.

1560. III. Gabriel Fallopius, *Tractatus de Morbo Gallico, cap. 3.* asserit hunc morbum suo tempore ita misem, ita familiarem effectum esse, ut... ex toto & maxima cum facilitate superetur.

1564. Levinus Lemnius, *De occultis naturæ miraculis, Lib. 2. capite 14.* dicit Morbum Gallicum sua ætate mitiorem esse, quam olim, cum enim superioribus annis intolerandis modis homines excarnificaret, jam capisse miscere minusque infestum esse.

1564. IV. Bernardinus Tomitanus, *Lib. 2. de Morbo Gallico, cap. 2.* post expositas luis venereæ mutationes sic concludit: Morbum Gallicum jam ad exireum senium pervenisse, hoc est ad occasum & declinationem tendere, proptereaque celerrime brevique tempore fore ut non amplius per contactum venereosque complexus propagationem suscipiat, paucisque interpositis ait ex mitigata morbi natura & placatis symptomatis se pro certo asserere posse eum jam proximum esse terminationi.

1566. V. Alexander Trajanus Petronius, *Lib. 3. de Morbo Gallico, cap. 1.* fatetur minui id malum & reddi mitius victu, loco, aereque mutatis, proportionem præsertim ad Indiam Occidentalem, unde primum ad nos penetravit, habita.

1577. VI. Laurentius Joubertus, in *Libro variola magna sive crassa, cap. 3.* asserit luem illam finem aliquando esse habituram.... cum per varia corpora transitu facto exoticis affectus jam multo mitior evaserit, ut tandem inclinans & consenscens simplicis scabiei. . . . speciem sit adepturus: quæ eadem verbis totidem jam ante dixerat, *De Erroribus popularibus, Lib. 2. cap. 12.*

1600. VII. Joannes Varandæus, *De Morbis hepatis, cap. 2. de lue venerea;* testatur morbi ferocitatem exolescere nunc & quasi minui, quia longius distat a primo seminario seu infectionis principio, & quia causæ disponentes vel concurrentes minus sunt dispositæ ad illum fovendum.

1680. VIII. Thomas Sydenhamius, *Epistola responsoria de lue venerea,* docet morbum, vegetabilium instar, in alienum a patrio solum quousque transplantatum, Europæo nostro non perinde letari, sed languere in dies & mitioribus phenomenis fatiscere. Novus apud nos hospes cum esset, pergit ille, si quem arrisuerat, mox omnem sanguinis massam contaminabat; & duri casus atque artuum doloribus, etiam ulceribus variis in partibus se prodebat. At vero centum retro annis gonorrhææ virulentiæ specie se primum ostendebat, ostenditque adhuc, hac sibi porta exitum querens.

1711. IX. Joannes Devaux, Chirurgus Parisiensis, qui *Tractatum Caroli Musitani de Morbo venereo* e Latino Gallicum fecit, ac typis edegit

curavit Trivultii anno 1711. in adnotatis ad *caput. 6. lib. 1.* observat symptomata luis venereæ in dies Lutetiæ mitiora esse a 30. vel 40. annis ; gonorrhœas nempe minus dolorificas ; ulcuscula cancrofa minus sæva aut erodentia ; bubones resolutioni aut suppurationi magis comparatos esse ; dolores venereos, tum vagos, tum fixos, minus cruciari ; uno verbo morbum ita remissum jam videri, ut sperare liceat Medicinæ ope tandem aliquando superatum iri.

X. Demum ipse quoque, ut & meum proferam testimonium, iterata & attenta observatione compertum dudum habeo luem veneream sensim in dies mitigari ; & quamvis, ut est præsentis ætatis in libidinem intemperantia, haud rarius, imo contra frequentius forsân etiamnum grassetur, debilius tamen jam pridem sævire ; tam multa, tam horrenda, curatu tam difficilia symptomata non inferre ; remediis, si caute adhibeantur, minus pertinaciter reluctari ; uno verbo vetustate pederentim exolescere.

Ex hac ergo testium caterva, qui licet diversis temporibus & locis vixerint, in idem tamen omnes uno ore conspirant, liquet luem veneream ad interitum gradarie tendere, licet forsân adhuc pede claudo. Neque sane mirum morbum peregrinum & alienigenam, in Europa præter naturam insititum paulatim senescere, ac tandem aliquando extingui. Spem ratam facere potest exemplum simile læpræ Arabum, quæ & ipsa apud nos hospes & bis in Europam olim traducta, bis in eadem sensim desuit pari de causa, etsi fuisset inter initia æque dira & æque vulgata.

Cæterum licet morbi interitum certi prælagiamus, de tempore interitus nihil definimus, quod caliginosa nocte premit Deus. Cito quidem lues cessatura foret, si Torellæ consilium in *Dialogo de dolore in pudenda*, quod ab Eustachio Rudio in *Opere de Morbo Gallico* renovatum legimus, posset adhiberi : Fœminas scilicet virosque omnes, quotquot lue venerea inficerentur, remediis simul subjicere, ut sublato omni morbi feminio morbus radicitus extirparetur. Sed hæc ad Utopiam ableganda.

Satis est morbum ad occasum sponte vergere, multis de causis, 1. Quibus de Quia virus, quod in Europa sponte non gignitur sed ex traduce tantum propagatur, transitione in dies sensim debilitatur : 2. Quia adversi aeris natura, alimentorum qualitate, sanguinis constitutione, apud nos quotidie infringitur : 3. Quia remediis efficacissimis in dies retunditur. Sic consociata causarum energia res ad optatum successum tandem aliquando perducitur ; quandonam vero, ipse prorsus ignoro ; celeriter tamen, si 1. Quemadmodum nunc usus viget, ægrotantes missa cunctatione male pedibunda ad remedia cito confugiant, dum virus recens est, nec unquam adeo permittat, ut per longas moras invalescens ultimum virulen-

tiæ gradum adipiscatur, 2. Si diligens * munditiæ studium adhibeatur; ut nunc moris est, saltem in Gallis, iteratisque lotionibus extergantur frequenter pudenda, ne humoris acrioris aut virulenti mora conspiciantur.

Gravis
obsectio
adversus
illam opi-
nionem
proponi-
tur & di-
huitur.

Non dissimulanda tamen obsectio, qua conjecturæ nostræ premi videntur: Scilicet scintillas e focus variis, quos in Zona Torrida admittimus, debere interdum ad nos agi, quibus incendium jam fere sopitum in Europa denuo exulscitetur, vel potius, ut sine metaphora dicam, e variis Zonæ Torridæ regionibus, ubi lues venerea endemia viget, frequentia veneni effluvia in Europam commercio debere traduci, quæ remittentem morbum renovatura sint.

Sed hanc argumentationem multa diluunt, 1. E regionibus istiusmodi alias, quæ omnium notissimæ erant & unde morbus ad nos olim deventus est, jam dudum vastatas & incolis exhaustas esse; atque adeo nihil inde ad nos apportari jam amplius posse; quod convenit Insulæ *Haiti* seu *Hispaniola*, cæterisque continentis Americæ regionibus calidioribus, quarum indigenæ ab Hispanis jam pridem internectione deleti sunt.

2. Cum nonnullis aliis harumce regionum ita rara nobis intercedere commercia, si qua porro intercedant, ut vix ulla morbosa seminia possunt hinc traduci, quod potissimum verum est de interioribus Africæ Provinciis, adeoque de Regnis *Tombouctou* & *Meli*, ubi luem venericam antiquitus vigere creditur.

3. Imo virus raro concipi in cæteris regionibus hujuscemodi, in illis etiam cum quibus frequentior est societatis usus & major consuetudo, ut sunt Indiarum Orientalium oræ & omnes Insulæ per mare Indicum sparsæ, quoniam postquam semel innovuit exemplo luis venericæ, quæ in Europa grassatur, venenum concubitu posse contrahi, solent vel perditissimi attentius sibi cavere ab imprudente & vesano usu veneris cum mulieribus barbaris.

4. Quod si vero contigerit aliquando quempiam illic contagio primigenio contaminari, ut interdum fieri inficias ire nolum, efficaci remediorum auxilio celeriter sibi prospicere, atque adeo sic abrumpi protinus successivam contagionis catenam, quæ posset alioquin novas tragedias forsitan excitare, Et sane quidem, licet Europæi jam a ducentis annis fere omnes Asiæ oras & Insulas sedulo lustraverint, ac inde forsitan venenum venericum de novo non semel hauerint, constat tamen experientia luem vene-

* *Friedericus Hoffmannus, Dissertat. Physico-Medicarum* 3. asserit luem venericam Constantinopoli non grassari, additque ideo non grassari, quod saminæ munditiæ op-
pre-ne studiose post se aquam sumant, & locos diligenter colluunt. Sed videtur ille in
erore versari gemino; tum facti, tum juris: Facti, aiendo luem venericam Constanti-
nopoli nullam observari; Juris, lotionum utilitatem nimium exaggerando.

veneream pari passu per idem tempus in dies mitigatam esse, unde si frequens cum Aliaticis consuetudo, si acceptum identidem ab illis venenum haftenus non obstiterint ne lues sensim in dies remitteretur, consequens esse videtur fore, ut in posterum causæ eædem haud efficacius valeant obstare, cur eadem lues magis ac magis extenuata aliquando tandem penitus non evanescat.

CAPUT XIV.

De legibus olim sancitis in eos, qui lue venerea laborant.

CREDEBATUR lues venerea, cum primum in Europa apparuit, pestis instar ab infectis in sanos contagione in distans serpere alloquio, convictu, usu vitæ communis, &c. ægri scilicet verum contagionis modum initio vel ignorantibus vel dissimulantibus. Inde fluxere leges illæ, quæ in infectos olim latæ sunt in Galliis, & quibus incolumitati publicæ ea diligentia providebatur, quam videbatur præjudicii ratio postulare.

Sic existat in Actis Senatus Parisiensis, *Registre du Conseil, commence le mois de Novembre 1496. finissant au mois d'Octobre 1497. cote N. XL. Fol. 74. verso.* Decretum datum non die 4. Martii, ut refert Fontanonus, *Edictis, & Ordonnances des Rois de France, Titre 28.* sed die 6. Martii anni 1496. quo lue venerea infectis pœna capitali interdictum erat commercio cum sanis, sanctumque ut in suburbium Sancti Germani secederent, in loca destinata segregandi. Placet ipsissima Decreti (a) verba Gallica exscribere, ne quid vertendo immutasse videar.

Olim creditum fuit luem veneream contagione in distans serpere more pestis.

Ab hoc præjudicio ortæ sunt Leges latæ in infectos lue venerea.

Arresté du Parlement de Paris, portant Reglement sur le fait des Malades de la Grosse Vérole.

Decretum Senatus Parisiensis de disciplina erga infectos magna variola observanda.

Aujourd'hui sixiesme Mars, pource que en ceste ville de Paris y avoit plusieurs malades de certaine maladie contagieuse, nommée (a) la Grosse Vérole, qui pui deux ans en ça a eu grant cours en ce Roiaume, tant

Hac die (6. Martii) cum in hac urbe Lutetia ægri adfint plurimi, morbo quodam affecti, qui *Magna seu crassa Variola* appellatur, & qui duobus abhinc annis in hoc Regno plurimum grassatus est, tum in hac

Decreto illo celebri, quod a Senatu Parisiensis datum est die 6. Martii anni 1496.

F 3 de

[a] Decretum idem a Domino Alexio Lobineau, Monacho Benedictino, ex scriptum fuit. *Histoire de la Ville de Paris, Tome IV. pag. 613.*

[b] Gaspar Torella, qui aliquandiu in Gallica commoratus fuit, asserit in *Dialogo de Dolore in pudenda gra*, quem Blesis scripsit anno 1469. *pudendagram Parisiis & in aliis magnis civitatibus Francie a literatis Grossam Variolam appellari.*

de ceste ville de Paris que d'autres lieux, a l'occasion dequoi estoit a craindre que sur ce printemps elle multipliaſt, a esté advisé qu'il estoit expedient y pourvoir.

Pour quoi ont esté mandez les Officiers du Roi en Chastelet, lesquels venus en la Court ont remonstré, qu'ils avoient esté en la maison de l'Evesque de Paris pour y mettre provision, mais n'y estoit encore advisé parmi le tout pour les difficultez qui se trouvoient.

Si leur a ordonné la Court y pourvoir, & pour assister avec ledit Evesque a esté commis M. Martin de Bellefaye, & moi Greffier (Pierre de Cerilay) en sa compagnie.

Et aprez ce que en la maison dudit Evesque avons communiqué ensemble, me a esté enjoint en faire l'Ordonnance, ce que ai fait selon les Articles ey aprez enregistrez, laquelle Ordonnance par moi portée en Chastelet, & delivré au Prevost de Paris, a esté mise a execution, & jusques cy bien gardée.

Pour pourvoire aux inconvenients, qui adviennent chacun jour par la frequentation & communication des malades, qui sont de present en grand nombre en ceste ville de Paris, de certaine maladie contagieuse nommé la Grosse Verole, ont esté advisez, concluds & deliberez par Reverend Pere en Dieu Monsieur l'Evesque de Paris, les Officiers du Roi, Prevost des Marchands & Eschevins de Paris & le conseil & avis de plusieurs grands & notables Personnaiges de tous estats, les Points & Articles, qui s'ensuivent.

urbe Lutetia, tum alibi, unde timendi locus sit ne morbus ille hocce vere vehementius ingravescat, visum fuit publicæ incolumitati prospiciendum esse.

Quocirca jussi sunt accersiri Præfecti regii in Castelletto, a quibus Curiam ingressis expositum fuit se jam in domum Episcopi Parisiensis convenisse providendi causa; negotium tamen nondum penitus confectum esse, quippe quod difficultatibus multis premeretur.

Atque jussit Curia, ut jam tandem prospicerent; ac M. Martinum de Bellefaye, & me (Petrus de Cerisay) Curie Tabularium delegit, qui consilio habendo una cum dicto Episcopo interessemus.

Porro habita in domo dicti Episcopi deliberatione, jussus sum Decretum facere juxta capita infraſcripta, quod a me delatum ad Castelletum, traditumque Parisiensi Præposito, diligenter hucusque observatum est.

Ut cautum sit infortuniis, quæ quotidie contingunt usu atque consuetudine cum ægris, qui nunc in urbe Lutetia numero plurimi adfunt morbo quodam contagioso infecti crassa, sive magna variola vocato, a Reverendo Patre in Deo Domino Episcopo Parisiensi, Præfectis regiis, Præposito Mercatorum & Scabinis Parisiensibus, consilio multorum præstantium & insignium Virorum cujuscumque ordinis, constituta sunt Capita sequentia.

I. Pre-

I.

Premierement sera fait cry public que de Par le Roi, Que tous malades de ceste maladie de Grosse Verole estrangiers, tant hommes que femmes, qui n'estoient demourans & residents en ceste ville de Paris, alors que ladite maladie les a prins, vingt & quatre heures apres ledit cry fait, s'envoient & partent hors de ceste dite Ville de Paris & pays & lieux dont ils sont natifs, ou là où ils faisoient leur residence quand ceste maladie les a prins, ou ailleurs où bon leur semblera, sur peine de la hart; Et a ce que plus facilement ils puissent partir, se retirent es portes Saint Denys & Saint Jacques, où ils trouveront gens deputer, lesquels leur delivreront a chacun quatre sols parisis, en prenant leur nom par escript, & leur faisant defenses sur la peine que dessus, de non rentrer en ceste ville jusques a ce qu'ils soient entierement gars de ceste maladie.

II.

Item, Que tous les malades de ceste maladie estant de ceste ville, ou qui estoient residents & demourans en ceste ville, alors que ladite maladie leur a prins, tant hommes que femmes, qui auront puissance de eulx retirer en maisons, se retirent dedans lesdites vingt & quatre heures sans plus aller par la ville, de jour ou de nuit, sur ladite peine de la hart, Et lesquels ainsi retirez en leurs sains maisons, s'ils sont pauvres & indigents, pourront se recommander aux Curez & Marregliers des Paroisses dont ils seront pour estre

I.

Primo. Regis nomine per præconem edicetur interposita mortis pœna, ut alienigenæ, quicumque hoc morbo *variola crassa* sive magna dicto affecti sunt, tum viri, tum fœminæ, qui in hac urbe Lutetia non commorabantur cum morbo illo correpti sunt, exeant ex urbe intra viginti quatuor horas a promulgatione, abeantque ocyus in regiones & urbes ubi nati sunt, vel quas incolebant quo tempore morbus ille eosdem invasit, vel alio quocumque lubuerit: Et ut commodius in viam se dare possint, accedant ad portas sancti Dionysii & sancti Jacobi quatuor solidos parisienses in singula capita accepturi a delegatis huic muneri viris, prolatoque scriptoque prius singulorum nomine, pœnaque mortis singulis iterum denunciata, si in urbem audeant regredi, antequam a morbo illo absolute convalescant.

II.

Item. Ut morbo eodem affecti, quicumque in hac urbe nati sunt, aut ibidem commorabantur dum morbus invasit, viri fœminæque, quibus domus suppetit quæ se continere possint, sedulo caveant ut se domi semotos contineant intra viginti quatuor horas, nec amplius per urbem noctu aut interdiu audeant divagari, sin secus capite plectendi: Quod si qui egeni fuerint, indigentiam suam Parochis Aeditisque suarum Parochiarum significent, ut cibaria sibi cætera-

des

„ tantes doloribus clamoris vexabantur, præsertim tempore noctis & se-
 „ dabantur in die cujus doloris finis fere semper fuit os & almo-
 „ chatin corrumpere, & vitare, quemadmodum in ventositate spinæ
 „ accidit.

Posterius vero fuere verrucæ & porri circa genitalia progerminan-
 tes, de quibus sequentia legimus apud Petrum Maynardum, *Tracta-
 tu de Morbo Gallico, cap. 4.* quem circa idem tempus scriptum fuisse
 haud inanis est conjectura, „ Propterea, inquit, dicimus quod signum
 „ potissimum hujus morbi Gallici, ut experientia vidimus, sunt pu-
 „ stulæ apparentes in extremitate mentulæ in viris, & in ore vulvæ
 „ in mulieribus sive in collo matricis, & pruritus in partibus semi-
 „ nis. Quæ pustulæ ut plurimum ulcerantur. Et ut plurimum dico,
 „ quia nonnullos vidi habentes has pustulas induratas, ut sunt verru-
 „ cæ, clavi, & porri.

Tertiam III. Tertia periodus, ab anno 1526. ad annum 1540. luem veneream
 ab anno jam mitescere incipientem prima vidit, teste Hieronymo Fracastorio, qui
 1526. ad in Opere de Morbis contagiosis anno 1549. Venetiis edito *Lib. 1. cap.*
 annum 11. refert: *tametsi nunc quoque suo scilicet tempore ea contagio vigeat,*
 1540. per quam post tamen prima illa tempora immutatam videri: ab inde enim annis fere vi-
 morbo ginti cepisse pauciores videri pustulas, gummositates vero plures, cum e con-
 quod ad trario primis annis fuisset: Factas item fuisse pustulas (si quæ apparebant) sic-
 cætera ciores, ac dolores (si qui accidebant esse acerbiores,
 mitescen- Sed eadem periodus accessu duorum novorum symptomatum infama-
 ti, super ta fuit, phymatis scilicet aut pani in glandulis inguinalibus, quem bubo-
 venere nem dixere, & alopecie seu capillorum defluvii.
 novobu- De priore quidem audiendus est Nicolaus Massa qui ad annum 1534.
 bo in in- scribebat, *Libro 1. de Morbo Gallico cap. 7.* Aliquando, inquit, est febri-
 alopecia. cula, & sæpiissime apparent ulcera virgæ, quæ sunt mala cum duritie callosa
 quæ tarde sanantur; & pustula fiunt circa pectinem Et sequuntur aposte-
 mata inguinum, quæ si suppurantur remouent ægritudinem, maxime a prin-
 cipio.

Similia expresso bubonis nomine narrat Alysius Lobera, qui Medi-
 cus Imperatoris Caroli V. floruit circa annum 1540. Interdum, inquit,
Tractatu de Morbo Gallico, cap. 2. in virga nonnulla ulcera cum duritie &
 callositate, quæ sanari exacte nequeunt, perpetitur, quod morbi Gallici certum
 signum est, maxime vero cum in inguine præcesserit apostema, quod bubonem
 dicunt.

Videtur & ipse Paracelsus de bubone venereo mentionem fecisse circa
 annum 1536. in *Chirurgia magna, Part. 4. Lib. 3. cap. 9.*

Sed expressius Antonius Gallus, *cap. 1. Opusculi de ligno sancto non per-
 miscendo*, Lutetiæ editi anno 1540. Jam vero adlito affricatoque ad pedem
 malo

malo nonnumquam usu venit, ut virulenta colluvies ad inguina vomica durioris erumpat imagine, quæ glandia, quas adstræ vocant, obsidione velut ambus & circumvallet: hæc si suppurat, frequenter bono est.... Hoc morbi genus cancrosum vocant bubonem, alii pulinum, dicaci etiamnum feommate notantes velut equuleo insidentes, quando divaricatis incedunt crusculis qui eo malo implicantur.

De posteriore vero consulendus Fracastorius, qui in *Opere de Morbis contagiosis* Venetiis edito anno 1546. & quod proinde paulo ante confectum fuisse credere est, *Lib. 2. cap. 11.* hæc habet. Porro & annis labemibus annis jam fere sex, (hoc est anno circiter 1534. aut 1535.) in quibus nunc sumus, magna rursus mutatio facta est ejus morbi; quippe cum in valde paucis pustula jam visantur, & dolores fere nulli aut multo leviores, gummositates vero multe; & quod mirum omnibus visum est, capillorum & reliquorum pilorum casus homines fere ridiculos facit, aliis sine barba, aliis sine superciliis, aliis glabro capite in conspectum venientibus; quod infortunium prius putabatur ex medicaminibus evenire, præsertim ex argento vivo; mox certiores facti omnes sciunt ex ipso morbo immutato procedere; quin imo (& quod pejus est) jam nunc multis videntur labefacti dentes, quibusdam etiam cadere.

VI. Quarta periodo ab anno 1540. ad annum 1550. hinc quidem in dies temperari visa sunt pleraque symptomata, quæ a morbi exortu affligebant, ut pustulæ, gummata, dolores, partium erosiones, &c. illinc vero simul accessit novum symptoma, cæterorum mitigationem compensaturum, quod nondum observatum fuerat, quod abhinc in incipiente lue venerea frequentissimum fuit, si non perpetuum, gonorrhæam dico virulentam, de qua* primi mentionem fecere Bralsavolus *Lib. de Morbo Gallico*, quem anno 1551. confectum publici juris fecit anno 1553. Fernellius anno 1556. *Lib. 2. de abditis rerum causis, cap. 14.* & *Lib. 6. de partium morbis & symptomatis, cap. 20.* & Fallopius, *cap. 23. Tractatus de Morbo Gallico*, quem circa annum 1560. aut 1561. scriptum fuisse conjicimus.

V. Quinta periodo, quæ anno 1562. terminatur, novum luis ejusdem symptoma a Fallopio observatum legimus, *Tractatus ejusdem cap. 23.* Tinnitum scilicet aurium. *Ultra decem annos, inquit, numquam audiri ab aliquo mentionem factam de hoc Tinnitu: ego primus observavi, jam octavus agit annus: rari sunt qui hujusmodi tinnitum non babeant in valde confirmato Gallico. Observatis, pergit ille diligentissime hoc, cum scriptum non repertis ab aliis. Hic tinnitus soles ob alia suboriri, sed etiam fit ex Gallico.*

VI. Demum debet & sexta periodus circa annum 1676. præcedentibus

Quartam ab anno 1540. ad annum 1550. per quam remittenti morbo novum tamen accessit symptoma, nempe gonorrhæa. Quintam ab anno 1550. ad 1562. per quam tinnitus aurium primum observatus dicitur.

* Vide infra lib. 5. capita, ubi de Jacobi a Bethencourt, & Theoph. Paracelso. his enim videtur gonorrhæam veneream descripsisse circa annum 1536. Ille vero ante annum 1527. eandem certissime descripsit.

tibus forsan addi, in qua primum apparuerint limphaticæ sive crystallinæ vesiculæ in genitalibus. Sane non memini de illo symptomate mentionem ullam fieri a Scriptoribus, qui hoc anno antiquiores sint: Narratque præterea Carolus Musitanus, *Tract. de Morbis Veneris, Lib. 3. cap. 10.* crystallinas in Italia frequentes non fuisse, nisi postquam classis Hispana ad Neapolim appulit defectionis Messanenſis tempore, atque adeo post annum 1675.

Harumce
periodo-
rum di-
fermina
magnis
Auctori-
bus aiti.

Videbor forsan gradarias luis venereæ accessiones verbis exaggerare, & leviora quædam symptomata ignoratione vel incogitantia omiſſa pro novis venditando morbi periodos nimis amplificare. Sane nec ipse, ut ingenue dicam, ab eadem suspicione multum alienus ſim, ſaltem de ſeunda periodo, in qua exostoſes & verrucas porroſque primum obſervata fuiſſe dixi, quippe ea symptomata in morbi nondum ſatis noti deſcriptione vel omitti potuere, vel nomine gummatum & puſtularum comprehendî.

At vero idem iudicium nulla ratione proferre licet 1. De bubone venereo, qui tertia tantum periodo prodiit; neque enim credere eſt Medicos, qui ante annum 1538. de lue venerea ſcripſere, omnes ad unum tam oſcitanſes fuiſſe, ut alte ſilere potuerint de bubone, tam inſigni ſcilicet luis venereæ ſymptomate, de quo Medici eodem anno poſteriores ad unum omnes tam copioſe diſerunt, ſi bubo jam ante annum 1533. obſervatus fuiſſet.

2. Saltem nulla poteſt ſubefſe ſuſpicio circa alopeciam, de cujus novitate conſtat idoneis & oculatis teſtibus.

Sic Fracaſtorius *Lib. 2. cap. 1.* Operis de Morbis contagioſis, quod circa annum 1540. conſectum eſſe dicimus, diſerte refert *jam a ſex annis*, (hoc eſt anno ipſo 1534.) *capillorum & pilorum omnium deſtium accidiſſe, imo quibuſdam labefacturorum dentium caſum.*

Sic Braſſavolus in Libro de Morbo Gallico, qui Venetiis anno 1553. editus eſt, aſſerit *jam a viginti annis citra* hoc eſt jam ab anno 1533.) *alias quaſdam ſpecies ortum habuiſſe, quæ an declinanti morbum ſequantur, an aliquo modo immutatum ſit genus ambigendum eſſet. Quinque ſunt potiſſimum, modi, pergit ille, quos referre non pigebit. Unus eſt, qui vulgo pellarola vocatur, vel deſtium pilorum, qui modus homines ridiculos reddit, cum capilli deciderint, barba, cilia, ſupercilia & palpebrarum pili; nullus enim eſt qui cum hoc videat ita depilatos, non rideat. Alius modus eſt, qui vulgo dicitur dentarola, quoniam dentes patienti decidunt. Tertius modus eſt unguium caſus, qui plerumque deſtium pilorum ſequitur.... vulgus hunc modum vocas unguiariola. Quartus modus, in qua homines oculos amiſſunt, & occhiarolam vulgo nuncupant.... Quintus modus eſt gonorrhœa.*

Sic omnium diſertiffime Fallopius *cap. 23. Tract. de Morbo Gallico*, quem

quem circa annum 1560. aut 1561. scriptum esse liquet ex capitibus 7. & 23. *Primis illis diebus, inquit, per spatium 40. annorum (hoc est ante annum 1533.) non erat defluuium pilorum, agitur jam trigessimus annus, quo hoc defluuium incipit. . . .* Et paulo infra, *jam est transactus quadragesimus annus, quo non radimur ob visuperium nostrum: Antea non erat defluuium pilorum & radebamur. Hispani inducere tyrannidem in Italiam, Gallicum & barba longa usum.*

3. Neque minus indubia est tum gonorrhœæ venereæ accessio, tum accessionis epocha. Testatur enim *ibidem* idem Fallopius anno 1560. aut 1561. scribens, *non esse quidem annos, quibus observata est gonorrhœa Gallica. Ex quo colligimus, pergit idem, variam esse naturam morbi & possumus expectare nova symptomata.* Inde liquet ergo calculo subducto gonorrhœam veneream circa annos 1545. aut 1546. primum observatam fuisse. Certe Brasavolus primus fuit omnium, quos sciam, qui in Tractatu anno 1553. typis edito Venetiis, gonorrhœam inter cætera luis venereæ symptomata retulerit, sed quem Fernelius locis supra laudatis brevi temporis intervallo secutus fuisse videtur.

4. Demum luculento Fallopii testimonio, *ubi supra* novitas symptomatis, quod luis venereæ quinta periodo accessit, tinnitus nempe aurium, abunde confirmatur. Refert enim ipsissimis verbis *ultra 10. annos se nunquam audivisse ab aliquo mentionem factam de hoc tinnitu, quem ipse primus observavit jam ab octo annis, (hoc est circiter anno 1552.)*

Post ultimam modo recensitarum periodorum omnia in melius semper abiere in hunc usque diem, sed progressu tardiore & magis gradario.

1. Nulla symptomata accesserunt de novo a Fallopii tempore: Neque enim nova dicenda censeo vel phimosim, quam accuratissime describere ipse Fallopius *Tractatu de Morbo Gallico, cap. 83. 84. & 85.* & Alexander Trajanus Petronius *De Morbo Gallico, Lib. 7. cap. 2. & 3.* vel stranguriam gonorrhœæ pedissequam, de qua idem Petronius, *ibidem cap. 13.*

2. Ex symptomatis, quæ olim sæviebant, quædam prius evanuerunt, ut prolapsus oculorum, dentium, unguium, &c. quæ jam dudum a nemine coniungit ut observentur.

3. Symptomata cætera pleraque jam rariora sunt & remissiora, ut gummata steatomatosa, vel atheromatosa; alopeciz; pustulæ crustosæ; caries ossium; ulcera maligna palati, columellæ, faucium, narium & dolores nocturni, &c.

4. In summa supersunt quatuor tantum symptomata, quibus tota lues videtur nunc comprehendi, nempe gonorrhœa, bubo, ulcuscula cancrosa penis, & porri seu verrucæ, cum quibus solis lues constanter incipit, cum quibus solis solet non raro terminari.

5. Imo vero morbus in sola gonorrhœa ut plurimum consistit, nec cætera

cetera ulla symptomata plerumque accidunt, nisi negligent gonorrhœæ curatio.

6. Demum gonorrhœa ipsa jam curatu facilior est, ac sæpe sine remediis sponte sanatur, modo dicta servetur conveniens: Cætera quonque tria symptomata, etsi operosiore methodo opus habeant, jam multo remissiora sunt.

CAPUT XII.

De periodis, quas præagere licet luem veneream in posterum habituram esse.

MORBI novi & in Europam aliunde advecti, cum aimalibus alienigenis aut plantis exoticis videntur jure merito conferri posse, ut supra indicatum fuit, *cap. 11.* Ut enim animalium, quæ a ienigenæ sunt, alia in Europa commode vivunt & generatione multiplicantur, ut bombyces a Sinarum Imperio oriundi, aut Gallinæ indicæ ab Indiis Occidentalibus delatæ: Alia vero brevi intereunt vel cito degenerant; Ut plantarum aut arborum, quæ sunt exoticæ, aliæ læte fruticant vigintque in Europa, ut hippocastanum, vulgo *Maronnier d'Inde* ex India, aut *Acaria* ex Ægypto devecta aliæ vero celeriter pereunt aut mutata natura degeneres fiunt; sic quoque morborum, qui novi sunt & in Europam aliunde advecti, alii sunt, qui ab ingressu iidem constanter permanent, eadem sæviunt vehementia, ideoque perennes futuri videntur, ut variolæ & morbilli, quos ab Arabibus jam a mille annis acceptos habemus: Alii vero sunt, qui a priore ferocia paulo post degeneres tandem sensim eveniunt, ut lepra, quæ in Europam bis inducta, ut supra vidimus *cap. 3.* bis in eadem sponte cessavit.

Itaque dum in futuras luis venereæ periodos inquiritur, id unum versatur in quæstione, quibusnam aliehigenarum animalium, aut plantarum exoticarum comparanda sit, utrum scilicet cum animalibus & plantis quibudam Europæ climati ita assuecat, ut apud nos propria & perennis fieri videatur, quemadmodum de variolis futurum esse conjicimus? An vero cum animalibus aut plantis aliis, adveria aeris temperie aut corporum quibus insidet constitutione fracta jam ita langueat, ut sensim ad interitum vergat tandem aliquando futurum, ut lepræ jam contigisse notum est.

Sane tam difficilis nodus expediri non potest nec conjecturis inanibus & cæca quasi divinatione, ut dum Fernelius *Lib. 2. de abditiis verum causis*, *cap. 14.* Hieronymus Reusnerus, *Lib. de Scorbuto*, Carolus Musitanus, *Tractat. de Morbo Venereo*, *Lib. 1. cap. 6.* temere prælagiunt luem veneream in perpetuum duraturam esse; nec futilibus Astrologiæ placitis

Morborum qui novi sunt & in Europam aliunde advecti, alios constanter permanentes, sensim evanescentes alios.

Proinde ad alterutram classificationem luem veneream pertinere.

Adquam tamen pertineat temere non esse pronuntiandum.

vis, quæ non sunt divinatione minus fallacia, ut cum Petrus Maynardus *cap. 3. Tract. de Morbo Gallico* anno 1518. editi falso olim tradidit hunc morbum anno 1584. cessaturum esse; sed augurio quod de futuris morbi periodis ex periodis jam præteritis ducatur, & quo nihil certius esse posse credimus in quæstione præsentis. Profecto si lues veneræ jam a 240. annis, a quibus in Europam introductam fuisse probavimus, sensim in dies mitescere visa sit, & si ætate nostra in dies magis ac magis mitescat, haud inanis spes inde affulgere videtur, fore ut progressu simili in posterum decrescens ad interitum tandem aliquando perveniat.

Vidimus quidem supra in *precedenti capite* testimonia multa, unde liquet primigenia luis veneræ symptomata, quæ initio sævissima erant, sensim in leniora mutata fuisse intra primos sexaginta annos. Videbimus modo *præsenti capite* testimonia alia, quibus evidens erit secundaria luis ejusdem symptomata, quæ prioribus successerunt, etsi a 180. annis eadem fere naturam retineant, attamen ipsa quoque non eadem ac olim vehementia nunc sævire. Proinde cum utroque probationum genere perinde manifestum sit veneream luem, aut mutata in melius primitivorum symptomatum natura, aut imminuta præsentium intensio, de pristina ferocia multum remississe, videmur jure merito assentiri posse sequentibus Medicis, eruditione & fama celeberrimis, qui a 200. annis, quasi successiva traditionis catena futurum luis veneræ interitum non speraverunt modo, imo etiam, ut ea quæ placent citius expectare commune est, multo promptiorem speraverunt, quam tarda morbi declinatio aut præsens ejusdem status pollicerentur.

I. Hieronymus Fracastorius, postquam fufe exposuit *cap. 11. Libro 2. de Morbis contagiosis*, mutationes, quæ jam suo tempore symptomatis plenisque luis veneræ acciderant, & quas supra indicavimus *precedente capite*, concludit inde *cap. 12. existimandum esse senium jam hujus morbi incipisse, nec longe post futurum ut ne per contagem quidem se propaget, quoniam materia in dies frigidior sit & terrestrior, in qua & seminaria tum pauciora, tum & debiliora in dies gignuntur. Quam eandem conjecturam jam ante ipse expresserat sequentibus versibus in Lib. 1. Syphilidis editæ ann. 1530.*

*Namque iterant cum fata dabunt labentibus annis;
Tempus erit, cum nocte atra sopita jacebit
Interitu data.*

Hac methodo multis jam prius videri lucem veneream ad interitum sensim tendere.

1546.

II. Antonius Musa Bratsavolus ex mutationibus luis veneræ, quas ipse etiam sedulo annotavit, collegit pari ratione in *Taßtu de Radicis Chine usu, Morbum Gallicum esse in declinatione universalis, nam, inquit, remitti capit, & adeo remittetur, ut penitus abeat, neque amplius aliquem vexabit.*

1552.

F

bit.

tiæ gradum adipiscatur, 2. Si diligens * munditiæ studium adhibeatur; ut nunc moris est, saltem in Galliis, iteratiliq; lotionibus extergantur frequenter pudenda, ne humoris acrioris aut virulenti mora conspiciantur.

Gravis
obiectio
adversus
illam opi-
nionem
proponi-
tur & di-
luitur.

Non dissimulanda tamen obiectio, qua conjecturæ nostræ premi videntur: Scilicet scintillas e focis variis, quos in Zona Torrida admittimus, debere interdum ad nos agi, quibus incendium jam fere sopitum in Europa denuo exfuscitur, vel potius, ut sine metaphora dicam, e variis Zonæ Torridæ regionibus, ubi lues venerea endemia viget, frequentia veneni effluvia in Europam commercio debere traduci, quæ remittentem morbum renovatura sint.

Sed hanc argumentationem multa diluunt, 1. E regionibus istiusmodi alias, quæ omnium notissimæ erant & unde morbus ad nos olim deventus est, jam dudum vastatas & incolis exhaustas esse; atque adeo nihil inde ad nos apportari jam amplius posse; quod convenit Insulæ *Haiti* seu *Hispaniola*, cæterisque continentis Americæ regionibus calidioribus, quarum indigenæ ab Hispanis jam pridem interneccione deleti sunt.

2. Cum nonnullis aliis harumce regionum ita rara nobis intercedere commercia, si qua porro intercedant, ut vix ulla morboſa seminia possunt hinc traduci, quod potissimum verum est de interioribus Africæ Provinciis, adeoque de Regnis *Tombouctou* & *Meli*, ubi luem veneream antiquitus vigere creditur.

3. Imo virus raro concipi in cæteris regionibus hujusmodi, in illis etiam cum quibus frequentior est societatis usus & major consuetudo, ut sunt Indiarum Orientalium oræ & omnes Insulæ per mare Indicum sparsæ, quoniam postquam semel innotuit exemplo luis venereæ, quæ in Europa grassatur, venenum concubitu posse contrahi, solent vel perditissimi attentius sibi cavere ab imprudente & vesano usu veneris cum mulieribus barbaris.

4. Quod si vero contigerit aliquando quempiam illic contagio primigenio contaminari, ut interdum fieri inficias ire nolim, efficacis remedium auxilio celeriter sibi prospicere, atque adeo sic abrumpi protinus successivam contagionis catenam, quæ posset alioquin novas tragedias forsan excitare, Et sane quidem, licet Europæi jam a ducentis annis fere omnes Asiæ oras & Insulas sedulo lustraverint, ac inde forsan venenum venereum de novo non semel hauerint, constat tamen experientia luem

venere-

* *Friedericus Hollmannus, Dissertat. Physico-Medicarum* 3. asserit luem veneream Constantinopoli non grassari, additque ideo non grassari, quod semine munditiei op. pr. ne studiosa post opus aquam sumant, & locos diligenter coluant. Sed videtur ille in errore versari gemino; tum facti, tum juris: Facti, aiendo luem veneream Constantinopoli nullam observari; juris, lotionum utilitate nimium exaggerando.

veneream pari passu per idem tempus in dies mitigatam esse, unde si frequens cum Asiaticis consuetudo, si acceptum identidem ab illis venenum haftenus non obstiterint ne lues sensim in dies remitteretur, consequens esse videtur fore, ut in posterum causæ eædem haud efficacius valeant obstaré, cur eadem lues magis ac magis extenuata aliquando tandem penitus non evanescat.

CAPUT XIV.

De legibus olim sancitis in eos, qui lue venerea laborant.

CREDEBATUR lues venerea, cum primum in Europa apparuit, pestis instar ab infectis in sanos contagione in distans serpere alloquio, convictu, usu vitæ communis, &c. ægri scilicet verum contagionis modum initio vel ignorantibus vel dissimulantibus. Inde fluxere leges illæ, quæ in infectos olim latæ sunt in Galliis, & quibus incolumitati publicæ ea diligentia providebatur, quam videbatur præjudicii ratio postulare.

Sic existat in Actis Senatus Parisiensis, *Registre du Conseil, commence le mois de Novembre 1496. finissant au mois d'Octobre 1497. cote N. XL. Fol. 74. verso.* Decretum datum non die 4. Martii, ut refert Fontanonus, *Edictis, & Ordonnances des Rois de France, Titre 28.* sed die 6. Martii anni 1496. quo lue venerea infectis pœna capitali interdictum erat commercio cum sanis, sanctumque ut in suburbium Sancti Germani secederent, in loca destinata segregandi. Placet ipsissima Decreti (a) verba Gallica exscribere, ne quid vertendo immutasse videar.

Olim creditum fuit luem veneream contagione in distans serpente more pestis.

Ab hoc præjudicio ortæ sunt Leges latæ in infectos lue venerea.

Arresté du Parlement de Paris, portant Reglement sur le fait des Malades de la Grosse Vérole.

Decretum Senatus Parisiensis de disciplina erga infectos magna variola observanda.

Aujourd'hui sixiesme Mars, pource que en ceste ville de Paris y avoit plusieurs malades de certaine maladie contagieuse, nommée (a) la Grosse Vérole, qui pui deux ans en ça a eu grant cours en ce Roiaume, tant

Hac die (6. Martii) cum in hac urbe Lutetia ægri adfint plurimi, morbo quodam affecti, qui *Magna* seu *crassa Variola* appellatur, & qui duobus abhinc annis in hoc Regno plurimum gralsatus est, tum in hac

Decreto illo celebri, quod a Senatu Parisiensi datum est die 6. Martii anni 1496.

F 3 de

[a] Decretum idem a Domino Alexio Lobineau, Monacho Benedictino, ex scriptum fuit. *Histoire de la Ville de Paris, Tome IV. pag. 613.*

[b] Gaspar Torella, qui aliquandiu in Gallica commoratus fuit, asserit in *Dialogo de Doloze in pudenda-gra*, quem Blesis scripsit anno 1469. *pudenda-gra Parisiis & in alijs magnis civitatibus Francie a literatis Grossam Variolam appellari.*

„ tantes doloribus clamosis vexabantur, præsertim tempore noctis & se-
 „ dabantur in die cujus doloris finis fere semper fuit os & almo-
 „ chatin corrumpere, & vitiare, quemadmodum in ventositate spinæ
 „ accidit.

Posterior vero fuere verrucæ & porri circa genitalia progerminan-
 tes, de quibus sequentia legimus apud Petrum Maynardum, *Tracta-
 tu de Morbo Gallico, cap. 4.* quem circa idem tempus scriptum fuisse
 haud inanis est conjectura, „ Propterea, inquit, dicimus quod signum
 „ potissimum hujus morbi Gallici, ut experientia vidimus, sunt pu-
 „ stulæ apparentes in extremitate mentulæ in viris, & in ore vulvæ
 „ in mulieribus sive in collo matricis, & pruritus in partibus semi-
 „ nis. Quæ pustulæ ut plurimum ulcerantur. Et ut plurimum dico,
 „ quia nonnullos vidi habentes has pustulas induratas, ut sunt verru-
 „ cæ, clavi, & porri.

Tertiam
 ab anno
 1526, ad
 annum
 1540. per
 quam
 morbo
 quod ad
 cætera
 mitescen-
 ti, super
 venere de
 novobu-
 bo in in-
 guine &
 alopecia.

III. Tertia periodus, ab anno 1526. ad annum 1540. lucem veneream
 jam mitescere incipientem prima vidit, teste Hieronymo Fracastorio, qui
 in Opere de Morbis contagiosis anno 1549. Venetiis edito *Lib. 1. cap.*
11. refert: tametsi nunc quoque immutatam videri: ab inde enim annis fere vi-
ginti capisse pauciores videri pustulas, gummositates vero plures, cum e con-
trario primis annis fuisset: Factas item fuisse pustulas (si quæ apparebant) sic-
ciores, ac dolores (si qui accidebant) esse acerbiores.

Sed eadem periodus accessu duorum novorum symptomatum infama-
 ta fuit, phymatis scilicet aut pani in glandulis inguinalibus, quem *bubo-*
nem dixere, & alopeciz seu capillorum defluvi.

De priore quidem audiendus est Nicolaus Massa qui ad annum 1534.
 scribebat, *Libro 1. de Morbo Gallico cap. 7.* Aliquando, inquit, est febri-
 cula, & sepiissime apparent ulcera virgæ, quæ sunt mala cum duritie callosa
 quæ tarde sanantur; & pustule fiunt circa peccinam Et sequuntur aposte-
 mata inguinum, quæ si suppurantur remouent egritudinem, maxime a prin-
 cipio.

Similia expresso bubonis nomine narrat Alysius Lobera, qui Medi-
 cus Imperatoris Caroli V. floruit circa annum 1540. Interdum, inquit,
Tractatu de Morbo Gallico, cap. 2. in virga nonnulla ulcera cum duritie &
callositate, quæ sanari exacte nequeunt, perpetitur. quod morbi Gallici certum
signum est, maxime vero cum in inguine præcesserit apostema, quod bubonem
dicunt.

Videtur & ipse Paracelsus de bubone venereo mentionem fecisse circa
 annum 1536. in *Chirurgia magna, Part. 4. Lib. 3. cap. 9.*

Sed expressius Antonius Gallus, *cap. 1. Opusculi de ligno sancto non per-*
miscendo, Lutetiz editi anno 1540. Jam vero adlito affricatoque ad pedem
 malo

malo nonnumquam usu venit, ut virulenta colluvies ad inguina vomica durior erumpat imagine, quæ glandia, quas adstrax vocant, obsidione velut ambia & circumvallet: hæc si suppurat, frequenter bono est.... Hoc morbi genus cancrasum vocant bubonem, alii pulinum, dicaci etiamnum seommate notantes velut equuleo insidentes, quando divaricatis incedunt cruscus qui eo malo implicantur.

De posteriore vero consulendus Fracastorius, qui in *Opere de Morbis contagiosis* Venetiis edito anno 1546. & quod proinde paulo ante confectum fuisse credere est, *Lib. 2. cap. 11.* hæc habet. Porro & annis labentibus annis jam fere sex, (hoc est anno circiter 1534. aut 1535.) in quibus nunc sumus, magna rursus mutatio facta est ejus morbi; quippe cum in valde paucis pustula jam visantur, & dolores fere nulli sicut multo leviores, gummositates vero multe; & quod mirum omnibus visum est, capillorum & reliquorum pilorum casus homines fere ridiculos facit, aliis sine barba, aliis sine superciliis, aliis glabro capite in conspectum venientibus; quod infortunium prius putabatur ex medicaminibus evenire, præsertim ex argento vivo; mox certiores facti omnes sciunt ex ipso morbo immutato procedere; quin imo (& quod pejus est) jam nunc multis videntur labefactari dentes, quibusdam etiam cadere.

VI. Quarta periodo ab anno 1540. ad annum 1550. hinc quidem in dies temperari visa sunt pleraque symptomata, quæ a morbi exortu affligebant, ut pustulæ, gummata, dolores, partium erosiones, &c. illinc vero simul accessit novum symptoma, cæterorum mitigationem compensaturum, quod nondum observatum fuerat, quod abhinc in incipiente lue venerea frequentissimum fuit, si non perpetuum, gonorrhæam dico virulentam, de qua * primi mentionem fecere Bralsavolus *Lib. de Morbo Gallico*, quem anno 1551. confectum publici juris fecit anno 1553. Fernellius anno 1556. *Lib. 2. de abditis rerum causis, cap. 14.* & *Lib. 6. de partium morbis & symptomatis, cap. 20.* & Fallopius, *cap. 23. Tractatus de Morbo Gallico*, quem circa annum 1560. aut 1561. scriptum fuisse conjicimus.

V. Quinta periodo, quæ anno 1562. terminatur, novum lue ejusdem symptoma a Fallopio observatum legimus, *Tractatus ejusdem cap. 23.* Tinnitum scilicet aurium. *Ultra decem annos*, inquit, numquam audiivi ab aliquo mentionem factam de hoc Tinnitu: ego primus observavi, jam octavus agitur annus: rari sunt qui hujusmodi tinnitum non habeant in valde confirmato Gallico. Observetis, pergit ille diligentissime hoc, cum scriptum non repertis ab aliis. Hic tinnitus solet ob alia suboriri, sed etiam fit ex Gallico.

VI. Demum debet & sexta periodus circa annum 1676. præcedentibus

Quantam
ab anno
1540. ad
annum
1550. per
quam re-
mittenti
morbo
novum
tamen
accessit
(sympto-
ma, nem-
pe gon-
orrhœa.
Quantam
ab anno
1550. ad
1562. per
quam
tinnitus
aurium
primum
observa-
tus dici-
tur.

* Vide infra lib. 5. capita, ubi de Jacobi a Berhencourt, & Theoph. Paracelso. Hic enim videtur gonorrhæam veneream descripsisse circa annum 1536. Ille vero ante annum 1527. eandem certissime descripsit.

tibus forsan addi, in qua primum apparuerint limphaticæ sive crystallinæ vesiculæ in genitalibus. Sane non memini de illo symptomate mentionem ullam fieri a Scriptoribus, qui hoc anno antiquiores sint: Narratque præterea Carolus Musitanus, *Tract. de Morbis Veneris, Lib. 3. cap. 10.* crystallinas in Italia frequentes non fuisse, nisi postquam classis Hispana ad Neapolim appulit defectionis Messanenensis tempore, atque adeo post annum 1675.

Harumce
periodo-
rum di-
serimina
magnis
Auctori-
bus aiti.

Videbor forsan gradarias luis venereæ accessiones verbis exaggerare, & leviora quædam symptomata ignoratione vel iacogitantia omiisa pro novis venditando morbi periodos nimis amplificare. Sane nec ipse, ut ingenue dicam, ab eadem suspicione multum alienus sim, saltem de secunda periodo, in qua exostoses & verrucas porrosque primum observata fuisse dixi, quippe ea symptomata in morbi nondum satis noti descriptione vel omitti potuere, vel nomine gummatum & pustularum comprehendi.

At vero idem iudicium nulla ratione proferre licet 1. De bubone venereo, qui tertia tantum periodo prodiit; neque enim credere est Medicos, qui ante annum 1538. de lue venerea scripsere, omnes ad unum tam olicitantes fuisse, ut alte silere potuerint de bubone, tam insigni scilicet luis venereæ symptomate, de quo Medici eodem anno posteriores ad unum omnes tam copiose disserunt, si bubo jam ante annum 1533. observatus fuisset.

2. Saltem nulla potest subesse suspicio circa alopeciam, de cujus novitate constat idoneis & oculatis testibus.

Sic Fracastorius *Lib. 2. cap. 1. Operis de Morbis contagiosis*, quod circa annum 1540. confectum esse dicimus, diserte refert *jam a sex annis*, (hoc est anno ipso 1534.) *capillorum & pilorum omnium defluvium accidisse, imo quibusdam labefactorum dentium casum.*

Sic Brassavolus in Libro de Morbo Gallico, qui Venetiis anno 1553. editus est, asserit *jam a viginti annis citra hoc est jam ab anno 1533.) alias quasdam species ortum habuisse, quæ an declinantiem morbum sequantur, an aliquo modo immutatum sit genus ambigendum esset. Quinque sunt potissimum, modi, pergit ille, quos referre non pigebit. Unus est, qui vulgo pellarola vocatur, vel defluvium pilorum; qui modus homines ridiculos reddit, cum capilli deciderint, barba, cilia, supercilia & palpebrarum pili; nullus enim est qui cum hoc videat ita depilatos, non rideat. Alius modus est, qui vulgo dicitur dentarola, quoniam dentes patienti decidunt. Tertius modus est unguium casus, qui plerumque defluvium pilorum sequitur.... vulgus hunc modum vocat ungiariola. Quartus modus est gonorrhœa. Quintus modus est gonorrhœa.*

Sic omnium disertissime Fallopius *cap. 23. Tract. de Morbo Gallico*, quem

quem circa annum 1560. aut 1561. scriptum esse liquet ex capitibus 7. & 23. *Primis illis diebus, inquit, per spatium 40. annorum (hoc est ante annum 1533.) non erat defluuium pilorum, agitur jam trigessimus annus, quo hoc defluuium incipit. . . .* Et paulo infra, *jam est transactus quadragesimus annus, quo non radimur ob vituperium nostrum: Antea non erat defluuium pilorum & radebamur. Hispani inducere tyrannidem in Italiam, Gallicum & barba longa usum.*

3. Neque minus indubia est tum gonorrhœæ veneræ accessio, tum accessionis epocha. Testatur enim *ibidem* idem Fallopius anno 1560. aut 1561. scribens, *non esse quidem annos, quibus observata est gonorrhœa Gallica. Ex quo colligimus, pergit idem, variam esse naturam morbi & possumus expectare nova symptomata.* Inde liquet ergo calculo subducto gonorrhœam veneræ circa annos 1545. aut 1546. primum observatam fuisse. Certe Brasavolus primus fuit omnium, quos sciam, qui in Tractatu anno 1553. typis edito Venetiis, gonorrhœam inter cætera lues veneræ symptomata retulerit, sed quem Fernellius locis supra laudatis brevi temporis intervallo secus fuisse videtur.

4. Demum luculento Fallopii testimonio, *ubi supra* novitas symptomatis, quod lues veneræ quinta periodo accessit, tinnitus nempe aurium, abunde confirmatur. Refert enim ipsissimis verbis *ultra 10. annos se numquam audivisse ab aliquo mentionem factam de hoc tinnitu*, quem ipse primus observavit jam ab octo annis, (hoc est circiter anno 1552.)

Post ultimam modo recensitarum periodorum omnia in melius semper abiere in hunc usque diem, sed progressu tardiore & magis gradario.

1. Nulla symptomata accesserunt de novo a Fallopii tempore: Neque enim nova dicenda censeo vel phimosim, quam accuratissime descripsit ipse Fallopius *Tractatu de Morbo Gallico, cap. 83. 84. & 85.* & Alexander Trajanus Petronius *De Morbo Gallico, Lib. 7. cap. 2. & 3.* vel stranguriam gonorrhœæ pedisequam, de qua idem Petronius, *ibidem cap. 13.*

2. Ex symptomatis, quæ olim sæviebant, quædam prius evanuerunt; ut prolapsus oculorum, dentium, unguium, &c. quæ jam dudum a nemine contingit ut observentur.

3. Symptomata cætera pleraque jam rariora sunt & remissiora, ut gummata steatomatosa, vel atheromatosa; alopeciz; pustulæ crustosæ; caries ossium; ulcera maligna palati, columellæ, faucium, narium & dolores nocturni, &c.

4. In summa supersunt quatuor tantum symptomata, quibus tota lues videtur nunc comprehendi, nempe gonorrhœa, bubo, ulcuscula cancrosa penis, & porri seu verrucæ, cum quibus solis lues constanter incipit, cum quibus solis solet non raro terminari.

5. Imo vero morbus in sola gonorrhœa ut plurimum consistit, nec cætera

cetera ulla symptomata plerumque accidunt, nisi negligent gonorrhœæ curatio.

6. Demum gonorrhœa ipsa jam curatu facilior est, ac sæpe sine remediis sponte sanatur, modo dicta servetur conveniens: Cetera quoque tria symptomata, etsi operosiore methodo opus habeant, jam multo remissiora sunt.

CAPUT XII.

De periodis, quas præagere licet luem veneream in posterum habituram esse.

MORBI novi & in Europam aliunde advecti, cum animalibus alienigenis aut plantis exoticis videntur jure merito conferri posse, ut supra indicatum fuit, *cap. 11*. Utenim animalium, quæ a iugis sunt, alia in Europa commode vivunt & generatione multiplicantur, ut bombyces a Sinarum Imperio oriundi, aut Gallinæ indicæ ab Indiis Occidentalibus delatæ: Alia vero brevi intereunt vel cito degenerant; Ut plantarum aut arborum, quæ sunt exoticæ, aliæ læte fruticant vigintque in Europa, ut hippocastanum, vulgo *Murennier d'Inde* ex India, aut Acaçia ex Ægypto devecçta aliæ vero celeriter pereunt aut mutata natura degeneres fiunt; sic quoque morborum, qui novi sunt & in Europam aliunde advecti, alii sunt, qui ab ingressu iidem constanter permanent, eadem sæviunt vehementia, ideoque perennes futuri videntur, ut variolæ & morbilli, quos ab Arabibus jam a mille annis acceptos habemus: Alii vero sunt, qui a priore ferocia paulo post degeneres tandem sensim evenerunt, ut lepra, quæ in Europam bis inducta, ut supra vidimus *cap. 3*. bis in eadem sponte cessavit.

Itaque dum in futuras luis venereæ periodos inquiritur, id unum versatur in quæstione, quibusnam alienigenarum animalium, aut plantarum exoticarum comparanda sit, utrum scilicet cum animalibus & plantis quibuldam Europæ climati ita assuecat, ut apud nos propria & perennis fieri videatur, quemadmodum de variolis futurum esse conjicimus? An vero cum animalibus aut plantis aliis, adverte aeris temperie aut corporum quibus insidet constitutione fracta jam ita langueat, ut sensim ad interitum vergat tandem aliquando futurum, ut lepræ jam contigisse notum est.

Sane tam difficilis nodus expediri non potest nec conjecturis inanibus & cæca quasi divinatione, ut dum Fernelius *Lib. 2. de æditis rerum causis*, *cap. 14*. Hieronymus Retulnerus, *Lib. de Sæributo*, Carolus Mustanus, *Tractat. de Morbo Venereo*, *Lib. 1. cap. 6*. temere prælagiunt luem veneream in perpetuum duraturam esse; nec futilibus Astrologiæ placitis

Morbos qui novi sunt & in Europam aliunde advecti, alios constanter permanentes, sensim evanescentes alios.

Proinde ad alteram classem luem veneream pertinente.

Adquam tamen pertineat temere non esse pronuntiandum.

vis, quæ non sunt divinatione minus fallacia, ut cum Petrus Maynardus *cap. 3. Tract. de Morbo Gallico* anno 1518. editi falso olim tradidit hunc morbum anno 1584. cessaturum esse; sed augurio quod de futuris morbi periodis ex periodis jam præteritis ducatur, & quo nihil certius esse posse credimus in quæstione præsentis. Profecto si lues venerea jam a 240. annis, a quibus in Europam introductam fuisse probavimus, sensim in dies mitescere visa sit, & si ætate nostra in dies magis ac magis mitescat, haud inanis spes inde affulgere videretur, fore ut progressu simili in posterum decrescens ad interitum tandem aliquando perveniat.

Vidimus quidem supra in *præcedenti capite* testimonia multa, unde liqueat primigenia luis venereæ symptomata, quæ initio sævissima erant, sensim in leniora mutata fuisse intra primos sexaginta annos. Videbimus modo *præsentis capite* testimonia alia, quibus evidens erit secundaria luis ejusdem symptomata, quæ prioribus successerunt, etsi a 180. annis eadem fere naturam retineant, attamen ipsa quoque non eadem ac olim vehementia nunc sævire. Proinde cum utroque probationum genere perinde manifestum sit veneream lucem, aut mutata in melius primitivorum symptomatum natura, aut imminuta præsentium intensio, de pristina ferocia multum remisisse, videmur jure merito assentiri posse sequentibus Medicis, eruditione & fama celeberrimis, qui a 200. annis, quasi successiva traditionis catena futurum luis venereæ interitum non speraverunt modo, imo etiam, ut ea quæ placent citius expectare commune est, multo promptiorem speraverunt, quam tarda morbi declinatio aut præsens ejusdem status pollicerentur.

I. Hieronymus Fracastorius, postquam fuse exposuit *cap. 11. Libro 2. de Morbis contagiosis*, mutationes, quæ jam suo tempore symptomatis plenique luis venereæ acciderant, & quas supra indicavimus *præcedente capite*, concludit inde *cap. 12. existimandum esse senium jam hujus morbi incæpisse, nec longe post futurum ut ne per contagem quidem se propaget, quoniam materia in dies frigidior fit & terrestrior, in qua & seminaria tum pauciora, tum & debiliora in dies gignuntur. Quam eandem conjecturam jam ante ipse expresserat sequentibus versibus in Lib. 1. Syphilidis editæ ann. 1530.*

Namque iteram cum fata dabunt labentibus annis;
Tempus erit, cum nocte atra sopita jacebit
Interitu data.

Hac methodo multis jam pridem videri lucem veneream ad interitum sensim tendere.

1546.

II. Antonius Musa Bratsavolus ex mutationibus luis venereæ, quas ipse etiam sedulo annotavit, collegit pari ratione in *Taßatu de Radicis Cbine usu, Morbum Gallicum esse in declinatione univervali, nam, inquit, remitti capit, & adeo remittetur, ut penitus abeat, neque amplius aliquem vexabit.*

1552.

bit. Satis enim, pergit ille, per octuaginta fere annos vagatus est; hoc nimirum modo morbi omnes novi & qui nonnullis solum temporibus visi sunt, deinceps diliterunt & aboliti sunt.

1560. III. Gabriel Fallopius, *Tractatus de Morbo Gallico*, cap. 3. asserit hunc morbum suo tempore *ita mitem*, *ita familiarem effectum esse*, ut... *ex toto & maxima cum facilitate superetur*.

1564. Levinus Lemnius, *De occultis naturæ miraculis*, Lib. 2. capite 14. dicit *Morbum Gallicum sua ætate mitiorem esse, quam olim*, cum enim superioribus annis intolerandis modis homines excarnificaret, jam capisse mitemscere minusque infestum esse.

1564. IV. Bernardinus Tomitanus, *Lib. 2. de Morbo Gallico*, cap. 2. post expositas luis venereæ mutationes sic concludit: *Morbum Gallicum jam ad exitum senium pervenisse, hoc est ad occasum & declinationem tendere*, propterea que celerrime brevi que tempore fore ut non amplius per contactum venereosque complexus propagationem suscipiat, paucisque interpolitis ait ex mitigata morbi natura & placatis symptomatis se pro certo asserere posse eum jam proximum esse terminationi.

1566. V. Alexander Trajanus Petronius, *Lib. 3. de Morbo Gallico*, cap. 1. fatetur minui id malum & reddi mitius victu, loco, aereque mutatis, proportionem præsertim ad *Indiam Occidentalem*, unde primum ad nos penetravit, habita.

1577. VI. Laurentius Joubertus, in *Libro variola magna sive crassa*, cap. 3. asserit luem illam finem aliquando esse habituram..... cum per varia corpora transitu facto exoticus affectus jam multo mitior evaserit, ut tandem inclinans & consenscens simplicis scabiei. . . . speciem sit adepturus: quæ eadem verbis totidem jam ante dixerat, *De Erroribus popularibus*, Lib. 2. cap. 12.

1600. VII. Joannes Varandæus, *De Morbis hepatis*, cap. 2. de lue venerea; testatur morbi ferocitatem exolescere nunc & quasi minui, quia longius distat a primo seminario seu infectionis principio, & quia causæ disponentes vel concurrentes minus sunt dispositæ ad illum fovendum.

1680. VIII. Thomas Sydenhamius, *Epistola responsoria de lue venerea*, docet morbum, vegetabilius inslar, in alienum a patrio solum quasi transplantatum, Europæ nostro non perinde letari, sed languere in dies & mitioribus phenomenis satisfacere. Novus apud nos hospes cum esset, pergit ille, si quem arrisuerat, mox omnem sanguinis massam contaminabat; & divris capitis atque artuum doloribus, etiam ulceribus variis in partibus se prodebat. At vera centum retro annis gonorrhææ virulente specie se primum ostendebat, ostendisque adhuc, hac sibi porta exitum querens.

1711. IX. Joannes Devaux, Chirurgus Parisiensis, qui *Tractatum Caroli Mufitani de Morbo venereo e Latino Gallicum* fecit, ac typis edendum

curavit Trivultii anno 1711. in adnotatis ad *caput. 6. lib. 1.* observat symptomata luis venereæ in dies Lutetiæ mitiora esse a 30. vel 40. annis; gonorrhœas nempe minus dolorificas; ulcuscula cancrofa minus sæva aut erodentia; bubones resolutioni aut suppurationi magis comparatos esse; dolores venereos, tum vagos, tum fixos, minus cruciare; uno verbo morbum ita remissum jam videri, ut sperare liceat Medicinæ ope tandem aliquando superatum iri.

X. Demum ipse quoque, ut & meum proferam testimonium, iterata & attenta observatione compertum dudum habeo luem veneream sensim in dies mitigari; & quamvis, ut est præsentis ætatis in libidinem intemperantia, haud rarius, imo contra frequentius forsitan etiamnum grassetur, debilius tamen jam pridem sævire; tam multa, tam horrenda, curatu tam difficilia symptomata non inferre; remediis, si caute adhibeantur, minus pertinaciter reluctari; uno verbo vetustate pedetentim exolescere.

Ex hac ergo testium caterva, qui licet diversis temporibus & locis vixerint, in idem tamen omnes uno ore conspirant, liquet luem veneream ad interitum gradarie tendere, licet forsitan adhuc pede claudo. Neque sane mirum morbum peregrinum & alienigenam, in Europa præter naturam insititum paulatim senescere, ac tandem aliquando extingui. Spem ratam facere potest exemplum simile læpræ Arabum, quæ & ipsa apud nos hospes & bis in Europam olim traducta, bis in eadem sensim desinit pari de causa, etsi fuisset inter initia æque dira & æque vulgata.

Cæterum licet morbi interitum certi præfagiamus, de tempore interitus nihil definimus, quod caliginosa nocte premit Deus. Cito quidem lues celsatura foret, si Torellæ consilium in *Dialogo de dolore in pudenda dagra*; quod ab Eustachio Rudio in *Opere de Morbo Gallico* renovatum legimus, posset adhiberi: Fœminas scilicet virosque omnes, quotquot lue venerea inficerentur, remediis simul subijcere, ut sublato omni morbi feminio morbus radicitus extirparetur. Sed hæc ad Utopiam ableganda.

Satis est morbum ad occasum sponte vergere, multis de causis, 1. Quibus de Quibus de causis spe-
Quia virus, quod in Europa sponte non gignitur sed ex traduce tantum rare liceat
propagatur, transiione in dies sensim debilitatur: 2. Quia adversi aeris morbum
natura, alimentorum qualitate, sanguinis constitutione, apud nos quoti- tandem a-
die infringitur: 3. Quia remediis efficacissimis in dies retunditur. Sic liquando
consociata causarum energia res ad optatum successum tandem aliquando delitutum
perducetur; quandonam vero, ipse prorsus ignoro; celeriter tamen, si
1. Quemadmodum nunc usus viget, ægrotantes missa cunctatione male
pudibunda ad remedia cito confugiant, dum virus recens est, nec un-
quam adeo permittat, ut per longas moras invalescens ultimum virulen-

tiæ gradum adipiscatur, 2. Si diligens * munditiæ studium adhibeatur; ut nunc moris est, saltem in Galliis, iteratiliq; lotionibus extergantur frequenter pudenda, ne humoris acrioris aut virulenti mora conspiciatur.

Gravis
obiectio
adversus
illam opi-
nionem
proponi-
tur & di-
scutitur.

Non dissimulanda tamen obiectio, qua conjecturæ nostræ premi videntur: Scilicet scintillas e focus variis, quos in Zona Torrida admittimus, debere interdum ad nos agi, quibus incendium jam fere sopitum in Europa denuo exsuscitetur, vel potius, ut sine metaphora dicam, e variis Zonæ Torridæ regionibus, ubi lues venerea endemia viget, frequentia veneni effluvia in Europam commercio debere traduci, quæ remittentem morbum renovatura sint.

Sed hanc argumentationem multa diluunt, 1. E regionibus istiusmodi alias, quæ omnium notissimæ erant & unde morbus ad nos olim deventus est, jam dudum vastatas & incolis exhaustas esse; atque adeo nihil inde ad nos apportari jam amplius posse; quod convenit Insulæ *Haiti* seu *Hispaniolæ*, cæterisque continentis Americæ regionibus calidioribus, quarum indigenæ ab Hispanis jam pridem internecone deleti sunt.

2. Cum nonnullis aliis harumce regionum ita rara nobis intercedere commercia, si qua porro intercedant, ut vix ulla morbosa seminia possint hinc traduci, quod potissimum verum est de interioribus Africæ Provinciis, adeoque de Regnis *Tombouctou* & *Meli*, ubi luem veneream antiquitus vigere creditur.

3. Imo virus raro concipi in cæteris regionibus hujuscemodî, in illis etiam cum quibus frequentior est societatis usus & major consuetudo, ut sunt Indiarum Orientalium oræ & omnes Insulæ per mare Indicum sparsæ, quoniam postquam semel innotuit exemplo luis venereæ, quæ in Europa grassatur, venenum concubitu posse contrahi, solent vel perditissimi attentius sibi cavere ab imprudente & vesano usu veneris cum mulieribus barbaris.

4. Quod si vero contigerit aliquando quempiam illic contagio primigenio contaminari, ut interdum fieri inficias ire nolim, efficaci remedium auxilio celeriter sibi prospicere, atque adeo sic abrupti protinus successivam contagionis catenam, quæ posset alioquin novas tragœdias forsan excitare, Et sane quidem, licet Europæi jam a ducentis annis fere omnes Asiæ oras & Insulas sedulo lustraverint, ac inde forsan venenum venereum de novo non semel hauerint, constat tamen experientia luem

vene-

* *Fridericus Hoilmannus, Dissertat. Physico-Medicarum* 3. asserit luem veneream Constantinopoli non grassari, addique ideo non grassari, quod fame mundiarii ap-
prehe studiose post opus aquam sumant, & locos diligenter colluant. Sed videtur ille in
errore versari gemino; tum facti, tum juris: Facti, aiendo luem veneream Constanti-
nopoly nullam observari; Juris, lotionum utilitatem nimium exaggerando.

veneream pari passu per idem tempus in dies mitigatam esse, unde si frequens cum Asiaticis consuetudo, si acceptum identidem ab illis venereum haecenus non obstiterint ne lues sensim in dies remitteretur, consequens esse videtur fore, ut in posterum causæ eadem haud efficacius valeant obstare, cur eadem lues magis ac magis extenuata aliquando tandem penitus non evanescat.

CAPUT XIV.

De legibus olim sancitis in eos, qui lue venerea laborant.

CREDEBATUR lues venerea, cum primum in Europa apparuit, pestis instar ab infectis in sanos contagione in distans serpere alloquo, convictu, usu vitæ communis, &c. ægri scilicet verum contagionis modum initio vel ignorantibus vel dissimulantibus. Inde fluxere leges illæ, quæ in infectos olim latæ sunt in Galliis, & quibus incolumitati publicæ ea diligentia providebatur, quam videbatur præjudicii ratio postulare.

Sic existat in Actis Senatus Parisiensis, *Registre du Conseil, commence le mois de Novembre 1496. finissant au mois d'Octobre 1497. cote N. XL. Fol. 74. verso.* Decretum datum non die 4. Martii, ut refert Fontanonus, *Edicts, & Ordonnances des Rois de France, Titre 28.* sed die 6. Martii anni 1496. quo lue venerea infectis pœna capitali interdictum erat commercio cum sanis, sanctumque ut in suburbium Sancti Germani secederent, in loca destinata segregandi. Placet ipsissima Decreti (a) verba Gallica exscribere, ne quid vertendo immutasse videar.

Olim creditum fuit lue venereum contagione in distans serpere more pestis.

Ab hoc præjudicio ortæ sunt Leges latæ in infectos lue venerea.

Arresté du Parlement de Paris, portant Reglement sur le fait des Malades de la Grosse Vérole.

Decretum Senatus Parisiensis de disciplina erga infectos magna variola observanda.

Aujourd'hui sixiesme Mars, pource que en ceste ville de Paris y avoit plusieurs malades de certaine maladie contagieuse, nommée (a) la Grosse Vérole, qui pui deux ans en ça a eu grant cours en ce Roiaume, tant

Hac die (6. Martii) cum in hac urbe Lutetia ægri adsint plurimi, morbo quodam affecti, qui *Magna* seu *crassa Variola* appellatur, & qui duobus abhinc annis in hoc Regno plurimum grassatus est, tum in hac

Decreto illo celebri, quod a Senatu Parisiensi datum est die 6. Martii anni 1496.

F 3 de

[a] Decretum idem a Domino Alexio Lobineau, Monacho Benedictino, ex scriptum fuit. *Histoire de la Ville de Paris, Tome IV. pag. 613.*

[b] Gaspar Torella, qui aliquandiu in Gallica commoratus fuit, asserit in *Dialogo de Dolore in pudend-ægra*, quem Blesis scripsit anno 1469. *pudendagram Parisiis & in aliis magnis civitatibus Francie a litter-æis Grossam Variolam appellari.*

I.

Premierement sera fait cry public de Par le Roi, Que tous malades de ceste maladie de Grosse Verole estrangers, tant hommes que femmes, qui n'estoient demourans & residents en ceste ville de Paris, alors que ladite maladie les a prins, vingt & quatre heures apres ledit cry fait, s'envoient & partent hors de ceste dite Ville de Paris & pays & lieux dont ils sont natifs, ou là où ils faisoient leur residence quand ceste maladie les a prins, ou ailleurs où bon leur semblera, sur peine de la hart; Et a ce que plus facilement ils puissent partir, se retirent es portes Saint Denys & Saint Jaques, où ils trouveront gens deputez, lesquels leur delivreront a chacun quatre sols parisis, en prenant leur nom par escript, & leur faisant defenses sur la peine que dessus, de non rentrer en ceste ville jusques a ce qu'ils soient entierement garis de ceste maladie.

II.

Item, Que tous les malades de ceste maladie estant de ceste ville, ou qui estoient residents & demourans en ceste ville, alors que ladite maladie leur a prins, tant hommes que femmes, qui auront puissance de eulx retirer en maisons, se retirent dadans lesdites vingt & quatre heures sans plus aller par la ville, de jour ou de nuit, sur ladite peine de la hart, Et lesquels ainsi retirez en leurs saines maisons, s'ils sont pauvres & indigents, pourront se recommander aux Curez & Marregliers des Parroisses dont ils seront pour estre

I.

Primo. Regis nomine per præconem edicetur interposita mortis pœna, ut alienigenæ, quicumque hoc morbo *variola crassa* sive magna dicto affecti sunt, tum viri, tum fœminæ, qui in hac urbe Lutetia non commorabantur cum morbo illo correpti sunt, exeant ex urbe intra viginti quatuor horas a promulgatione, abeantque ocys in regiones & urbes ubi nati sunt, vel quas incolebant quo tempore morbus ille eosdem invasit, vel alio quocumque lubuerit: Et ut commodius in viam se dare possint, accedant ad portas sancti Dionysii & sancti Jacobi quatuor solidos parisienses in singula capita accepturi a delegatis huic muneri viris, prolatoque scriptoque prius singulorum nomine, pœnaque mortis singulis iterum denunciata, si in urbem audeant regredi, antequam a morbo illo absolute convalescant.

II.

Item. Ut morbo eodem affecti, quicumque in hac urbe nati sunt, aut ibidem commorabantur dum morbus invasit, viri fœminæque, quibus domus suppetit quæ se continere possint, sedulo caveant ut se domi semotos contineant intra viginti quatuor horas, nec amplius per urbem noctu aut interdiu audeant divagari, sin secus capite plectendi: Quod si qui egeni fuerint, indigentiam suam Parochis Aeditisque suarum Parochiarum significent, ut cibaria sibi cætera-

des

recommandez, & sans ce qu'ils parent de leurs dites maisons, leur sera pourveu de viures convenables.

III.

Item. Tous autres pauvres malades de ceste dite ville, hommes qui avont prins icelle maladie, eulx residants, demourants ou servants en ceste ville, qui ne avont puissance de eulx retirer en maison dedans les vingt & quatre heures aprez le cry fait, sur la dite peine de la hart se retireront a Saint Germain des Prez, pour ester & demourer es maison & lieux qui leur seront baillez & delivrez par les gens & deputez a ce faire, ausquel lieux durant ladite maladie leur sera pourveu de viures & autres choses a eulx necessaires, & ausquels lon defend sur ladite peine de la hart de non rentrer en ceste dite ville de Paris jusqu'es a ve que ils soient entierement garris de la dite maladie.

IV.

Item. Que nul soit si hardi de prendre lesdits quatre sols parisis, s'il n'est estrangier comme dis est, ou qu'il vouldist partir de ceste dite ville sans plus entrer jusques a ce qu'il soit entierement gari.

V.

Item. Et quant aux femmes malades, leur sera pourveu de autres maisons & demourances, esquelles ils seront fournies de viures & autres choses a eulx necessaires.

VI.

Item. A este ordonné que pour satisfaire au dit cry, lesdits malades, qui estoient de ceste ville, ou qui estoient

que quibus opus fuerit, subministrentur.

III.

Item. Ut sub eadem mortis pœna cæteri omnes morbo eodem affecti inopes viri, quibus morbum obvennerit in hac urbe commorantibus vel famulantibus, quibusque domus nulla est, quæ se contineant, intra viginti quatuor horas concedant in suburbium sancti Germani Pratenfis, commoraturi ibidem in domibus destinatis, sibi que indicandis a viris præpositis, quo quæcunque ad usus vitæ necessaria futura sunt, conferentur, denuntiata iisdem mortis pœna si prius in urbem regrediantur, quam a morbo plane convalescant.

IV.

Item. Audeat nemo solidos illos quatuor accipere, nisi alienigena fuerit, velitve ab hac urbe abire numquam rediturus nisi peffecte curatus.

V.

Item. Fæminis morbo eodem infectis alia parabuntur hospitia, quibus seorsim a viris concludantur, & quo ut cibaria cæteraque ad vitam sustentandam necessaria comportentur, curæ futurum est.

VI.

Item. Sancitum est, ut secundum denunciationem ægii in hac urbe nati aut ibidem commorantes, cum

de-

demourans en ceste ville à l'eure qu'ils ont esté prins de ceste dite maladie, seront mis en la maison, qui ja a esté loué pour ceste cause a Saint Germain des Prez, & où elle ne pourroit fournir, seront prins granges & autres lieux estant prez d'icelle, afin que plus facilement ils puissent estre pansés; & en ce cas seront ceulx, a qui seront lesdites granges & maison, remunerés & satisfaits de leurs louaiges par ceulx qui sont commis & deputés a recevoir l'argent cueilli & levé en ceste ville de Paris pour lesdits malades par l'Ordonnance des dits Evêque & Officiers du Roi & Prevost des Marchands: & a ce souffrir seront contraints realement & de fait.

VII.

Item, Apres le dit cry fait sera pourveu par celux, qui sont commis a recevoir le dit argent, a ce qu'ils mettent deux hommes, c'est a sçavoir ung a la porte Saint Jaques, & l'autre a la porte Saint Denys, pour en la presence de ceulx, qui seront commis par les Officiers du Roi & Prevost des Marchands, paier lesdits quatre sols parisis, & prendre les noms par escript de ceulx qui les recevront, & leur faisant les deffences dessusdites.

VIII.

Item, Sera ordonné par le Prevost de Paris aux Examineurs & Sergens, que es quartiers dont ils ont la charge, ils ne souffrent & permettent aucune d'iceulx malades aller, converser, ou communiquer parmi la ville; Et où ils en trouveront aucuns, ils

morbo illo tentati fuerunt, secludantur in domo, quæ jam ære conductæ est hunc in usum in suburbio sancti Germani Prætenfis, ac si tot ægrotis capiendis illa non suffecerit in horreis cæterisque hospitiiis proximis, ut commodius curari possint: Quo quidem in casu illorum horreorum hospitiorumve dominis locationis pretium numerabitur a Quæstoribus pecuniæ in horum ægrotantium usus in hac urbe collectæ jussu dictorum Episcopi, Præfectorum regionum, & Præpositi Mercatorum; Cogentur vero domini oblato locationis pretio haud gravate ferre, ut illis hospitiiis dicti ægrotantes excipiantur.

VII.

Item. Post promulgatam edictionem curabitur, a dictis collectitiæ pecuniæ Quæstoribus, ut viri duo deligantur, quorum alter portæ sancti Jacobi, alter portæ sancti Dionysii adstet, coram delegatis a Præfectis regiis & Mercatorum Præposito numeraturi abeuntibus in singula capita quatuor illos solidos, singulorum quibus numerabuntur nomina scripturi, singulique pœnas jam sæpius memoratas denuntiaturi.

VIII.

Item. Mandabitur a Proposito Parisiensi Curatoribus Apparitoriæ, ut in vicis, quibus singuli præsunt, caveant diligenter ne qui morbo illo infecti per urbem divagentur: Et si quos obvios forte habuerint, ut ex urbe ejeciant, vel

les

les mettent hors d'icelle ville, ou les envoient ou manent en prison pour estre puni ys corporellement selon ladite Ordonnance.

IX.

Item, Apres le dis cry mis, a execution soient ordonnez gens par les diss Prevost & Eschevins, les quels setiendront aux portes de ceste ville de Paris, pour garder & deffendre qu'aucuns malades de ceste maladie ne entrent appertement ou secretemens en ceste dite ville de Paris.

X.

Item, Soit pourveu par ceulx qui sont deputez a recevoir l'argent donne & ausmosné ausdits malades, a ce que a iceulx retirez & dites maison soit pourveu de viures & autres choses necessaires soingneusement & en diligence, car autrement ils ne pourroient oboir ausdites Ordonnances.

compellant in carcerem in cute pœnas daturus, ut in Decreto sancitum est.

IX.

Item. Re in hunc modum composita decernant Propositus & Scabini custodias, quæ ad urbis hujusce portas excubent, vetentque ne ullis morbo illo infectis palam vel clam in urbem ingredi licitum sit.

X.

Item. Procurabitur a Quæstoribus pecuniæ collectitiæ & in stipem erogatæ, ut ægrotis qui domibus illis conclusi detinebuntur, cibaria cæteraque quibus ad vitam opus est, diligenter, & abundè subministrantur, ut qui alioquin edictioni parere non possint.

Seu potius
anni 1497
si habeatur
ratio computatio-
nis, quæ
nunc in
usu est.

Videbitur forsan dies huic Decreto adscriptus haud exiguam difficultatem afferre. Non potuit enim lues venerea in Gallia citius grassari quam post reditum Regis Caroli VIII. vel ad summum Aulicorum, qui sub eo meruere in Italia, unde morbum adductum fuisse credimus. Sed Carolus, cum Lugduni, aliquandiu subliterit, Lutetiam non rediit nisi mense Octobri anni 1495. Aulici vero militesque, qui citissime, nonnisi mense Augusto, ut qui omnes interfuerint prælio ad Forum novum commissio die 6. Julii ejusdem anni, quo Carolus insignem de Venetis victoriam reportavit. Quanam ergo computandi ratione dici potuit in alato Decreto facto die 6. Martii anni 1496. veneream luem jam ab annis duobus vulgo in Gallia grassari tum Lutetiæ, tum alibi, cum vix a sex mensibus nota tunc foret, si a reditu Regis ratio ineatur; saltem vix ab octo, si a reditu Aulicorum militumque?

Sed eas tricas expedire facillimum est, modo ad diversam computandi rationem attendatur, quæ olim in usu fuit. Antiquitus enim anni principium ducebatur a Festo Paschatis, nec mos ille interversus est, nisi Edicto Caroli IX. dato mense Januario anni 1463. quo constitutum fuit, ut deinceps annus initium sumeret a Festo Circumcisionis Domini. postea
J. C.

J. C. Itaque cum Pascha anni 1497. incideret in diem 26. Martii, *Vid. Tabellas Chronologicas, quæ extant in Glossario Ducange, in verbo Annus*, Senatus consultum, de quo agitur, quod datum dicitur die 6. Martii anni 1496. reipsa datum fuit die 6. Martii anni sequentis 1497. juxta computationi rationem, qua nunc utimur.

Sed quorsum alienis suffragiis operose probamus, quæ vel ex ipsis Senatus Parisiensis Actis apertissima sunt. Quippe constat in illis annum 1496. Decretis singulis apponi per menses Januarium, Februarium, & Martium, ad diem usque 26. mensis Martii, in quam incidebat hoc anno Festum Paschatis: Inde vero in Decretis cæteris ex ordine subsequenter annum 1497. numerari. Ex his liquet ergo, ut modo dicebamus, Decretum, quod datum dicitur die 6. Martii anni 1496. revera referendum esse ad diem eandem, sed anni 1497. si computationis, quæ nunc usu recepta est ratio habeatur; atque adeo datum esse octodecim, imo viginti mensibus post primum luis veneræ ingressum, unde in Decreto illo jure maximo dici potuit, luem jam ab annis duobus grassari, cum nihil usu vulgarius sit, quam annum affectum pro confecto numerari.

Cum ea solutione sequentia omnia mire concordant. Die Veneris nempe, 5. Maii anni 1497. hoc est duobus mensibus a proposito Decreto, a Senatu constitutum est, ut ex multatitia pecunia sexaginta libræ Parisienses numerarentur in usum lue veneræ infectorum, ut prostat in iisdem Actis fol. 124. *restito*.

Cæteris, que Decretis ad eundem finem spectantibus, quæ extant, tum in Actis Senatus Parisiensis.

Une amende de soixante livres Paris, ordonnee pour les malades de la Grosse Vérole.

Sexaginta Libræ Parisienses a Senatu Parisiensi in stipem erogata ægrotis, qui magna variola infecti erant.

Ce jour, (Vendredi 5. May) la Court a ordonné la somme de 60. livres Paris estre baillée & delivree par M. Nicole Herbelot, Receveur des Exploits & Amendes de la Court de ceans, a Sieur Nicolas Potier, & autres commis touchant le fait des Malades de Naples, pour icelle somme estre employée & affaires & necessitez desdits Malades. Fait le 5. May.

Hac die Veneris, 5. Maii, anno 1497. Jussit Curia libras Parisienses * sexaginta a M. Nicolao Herbelot æris multatitii Coactore in Curia numerati D. Nicolao Potier cæterisque, qui præpositi sunt administrandis negotiis ægrotantium Morbo Neapolitano, ut in eorum usus impendantur. Actum die 5. Maii.

F 4

Die

* Non contemnebatur hæc temporibus hæc summa quippe tunc argentibus vulgo Marc. apud Gallos libras tantum undecim Francicas representabat, ac proinde hæc sexaginta libræ besse 5. $\frac{1}{3}$ proxime reddebant, qui hodie libris 275. æstimarentur. *Vid. Le Blanc. Traite historique des Macerones de France.*

Acta Curiae Parisiensis, quae Curia Castellani dicitur; Registre bien du Chastellet de paris, fol. 111. verso.

Ordonnance du Prevost de Paris
pour les malades de la Grosse
Verole.

*Editio Præpositi Parisiensis in illos,
qui magna variola
infecti sunt.*

*Combien que par dy-devant ait esté
publié, crié, & ordonné à son de
trompe & cry public par les Carro-
fours de Paris, à ce qu'aucun n'en
peut pretendre cause d'ignorance: Que
tous malades de la Grosse Verole
vuidassent incontinent hors la ville &
s'en allassent, les estrangiers és lieux
dont ils sont natifs, & les autres vui-
dassent hors ladite ville sur peine de
sa barte: Neantmoins lesdits malades,
en contemnant lesdits crys, sont re-
tournez de toutes parts & convergent
parmi la ville avec les personnes saines,
qui est chose dangereuse pour le
peuple & la Seigneurie, qui à pres-
ent est à Paris.*

*L'on deffend derechef de par le Roi
& Monsieur le Prevost de Paris à
tous lesdits Malades de la dite mala-
die, tant hommes que femmes, que in-
continent apres ce present cry ils vui-
dent & se departent de ladite Ville &
Forsbourgs de Paris, & s'envoient,
sçavoir lesdits forains faire leur resi-
dence és pais & lieux dont ils sont
natifs; & les autres hors ladite Ville
& Forsbourgs, sur paine d'estre jectez
en la Riviere, s'ils y sont prins le jour-
d'uy passé; Enjoint lon à tous Com-*

*Quamquam jam ante edictum;
promulgatum, & denunciatum
fuerit tuba & præconis voce, ne-
quis ignorationem causari possit,
ut interposita capitis poena quicum-
que magna sive crassa variola ægro-
tarent, abirent ocys ex urbe, a-
lienigenæ quidem in eas urbes, in
quibus nati sunt; cæteri vero ex-
tra urbis pomeria; Nihilominus
tamen ægotantes istiusmodi, præ-
ta denunciatione, undique regressi
per urbem vagantur & utuntur cum
sanis, unde maximum impendit
periculum tum Plebi, tum (6) O-
ptimatis, qui nunc Lutetiæ ad-
sunt.*

*Quapropter jubentur iterum no-
mine Regis & Præpositi Parisiensis
quicumque morbo illo infecti sunt,
ut post promulgatam hanc alteram
edictionem ex urbe urbisque sub-
urbis decedant, abeantque alieni-
genæ in urbes ubi nati sunt, cæteri-
que extra urbis suburbia, sin secus
faxint, præcipitis in amnem agen-
di, quoscumque ab hodierna die
comprehendi contigerit. Mandatur
simul Curatoribus, Præfectis
Vicanis & Apparitoribus, ut quos-*
missi-

[6] Aderant tunc Lutetiæ plerique Galliarum proceres, Nobilesque primatibus Ludovico XII, obsequium præstituri, qui Regni nuper partitus post mortem Caroli VIII. Ambasiis facti functi die 7. Aprilis anni 1498. Rhemis jam rediit erat, ubi inunctione consecratus fuerat die 27. Maii anni ejusdem.

*huissaires, Quartemiers & Sergens
prendre ou faire prendre ceux qui se-
ront trouvez pour en faire execution.
Fait le Lundi 15. jour de Juin, l'an
mil quatre cent quatre-vingt-dix-huit.*

cumque obvios habuerint prehen-
dant vel prehendi jubeant, denun-
tias penas daturos. Actum die
Lunæ 25. Junii, ann. 1498.

Demum die 22. Augusti anni 1505. Senatusconsulto decretum fuit
ut domus conducere, ubi lue venerea infecti habitarent, & ut locatium nume-
raretur de pecunia multatitia.

Tolosæ in-
fectis lue
venerea
tardius,
sed eadem
ratione
provisum
est.

Leges illæ
vero con-
tagionis
modo, quo
lue vene-
rea disse-
minatur,
melius
comperto
jam du-
dum anti-
quatæ sunt.

Tardius Tolosæ provisum est infectis lue venerea, nec ante annum
1528. quo tempore dicitur a Guillelmo de Catel, *Memoires de l'Histoire
du Languedoc*, pag. 237. Domum quamdam cum adjuncta æde Sanctæ Ca-
tharinæ in suburbio Sancti Michaelis eorum usui addictam fuisse, quæ
ideo vulgari idiomate appellata est *l'Hospital des Rougnous de la rouge-
de Naples*, hoc est Nosocomium laborantium scabie Neapolitana.

Tandem vero postquam experientia compertum est luem veneream li-
cet tactu idoneo contagiosa sit, attamen nec congressu aut alloquio in di-
stans propagari, imo nec convictu aut contubernio, nisi opus venereum
accesserit, contactusve alter intimus & per partes molles & porosas, cap-
tum est cum ægrotis lenius agi, & abrogatis sensim severioribus Legi-
bus cuilibet concessum est sui juris esse & valetudini ex voluntate con-
sulere. Cavit tantum Christiana charitas, quæ in omnes effusa est, ne
inopes, quos morbus premeret infortunio contractus, imo etiam quæsitus
culpa, tristi miseraque morte defungerentur ante diem, remedium aut
alimento penuria: Ideoque in majoribus urbibus vel certa nosocomia,
vel saltem in nosocomiis communibus conclavia certa syphiliticis
destinata sunt, ubi sanitati restituantur.

Conse-
pta, quæ
ex præce-
dentibus
videntur
posse in-
ferri.

Ex his tria videntur posse colligi. 1. Luem veneream novam esse,
Quorsum enim Leges novas condere, nisi morbus novus fuisset? 2. Lu-
tetix primum innotuisse anno 1495. ut liquet ex primo Decreto dato
mensis Martii anni 1497. ubi morbus dicitur a duobus annis grassari.
3. A lepra Arabum plane diversum fuisse. Quid enim causæ fuisset, cum
duo nosocomia elephantiacorum, vulgo *maladeries & leproseries*, Lutetix
præsto essent, alterum in suburbio Sancti Dionisii, ubi nunc est Domus
Sancti Lazari, alterum in suburbio Sancti Germani, ubi nunc est Mo-
rodochium, vulgo les *Petites Maisons*. Voyez *La Marre, Traité de la Police*,
L. 4. Tit. 12. chap. 1. cur ædes alienæ ad syphiliticorum usum converterentur
multo ære, nisi pro certo tunc fuisset, lepram luemque veneream ita
differre inter se, ut qui alterutra harum æ affectionem laborarent, cum
infectis altera non possent una promiscue cohabitare, nisi maximo utro-
rumque damno, scilicet labe mutua per contagionem reciprocata.

DE



DE MORBIS VENEREIS. LIBER SECUNDUS.

De Contagione, Natura & Therapeia Mor-
borum Venereorum.

CAPUT PRIMUM.

Qua ratione lues venerea contrahatur.



LGNORABATUR luem veneream, cum in Europa primum apparuit, contagione traduci usu veneris, ægrotis scilicet modum quo infecti erant caute dissimulantibus, ut flagitia celarent, vel forsan ne suspicantibus quidem posse tam grave morbum sola venere contrahi, utpote quæ contagionis ratio plane insolens esse videretur. Inde adeo factum est ut Medici, qui illo tempore florebant, summa consensione crediderint, ut jam supra dictum fuit, novum hunc morbum more cæerorum pestilentium epidemicum seu popularem esse, & induci proinde a causa externa & communi, qualem alii esse putabant noxium astrorum influxum vel planetarum aspectum; alii vero insalubrem aeris statum, quem pluvie vel inundationes attulissent.

Caspari Torellæ primo omnium de contagione luis venereæ subsoluisse videtur. Ille sane jam anno 1500. disertè docebat *Tractatu 1. De Pudenda gra*

Initio lue-
re vene-
reæ, inter
morbos e-
pidemicos
non erat
tam lues.

dagra, hunc affectum ut plurimum evenire per viam contagionis, sed tamen præconcepta opinione ductus vel ægrotantium mendaciis delusus causam alteram simul adjungebat, asserens *ibidem* luem veneream aliter etiam evenire posse utendo malo regimine, quod exemplo Antonii cujusdam Marci, Catalani, Artium & Medicinæ Doctoris confirmare conabatur.

In eadem sententia fuisse Jacobus Cataneus de Lacu Mercino, Genuensis, *Tractat. de Morbo Gallico*, cap. 3. anno 1516. Georgius Vella, Brixienfis, in *Opusculo de Morbo Gallico* cap. 1. anno 1516. Nicolaus Massa, Venetus. *Lib. de Morbo Gallico*, *Tractatu* 1. cap. 2. anno 1536. qui licet luem veneream contagione potissimum serpere faterentur, credebant tamen sine contagione ulla, *intrinseca*, ut aiebant, *alteratione* posse quoque generari. Quin imo Hieronymus ipse Fracastorius, Veronensis, celeberrima ætate Medicus, nec indiligens veri investigator idem sentiebat anno ipso 1546. dum scriberet *de Morbis contagiosis*. Tametsi enim concedat *hujus Operis Lib. 7. cap. 12. Maximam mortalium partem e contagione morbum hunc contraxisse*, putat tamen *observatum fuisse innumeros alios sine ulla contagione per se infectionem eam perpeffos fuisse*. Nam, pergit ille, *impossibile alioquin fuisset tam parvo tempore, contagionem, quæ per se segnis est nec concipitur facile, tantum terrarum peragrasse ab una classe ad Hispanos primum delatam, quando constat aut eodem tempore, aut fere eodem & in Hispania & Gallia & Italia & Germania & tota fere Scythia. visam fuisse*.

Sed tandem usu-
comper-
tum esse
propagari
tantum ex
traduce.

Sed pervicit tandem nota rei veritas, ac jam dudum certa, constanti, indubitata experientia innotuit, & unanimi Medicorum omnium testimonio compertum est luem veneream non concipi, nec errore diætæ, nec aeris vitio, nec ullo rerum non naturalium abusu, nec spontanea humorum labe; sed unica tantum ratione propagari, si ab ægroto in sanum communicatione traducatur.

Nempe I.
genera-
tione.

Hæc autem communicatio fit vel generatione, transmissa a parentibus labe, dum tenellulum embryonis corpus concipitur; vel contagione, morbo ab ægroto in sanum transmissio. Lues priore modo concepta *hereditaria*, posteriore vero, *adventitia* dicitur.

Lues hereditaria creditur ab alterutro parentum in fœtum traduci posse a patre & matre: A patre quidem, quia seminales particule a patre deciduæ & venereo contagio infectæ embryonem, quem lambunt, simili labe coinquinant; a matre vero, quoniam hæc, cum per novimestre gestationis tempus nutrimentum fœtui subministret, morbificum luis seminum, quo laborat ipsa, una simul suggerit.

Quamquam ipse quidem noluerim eam a parentibus communicationis viam profus rejicere, quam ab omnibus ferme Medicis probari novi, fatebor tamen ingenue mihi merito suspectam videri, si de lue venerea

vero

vere & proprie dicta quæstio sit. Equidem sæpe vidi Rachitidem aut affectus Rachitidi congenere, strumas aut strumulos glandularum melerai-
carum tumores, atrophiam pulmonarem, ossium distortionem, unde gib-
bositas, aliosque non paucos morbos hujuscemodi, qui a lue venerea de-
genere oriri solent, in tenella infantium corpuscula traductos fuisse vel pro-
gressu ætatis tacita labe sensim prorupisse: Numquam tamen luem venere-
am vere sic dictam & pathognomonicis signis conspicuam, jure quasi hæ-
reditario, in infantes transmissam observavi, unde in eam opinionem faci-
le propenderem hæc a Medicis jam pridem levi fide ideo admissa fuisse, ut
si res ita ferat, famæ possint ægrotantium consulere, causam probabilem, si
non veram luis prætexendo, quæ ægrotantes culpa absolvere videatur.

Sed hæc Lectorum judicio permittantur. Saltem si non unica, at vero
certissima communicationis via est contagio quæ post ortum adventit; Quo-
circa magni interest modos omnes, quibus lues venerea tali contagione
traducatur, exploratos habere. In genere quidem notum est plurimo-
rum morborum exemplo contagionem posse disseminari triplici ratione:
1. *In distans*, intervntu scilicet aeris in quem miasmata morbosa exha-
lent. 2. *Per fomitem* qualemcumque, quo effluvia morbifica in sanos des-
ferantur. 3. *Demum contactu immediato*, in quo liberrima est veneni trans-
missio: Sed simul quoque notum est hosce singulos ad propagan-
dam luem veneream perinde locum non habere.

Sic 1. probatur tum experientia, tum ratione luem veneream conta-
gione in distans propagari non posse: Experientia quidem, cum nullum
proffet in Medicorum Scriptis testimonium contrarium, unde licet jure
colligere possibilem eum non esse contagionis modum, qui jam a ducentis
annis & ultra nunquam observatus fuerit; Ratione vero, cum venenum,
quo lues venerea produetur, crassius, densius, fixius sit, ut in aerem
vaporis instar exhalare valeat, atque ea ratione in distans ad certum in-
tervallum disseminari.

II. Haud ita perspicue liquet de contagione altera, quæ per fomitem
spargitur, jacendo scilicet in eisdem linteis, induendo easdem vestes, bi-
bendo eodem poculo, os & labia extergendo iisdem mantilibus, quibus
infectus jam ulus sit. Proferuntur quidem exempla aliquot, quæ & huic
contagionis speciei suffragari videntur: Sic refert Nicolaus Massa, *Lib. de*
Morbo Gallico, Tract. 1. cap. 2. se curasse amicum quemdam suum, qui per
contactum linteaminum, in quibus dormierat quidam qui habebat ulcus Galli-
cum in crure, captus fuit, licet in illis per unam noctem tantum dormiverit. Sic
Antonius Fracantianus *Lib. de Morbo Gallico, ait se semel vidisse luem Gal-*
licam hoc modo contractam a puella septem annorum, quæ pelliceam vestem cu-
jusdam infectæ mulieris induerat. Sic Fallopius *Tractat. de Morbo Gallico,*

G

cap. 2.

Et II.
præfer-
tim con-
tagione.

Non ta-
men
conta-
gione in
distans.

Imo for-
san ne-
que con-
tagione
per fomitem.

cap. 22. dicit, *se loquutum fuisse cum sene, qui habebat domi duos laborantes, habentes partes posteriores ulceratas, & assererat se infectum ob usum ejusdem latrine.* Sic demum Leonardus Botallus, Medicus Astenfis. *Lib. de Luis veneræ curandæ ratione, cap. 4. testatur amicum & admodum familiarem quendam suum, virum sane integrum ac probum, hac miseria olim male multatum fuisse, qui perpetuo supremo asseveravit de jure reputare secum minime posse unde eam hauferit, nisi ex poculis cujusdam sibi necessarij, qui tunc acriter hac lue direxabatur.*

Sed hæc merito dubia videntur, vel ideo quia rara sunt. Hæc olim forsan observari potuere, primo ingressu luis venereæ, cum vehementissima erat morbi malitia; & ea Fallopii sententia fuisse videtur, qui postquam retulit, ubi supra, *primis temporibus creditum fuisse ex usu visrorum atque poculorum posse nasci affectionem istam*, in hæc tandem verba concludit, *videte quanta morbi istius erat rabies, hodie non est timendum hoc.* Forsan etiam, quod sane probabilius est, hæc omnia ab ægrotantibus astu conficta fuere, ut fraude & fallacia flagitia celarent. Sane, ut cum Brassavolo dicam, *Lib. de Morbo Gallico. profiteri possum numquam aliquem vidisse, qui morbum per fomitem suscepit, neque quempiam audivisse, qui id viderit.*

In summa nollem equidem eam contagionis viam pertinaciter negare: Sicut enim certum est variolarum fermentum per fomitem traduci apud Turcas, si guttulæ aliquot puris gossypio vel lineamento exceptæ superficiali cutis summæ incisuris insinuantur; imo vero apud Chineses, si pustulæ aliquot a variolosis deciduæ in nares intrudantur; quidni fermentum venereum poterit quoque per fomitem transmitti pari ratione, sed tamen tardius, debilius, difficiliter, quoniam fermentum istud altero fermento densius, crassius, fixius est. Verum enim vero vellem multo minus eundem contagionis modum pro comperto admittere, cum experimentis, quæ omni exceptione majora sint, nondum liqueat, imo contra probabilis suspicio sit adultos adultasve, qui tales morbi causas asserunt, meliori jure luem veneream acquisivisse, sed præ pudore dissimulare. Sic Fallopius *Tractatu de Morbo Gallico, cap. 13. falsè irridet quosdam, qui ut defendere castas matronas, dicebant eas fuisse aqua benedicta infectas, sed infectio illa, inquit ille, habuit originem per anum asperges, scio ego.*

Scd ma-
xime
conta-
gione per
corta-
cium.

III. Itaque contagio vel sola vel omnium communissima, ea est, quæ fit contactu immediato ægroti cum sano penes partem aliquam, quo sane constat experientia, si non semper, at saltem frequentissime luem contrahi, præsertim si sequentes conditiones forte coincidunt, nempe si partes, quæ contactu junguntur, madeant humore, qui veneni venerei vehiculum sit; si molles, laxæ, veneno facile permeabiles sint; si natura, situ vel fricatione calefiant & rarefiant, atque adeo venenum tanto facilius imbibant.

Hinc

Hinc cum varia sit & multiplex contactus species, in quæ conditiones illæ simul reperiuntur, multiplici quoque contactu potest lues venerea communicari.

1. Ufu veneris, siue mulier sana sui copiam faciat viro infecto, cuius balanæ ulcusculis cancrofis obfideatur, cui virulenta fluat gonorrhœa, aut saltem cuius semen feminio venereo inquinetur; siue contra vir sanus concumbat cum impura fœmina, cuius muliebria ulcusculis erodantur, vel fluente gonorrhœa conspurcentur, vel saltem feminali humore mædeant, qui non sit veneni venerei immunis. Siquidem in priore casu ichor purulentum, quod a balano ulcerato manat, aut corruptum semen quod ejaculatione emittitur, vulvæ, vaginæ, utero venere æstuantibus adhærent allita, unde luem variaeque luis symptomata brevi illatura sunt. In altero vero mentulæ glans, ex se quidem spongiosa, sed tunc tensione dilatata, & amatorio pathemate impensius rarefacta tabum quod ulcusculis extergitur, aut feminalem humorem veneno venereo prægnantem quem mulier ejaculatur in vulvam, alte imbibit, unde prima mali labes.

1. Ufu
veneris.

Creditur etiam lues a viro sano contrahi posse cum muliere, quæ & ipsa sana sit, si paulo prius illa rem habuerit cum infecto, & ad alterum illota accedat; quandoquidem reliquæ feminis putridi paulo ante excepti, quæ in utero vel vagina etiam tum hærent, balanæ viri paulo post admissi possunt pari labe inquinare, qua virulentum semen, quod ab ipsa muliere emitteretur, si infecta esset.

Demum quæcunque de contagione ex usu naturalis veneris dicta sunt, debent hæc eadem intelligi de usu pessimo veneris præposteræ, qua contingit agentem vel patientem, prout alteruter morbo infectus fuerit, æque celeriter ac altera venere quæ naturalis est, imo gravius etiam contaminari, ut infra probabitur.

2. Lactatu, siue impura nutrix alumnum sanum lactet, nam tunc lact vitiatum, quod subministratur, tenellum infantis corpusculum simili vitio cito contaminat; siue alumnus impurus lacteat ex nutrice sana, quia tunc morbosa alumni saliva laxis mammarum papillis suctu insinuata venereum feminium secum intro devehit.

2. Lacta-
tu.

3. Basiatione, si procius infectus cum amasia sana, aut infecta amasia cum proco sano columbent labra conferendo labris, potissimum vero si oris aut faucium interiora, ut columella, palatum, tonsillæ, gingivæ, lingua ulceratione venerea computrescant; quoniam saliva infecti vel infectæ, cum ex se jam inquinata sit & purulentis guttis, quæ ab ulceribus deraduntur, simul graviora, debet simili vitio inficere tum labra sani vel sanæ, tum præcipue linguam, cum petulanti lascivia exerta vibratur. Sic Benedictus Victorius testatur *Lib. 1. de Morbo Gallico, cap. 2. se experien-*

3. Basia-
tione.

tia edoctum fuisse juvenem seve inculpabili sanitate manitum, longe quidem tentis poris intervallo assuetum quam sepiissime mulierem Gallico morbo depravatum ore exosculari, nullo per seve exercitato coitu . . . in morbum Gallicum incidisse. Narrat similem historiam Carolus Musitanus *Tract. de Morbo venereo, Lib. 2. cap. 4.* de Monialibus Surrentinis, quæ morbum conceperunt puellulam suaviando quæ a nutrice infecta lactebar.

4. Cubitu solo. 4. Cubitu solo cum inquinato vel inquinata, & sine ullo usu veneris, jacendo tantum per aliquot noctes in eodem lecto & in iisdem lintheis, præsertim vero si infectus aut infecta morbo quodam cutaneo laboret, qui a contagio venereo ortum ducat, ut scabie, pustulis, lichenibus, &c. vel si in lecto affatim sudet; Tunc enim ichor ab ulcerata cute manans, aut sudoris halitus ab infecto prodians & a sano accubante excipi, cum pori cutis calore pateant, exceptaque luem similem communicare facile possunt.

5. Contrectatione par-
tium ul-
cerata-
rum. 5. Denique immissione digiti vel manus in loca, quæ ulcere vel fluxu venereo spurca sint, ulcera *verbi gratia* venereo digito explorando vel obstericando infectæ mulieri, maxime vero si Chirurgi digitus, aut obstericantis manus vulnere vel scissura faucientur, unde venenum facilius possit imbibere. Sic Antonius Gallus refert *Lib. de Ligno sancto non admiscendo, cap. 1. se obstericem novisse, quæ dum mulieris inquinatæ partium exciperet, hoc morbo corrupta fuit.* Sic Chirurgus, qui Carolum Musitanum, Gallice loquentem fecit in notis *ad Caput 4. Lib. 2.* geminam istiusmodi historiam refert, sed ita liquide confirmatam, ut utraque videatur omni exceptione major. Sic demum Jacobus Vercellonus *Tractatu de pudendorum morbis & lue venerea, articl. 4. §. 1.* testatur *se novisse adolescentem, qui cum mereivice sordida congressi veritus, ejus pudendum procaci tantum manu attrectaverat, nihilominus membro hoc insolentissime tumuisse, pustulis ubique scatuisse, inanem porro delectationem constanti morbo expiaturum, ni ad opem medicam confugisset.*

Ex supra dictis colligere est 1. Duos quidem priores contagionis modos certis & frequentibus experimentis ita confirmatos esse, ut in dubium venire non possint: Tres vero posteriores, utcumque probabiles sint, nec certis careant Auctoribus, nondum tamen ita compertos videri.

8. Duobus modis prioribus contragem promptam, facilem atque adeo frequentem esse, quia veneni transmissio certa, velox, copiosa est: Tribus vero posterioribus difficillimam, tardissimam, rarissimam ratione contraria, quia tractatio veneni incerta, lenta, pauca est, potissimum vero si in duriorem & integram cutem debeat introduci.

3. Proinde multo plures lue venerea infici prioribus duobus modis, quam tribus posterioribus, cui asserto experientia manifeste suffragatur, cum constet *vix unum* alterumve basiatione, cubitu, attactu contaminari, dum

dum supra mille sunt, qui eodem temporis intervallo lactatu, sed potissimum venereo concubitu vitentur.

CAPUT II.

Quid sit virus venereum & quale sit?

VIDIMUS in præcedente capite morbos venereos in Europa contagione sola propagari. Dimanat ergo ab ægris in sanos seminum Luem venereum propagari morbosico seminio, quod virus venereum nuncupari appellatur. five miasma quoddam morbificum, quod pauca quidem, imo paucissima quantitate & inconspicuis viis sano corpori insinuat, dein copia, viribus, efficacia sensum invalescens totam humorum malsam tardius citiusve inficere valeat atque pefundare. Hoc autem seminum qualecunque solet nec inepte *fermentum*, *venenum*, *virus venereum* nuncupari.

Hæc propagationis ratio ex traduce luis venereæ propria non est, sed cum cæteris quibuscumque morbis, qui contagione nocent, communis. Sic constat variolas pure pauculo e pustulis extracto & incisæ cuti instillato; pestem pure ex bubonibus manante, & vulneri animalis cujusvis inferto; scabiem aut lichenes ichore quod e cute morbosa defluit & sanæ cuti adhærescit; hydrophobiam saliva canis rabidi in demorsam partem intromissa; ægritudinem, quam Tarentula infert, humore, que phalangium hocce punctura in cutem introducit, seu fermentis totidem peculiaribus singulatim communicari.

Ut autem diversis illis fermentis natura diversa inest, qua singula singulos morbos inferre valeant, quales solent advocare, sic quoque debet & ipsum virus venereum sua propriaque indole pollere, tanto quidem cæteris magis nocifera, quanto morbus quem producit cæteris gravior est, & quam ideo tanto pluris intersit notam habere perspectamque, ut inde certior adhibeatur medicina morbis, quos inducit. Frustra quidem quæreretur de ejusdem natura, si ea vel analysi Chimica, vel miscela cum aliis notis liquoribus definienda foret, quandoquidem experimenta hujusmodi nec institui ulla ratione possunt, nec si instituerentur, satis tuta essent & omnis fallaciæ immunia; unum ergo Criterium superest, quod sit exceptione majus, ex notis scilicet veneni venerei effectibus; unde peculiarem ejusdem naturam & proprietatem haud ineptis conjecturis colligere licet.

Itaque I. Virus venereum partibus, quascumque afficit ruborem, I. Virus calorem, tensionem, dolorem, uno verbo phlogosim vel inflammationem infert. Sic in gonorrhæa urethram, prostates, vesiculas seminarias illud venereum in viris; in sceminis vero vaginam, vulvam, prostates & glandulas Coverticium phlogisticum esse. peranas: Sic in ulcusculis cancriosis, balanum, præputium in

G 3 viris;

viris; pterygia caruncula myrtiformes, cæteramque vulvâ in mulieribus: Sic in bubone inguinales glandulas: Sic in exostosis perioſtium: sic demum cæteras omnes corporis partes, quascumque virus obſidet, inflammari notum eſt. Virus ergo venereum phlogiſticum eſt & inflammatorium, hoc eſt ita natura conformatum, ut membranea partium ſtamina, intra quæ penetrat, denſando, criſpando, adeoque extrema vaſorum capillamenta, quæ iisdem interjecta ſunt, conſtringendo, cogat devium ſanguinem a conſueto tramite in lateralia vaſa lymphatica divertere, unde phlogofiſ & inflammatio.

II. Virus illud venereum corroſivum eſſe.

II. Virus venereum ſibi permiſſum ſenſim rodit, exulcerat, depaſcitur partes, quascumque aliquandiu inflammavit. Sic in gonorrhœa urethra, proſtatæ, veſiculæ ſeminariæ in viris; in ſœminis vero proſtatæ, glandulæ Cowperianæ, vagina: Sic in ulcuſculis virilium, belanus, frænum, & præputium; muliebrum vero, vulva variæque vulvæ partes: Sic in bubone glandulæ inguinis: ſic in exostosis lamellæ oſſeæ & perioſtium: ſic in palati & narium ulceribus columella ſeu uvula, pariſthmia ſeu tonſillæ, membrana pituitaria, oſſa palati quadrangularia, vomer, lamellæ narium oſſeæ, &c. roduntur & exulcerantur. Virus ergo venereum ita comparatum eſt figuratiōe, mole, mobilitate partium quibus conſtat, ut obvia partium ſtamina, quæ ſtrinxit, criſpavit, inflammavit, tandem diſcindere, diſrumpere, diſſolvere valeat, unde eroſio & exulceratio.

III. Virus illud venereum coagulans eſſe.

III. Virus venereum in partibus, quascumque attingit roditve, ſkirrhos, tumores ſkirrhosos, calloſque producit: Sic in gonorrhœa in utroque ſexu proſtatæ, veſiculas ſeminarias aut glandulas vaginæ: Sic in ulcuſculis genitalium, oras ulcerum: Sic in bubone glandulas inguinum: Sic in puſtulis baſim & peripheriam puſtularum: Sic in exostosis perioſtium oſſi appoſitum, & perioſtii filaſmenta lamellis oſſeis interjecta: Sic meſenterii glandulas, hepatis acinos, vaſa pulmonum lymphatica, indureſcere, ſkirrhofa fieri, vel callis durioribus obſideri compertum eſt. Virus ergo venereum talis efficaciz eſſe debet, ut partibus inſtillatum, ſi earumdem ſtamina nequeat diſrumpere & ulcerare, at ſaltem humorem lymphaticum, quo humeſcunt, inſpiſſando, poſſit eadem in callos multiformes indurare.

IV. Virus illud venereum fixum eſſe.

IV. Demum virus venereum numquam in diſtans, ſed contactu tantum immediato propagatur; quin imo nec contagioni compar eſt contactus quilibet, momentaneus, fugax, inter partes duras, calloſas, frigentes, ſed opus eſt contactu diuturniore, qui cum calore & rareſcentia inter partes molles & ſpongioſas intercedat, ut liquet ex iis quæ præcedenti capite dicta ſunt de modis, quibus lues venerea ſerpit & propagatur. Virus ergo venereum non conſtat partibus tenuibus, levibus, volatilibus, penetra-

trabilibus, quæ in auras spargi possint; quæ in distans avolent; quæ stric-
tissimos poros celerime pervadant; sed crassis, ponderosis, fixis, quæ
communicari non possint, nisi calore exaltentur, nisi partes objectæ ra-
ræ sint & permeabiles, nisi contactus intercedat immediatus & satis diu-
turnus.

Hinc consequitur 1. Satis apte conjici virus venereum acidæ aut acido-
salæ, corrosivæ & fixæ naturæ esse, quæ ab aquarum stygiarum vulga-
rium natura haud ita multum abludat: Siquidem hæc una videtur esse
proprietas, qua virus possit simul & tam aptum esse ut inflammationem,
exulcerationem, indurationem inferat, & tam ineprum ut in distans
contagione celeri propagetur.

2. Verum eam conjecturam urgendam non videri, quasi revera virus
venereum aquis stygiis in omnibus congener esset; neque enim credibile
est posse unquam in humano corpore venenum tam nocens & tam actuo-
sum generari; sed eam ita accipiendam esse, quasi proposita similitudine
veneni proprietas non tam accurate exprimatur, quam quodammodo
adumbretur.

3. Nihilominus tamen virus venereum, quantalacumque sit ejusdem
efficacia, numquam posse in Europa, ea sanguinis aut humorum corru-
ptela, quæ a causis non naturalibus & ordinariis inferatur, sponte gene-
rari; cum hic lues venerea numquam ex se invadat spontaneo vitio, sed
semper sobolescat translatione veneni insititii, quod tragœdiam ducat,
atque primitivam labem cæteris humoribus inurat.

4. Porro virus venereum, quod a sano contrahitur, haudquaquam
pro novo humore, seu liquido habendum esse intra corpus admisso, cæ-
teris naturalibus humoribus superinducto eosque inficiente, ut vulgo
credi videtur; sed meram esse vitiosam humorum naturalium qualitatem
aut dyscrasiam, qua degeneres a nativo statu in alienam naturam, hoc
est in naturam præternaturaliter falso-acidam descendant.

5. Proinde humores omnes vitiosa illa qualitate inquinari non modo
posse sed etiam reipsa inquinari plerumque, cum ex præcedente capite
liqueat luem veneream communicari lacte, dum a nutrice in alumnus
traducitur; saliva, dum suctu aut suaviatione transmittitur; sudore,
dum cubitu contrahitur, demum ichore limphathico aut pure, dum ob-
stericatione aut attritu ulcers sordidi & virulenti concipiuntur.

6. Nihilominus tamen semen & seminalia fluida quæcumque huic vi-
rio omnium maxime obnoxia esse, peculiari quadam affinitate, qua se-
minales quivis humores labem istiusmodi & facilius contrahant & altius
imbibant. Sane constat experientia luem veneris usu, adeoque seminis
aut seminalium humorum vehiculo potissimum propagari. Cujus rei ratio
inde videtur repetenda, quod semen & seminales cæteri humores, cum

Hinc
multa de-
ducuntur
confectu-
ria de na-
tura &
qualitate
feminii
venerei

acidam naturam ex se habeant, ut in physiologia probatur, possint ideo tanto facilius ad nimiam adeoque morbosam aciditatem ab inspirato veneno venereo evehi. Nec defunt alia similis analogiæ exempla inter certa venena, humoresque certos; sic venereum hydrophobicum salivæ; venenum variolosum puri pustularum; venenum viperarum humori felleo; qui ad radices dentium uncinatorum latet; venenum scorpionum. Tarentulæ, &c. humori quem utriculis ad caudam vel ad uncinos ori aditos, conclusum habent, tanquam propriis vehiculis insident.

Proinde hallucinari eos, qui putant luem veneream produci a pulitæ animalculorum minutissimorum & mordacium.

[a] Philop.
2.

Cæterum haud lubet tempus terere in refutandis eorum commentis, qui arbitrantur virus venereum nihil aliud esse, præter numerosam pullitiam animalculorum minutissimorum, agillimorum, vivacium, multiplici prole foeticantium, quæ semel admissa multa progenie sobolescant; quæ ad varia corporis loca frequentes colonias deducant; quæ partes, quas incolunt vellicando, fodicando, mordendo inflamment, erodant, exulcerent; in summa, quæ seclusa humoris qualiscumque energia, universa inferant symptomata, quæ in syphiliticis conspicua sunt; cum hæc enim meræ fabulæ sint, somniantium visis simillimæ, & ne conjecturis quidem nitantur ullis, nulla quoque argumentatione opus est ut rejiciantur. Neque enim par esse videtur, ut a negante magno molimine everti debeant; quæ ab affirmante nullo stabiliuntur fundamento: Satis esse debet, si ad hoc argumentum transferamus, quæ in re haud dissimili a Tullio dicta novimus, *Nempe nihil esse minus, non dico Medici sed hominis, quam id obijcere adversario, quod ille si verbo negarit, longius progredi non possit, obijcerit.*

Porro autem si pro vero semel admitteretur luem veneream ab animalculis sanguini innatantibus produci, idem quoque pari jure sentiendum esset non modo de peste, ut olim Athanasio Kircheri e Societate Jesu ac nuperrime Joanni Saguens ex Ordine Mimimorum visum est, sed etiam de variolis, hydrophobia, scabie, lichenibus, cæterisque affectibus contagiosis, imo vero de morbis omnibus; atque adeo universa Medicinæ Theoria pessum itura foret; cum nihil quidquam dici possit, ut probent luem veneream ab animalculis similibus, sed diversi generis, cæteros quoque morbos deducendos esse, quo tamen nihil absurdius affirmari posse crediderim.

Data occasione narratur historia de Circuiatore quodam qui aiebat morbos.

Memini quidem anno 1727. has easdem ineptias a Circulatore quodam, cui nomen erat *Boile*, Lutetiæ confidenter propositas fuisse, ea quidem astutia, a qua sibi cavere primo aditu facile non esset, sed eo tandem successu, qui debeat exemplo deterrere. Haud longa futura est narratio, nec ab instituto aliena, & quæ idcirco excusationem faciliorem impetrare possit. Afferbat Ille morbos omnes ab animalculis, quæ sanguini morbose inessent, produci, diversos a diversis: Animalculis illis pe-

stise.

stiferis animalia alia hostes esse capitales, singula singulis, quibus exagitarentur & deleterentur, ut lepores a venaticis canibus, aut ab accipitribus columbæ: Se probe nosse singulorum animalculorum pestiferorum genera pro morbi cuiuscunque natura, nosse quoque singulorum hostes acerrimos, qui ægrotantibus opitulari possent, & medicinas singulas, quæ animalculis illis auxiliariis fœtissimæ essent: Artem proinde se calere morbos quoscunque radicitus curandi methodo tutissima, brevissima, efficacissima.

omnes
ab ani-
malculis
singulos
a singu-
lis pro-
ducl.

Ut autem distis fidem faceret, præsto erat microscopium cujus ope gloriabatur posse quæcumque diceret oculis ipsis representari. Hoc autem microscopium mole satis magnum, non ex unico tubo recto, ut communis fert usus, sed ex quinque tubis constabat, qui ad datos angulos alterais flexuris oblique committebantur. Sic enim ajebat objectorum imaginem magis augeri non sola radiorum refractione per vitra interposita, ut in vulgaribus microscopiis, sed simul etiam eorumdem reflexione supra specula, quæ ad angulos singulos interne apposita laterent; pari videlicet artificio, quo celeberrimus Nevvtonus non ita pridem usus est in conficiendis telescopiis, quæ licet brevia sint, ope tamen reflexionis cum refractione conjunctæ effectum eum præstant in observandis sideribus, qualem a longioribus telescopiis sperare vix liceret.

Extremo hujusce microscopii tubo, qui ab oculo longissime distabat, vitra aptabantur plana vel leviter concava, quæ guttulas aliquot concluderent seri educti a sanguine recens emisso e venis ægri cujuslibet: Dein omnia ex arte componebantur ut vitra ad microscopii focum consisterent, atque repente intuentium oculis ingens offerebatur animalculorum examen fluido limpidoque humori celerime innatantium, quæ ut Ille ajebat pro alia morbi natura alia forma spectabilia fuissent. Postquam hæc omnia ab adstantibus abunde spectata erant, vitris iisdem a microscopio detractis guttas aliquot instillabat humoris alicuius fœti, ut ipse dicebat, animalculis, quæ priora venarentur & deleterent, & omnibus denuo arte compositis, mutata subito scena nihil apparebat amplius, quasi visa modo animalcula a posterioribus intersectione deleta illico evanuisent.

Minime mirum est similibus præstigiis fucum & diu & multis factum fuisse; sed tandem sedula & curiosa inquisitione palam & aperte patuit quatuor infimos microscopii tubos visioni nullomodo conferre, sed ad fraudem unice comparatos esse: Vitra proinde sero sanguinis vel alio quocunque humore madentia, quæ extremo ultimi tubi tanto apparatu aptabantur, ludificationis tantum causa apponi, cum nec liquores quos continerent, nec animalcula, si qua iisdem inessent, in conspectum venire possent: Supremo tantum tubo visionem fieri, & eo solo microscopium consistere: In hujus extremo vitro artificiose latuisse, quæ liquorem con-

clu-

cluderent aliquem animalculis foetum, quales plurimi noti sunt: Dum ceteri tubi videbantur ad visionis negotium componi, vitra latentia a sy-cophanta vel ad focum supremi tubi callide deducta, vel ab eodem abdu-cta fuisse, atque ea ratione facile pro lubitu potuisse animalcula, quæ li- quoribus inerant, vel offerri vel subtrahi intuentim conspectui.

En artes callidi quidem & vaferrimi veteratoris, sed simul etiam vere impudentissimi, qui præsentis sæculo, dum florent litteræ & rerum Physi- carum studia, Lutetiæ in urbe scilicet doctissimis viris refertissima, lu- dos, istiusmodi facere non dubitaverit ! Nescio quidem quem fallacia- rum fructum sibi ipse promississet, sed certe scio quam meritis fuerat pœ- nam fuga prudenter cavisse; nam ubi primum sensit fraudes retegí, con- vasatis sarcinulis clam abiit, excessit, evasit, erupit. Sic explosis tan- dem fabulis commentitiis, Medicina antiquissimis legibus restituta, & a ludibriis feliciter vindicata est.

C A P U T III.

Quibus viis virus venereum introducat & qua norma æstimanda sit suscepti quantitas?

DOCET experientia, quam solam in rebus Medicis magistram agno- scimus.

I. Virus venereum intro penetrare triplici modo.
1. Mado-
re.

1. Virus venereum, dum contagione spargitur, triplici via in sanos admitti.

1. Madoresolo, cum in obvios & superficiarios poros partis cui adhæ- rescit, solo fluiditatis, caloris, fricationis motu sensim penetrat, ut & cæteris quibusvis fluidis commune est. Sic ulcuscula cancrrosa accidunt in genitalibus in utroque sexu, si concubitu; in ore, lingua, gingivis, pa- lato, faucibus, si sugendo aut suaviando; in mammarum papillis, si la- ctando; in cutis habitu, si cubando; demum in manibus, digitisque, si obstetricando aut ulcera venerea contrectando lues contrahatur.

2. Halitu.

2. Halitu, cum veneni partes calore extenuatæ vaporis instar exhalant & vicinioribus partibus inspirantur. Sic in gonorrhœa urethra, prostata, vesiculæ seminarie in viris; prostata vero, urethra, glandulæ Cow- perianæ in sæminis: Sic in alumno ab infecta nutrice lactente trachæa ar- teria, brouchia & pulmonum vesiculæ, sola contagii exhalatione inflam- mantur, eroduntur, & exulcerantur.

3. Tra-
ductione
per vasa
limpha-
tica.

3. Denique traductione per vasa limphatica, cum virulentæ guttulæ per poros partium in vasa limphatica, quæ cutem irrorant, insinuatæ una cum circulante limpha in proximiores glandulas conglobatas, quo & ipsa confluit, devehuntur, ubi vires exerunt. Sic concubitu impuro, ul- cusculis cancrosis genitalium, aut gonorrhœæ parcius fluenti tumores glan-

glandularum inguinalium; sic venereis gingivarum, linguæ, palati aut faucium aphthis vel ulcusculis in lætentibus aut iis qui basis morbum concepere, tumores glandularum maxillarium & parotidium; sic papillarum rhagadibus, scissuris, ulceribus venereis in nutritibus tumores glandularum axillarium solent supervenire, devescæ scilicet veneni parte a genitalibus in inguinales, ab oris interioribus in parotides vel maxillares, a mammarum papillis in axillares glandulas, juxta circulationis leges quibus limpha paret.

II. Proinde eas corporis partes veneno venereo primas omnium affici, quibus contagium admittitur. Genitalia nempe in utroque sexu, si concumbendo; linguam, gingivas, buccas, palatum, fauces in alumno, si sugendo, aut in amasio vel amasia si suaviando; mammarum papillas in nutrice, si lactando; corporis habitum, si una cubando; summos demum digitos si obstetricando aut ulcera contrectando contagies concipiatur. Unde facile est sceminarum dissimulationem ludificare, quæ ut se excusent a culpa, solent aliquando falsam & absurdam morbi originem prætexere, cum experientia compertum sit & ea parte, quæ prima affecta fuerit, virus certissime admissum fuisse, & virus numquam admitti, nisi ea pars, qua admittitur, primum affecta fuerit.

II. Ea s corporis partes primas affici, per quas virus admittitur.

Frustra in contrarium objiceretur luem ipso concubitu aliquando concipi sine prævia ulla labe in obscænis partibus. Id enim ullo experimento, quod certum sit, confirmari negamus. Meminimus quidem legisse apud Bernardinum Tomitanum, *De Morbo Gallico Lib. 2. cap. 13.* sicut & alibi in una aut altera observatione ægrotantes duos tresve, qui morbum venereum localem nullum unquam experti essent, vera & confirmata syphilide laboravisse, quam quidem in ægrotante Tomitani *imbecillitas universa virium, præsertim ventriculi labefactio*; quam vero in duobus aliis pustulæ per cutem sparæ indicarent.

Expli- cantur observationes, quæ in contrarium opponi possunt.

Sed hæc neque numero neque momento tanta sunt, ut unanimi omnium sententiæ refragari valeant.

1. Forsan ægrotantes falsi sunt, dum se a morbo locali vacasse affirmarunt; neque defunt probabiles erroris causæ; sic imperiti porcos, qui breves & parum obviæ in fugis fræni latent, ignorare; sic ulcuscula venerea sed benigniora pro fissuris cutaneis habere; sic leviores gonorrhæas, quamvis venereas, potatæ cerevisiæ, equitationi, aut nimio veneris usus adscribere non modo possunt, sed etiam frequentissime solent. Multos sane reperire esset venerea lue sine præviis morbis localibus infectos, si ineptis inexpertorum narrationibus aut præjudiciis temere fides adhiberetur.

2. Forsan falsi sunt observatores ipsimet, dum ægrotos illos lue laborare judicarunt. Unum tantum signum memorat Tomitanus, scilicet *imbecil-*

becillitatem virium & ventriculi labefactionem: Pariter Observator alter unum tantum refert, *pustulas* videlicet *per cutem sparsas*: sed horumce signorum neutrum syphilidi demonstrandæ sufficit. *Virium enim imbecillitas & labefactio ventriculi*, si luis venereæ signa sint, signa sunt valde æquivoca, atque adeo valde incerta: *Pustula* vero *certius* quidem luem indicant, si venereæ sint, ad pustulæ omnes venereæ non sunt, & in distinguendis pustulis, quæ a feminio venereo fiunt, haud rarum est fucum fieri vel oculatissimis. Sane, ut libere dicam, & plura & certiora signa expectanda fuisse viderentur in re tam anticipi & tam nova, præsertim cujus observationem publici juris facere consilium esset.

3. Demus tamen rem in illis ægrotantibus se habuisse, ut narratur, quod sane nimium nimiumque est. Quid tum? Luem veneream aliquando forsan posse contrahi sine prænunciis ullis morbis localibus. Esto. Sed simul ultro confitendum est id si verum sit, tum raro usu venire, ut vix inter ægros mille, quid aio? Vix inter decem mille unum numerare liceat: quem lues eo pacto per saltum infecerit. Ergone una aut altera observatio, dubia incerta, fallax, quæ si vera sit rarissima est, in normam statim ducetur? Neutiquam sane! sed notis & omni exceptione majoribus regulis insistendum est; & idcirco de lue venerea quoties morbi locales præluserint, ex levioribus quidem signis judicandum est: Si vero nulli præcefferint, neganti opinioni adhærescendum est, vel ad summum quod re ipsa eodem recidit iudicium caute cohibendum, dum signa pathognomonica plura, urgentia, certo certiora rem in apertissima luce collocent.

Proinde facile condono, ut de facti veritate ulterius *anquiratur*. Neque enim obfuit unquam, profuit vero non semel de iis, quæ evidentissima esse videbantur, quæstionem movisse. Sed interim cordatos Medicos monitos velim, qui veritati & ægrotantium commodis servire student, ne sine certa, explorata, gravi auctoritate talia effutiant, quæ manifeste adversantur notæ feminis venerei fixitati, quæ sit ut illæsa parte qua admittitur, non possit ultra pergere: imo quæ pugnant cum evidente cæterorum venenorum natura, etiam volatiliorem, quæ licet altius penetrare valeant, primas tamen ac potissimas vires exerunt in partes, per quas intro subeunt. Sic pus variolarum pustulas excitat vel solum vel maxime in parte cui admoveatur: Sic saliva canum rabidorum, dum hydrophobiam producit, inflammationem maximam infert cum dolore in demorsa parte: Sic humor, quo scabies aut herpes affricatur, eam corporis partem præsertim inficit, cui adhæret agglutinatus; sic venenum Tarentulæ dum tragædiam edit in sanguine dolorem peculiarem excitat in parte vulnerata.

III. Inde III. Virus tandem, si sibi permittatur, post affecta primum ea loca, per

per quæ introgressum est, in ipsum sanguinem sensim deduci, quod duplici via fieri credimus, vel circulatione sanguinis, qui transeundo per confinia virulentas partes guttatim lambat & abripiat; vel circulatione lymphæ, quæ ab infectis partibus redux una secum plurimas veneni guttulas devehat in sanguinem, in quem ipsa perpetim confluit vasculis peculiaribus. Virus autem utralibet via traducatur, inde sensim multiplicari, intendi, invalescere, atque demum multiplicem functionum læsionem inferre, sed de his sequenti capite.

IV. In summa virus, quocumque modo penetret, vel madore, vel halitu, vel circulatione lymphæ, pari prorsus ratione guttularum tenuitate fluiditatis motu, calore quo æstuat, mutua partium quas humectat fricatione primo semper introduci per poros minutissimos quidem sed serme innumeros, quibus cutis densissime pervia est & permeabilis, quibus tanquam emissariis seu spiraculis exeunt ἀρόρραι, quæ intrinsecus effluunt, ut notissimum est experimentis Sanctorianis; & quibus etiam tanquam, immissariis seu infundibulis introeunt motu contrario ἐπίρροιαι quæ extrinsecus influunt, ut ex utilitate balnearum aquæ tepidæ embroches aquarum thermalium, frictionum mercurialium, cataplasmatum linimentorum, emplastrorum, unguentorum quorumcunque manifestum est.

Ex his consequitur 1. Ad introducendum virus venereum una simul conferre & infectum, qui agentis; & sanum, qui patientis partes sustinet; adeoque in æstimanda admissi veneni quantitate rationem perinde habendam, esse, tum conditionum omnium, quæ possunt ex parte communicantis seu infecti uberiores veneni copiam intro pellere; tum conditionum similium, quæ possunt ex parte accipientis seu sani uberiores introductionem permittere.

2. Conditiones ex parte infecti seu communicantis repetendas esse ex capite gemino: 1. Ex copia semini morborum, unde cæteris paribus debet venenum eo uberius introduci, quo copiosius abundat. Hinc si gonorrhœa summe virulenta actu fluat, si pudenda ulcusculis venereis erodantur; si citra gonorrhœam & ulcuscula, semen vel feminales humores, in quos concumbentes mutuo colliquefcunt, contagio venereo multo inveniuntur tanto facilius inde contagium communicabitur cæteris paribus, potissimum si ex spurcitie hærentes virulenti humoris guttulæ in illotis partibus computrescant. 2. Ex qualitate ejusdem semini, unde virus cæteris paribus tanto facilius promptiusque debet introgredi, quanto tenuius erit. Hinc si virus subtile, penetrans, fervidum fuerit ex naturali sanguinis acrioris vitio, ex immodica corporis jactatione & excandescencia, quæ concubitus præcedat, ex impotenti amore, aut salaciore libidine, inde labem

virus paulatim ulterius pergere, & sanguinem inficere.

IV. Virus, quocumque modo penetret, semper peris admitti tenuissimi & numerosissimi.

Proinde semini morborum intro-missio-nem æstimandam esse.

Modo ex parte infecti seu communicantis tantum.

tanto expeditius celeriusque per obvios poros in sanum introrumpet, atque adeo contagione tanto certius nocebit.

Modo ex parte fani seu accipientis tantum.

3. Pari ratione conditiones ex parte fani seu accipientis desumendas esse ex duobus capitibus; 1. Nempe ex textura partis, qua virus admittitur, quæ si rarior, mollior, magis spongiosa, aut erola, cuticula denudata, ulcere sautia sit debet ideo cæteris paribus tanto uberius venenum imbibere. Inde est quod lues celerrime contrahatur, si balanus in viris natura rarior, defectu satis rigidæ erectionis mollior, aut erosione quavis superficialia saucius sit; si in fœminis vaginæ aut vulvæ superficies laxior, rarior, nimis spongiosa, aut exulcerata fuerit; si in utroque sexu urethra, prostatæ, vesiculæ seminarie ex male curata gonorrhœa sint adhuc ulcerosæ, fungosæ, aut fistulosæ, &c. 2. Ex spatio temporis, quo pars veneno ingressuro objicitur, nam quo diuturnius fuerit, eo quoque futurum est ut cæteris paribus uberius admittatur veneni quantitas. Hinc ideo luis contagio potissimum obnoxii sunt, qui in venerem segnes vel frigidi opus tarde conficiunt, aut qui re peracta vasa non eluunt & abstergunt, præcipue si longiore præputio balanus obtegatur in viris, aut si latioribus pterygiis ostium vaginæ occludatur in mulieribus, adeoque nidulantes superstitiis contagii guttulæ pertinacius retineantur.

Modo ex parte ambo- rum.

4. Quapropter si omnia sint paria ex parte infecti vel infectæ, pericula contagionis futura esse invicem in ratione directa conditionum quæ sunt ex parte sanorum vel sanarum; si vero omnia paria fuerint ex parte fani vel sanæ, pericula eadem futura esse inter se in ratione directa conditionum quæ sunt ex parte infectorum vel infectarum; demum si cuncta sint utrimque imparia, contagionis pericula futura esse in ratione composita ex rationibus directis, tum conditionum quæ sunt ex parte sanorum aut sanarum, tum conditionum quæ sunt ex parte infectorum vel infectarum.

Hinc patet quantam varietatem esse debeat in contagionis modo, qua lues venerea propagatur.

5. Hinc ergo explicari commode cur sint alii qui contagium facillime contrahant vel ex levissima occasione, alii vero qui difficiliter licet in discrimen sæpissime sese conjiciant, alii demum qui difficillime & fere numquam? Cur quidam quibus diu innocuus est veneris usus cum maxime contaminatis, morbum celeriter concipiant, si cum aliis levius infectis misceantur? Cur nonnulli, qui cum infectis rem diu habuerunt sine noxa, dein tamen absque ulla morbi accessione ab eisdem aliquando vitentur, aliaque hujuscemodi plurima problemata, ad quorum tamen solutionem haud parum lucis conferent, quæ in sequenti capite proponentur tum de multiplicatione semini venerei semel suscepti, tum de multiplicationis modo.

CAPUT IV.

Qua causa virus venereum intro admissum multiplicetur, & quam sit multiplicationis ratio?

I. **V**irus venereum superviciè fatis angusta, poris inconspicuis & strictissimis, brevi temporis spatio exceptum, adeoque pauca quantitate intromissum, post affectas proximiores partes, ubi morbi locales statim excitantur, nisi sedulo & tempestive occurratur, quæ data porta sanguinem totum brevi inficit, unde varia ac multiplex læsio tum in partium substantia, tum in functionibus, qualis observatur in lue confirmata. Virus ergo venereum pedetentim in infectis copia multiplicatur, dum viribus invalescit.

II. Virus venereum, quo sanguinis massa contaminatur in lue confirmata, ab uno solum, qui vitium ipse retinet, in multos, 10. 50. 100. ita traducitur, ut singuli sint, nisi medicina efficax cito adhibeatur, simili & æque confirmata lue brevi contaminandi. Virus ergo venereum multiplicatur ex traduce, dum ab uno in plures contagione propagatur.

III. Virus venereum serpit repetita transmissione, cum unusquisque ex decem, vel quinquaginta primum infectis sufficiat inficiendis decem vel quinquaginta aliis, qui singuli possunt totidem alios ipsi quoque inficere. Eo sane modo a paucioribus Hispanis, qui ab insula Haiti seu Hispaniola olim redierunt, luem veneream in totam Europam, partemque maximam Asiæ & Africæ disseminatam fuisse credimus. Virus ergo venereum gradarie multiplicatur, viresque acquirit eundo, dum numerosa progenie sobolescent ab uno in vulgus spargitur.

Quæcumque de multiplicatione veneni seu fermenti veneræ afferrimus, tum venenis seu fermentis cæteris communia sunt. Sic canis rabidus paucæ salivæ vehiculo plures canes rabidos efficit, quorum unusquisque potest totidem alios simili labe de novo coinquinare. Sic scabiosus unus paucissimo ichore, quod a cute manat, pluribus scabiem affricat, qui singuli cum aliis totidem possunt eandem communicare. Sic peste correptus unus obviis plurimis morbum infert afflatu vel effluviis, quorum unusquisque simili via peste eadem totidem alios solet impertire. Sic demum æger unus variolis laborans potest pus sufficere quo plures inficiantur, quorum quilibet totidem aliis inficiendis par futurus est.

Imo etiam eadem multiplicationis ratio in rebus ipsis sensu carentibus observatur; sic libra una fermenti vulgaris panifici plures farinæ libras in pastam convertit, cujus libra quævis totidem aliis farinæ libris fermentum-

Virus venereum semel admissum multiplicari in infecto, dum lues confirmatur.

Multiplicari magis, dum ab infecto uno plures alii inficiuntur.

Multiplicari maxime, dum ab infecto uno in plurimos propagatur indefinitè.

Dari exempla similis multiplicationis in cæteris venenis.

Imo etiam in fermentis omnibus.

mentandis & immutandis pariter apta est: Sic congius florum cerevisiæ con-
gius plures decocti ex hordeo seu *malto* in cerevisiam commutat, cujus cere-
visiæ fermentatæ congius quivis similem mutationem asserre potest totidem
mensuris novi ex *malto* decocti: Sic pœnum putrescens poma alia circum-
posita in putredinem trahit, quorum singula dum computrescunt similem
labem totidem pomis aliis juxta positis impertiuntur, donec totus po-
morum acervus eadem perniciæ corrumpatur.

Quænam
conditio-
nes re-
quiran-
tur ad
eam mul-
tiplica-
tionis
speciem?

Patet autem attendenti ad singula propositam multiplicationis speciem
1. Non succedere nisi inter corpora invicem fermentescibilia, qualia sunt
omnia in exemplis laudata, hoc est inter corpora quorum partes motu inte-
stino actæ sese invicem impetant, eaque lucta singulæ & alterent & alteren-
tur. 2. Imo etiam inter corpora fermentescibilia non succedere, nisi certa
inter sit naturæ similitudo inter agens, cujus est conversionem moliri, pa-
tientsque, quod eandem pati debet. Sic fermentum panificum farinam si-
milaginis, ex qua constat ipsum primitus, in pastam convertit, quod nequic-
quam efficeret in farina milii; sic flores cerevisiæ decoctum malti, unde ipsi
prodire, in cerevisiam commutant, quod in decocto lentium sive maizzii
non perficerent; sic etiam in præsentî quæstione humor virulentus ab unius
sanguine defluens alterius sanguinem & humores, quorum natura compar-
est, simili virulentia pervertit, ac in vitii consortium trahit.

Hinc ergo sequitur 1. Vi & energia fermenti minutissimas particulas
fluidi immutandi ita atteri, subigi, comminui, conformari, ut mole, fi-
guratione, nexu particulis fermenti ipsius simillimæ fiant.

Et quæ-
nam con-
fectaria
inde de-
ducenda
sint?

2. Huic assimilationi eo aptiores esse particulas immutandi fluidi, quo
natura propius accedunt ad formam qualem fermenti particulæ olim
ipsæ habuere, adeoque quo possunt facilius inde simili modo deciscere
in formam, quam eandem fermenti partes jam obtinent.

3. Inconspicuas illas mutationes, quibus particulæ fluidi immutandi
alterantur & a primigenia forma degenerant, fieri motu fermentativo seu
intestinali, ut in panificio & præparatione cerevisiæ evidens est, & ut
de cæteris haud inani creditur conjectura.

4. Proinde sanguinis & humorum a sanguine secedentium immuta-
tionem, qualis sit ab admixto veneno venereo, produci motu illo intesti-
no sive fermentativo, qui continenter viget in circulante sanguine, quo
chylus, quem alimenta luggerunt, in sanguinem, quo sanguis in varios
humores convertitur; atque adeo virus, quod sanguini inspiratum est,
in ipso glicere & multiplicari mechanismo eodem, quo sanguis ex chy-
lo, quo humores cæteri ex sanguine renovantur.

Difficile
esse me-

Quærant jam umbratici Doctores, quibus dulce est insolubilia sectari
& in phantasmatis ludere, qualis sit primitiva moles, figura, dispositio
mi-

minimarum atomorum corporis immutandi; qualis debeat esse nova particularum facies, quam induunt, ut immutentur; qua vi, quo artificio, quo mechanismo a priori forma in hanc novam possint deciscere. Haud nobis suppetunt oculi satis lyncei, ut scenas, quæ in ea conversione exhibentur, possimus perspicere; & cæcutientibus temerarium videtur in tanta formarum & mechanismo possibilium diversitate de formis certis & de mechanismo peculiari solis conjecturis velle divinare. Quocirca mittendam censemus quæstionem obscurissimam, quæ forsitan nec soluta lucem majorem rebus Medicis afferret, cum experientia comperit sit Medicis practicis, posthabita causa, si altius lateat & intricatior sit, plerumque satis esse, modo de effectibus certi sint.

Et sane, ut jam ad quæstionem regrediamur, qualiscumque sit mutationis causa & mechanismus, manifestum est.

1. Multiplicationem semini virulenti in sano, dum inficitur, æstimandam esse ex duobus capitibus; Nempe ex viribus fermenti, quod agentis partes implet, & sanguinem cæterosque humores pervertit; 2. Ex facultate sanguinis cæterorumque humorum, qui mutationem pati debent & fermenti efficaciam pervertendos se præbent.

2. Vires quidem fermenti seu contagii venerei statuendas esse. 1. Ex copia qua admissum fuerit, virus enim tanto fortius & efficacius ager cæteris paribus, quanto magis abundaverit; sed ea de re consulatur caput præcedens. 2. Ex energia qua pollet, nam virus eo magis efficax & actuosum futurum est cæteris paribus, quo tenuius, acrius, subtilius erit, ex nativa temperie ut in regionibus calidioribus; ex morbosa dyscrasia sanguinis unde prodit, ut in cachecticis, biliosis, atrabiliaris, febre hectica laborantibus &c. ex diuturnitate temporis a quo ægrotanti inest, ut in iis qui jam dudum morbis venereis affligantur.

3. Facultatem vero sanguinis cæterorumque humorum, qua se facilius pervertendos præbent, repetendam esse. 1. Ex vitiosa eorumdem qualitate, qua venenum & citius & altius imbibunt; hinc qui cachexia vel obstructionibus laborant, aut qui biliosam vel atrabiliatam temperiem a natura habent, facilius solent cæteris paribus labem inde concipere. 2. Ex accidentibus variis, quæ veneni multiplicationem favent, ut sunt febrilis incandescencia, error in dieta, animi pathemata vehementiora, exercitia immodica, crapula, vigiliæ nimium protractæ &c. quæ si frequentius contingant, gliscenti veneno solent calcar addere.

4. Proinde multiplicationis modum æstimandum esse ex diversa facultate sanguinis & humorum, in quibus debet venenum multiplicari, si omnia paria sint ex parte veneni; ex diversis vero veneni viribus, si omnia paria fuerint ex parte sanguinis & humorum; demum ex ratione composita ex rationibus diversis tum virium fermenti, tum facultatis

chani-
cam il-
lius mul-
tiplica-
tionis
causam
assigna-
re.

Sed quod
medicæ
sufficit,
certo li-
quere
multipli-
cationem
illam ex
duplici
capite æ-
stimandam
esse.
1. Ex vi-
ribus se-
mini ve-
nerei ip-
sius, quod
fermeoti,
seu agen-
tis partes
sustinet.
2. Ex fa-
cultate san-
guini-
nis, qui
patientis
vices ge-
rit.

tis sanguinis & humorum, si ex utraque parte omnia imparia supponantur.

5. Hinc ergo tanto magis patere solutionem problematum, quæ præcedenti capite proposuimus, & aliorum quamplurimum quæ in præxi sæpius occurrunt, nempe cur alii a morbis venereis levioribus, & quibus videbatur diligenter occursum esse, in lues veneream confirmaram citissime incidant? Alii contra a morbis similibus, imo etiam urgentioribus & neglectis vel nullum vel leve & tardum damnum patiantur? Cur in alijs lues malignior diris symptomatis ferociat? In alijs contra mitis sit & benigna? Cur celeriter modo, modo vero tarde procedat? &c.

C A P U T V.

Quo pacto virus venereum tam diu aliquando lateat in sanguine sine noxa?

Utrumque experientia comprobatum esse, virus venereum diu aliquando latere sine noxa, tum aliquando deridente reviviscere. Quod utrumque ceteris etiam venenis communis est.

JAM dudum observatione compertum est, 1. Virus venereum cum profligatum creditur, clam aliquando latere ad multos annos in ipso sanguine, sine ulla ægotantis noxa, quæ manifesta sit, atque adeo sine ullo sui indicio: 2. At vero, ubi primum ex accidente sanguinis crasis vitio pervertitur, quamquam virus nullum de novo accedat, hydrae instar sponte reviviscere, celerique progressu gravissima symptomata inferre, unde lues confirmata.

Sane utrumque mirum est, & posse virus ita nocens in medio sanguine, quocum intime confunditur, quiete tandiu delitescere sine ulla noxa; & posse tam paucam veneni quantitatem in ipso sanguine, qui continuo renovatur, illibatam tandiu conservari. Sed tamen neutrum seminio venereo proprium est; virus enim hydrophobicum, quod acrius est potentiusque, non modo per multos a morsu dies, sed etiam aliquando per annos plurimos sopitum latet in corpore priusquam vires exeat, & aquæ timorem cæteraque hydrophobiae symptomata advocet. Quin imo, si vulgari opinioni credendum sit, fermentum seu virus variolosum nobis congenitum est a materno utero, latetque proinde sine noxa longissimo tempore, donec oblata occasione scenas agat plerumque funestissimas.

Nihilominus tamen ut hæc phenomena explicen-

Medici, ut hunc nodum rescant, vulgo existimant virus venereum cæteraque venena istiusmodi, dum innocue latent, recondi loculamentis quibuldam, quæ inter medias sanguinis partes sulfureas intercedant, vel inglandularum quarundam recessibus seponi, ubi sine in tuto, sed unde data occasione possint quasi ex insidijs erumpere, & vi atque impref-

pressionem sanguinem ceterosque humores, imo vero partes solidas perfundare.

Sed hæc meræ augæ sunt, nec ad veri speciem satis apte conficiantur.

Quasi vero in sanguine, qui fluidus est, qui motu circulatorio indefinenter truditur, cuius partes luscque deque multifariam aguntur, localimenta ulla liceat comminisci, invia, inaccessa, quibus veluti totidem pyxidibus partes veneni veneris arctè concludantur nec exhalent, aut ne aliarum partium confortio tandem immutentur: Aut quasi recessus, glandulæve ulla sic in toto corpore, in quibus sanguinis vel humorum circulatio vel uno monumento cesset in statu naturali; in quibus contentus humor perenni jugique motu sanguini non reddatur, si lymphaticus; in destinata loca non convehatur, si recrementitius; vel foras non expellatur, si excrementitius sit; demum in quibus humor ullus venereo veneno inquinatus possit per multos annos pacate subsistere illibata forma & indole.

Sed quid figmentis opus est, cum possit quæstionis solutio ex certissimis æconomiz animalis principiis deduci? Chylus, qui ex alimentis conficitur, in sanguinem intra vasa convertitur fermentatione; ibidem fermentatione simili sanguinis inde confectus, in humores secundarios ipse commutatur. Sanguis quidem, quandiu purus est, ex chylo probè notæ sanguinem purum, & ex sanguine puro puros humores generat, ut in statu sano; at vero si sanguis veneno venereo semel inquinetur, similem partemque labem debet inurere, nisi ocyus occurratur, tum sanguini quem ex chylo, tum humoribus omnibus quos ex sanguine de novo generat, unde virus, quod initio parce insinuatum fuit, renovatur & perpetuatur.

Jam vero potest ea labes, quæ sanguini infertur seminio venereo, tripliciter gradu & intensione variare pro diversa veneni admixtæ vel superstitis copia, aut diversa sanguinis in quem agit, natura, qualitate, indole, nimirum, 1. Gliscere in dies atque sensim invalescere veneno venereo multiplicata; 2. Contra minui & extenuari veneno venereo convalescente; 3. Media viæ progredi & statum modumque eundem constanter retinere, veneno venereo renovato quidem sed sine accessione aut decessione ulla.

I. Quidem si labes gliscat & invalescat, si virus inde celerè progressione augeatur in dies & multiplicetur, universa sanguinis & humorum massa brevi corrumpetur, unde lues confirmata; quod accidit ex triplici causa, utliquet ex præcedente capite 1. Si virus multum, acce, summè virulentum sit; 2. Si sanguis in quem virus agit, vel natura vel per accidens prævus & vitiosus fuerit; 3. Si, quod pessimum est, omnia hæc eadem ex utraque parte simul coincident.

II. Contra si labes in dies retundatur & imminuatur, atqueque si contagium & viribus extenuetur & decrescat copia, inde ratum quidem sed

tur, neque supponenda esse in sanguine loculamenta, quæ virus concludant, neque admitteudas in corpore glandulas, in quibus virus latere possit.

Sed hæc facile explanari posse ex diversis modo, quo sanguis & humores jugiter renovantur.

Ea nempe ratione virus sum ali-quando gradatim invalescere: & multiplicari. Aliquan-

do pede
dentim
extingui
& eva-
nescere.

certa progressionē virus omne sensim diffabitur, ut in iis qui a bubonibus, ulcusculis, gonorrhœis gravioribus convalescunt sine remediis, vel cum remediis haud satis efficacibus, & qui toto vitæ tempore optima fruuntur valetudine, in quibus virus venereum aliquantulum & diu latuisse, & optima sanguinis constitutione atque felici rerum non-naturalium usu sensim domitum fuisse nullus dubito. Sed tam faustum successum sperare numquam licet, nisi ex causa triplici, ut colligere est ex præcedente capite lege contrariorum, 1. Si virus paucum & benignum sit; 2. Si sanguis purus, rite constitutus, & perfecte elaboratus fuerit; 3. Quod optimum est, si ex utraque parte contingat ut hæc omnia una concurrant.

Demum
aliquan-
do mo-
dum ita
tenere,
ut ad
eundem
gradum
constan-
ter reno-
vetur.

III, Quod si labes medium statum teneat, ac proinde si virus jugiter quidem renovetur ut prius, sed semper eodem tantum gradu, qualem initio habuerit, adeoque perinde impari ad effectum, tunc quidem virus constanter perpetuabitur, sed ita coercitum & refrænatum ut effectu careat, seu quod idem est, latebit quidem in sanguine, sed latebit innoxie, quemadmodum in praxi obvium est.

Ut hæc autem succedant, oportet ut virus, quod admittitur vel quod superstes remanet, modum ita teneat in quantitate & energia, & ut simul sanguis ipse mediocritatem ita servet in qualitate & generationis ratione, ut inde permittatur quidem veneni reproductio, sed constans & eadem semper permittatur, neque major neque minor. Sin secus contigerit, si febre aut alio quovis morbo adventitio, si erroribus dietæ, vigiliis immodicis, crapula, &c. sanguinis qualitas vitietur, tunc qua ratione sanguis a naturali crasi desciscet ipse, futurum est, ut ratione eadem venenum antea latens copia & viribus prompte invalescat, naturali ferociæ restituatur, atque inde quasi aperta Pandoræ pyxide atra gravissimorum symptomatum cohors derepente incumbat, unde lues manifesta.

Possumus in confirmationem exemplum notissimum adducere, fructuum, nempe, qui in arboribus silvaticis feri & ægrestes ac proinde acerbi sunt, cultura vero molliuntur & mansuescunt; non ideo quidem quod nativam succi indolem, quæ ægrestis est, deponant, sed ideo tantum, quod dulcior succus, quem exultum solum suggerit, natales arborum succos ita temperet, ut inde fructuum sapor mitior fiat; quemadmodum videtur vel inde posse argui, quod fructus iidem ad pristinam acerbitatem subinde redeant, si a cultura aliquandiu cessante fuerit. Quippini ergo pari quoque modo potest pauca veneni venerei benignioris copia intra corpus latere quidem innocue, quandiu sanguis purior largiorem veneni similis renovationem refrænaturus est; suæ vero reddi nativæ ferociæ & virulentæ, ubi primum depravata sanguinis integritate datur latenti veneno nocendi locus.

Una

Una superest solvenda quaestio, utrum vir latente morbofo seminio infectus possit sanam mulierem, quacum rem hubuerit, lue venerea inficere, aut vice versa foemina virum? Acriter quidem disputant Medici in utramque partem, dum affirmant, alii negant, sed cum experientia utrique opinioni quandoque patrocinetur, proum est inde colligere utramque opinionem perinde veram esse, atque adeo virum eundem, in quo virus clam lateat posse & non posse mulierem, cum qua concubuerit, lue contaminare, pro diverso mulieris statu, & vice versa foeminam virum.

Quae probe intellecta plurimum conferunt ad resolvenda varia problemata de contagione venerea, quae in quaestione vocari solent.

Sage quidem, quoniam constat ex iis quae praecedente capite dicta sunt, infectionem non ab uno tantum sed a duobus dependere, sequitur non in uno tantum sed in duobus considerandam esse, ejusque propagationis modum non ex uno sed ex duobus aestimandum. Idcirco licet certus & constans supponatur inficientis status, necesse est ut effectu tamen diuerse variet a diverso statu inficiendae. Vir igitur, in quo virus lateat, potest quidem mulierem sanam lue manifesta inficere, si ipsa natura, morbo, vivendi ratione, tali temperie, qualitate, indole fuerit, ut veneni venerei vis, quae infecti viri sanguine inefficax est, pervertendo sanguini mulieris compar sit: Non potest vero, si mulier robustior, sanior, meliori constitutione praedita sit, atque adeo vim eludat veneni concubui admissi, quod in illa perinde ac in viro effectu cariturum sit.

Ex eodem principio deducendum est, 1. Cur mulier eadem, quae cum viro in quo seminium latet, veneris usum diu habuit sine damno, dein tamen aliquando ab eodem celeri lue inficiatur? Id enim supponit quidpiam ex alterutra parte mutatum fuisse, unde contrarium, quod ab infecto viro manat, jam efficacius sit, vel sanguis mulieris, qui inficiendus est, ad concipiendum venenum jam magis comparatus.

2. Cur ex pluribus liberis, qui ab iisdem parentibus suscipiuntur, laboret unus aut alter strumosis vel Rachiticis affectionibus, quae sunt degeneris luis symptomata, non vero alii? Id enim arguit hunc aut illum nativae corporis constitutione, vel morbis, qui dum utero gestantur matrem debilitant, caeteris imbecilliores esse, unde contagio alius inficiantur; atque sic de caeteris phaenomenis, quae in luis propagatione solent observari.

CAPUT VI.

De diversis methodis therapeuticis, quae in curanda lue venerea a primo morbi ingressu in hanc usque diem adhibita sunt.

I. Medici, qui circa luis venereae ingressum in Europa florebant,

H 3

mor-

venereꝝ morbi novitate & ferocia stupefacti hæſere diu ancipites, quid agerent plane neſcii: Nec enim audebant morbi curationem aggredi, cui ſe impares eſſe ſentiebant. Poſſunt in rei teſtimonium adduci Scriptores & plures ex diverſis gentibus, qui morbi exordio ſuppares vixerunt.

Sic inter Italos affirmabat anno 1500. Gaſpar Torella, in *Tractatu de Doloꝛe in pudendagra*, *Litteratos ab hac cura fuſiſſe, in hoc morbo ſe nihil ſcire confiſſendo*; cum enim, pergit idem, noſtris temporibus talis monſtruoſa ægritudo a nullo fuerit viſa, idcirco a nullo quantumcumque perito, experto, & ſenio conſeſſo canonice & recte curari poterat. Quæ eadem totidem verbis legere eſt apud Vvendelinum Hock, anno 1514. *Tractatus de Morbo Gallico*, cap. 1. Sic etiam Jacobus Cataneus a Lacu Marcino aſſerebat anno 1515. *Tractatu de Morbo Gallico*, cap. 7. *Apparente hoc novo in Italia morbo plurimos Medicorum inſignes hæſitaviſſe & a curatione ipſius reſuſciſſe*. Jure quidem, ſubjungit Ille, in curandis enim morbis prima intentio ut Galeno placuit, ab eſſentia morbi ſumenda eſt, quæ, cum nulla hujus morbi memoria extaret, incognita erat.

2. Neque res melius cedebat tunc temporis in Hiſpania, unde prima mali labes, Joannes enim Almenar, Hiſpanus, in *Praſatione præfixa Opuſculo*; quod de Morbo Gallico conſcripſit ante annum 1516. conquerebatur de ſupina Medicorum ignorantia in affectu curando. Et Gonſalvus Fernandez de Oviedo narrabat anno 1535. *Lib. 2. cap. 14. Hiſtorie General. & Natur. Indiarum Occident.* Hiſpanice ſcriptæ, Morbum Gallicum ferocem, curatu difficillimum, plerique initio funeſtum fuiſſe, quoniam cum ignotus eſſet, neque antea unquam viſus, Medici, quo pacto infectis mederentur, plane ignorabant.

3. Conſtat neque minus attonitos fuiſſe Medicos in Germania; reſert enim Ulrichus Huttenus, nobilis Germanus, anno 1519. *Lib. de curatione Morbi Gallici per adminiſtrationem ligni Guajacæ*, cap. 2. & 1. *Medicos ab ejus morbi ortu totum in Germania biennium ſiluiſſe*..... Et fuiſſe morbi aſpectum, nedum contactu abſtinuiſſe, ut mali prætereæ nullius. Ait vero Laurentius Phriſius, Medicus Metenſis, anno 1532. in *Opuſculo de Morbo Gallico*, cap. 1. *Pauperes hoc malo laborantes initio expulſos fuiſſe ab hominum converſatione, tanquam purulentum cadaver; dereliſtosque a Medicis (qui ſe volebant intramittere in curam tam ſpeculando & conſulendo quem viſitando) habitaviſſe in arvis & ſylvis*.

4. Porro qua ratione Medici in Gallia ſe geſſerint eodem tempore plane ignoro, cum inter Gallos Auſtor nullus exſtet, qui de lue venerea primis illis temporibus ſcripſerit, & antiquiſſimus omnium, quos noverim ſit Jacobus a Bethencourt, Rothomagenſis, qui anni 1527. *Tractatum de Morbo Gallico ſive venereo* edidit, ſed cujus ætate

jam

jam nota erat tum Mercurii tum Guajaci administratio & usu frequenti confirmata. Nullus tamen dubito quin eodem ac cæteri stupore percussi fuerint, ut ex scriptis hac de re legibus a Senatu Parisiensi, quas supra attulimus *cap. ultimo Libri præcedentis*, haud obscure videtur colligi.

II. Exin vero morbo latius opinione disseminata, cum numerus opem queritantiū in dies magis magisque cresceret, puduit tandem Medicos officio in re tam gravi penitus deesse. Sic ergo primum verecundia potius quam confidentia morbo Medicina fieri cæpta est, & mali curatio attentari. Liqueat autem ex Operibus Nicolai Leonicensi, Conradi Gilini, Gasparis Torellæ, Sebastiani Aquilani, Antonii Benivenii, Jacobi Caneani, Vvendlini Hock, cæterorumque Medicorum ejusdem ætatis in sequenti Therapeia adhibenda Medicos omnes consensisse, quam ceu reliæ rationi methodoque ad congeneres affectus receptæ maxime consonant, *methodicam seu rationalem* nuncupabant.

Deinde curatio-
nem ag-
gressi
sunt the-
rapeia,
quam
methodi-
cam seu
rationa-
lem ap-
pellaban-
t.

1. Quidem dietam imperabant tenuem, cum ex Hippocrate *Aphorif. 9. Section. 2.* impura corpora, quo plus nutriuntur, eo magis lædantur; & salubrem, ad quam videlicet deligebantur cibi eupepti & euchymi, qui sanguinis vitio temperando pares essent.

2. Venam incidebant ineunte morbo rarius vel frequentius pro ægrorum ætate, viribus, temperie: Morbo vero jam progresso a venæ sectione plerique cavebant, cujus vices malebant supplere sanguis ugis vel cucurbitulis.

3. Quæ in primis viis congesta erant, educebant vel clysteribus *laxativis* ex decocto emolliente, cassia, catholicone, diaphœnico, &c. vel medicinis *minorativis* ex senna, cassia, manna, myrobalanis, tamarindis, syrups pomorum Regis Sapor, de cichoreo composito, rosarum solutivo, &c.

4. Inde digerebant pravos humores, qui sanguini inerant, potionibus alterantibus, pro varia sanguinis crasi variis, modo blandioribus, ut 1. Apozematis ex succis depuratis cichorei silvestris, borraginis, buglossi, scolopendrii, &c. 2. Syrupis ex iisdem succis; 3. Sero lactis vaccini, cui herbæ eadem incoquebantur: Modo vero efficacioribus, ut 1. Decoctis radicum apii, petrolelini, fœniculi, asparagi, polypodii, &c. & foliorum fumarie, scabiosæ, epithymi, prassii, summitatum lupulorum, &c. 2. Syrupis ex iisdem; 3. Sero lactis iisdem herbis alterato.

5. In eundem finem utebantur balneis in aqua tepida, modo pura, modo prius decocta vel cum radice althææ & nymphææ; foliis malvæ, brancæ ursinæ; floribus chamæmeli, meliloti; semine lini, &c. ad emolliendum & diluendum: Vel cum radice cucumeris asini aut serpentariae

riæ; foliisque lapathi acuti, chelidoniæ, scabiofæ, praffii, &c. ad resolvendum.

6. Humores semel digestos dilutosque purgabant identidem catharticis efficacioribus, modo simplicibus, ut agarico, senna, aloë, diagridio, turpetho infusis aquis decoctivæ appropriatis, vel syrupo aut conferva exceptis in opiatam; modo compositis, ut electuario lenitivo, diaphenna Rhafis, diacatholicone, electuario Indo minore, confectioe hamec, electuario de dactylis, &c. pilulis cochiis; fœtidis, aureis Nicolai, de hiera Ruffini &c.

7. Postulas, si quæ cutem deturparent, calide inungebant post balneum linimento ex detergentibus & exsiccantibus, ut malleicæ, thure, myrrha, fuligine, sulfure vivo, lithargyrico, tartaro albo, radice ireos, enulæ campanæ, lapathi acuti &c. tenuissime pulveratis & axungia exceptis.

8. Si qui vero dolores torquerent, affecta loca sæpius illinebant calidissime oleo olivarum antiquo, laurino, chamæmelino, anethino, de spica, de croco; Medulla cervi, vulpis; Adipe humana, sapone veneto, decocto hyoscyami &c.

9. Ad morbum difficiliorem utebantur *stuffs*, in quibus blando aquæ ferventis calore, vel thymiamatum fumo ægri sudore manabant copioso, quo sordities, quæcumque cuti adhærescebant, abstergebantur. Pro pauperibus loco *stussarum* calore furni sudationem movebant felicissimo successu, si Gaspari Torellæ credere est, qui in *Tractatu de pudenda* agna ait inter omnia sibi experta pro curatione doloris ac etiam pustulatum esse, ut *patiens intret ad sudandum in furno calido, aut saltem in stussa, & hoc faciat diebus quinque continuis jejuniæ stomacho.*

10. Haud deerant, qui ad everrendas morbo reliquias multiplicem viperarum usum suaderent, ut vini, in quo viperæ extinctæ essent & aliquandiu infusæ; jusculorum ex viperis; carnis viperarum elixæ vel assatæ; syrups ex decocto viperarum &c. quæ singula fusius explicata invenies apud Sebastianum Aquilanum, Jacobum Cata-neum a Lacu Marcino, Petrum Andræam Matthiolum, & Joannem Benedictum.

11. Demum cauterium bregmati, occipiti, brachio tibiarum inurebant, quo latentes morbi reliquæ sensim exhaurirentur, ut ab Hispanis etiamnum fascitari dicitur. Sic ait Coradinus Gilinus, in *Opusculo de Morbo Gallico*, *cauterium actuale vel potentiale super commissura coronali maximum ferre juvamentum, & se hoc in pluribus expertum esse hanc aggritudinem in gula patientibus, qui omnes curati sunt ad laudem Omnipotentis, qui omnium inferiorum & superiorum causa existit.* Similia legere est apud Wendelinum Hock, & Benedictum Victorium.

Pote-

Poterant quidem ea singula morbi ferociam mitigare, humorum virulentiam lenire, & ad summum viam remediis efficacioribus parare. Plerisque sane, nec sine successu etiamnum utimur, quoties ægrum ad inunctiones mercuriales præparatum cupimus. Sed neutiquam poterant hæc univërfa morbum ita ferocem extirpare, & pestilentiam, qua tota humorum massa imbuta erat depellere. Haud ergo mirum si Medici ea methodo oleum & operam ita perdidissent, ut refert Gabriel Fallopius, *Tractat. de Morbo Gallico, cap. 10. Medicos, qui aderant in principio, desperasse in arte cum viderent se methodo non potuisse invenire rationem curandi*, ideoque fuisse in maximo despectu tunc temporis apud omnes, & nisi casu Chirurgici audacissimi invenissent hydrargyrum, & nisi Hispani illi supervenissent docti quomodo morbus tractaretur in Indiis, fore, ut rebellis esset morbus & adhuc sevirer. Quæ ipsissima verba profert etiam Prosperus Borgarutius, *sue Methodi de Morbo Gallico cap. 2.* ea scilicet a Fallopio mutuatus, sed suppresso tamen ejus nomine.

III. De Hydrargyro sive Mercurio pauca quidem hic proponere animus est, cum hoc argumentum fusius tractaturi sumus sequenti capite. Attamen ut sibi constet narrationis ordo; oportet attendere Medicinam quæ ex Mercurio ad luem veneream petitur, non casu inventam, ut censebat Fallopius, sed ex antiquiorum Medicorum praxi analogice deductam esse: Jam ab antiquissimis luis veneræ temporibus adhibitam fuisse, scilicet ante annum 1498. atque adeo ab ipso morbi ingressu: Videri quidem ab Empiricis vel Chirurgis primum tentatam fuisse, at vero ubi semel successu comprobata fuit, a Medicis celeberrimis non laudatam modo, sed etiam usurpatam esse: Porro parca, imo parcissima manu initio admotam fuisse, atque adeo nullo vel minimo periculo: Factum vero dein aliorum quidem Empiricorum ignorantia & præcipitantia, ut præpropere festinatione remedii vis plerumque inefficax esset, unde Huttenus asserit, *Lib. de Morbi Gallici curatione per administ. ligni Guajaci cap. 4.* ea methodo vix censejimum quemque levatum fuisse, *recidivo ut plurimum malo.* Aliorum vero temeritate & imprudentia, ut Mercurio largius illico gravissima cierentur incommoda, imo vero mors ipsa præcipiti casu non raro accideretur; unde contendit Gaspar Torella, in *Tractatu de Doloze in pudendagra*, ea therapeia Cardinalem Segobricensem, [Bartholomæum, ut opinor, Martinum: Valentinum apud Hispanos; Episcopum Segoviensem, qui creatus Cardinalis ab Alexandro VI. anno 1496. mortuus est anno 1500.] Alphonsium Borgiam, Alphonsi fratrem, innumerosque alios miseram mortem ante diem obiisse: Quapropter Medicos non paucos tot infortuniorum testes in eam medendi methodo acriter invejtos esse, non solum tanquam periculosam, sed etiam tanquam

Visum quoque nonnullis ex analogia vim hydrargyri experiri, sed methodo temeraria, ideoque minus felici.

quam lethiferam, neque forsan injuria, si putemus mercurialem therapiam tunc temporis ut plurimum adhibitam fuisse ab ignarissimis nebulonibus & in Medicina plane hospitiis, qui quasi Andabatarum more in tenobris pugnassent, Mercurium, remedium nempe ferocissimum, nec arte temperare norant, nec gravissimis symptomatis mederi, quæ sibi permixtus Hydragyrus plerumque advocat.

Circa
annum
1517. in
usum li-
gni Gua-
jaci cer-
tatim
itum est.

IV. Itaque res eo tandem reciderat, ut ambigerent ægrotantes utrum utri præstaret, an Medicos auscultando lenta labe contabescere? An vero certis cruciatibus exponi, imo evidens capitis periculum adire empiricis confidendo? Cum ecce contingit in Europam deferri ligna ex India, *Guajacum* & *Lignum sanctum*, quibus luem veneream sine periculo eradicari contendebant, & quæ ideo miro applausu excepta sunt, tanquam humani generis alexicaca.

Refert Ulrichus Hutten, qui Tractatum scripsit anno 1519. de *Morbi Gallici curatione per administrationem ligni Guajaci cap. 1.* remedia ea Europæ innotuisse biennio ante, atque adeo anno 1517. quod videtur confirmari a Leonardo Schmai, Salisburgensi, qui anno 1518. Opusculum de illem lignis edidit, in quo fatetur id remedii genus recentissime detectum esse, & vix dum in Germania solo nomine notum. Si tamen fides adhibenda sit Antonio Mulsæ Bralsavolo, in responsis ad quæstiones Alexandri Fontanæ, ligna illa in Italiam tardius deventa sunt nec ante annum 1525. cum ipse asserat anno 1551. dum scriberet, viginti sex annos agi, quod in Italiam deventum est ejuscemodi lignum, ac se primum fuisse, qui hujus ligni decoctum Ferrarie præbuerit Illustri Ænea Pio, cum omnibus aliis Medicis novum ac inusitatum videretur, (ut vera erat) medicamentum, multique id ipsum deriderent, quousque viderunt Illustrum Virum sanitati restitutum esse.

Narrat ibidem idem Bralsavolus qua ratione illud remedium Europæ primum innotuerit. Fuit, inquit, Consalvus quidam Hispanus morbo Gallico sævissime affectus, qui rei fama commotus, [nam omnibus fere aliis expertis præsidis sanitati restitui non poterat] una cum aliis ad Insulas nuper repertas navigavit, seque curari fecit ac sanitati restitui: Postea in Lusitaniam rediens Medici officio functus est, & eodem modo morbo Gallico affectos curare cepit, quo & ipse ab Indo quodam Medico curatus fuerat. Nescio quo consilio Joannes Freind, Vir de re medica optime meritus, in tertia *Historiæ Medicinæ* parte huic Consalvo, de quo Bralsavolus, Ferrandi seu Fernandi nomen de suo addiderit, quasi nempe vellet inauerte eundem cum Consalvo Fernando de Oviedo vel Ovietenfi fuisse, quod tamen a vero alienissimum puto, cum Ovietenfis in Lusitania Medici officio numquam functus fuerit, sed ab anno 1513. quo jussu Ferdinandi Arragonum Regis

Indies petiit, ut regio nomine accenderet ad mineras, & mineralium fusiones, ibidem commoratus sit ad annum usque 1525. imo vero 1535. ut ipse testatur in sua Indiarum Occidentalium Historia.

Sunt qui rem paulo aliter narrent, (a) nempe Hispano cuidam, qui lues Indicam ab Indica concubina contraxerat & qui divis cruciatibus torquebatur, famulum Indum in Hispaniola Medicum agentem aquam Guajaci propinavisse, qua non solum magnis illis cruciatibus liberatus est, sed pristina etiam sanitati restitutus: Hujus exemplo plurimos alios Hispanos morbo eodem infectos curatos esse: Inde harum curationum famam Hispani primum vulgatam fuisse ab iis, qui ex ea Insula redierunt & hinc per totam Hispaniam ac demum per totam Europam, quam ea lues jam occupaverat.

Demum si Ulricum Hurtenum audiamus, de Morbi Gallici curatione per administrationem ligni Guajaci, cap. 6. Nobilis quidam Hispanus, cum Quaestor in Provincia (Insulae Hispaniolae) esset, eo morbo graviter affligeretur, monstrata ab Indigenis medicina, usum ejus in Hispaniam attulit primum anxius ne non trans mare quales in Insula, essent ejus affe-

(a) Inno-
sius ad
Hierony-
mum
Benzoni-
um, edi-
tum
Franco-
furtia
Theodor.
de Bry
ann.
1594.

ctus. Sed ut-ut sit de modo, quo Guajacum in notitiam venerit certissime constat unanimum Auctorum omnium coetaneorum consensu id remedii genus ab Indis Occidentalibus acceptum a quibus lues accepta, & ab Hispanis in Europam transmissum esse, per quos lues transmissa fuerat; atque adeo antidotum inde petitum, unde malum petatum erat, quemadmodum olim de Achillis hasta fabulantur, quasi vulneris auxilium tulerit eadem, qua vulnus infixerat, ut apud Plinium legere est *Histor. natural. Lib. 25. cap. 5. & Lib. 34. cap. 15.*

Hæc autem ligna Indica, quæ ad lues veneream usu valent, duo sunt ut jam innuimus: Alterum (a) solidum, densum, resinofum, nigricans, constans ex fibris varie implexis, saporis acris, amaricantis & aromatici, odoris fragrantis, quod ab Americanis *Hiacan* seu *Huacan* vocabatur, unde Europæis *Guajacum* dictum est: Alterum densitate, fibrarum implicatione, sapore, odore, priori fere proximum, sed albidius seu potius subflavius, quod ab indigenis *Hoaxacan* appellatum, ab Europæis *Lignum sanctum* nuncupatum est, propter insignem usum sua materiae & efficaciam. Utriusque cortex est lignosus, tenuis, durus; ex plurimis lamellis parallelis & stricte densatis conflatus; extus ex cinereo rufescens, nigricans, maculatus; intus pallidus & lævigatus; saporis acris, amaricantis, odoris fere nullius.

Arbores, quæ hæc ligna proferunt, non ætate solum, ut multis, & nunc & olim visum est, sed specie differunt, ut demonstratum est a Joanne Terentio in notis ad Consalvum Hernandez Ovietaensem, & a

Plu-

Descri-
ptio
Guajaci
& ligni
sancti.
(a) Pau-
lus Her-
mannus
in Cymo-
logia
sua ma-
teria me-
dica.
Samuel
Dale in
Pharma-
cologia.

Plukenetio in Phytographia, quanquam ad idem vel ad affine genus pertinere credantur. Prior quidem, quæ suppeditat Guajacum, olim primum observata legitur in Insula *Hispaniola*, hodie *Sancti Dominici*, sed maxime in Insula *Beata*: Altera vero, a qua depromitur lignum sanctum, olim obvia erat in Insula *Borichen*, quæ jam sancti Joannis *de poru ricco* seu *divite* dicitur. Nunc vero ambæ frequentes sunt in plerisque Insularum Antillarum & in ea tota Americæ parte, quæ *Zona Torridæ* subjacet.

Quæ- Initio, quamdiu Guajacum & lignum sanctum auro contra care erant, **o-** mos fuit in eorum locum sufficere ligna varia Europæa, quorum virtus **lin habi-** congener vel affinis esse censebatur, ex * citro, cupressu, pinu, tere- **ta sint** bintho, corno, corylo, buxo, sed plerumque nullo vel minimo successu. **pro suc-** Unum est, quod forsitan exceptum velim, lignum videlicet ex junipero, **cedaneis** cujus decocto recentem luem curari vel saltem mitigari comper- **Guaiaci** tum esse dicitur non una experientia. Qua de re præter Antonium Mu- **& ligni** sam Brasavolum, loco ad libri marginem laudato, legi velim Joannem **sancti ?** Leonis *Descriptionis Africæ Lib. 1. in fine*, & Julium Cæsa-rem Scaligerum, in *Cardanum de subtilitate, exercit. 181. n. 19.* de usu ligni juniperini in Africa ad luis venereæ curationem.

(b) Guil- Possem quoque in testimonium adducere Franciscum I. Galliarum **elmus** Regem, qui idem (b) ipse sentiebat de hujus ligni virtute, & contra **Ronde-** quem Guillelmus Rondeletius satis temere pugnavit, nimium scilicet **tius Lib.** confidens auctoritati Dioscoridis, cujus vulgaria exemplaria habebant **de Morbo** tunc temporis *ramenta juniperi lsethifera* esse, sed nescius hæc verba Dio- **Italico.** scoridis textui ab aliena manu interta fuisse & quasi spuria ab Auctoris illius exemplaribus abesse quæ melioris notæ erant.

Ratio de- Hæc olim fuit Guajaci decoquendi ratio usu maxime recepta. Ligni **coquendi** minutim concisi aut ejus scobis lib. j. seu ꝑxij. in libris viij. x. aut xij. **Guajaci.** aquæ infundebant per horas xxiv. in olla fictili nova. Deinde vase prius bene occluso decoquebant in Diplomate, lento sed continuo igne ad quartæ, tertiæ, vel dimidiæ partis consumptionem, prout decoctum intensius, debiliusve ægri viribus & temperamento, morbove vehementiæ congruere videbatur. Decoctum refrigeratum & colatum in vase vitreo obturato ad usum asservabant.

Ligno, quod in olla supererat, affundebantur denuo totidem libræ aquæ

* Ulricus Huttenus, *Lib. de Morbi Gallici curatione per admin. Guajaci, cap. 21.*
 Antonius Musa Brasavolus, *Lib. de Morbo Gallico,*
 Græbiel Fallopius, *Traclat. de Morbo Gallico, cap. 37.*
 Bernardinus Tomitanus *Lib. 2. de Morbo Gallico, cap. 16,*
 Prosper Borgiautius *Method. de Morbo Gallico, cap. 14.*
 Alexander Trajanus Petronius, *Lib. 6. de Morbo Gallico, cap. 24.*
 Augerius Ferrerius, *de Pndendogra, Lib. 1. cap. 16. & 20.*

aquæ, iterum ad consumptionem quartæ partis lento igne decoquenda, Colatum secundarium illud decoctum sive *Bachetum* in lagenis vitreis, sicut & præcedens, recondebatur. Priore utebantur tanquam medicamine, posteriore vero pro potu ordinario.

Cæterum an lignum Guajacum sine cortice, an cortex Guajaci sine ligno, an ambo simul? An hæc sola, an cum aliis lignis, radicibus, plantisve affinis? An in vino, an in aqua, an in decocto vel aqua stillatitia plantarum congenerum; decoquenda essent, olim inter Medicos controvertebatur, & tanta quidem contentione ac si pro aris focusque dimicavissent? Sed quid opus lege certa rem incertam definire velle? Cum ægrotantium temperies, ætas, status, morbiq; natura, ratio, complicatio, varie variant, res tota Medicorum iudicio permittenda est, qui ipsi in casu quolibet ea eligent, quæ maxime profutura esse videbuntur.

Paratis semel decoctis, æger blando cathartico prius purgatus & prioribus cibis ab aliquot diebus enutritus, in cubiculo concludebatur, quod arte vel natura temperet & ita munitum esset, ut neque aer neque frigus penetrare possent. Lecto detentus summo diluculo sumebat cyathum unum prioris decocti calentis, qui capax esset ℥viij. vel x. & operto stragulis corpore & quatuor ad minus horis post assumptum decoctum offerebantur panis biscocti unciz duæ vel tres; cum uvis aliquot passis, vel amygdalis aut pistachiis, & decoctum secundarium assatim propinabatur. Inde post horas alteras quatuor sumebatur cyathus alter decocti primarii ad ℥viij. vel x. subdabatur ut prius per horas tres munitoq; dein corpore, & duabus vel tribus panis biscocti unciis iterum comestis cum uvis passis, amygdalis vel pistachiis, aliquot decocti secundarii pocula exhauriebantur. Quod si æger gracilis, attenuatus, tenerioris constitutionis, viribus minus valeret, neque tolerandæ tam severæ inediæ par videretur, concedebatur paulo major panis & passularum quantitas, vel panis unus *Martius*, vel etiam iusculum ex pullo Galinaceo; imo vero post dies aliquot quarta vel dimidia pars pulli Galinacei junioris assati vel in aqua pura & sine sale elixi.

Servabatur ea methodus per dies quindecim, quo tempore si alvus strictior esset, enemate emolliente laxabatur altero vel tertio quoque die. Transactis quindecim primis diebus æger blando cathartico, *verbi gratia* medulla cassiæ, manna, tamarindis &c. purgabatur, & ea die bibat tantum e decocto secundario. Inde therapæja eadem iterabatur eadem ratione usque ad diem trigessimum vel quadragesimum; sed paulo largiore diætâ sensim concessa: Imo post diem vigesimum quintum vel trigessimum licebat ægro, si viribus valeret, lecto identidem surgere, & bene vestito per cubiculum ambulare, dum ab omni sudatione liber erat.

De:

Et admi-
nistrandi
decocti.

Demum sub curationis finem iterum purgabatur, ac ei copia tunc erat e cubiculo non quidem in apertum aerem exeundi sed in aliud conclave, donec aeri ferendo par esse videretur. Neque enim quidquam derепente innovandum erat, sed omnibus paulatim adulescendum per mentem alterum, quo æger dicitur etiamnum observans & vino abstinens secundario decocto utebatur pro potu ordinario.

Virtus
decocti
Guajaci.

Sic ergo meracius Guajaci decoctum, quod natura acre est & aromaticum, vel nullis vel paucissimis cibariis in ventriculo alteratum, & in vasa lactea præ inedia exhausta & exinanita ubertim exceptum, singulas corporis partes liberrime circulando pervadebat; sanguinis limphæque globulos seminii virulenti præsentia induratos inspissatosque solvebat, attenuabat, liquebat; obvias contagii guttulas vel alterabat corripiebatque, vel diaphoresi aut diuresi abigebat & eliminabat; ac viscera omnia, vasaque singula acri illo lixivio per dies quadraginta macerata, si obstructa essent, paulatim referabat, si hærente humore infarcta, gravamine sensum liberabat; unde deleta, eliminata, profligata contagii venerci virulentia ægri pristinae reddebantur valetudini.

Utilitas
illius.

Multis sane ea therapeja profuit & in Hispaniola & in Hispania, narratque Nicolaus Poll, Caroli V. Imperatoris Medicus, in *Opusculo de curatione Morbi Gallici per lignum Guajacum*, edito anno 1536. uno quasi & eodem tempore usu decocti ex Guajaco tria hominum millia de quibus desperatum erat, ad bonam valetudinem reducta fuisse, qui post convalescentiam sibi ipsis renasci videbantur. Itaque haud mirum, si tantam famam derепente obtinuerit, ut teste Ulrico Hutteno, *Lib. de Morbi Gallici curatione per administrationem ligni Guajaci, cap. 11.* Medici non in celebres nomine *Cæsaris* & in cuiusdam in Germania Episcopi Hispaniarum adierint ad rectam administrationis methodum addiscendam ab illis, qui in *Spagnola* rem usu cognoverant. Facile tamen crediderim non parum auctam fuisse in tota Europa hujusce remedii celebritatem *Opusculo* jam laudato ipsius Hutteni, anno 1510. typis edito, quo Vir ille amicitii & inimicitii, quas cum Erasmo Roterodamo successive exercuit, orbi notissimus aperte testatur, *cap. 16.* se Morbo Gallico gravissimo ab annis novem infectum; doloribus atrocibus, multiplici exostosi, ossium carie ulcerosa, summa totius corporis emaciatione, & difficili marasmo laborantem; undecies sed incassum mercurialem curationem expertum; post torturas, supplicia, pericula, quæ vix poterant animo concipi, cum de ipsius salute ab omnibus desperatum esset, solo usu decocti ex Guajaco per dies triginta propinati juxta methodum, quam modo proposuimus, perfectæ & integræ valetudini feliciter restitutum fuisse.

Ejusdem
pericula

Sed nihil est vulgo imprudentius in æstimandis novitatibus. Ut temere credebatur olim decoctum Guajaci tutam, certam, innoxiam luis vene-

reque medicinam esse, qua sine periculo ut liceret omnibus, sic etiam omnibus nullo discrimine propinabatur. At vero brevi tempore certa tristisque experientia compertum est plerosque, qui tenui essent valetudine, aut temperamento acri, bilioso, fervido; qui natura macilentum & exsuccum; quibus pulmones, hepar, renes, aut ventriculus retortidi vel jam male affecti essent; denique qui in tabem quomodocunque inclinarent; inedia nimia, acriore decocto, sudore immodico confectos & extenuatos in marcorem, marasmodum, febrem hecticam, tabem, phthisim immedicabilem saepe decidere. *Observavi*, inquiebat Petrus Andreas Matthiolus, in *Opusculo de Morbo Gallico*, quod editum est anno 1533. *ficioris habitudinis Morbo Gallico laborantes ligni putatione cum besticam febriculam, tum tabem incurrisse.*

Visum quidem fuit, ut ea arcerentur pericula, administrationis acerbiterat mitigare; ideo permixta est plenior diæta, decoctum debilius propinatum, datum sudationi tempus brevius. Quid inde emolumenti collectum? Scilicet soluta versura in contraria peccatum est. Vis enim remedii eo modo fracta & debilitata ad curandum morbum jam non satis efficax fuit, querebaturque ideo *ibidem* idem Matthiolus non videtur bujusmodi lignum, sicut jam prius, male habentibus conferre, & plerosque ejus decoctum assumptum non sanari ob exhibensium incuriam, qui a legibus severioris diætae ægros imprudenter absoluebant. Sic ergo Guajacum, quod initio tanto applausu exceptum fuerat, minus commode audire jam cœperat; cum ecce allata in orbem nostrum radice Chinæ ægrotantium & mentium mentes in novas spes erectæ sunt.

V. Radix Chinæ (a) crassa, tuberosa, nodosa, levis, lignosa, caviem facile sentiens, extrinsece pallide rubescens, intus candida; lapidis farinae & terrestris, leviter astringentis; odoris vero nullius, creditur esse radix simlacis cujusdam asperæ, *Lampatam* diætae in China sive Sina, ubi copiose crescit, & unde delata nomen *China* habuit. Reperitur in America, præsertim in nova Hispania & in Peruvia radix affinis magis tamen oblonga, & intus paulo magis rubescens, quæ China Occidentalis appellatur, sed quæ virtute cedit Chinæ Orientali, e China vel Provinciis Chinæ finitimis devehitur.

Ea radix Europæ primum innotuit circa annum 1535. auctore Theodoro, *Cosmographi Universalis Lib. 11. cap. 25.* cum quo videtur Vesalius etiam consentire, ut qui referat, in *Epistola de radice Chinæ*, dum ipse adhuc Venetiæ sub præceptoribus & præcipuis illic artem exercentibus Medicis ægros iuvisset, radicem istam, non sine maxima expectatione summi laudibus illuc fuisse perlatam. Vesalius enim, cum natus esset anno 1513. consequens est vigesimo secundo vel tercio ætatis anno, adeoque circa annum a Christo nato 1535. vel 1536. Medicinæ studio

Radix Chinæ innotuit Europæ circa annum 1535. tanquam alterum specifi- cum.

(a) Paulus Hermannus, & Samuel Dale, ubi supra.

ope.

operam navavisse, ac artis tyrocinium Venetiis fecisse, potissimum cum liqueat auctoritate Valerii Andreæ in *Bibliotheca Belgica* Vesalium anno 1537. Paravii publicum Anatomes Professore fuisse.

Quamethodo illius decoctum ægrotantibus exhibitum fuerit.

Parabatur decoctum hujus radices sequenti methodo; nempe Chinæ recentis & non cariosæ ac in frustula seu *talloles* tenues concisæ ʒj. aut ij. viginti quatuor horis in aquæ fontanæ lib. vj. aut viij. tepide macerabant. Inde in olla fistili satis ampla & operculo contexta lento igne decoquebant ad duas tertias, decoctumque colatum in lagenâ vitrea obturata tepide detinebant ad usum quotidianum.

Porro autem æger prius præparatus præmissis universalioribus, purgatione scilicet, imo venæ sectione si ita e re videretur, cyatum unum hujus decocti calidi ad ʒx. vel xij. summo diluculo quotidie exhaurebat, ac in lecto compositus & stragulis contextus ad sudorem se comparabat per duas vel tres horas. Inde sudore semel absterfo & lecto surgere, & bene vestito in cubiculo ambulare licitum erat; imo vero post decimum vel duodecimum diem, si benignior esset aeris status, domo egredi sub eadem cautione. Diæta quoque liberalior concedebatur quam in administratione decocti ex Guajaco; poterat enim æger vesci pullis, gallinis, aut caponibus tostis vel sine ullo sale elixis, sed vino penitus abstinendus erat, permissio tantum pro potu ordinario decocto tepido radices Chinæ. Quotidie hæc eadem singula ordine eodem iterabantur per dies 24. aut 25. quibus curatio perfici credebatur, & si alvus pigrior esset, vel additis decocto quotidiano folliculis lennæ, vel enemate emolliente alternis diebus poterat subduci.

Celerem famam obtinuit.

Celerem huic therapææ celebritatem fecit auctoritas Caroli V. Imperatoris, qui jam ante, ut refert Vesalius in *Epistola de Radice China*, *articularis sui morbi & mali habitus occasione decocto Guajaci usum*, sed irritò successu, voluit suo potius Marte quam Medicorum consilio Chinæ virtutem etiam experiri Bruxellis, a qua si non optime, at certe melius habuit. Hinc ergo factum est ut vicini Germaniæ Medici, quibus summum mundi Principem China usum esse consilii, magnifice de hoc remedio & fenserint & judicaverint, sibi que multa deficere existimaverint, si non & ipsis hujus decocti propinandi ratio comperta haberetur; ... Quocirca suis principibus istius decocti vires ita laudandas duxerint, ut illi apud Cæsarem Medicorum causa instare urgereque non dedignati fuerint, quo ab Aulicis Medicis universus decoctum illud administrandi modus ipsis exponeretur.

Sed quam resinum parum diu.

Sed quam fluxa est ac mutabilis novorum remedium fortuna! Radix illa Chinæ tantopere laudata brevi vilescere visa est. Vesalius ipsemet in hac eadem *Epistola* anno 1524. edita, fatebatur se *comperitissimum habere Chinæ decoctum in usum excrecentiis tumoribusve, pravis ulceribus veneris Guajaci decocto longe inferius esse*. Prostant similia de China testimonia apud

Hic.

Hieronymum Cardanum in *Libro de radice Chynæ seu de Decoctionis*, anno 1548. Apud Antonium Musam Brassavolum, in *Traçtatu de radicis Chynæ usu*, anno 1551. Apud Antonium Fracantianum, in *Libro de Morbo Gallico*, anno 1564. Apud Julium palmarium, *Lib. 1. de Lue venerea*, cap. 14. anno 1578. Sed omnium disertissime apud Gabrielem Fallopium, in *Traçtatu de Morbo Gallico*, cap. 60. anno 1560. Non utator, inquit, hac radice in Morbo Gallico, expertus enim sum ter & quater, & nunquam aliquid potui assequi. Sane jam pridem apud omnes in confesso est radicem Chinæ podagræ, Ischiadico dolori, tumoribus œdematosis, strumis, ventriculi imbecillitati, hemicraniz, renum & vesicæ ulceribus prodesse; at vero ad luem parum utilem esse, & si quid forsan valeat, saltem Guaiaco virtute plurimum cedere.

VI. Famam paulo melius obtinuit radix altera nomine Sarsæ-parillæ Radix sarsæ-parillæ in Europam delata circa idem tempus tanquam specivum tertium. Illius descriptio. (a) Paul. Hermanus, & Samuel Dale, ubi supra.

notissima, quæ & ipsa eodem circiter tempore magnifice celebrata est, ut liquet ex eadem Vesalii Epistola. Cedit quidem Guajaco, at China virtute multum superior esse creditur communi sententia, imo etiam Guajaco ipsi præstare, quotiescunque post adhibitas inunctiones mercuriales, vel administratum Guajaci decoctum, supersunt ulcera, rhagades circa anum, tophi, nodi, ganglia, gummata, potissimum vero dolores rheumatici, fixi sive vagi, sed ab impura venere primum oriundi, ad quos specifica existimatur.

Devehitur ex pluribus Americæ locis, præsertim ex Peruvia, Mexico, Brasilia &c. ubi sponte & ubertim dicitur adolescere in sepibus (a). Tenuis est, crassitie calami, longa, sarmentosa, enodis, foris rugosa & plicata, ex flavo pallida, intus candida & farinacea, saporis & odoris nullius evidentis. Constans opinio est radicem esse plantæ, quæ cum smilace aspera eadem sit, vel smilaci maxime affinis; Inde factum ut ab Hispanis *sarsa-parilla*, seu *garça-parilla* dicta sit, hæc est *viticula rubo similis*. Id enim nominis est smilaci asperæ apud Hispanos, ut auctor est Andreas Lacuna, nempe quod smilax sarmentis, foliis, labruscis *viticulam*; spinis, aculeisque *rubum* referat; *carca* enim *rubum*, *parillam* *viticulam* Hispanice significat. Huic opinioni favet & ipsa experientia: Constat enim radices smilacis asperæ nostratis, ut sarsæ-parillæ forma proxime similes sunt, sic virtute fere pares esse, cum testetur Fallopius in *Traçtatu de Morbo Gallico*, capite 63. se radice smilacis asperæ in Italia effossæ usum esse felici cum successu, & plurimos a lue Gallica liberavisse.

Decoquitur sarsa-parilla eodem modo quo China, scilicet unciz duarum Et administratur ratio; frustatim selectæ macerantur tota die in aquæ communis lib. vi. Dein coquuntur igne remisso in diplomate olla operculo bene contexta, donec tertia vel media pars exhalaverit. Mane summo ab ægro in lecto jacente exhauritur hujus decocti cyathus ad decem uncias capax. Quod super.

superest per diem bibitur pro potu ordinario, sic quotidie iterando per dies 20. aut 24. Cæterum dicta paulo largior permittitur, quam in usu decocti Guajacini, eademque quam modo proposuimus in administratione Chinæ.

Lignum
sassafras,
specifi-
cum
quartum
(b) Paul.
Herman-
nus, &
Samuel
Dale, ubi
supra.

VII. Allatum est circa idem tempus ex variis Americæ tractibus, sed maxime ex Florida, lignum alterum ad lueem veneream efficax, a Floridianis *Pabamvve*, teste Francisco Coreal *Voyage aux indes Occidentales*, chap. 2. Europæis vero *Sassafras* dictum, quod (b) sub cortice tenui, foras cinereo, intus sanguineo, ex ruffo albicat, lignosum, leve, rarum est, saporis acris, subdulcis & aromatici, odorisque fragrantis, unde dici solet *lignum faniculi* seu *faniculatum*.

Parabatur & adhibebatur hujus decoctum eadem methodo ac decocta radicum Chinæ & sarsæ-parillæ; sed ut Chinam in abigendis, lue venerea, & luis venereæ symptomatis virtute proxime æquat, si Guajaco & sarsæ-parillæ plurimum cedit.

Pisana
hidroti-
cz seu
sudorife-
ra.

VIII. Mos jam pridem obtinuit ligna illa duo, Guajacum & Sassafras, radicesque totidem Chinam & Sarsam-parillam, quorum natura virtusque similis est, una simul decoquere, plerumque sine ullo purgante, aliquando vero cum folliculis sennæ, ut jam ab anno 1550. in usu fuisse testatur Brassavolus in *Tractatu de radicibus Chinæ usu*. Hinc parantur Decocta & Bocheta, quæ modo tantum diaphoretica & diuretica, modo vero cathartico-diaphoretica vi pollent, & quæ notissima sunt nomine *Pisinarum sudoriferarum*, vel *Pisinarum e lignis sudorificis*.

Varia solet esse singulorum dosis, pro diversis indicationibus, quibus satisfaciendum est. In genere uncia ij. ligni Guajaci in scobem vel in frustula redacti, unciaque totidem ligni sassafras in frustula pariter divisi, cum radicum Chinæ & sarsæ-parillæ minutim incisarum ana uncias totidem, infunduntur tepide horis 24. in aquæ communis lib. x. vel xij. Inde additis, si ita videatur, antimonii crudi crassiuscule triti & nodulo laxè conclusi ℥ij. omnia lento igne in vase operculo clauso decoquuntur ad consumptionem tertiæ partis. Tunc additur liquiritiæ ratiæ uncia j. imo si vis purgans in decocto requiratur, folliculorum sennæ Orientalis ℥ß quæ horæ momento coquenda sunt. Postea decoctum, cum repuit, colo transmittitur, & in lagenis vitreis bene obturatis servatur ad usum.

Solenne est hujus decocti tres haustus quotidie propinari per duodecim vel quindecim dies, mane jejuno ventriculo, quarta vel quinta hora post prandium, & vesperi ante decubitus: Vel saltem duo, mane scilicet & vesperi, omisso haustu pomeridiano, si ita e re videatur. Per id tempus æger ad parciores dietas addicendus est, domique continuendus si anni tempus asperius ita exigit.

Hæc

Hæc eadem lignorum decocta, quibus nihil notius est, vulgatus nihil, Lutetiæ tamen tanquam arcana remedia, & ad morbos quosvis *pan-* quam ar-
chresta venditari non ita pridem vidimus a duobus aretalogis nec sine cana no-
 lugo; usque adeo vulgus & præsertim vulgus Parisiense novitatis a va & ad
 mans est avidumque. Priori, qui Chirurgus fuit, nomen erat *Calat*: Hic morbum
 cæteris lignis dicebatur adjicere lignum Phyllyreæ angustifoliæ; egre- quem-
 gium sane & vere efficax additamentum! Imo etiam prædicabat se cal- curaque
 cem auri una incoquere, quod quidem sine dispendio fieri potuit, quod specifica,
 tamen factum vix credo, ex quo demum si factum fuerit, efficaciam ab Ægyr-
 nullam decocto accessisse certus scio. tis duo-
 bus ven-
 ditata.

Alter, artifex liquandi æris, dictus *Vinacbe*, superbiebat præparato antimonicali nescio quo, cujus additione suam pristinam cæteris præ-
 llare gloriabatur. Habuit hic unum atque alterum Medicum, non con-
 niventem modo, sed etiam suffragantem, quod quidem in artis me-
 dicæ opproprium redundavit aliquandiu, at vero simul in multorum
 perniciem cessit, & tandem; ut æquum fuit, in perpetuum, ipsorum-
 met approbatorum dedecus.

IX. Restat tandem, ut huc congeramus remedia non pauca, quæ Remedia
 quidem ad luis venereæ curationem plane inefficacia sunt ideoque jam varia, luis
 dudum obsoleta, sed quæ tamen a Medicis, nec incelebribus, olim venereæ
 & laudata & usurpata fuisse certum est. Inde saltem manifestum fiet olim ad-
 exemplo alieno quanta prudentia in rebus medicis, anticipatis aut tem- hibita,
 mere conceptis conjecturis parcendum sit, quantoque labore ad veri- sed quæ
 tatem pededentim sit enitendum. tamen
 huic cu-
 randæ
 inparia
 sunt.

1. Lignum Herechen, de quo Avicenna *Lib. 3. Tractat. 2. cap. 335.* & cujus decocto, ut refert Joannes Leonis, in *descript. Afric. Lib. 1. in*
fine, apud Afros luis venereæ medicina parabatur, a nonnullis tanquam
 egregium & specificum remedium * laudatum olim fuit. Constat au-
 tem hoc lignum idem plane fuisse cum junipero majore bacca rufescente
 sive oxycedro, tum ex descriptione ipsiusmet Joannis Leonis, *loco lau-*
dato, tum ex auctoritate Julii Cæsaris Scaligeri in Cardanum de Subtili-
 tate, *exercitatione*, 181. n. 19. Quale autem judicium ferendum sit in
 curanda lue venerea de ligno juniperino, Guajaci succedaneo, videbis su-
 pra articulo *hujusce capitis 4.* Cæterum notandum est vocem hanc Here-
 chen, quæ vera hujus ligni apud Arabes nomenclatura fuisse videtur,

* Gabriele Fallopio, *Tractat. de Morbo Gallico, cap. 40.*
 Antonio Fracantiano, *Lib. de Morbo Gallico.*
 Bernardino Tomitano, *Lib. 2. de Morbo Gallico, cap. 16.*
 Prospero Bargarutio *Method. de Morbo Gallico, cap. 14.*

varie depravatam esse in Hestleden a Prospero Borgarutio, & in Hestleden vel Heddeen a Gabriele Fallopio.

2. Decoctum saponariz officinarum, seu lychnidos saponariz dictæ, quod Joannes Baptista Zappata, Empiricus, tanquam specificum laudabat *li meravigliai secreti cap. 9.* & quod commendatum fuisse legimus a Daniele Sennerto *Practica Lib. 6. parte 4. cap. 17.* & ab Eustachio Rudio, *de Morbo Gallico.* Sed quod jam pridem penitus obsolevit, ceu nullius pretii.

3. Joannes Fernelius, Medicus Parisiensis clarissimus quidem, sed ab hydrargyri usu alienissimus, quem perniciosum Empiricorum inventum esse putabat, sine Mercurio & Guajaco perfectum luis venereæ curationem pollicebatur; ope duarum opiatarum, quarum alteram majorem, minorem alteram vocabat. componebatur utraque ex vulnerariis & purgantibus variis, sed neutra ad luem veneream profligandam satis efficax erat. Illarum opiatarum formulæ, quas piget hic describere, obvix sunt apud ipsum Fernelium *De curatione luis Venereæ, cap. 15.* aut apud Julium Palmarium *Lib. 1. de lue venerea, cap. 7.* ubi aptertius proponuntur.

4. Julius ille Palmarius, celeberrimus Fernelii discipulus, sed ea in re in verba Magistri jurare nimium paratus, non sustinuit quidem Mercurii ulum cum illo damnare, ut cujus utilitas in dies exploratior esset at vero existimavit cum illo luem debellari posse solo opiatæ usu, quam ibidem proponit, quæ dicit *neminem hactenus falsum esse*, quam venalem proflare monet Lutatiz *in vico Antoniano* apud Pharmacopœum quem nominat, quam fatetur ex duabus modo memoratis Fernelii opiatis compositam esse, *adjectis etiam*, ut ille subjungit, *aliquot aliis medicamentis, quæ adversus venena valere & ad sudores ciendos aptissima esse compererat*; sed quam certius est optato effectui imparem fuisse.

5. Guillelmus Rondeletius Professor & Cancellarius Facultatis Medicæ Monspelsulanæ, asserit in *Tractatu de Morbo Italico, se in pauperibus usum esse syrupo sancti Ambrosii, qui ex decocto milii paratur & ramensis ligni ficuum.* Prostat simile remedium in Pharmacopœa Bateana sub titulo *Decocti Ambrosiani*, diciturque *Diaphoreticum nobile.* Refert Nicolaus Chesneau in *ordine remedium alphabetico* ad calcem Observationum suarum adjecto tertiam ejusdem remedii formulam, juxta quam milium cum papsulis & ficibus decoquitur, atque decoctum illud laudari *ab Ottobone Heurnio tanquam nobile sudorificum & diureticum.* Sed liquet hosce syrnpos sive decocta, si quid ad sudorem movendum conferant, ad plenam luis venereæ curationem haud quidquam valere.

6. Demum narrat Samuel Formius, Chirurgus Monspeliensis, in Observationibus cum Lazaro Riverio communicatis, *Observat. 41.* „Hen-

„ ricum III. Gallorum Regem, lue venerea laborantem, cum a Medi-
 „ cis ordinariis curari non potuisset, monitum fuisse Penam (Petrum)
 „ tunc temporis Lutetiæ Medicinam facientem multos ab hoc morbo
 „ liberare remedio peculiari, quod a quodam Turca didicerat, ideo-
 „ que iussisse Penam vocari, a quo curatus fuit. „ Illud autem pecu-
 „ liare remedium nihil erat præter radicis Bardanæ in talleolas lectæ
 decoctum in æqualibus aquæ fontanæ & vini albi partibus, additis sub
 decoctionis finem folliculis sennæ, cujus decocti selibra mane jejuno
 ventriculo propinabatur in lecto per dies 15. vel 20. admonis ad di-
 versas corporis partes silicibus majoribus calidis, & linteo obvolutis,
 ad sudorem proliciendum.

Non nescius sum quosdam esse, qui affirmant Henricum III. usu
 radicis Bardanæ, quam Petrus Pena adhibuerit, non ex lue venerea,
 sed ex febre quartana convaluisse. Ita sane sentiunt Tancredus Robin,
 apud Joan. Jacob. Mangetum, in *Bibliotheca Pharmaceutica*, in verbo
 Bardana, & J. B. Chomel, Doctor Medicus Parisiensis, *Abbrégé de
 l'Histoire des Plantes Ussuelles*. Sed eos falsos esse opinor & in errorem
 ideo forte inductos, quod minus attente legerint *Observationes* Geor-
 gi Hieronymi Velschii, ubi narratur eadem historia. Ille scilicet post-
 quam dixit in *Observationum Medicinalium Epifagmate*, *Observat. 4. Em-
 piricum quemdam Parisiensem plurimos quartanarios decocti radicis Lappæ
 majoris seu Bardanæ ex vino albo magno successu curare solitum fuisse*,
 mox addit eadem quartanæ & lue venereæ quandoque remedia observari.
Sicillam, pergit idem, cum tibiæ ulceribus hydrargyrosi curatam nar-
 rat Guillelmus Ballonius, 2. *Epidem. & Ephemerid.* pag. 131. *hanc vero
 in Henrico III. Galliarum Rege eodem decocto Bardanæ a Petro Pena de-
 latam esse testatur Samuel Formius apud Lazarum Riverium*, *Observatio-
 ne 41.* Inde ergo factum fuisse videtur, ut præ oscitantia, nec satis
 adversa pronominum illam & hanc relatione creditum sit luem vene-
 ream cum ulceribus tibiæ in ægro Ballonii, hydrargyrosi; quarta-
 nam vero in Henrico III. decocto Bardanæ curatam fuisse, cum ta-
 men ex ipso orationis contextu contrarium manifestum sit.

Itaque tantum abest ut ex Velschii auctoritatem Formii elevare jure
 liceat, ut contra Velschius ipse Formii observationem aperte confirmet.
 Neque in contrarium pugnat ullo modo Pena ipse, quicquid a non ne-
 mine dictum fuerit, cum nullum exstet hac de re testimonium, quod
 equidem sciam. Quapropter credibile est virus venereum ab Henrico III.
 olim contraxit, dum e Polonia rediens Venetiis gonorrhœa virulenta
 male habuit, aliquot post annis repullulasse, quo tempore Petri Penæ
 consilio decocto Bardanæ retusum fuerit, ut refert Formius. *Retusum
 dico*, neque enim puto Bardanæ decoctum ad extirpandum virus ve-
 nereum

nereum valere ; imo neque cum decocto Guaiaci ulla tenus conferendum esse, quicquid de Bardanæ virtute adversus morbos venereos prædicent tum Simon Pauli *Quadripartiti Botanici*, cap. 3. tum Georgius Baglivius. *Præcos lib. 1. §. De Lue venerea.*

CAPUT VII.

De diverso Mercurii & Mercurialium usu ad luis venereæ curationem ab ipso morbi ingressu ad hæc usque tempora.

GRÆCIS Τόρρυρος, Latinis *aqua argenti*, vel *argentum vivum*, recentioribus Chemicis *Mercurius*, est substantia metallica, mobilis, fluida, ponderosissima, globosam vel globosæ proximam figuram affectans, coloris ex cæsis albicantis, auro jungi amans. Duplex habetur, *Naturalis* alter, qui in forma viva e mineris eruitur, & dicitur *Mercurius virgineus* : Alter *artificialis*, qui ex minera cinnabarina excoquitur, & *Mercurius cinnabarinus* appellatur. Reperitur uterque in variis Europæ locis, sed optimus censetur, qui ex Hispania aut Hungaria devehitur.

Hydragyrum
ab antiquis
dammatum
tanquam
deleterium.

Mercurius olim Aristoteli notus, *Meteorologicor. Lib. 4. cap. 8.* & Theophrastæ ejus discipulo, *Libro de Lapidibus* nomine *argenti fusi*, ἄργυρος χυτός, Plinioque, *Historiæ Naturalis Lib. 33. cap. 6.* nomine *argenti vivi* ab usu medico diu exclusus est, ut qui diceretur venenosus. Sic olim creditus fuit a Dioscoride, *de Medicinali materia Lib. 5. c. 110.* & *Alexipharm. cap. 28.* vim habere perniciosam potus, suoque pondere interna exdere : Sic a Galeno, *de simplic. Medicam. Facultate, Lib. 4. cap. 19.* & *Lib. 5. cap. 19.* & in *6. Epidem. comment. 6. textu 6.* relatus est inter deleteria, quamvis hoc Galeni de Mercurio judicium aliorum sententia potius quam sua niti videatur, cum fatetur ipse alibi, *de simplic. Medic. Facultate, Lib. 9. cap. 3. artic. 32.* se nullum unquam Mercurii periculum fecisse, interimatne interne sumptum, an externe admotum ? Sic demum ab universa Medicorum posteriorum turba cum Dioscoride & Galeno consentiente proscriptus fuit, ut videre est apud Oribasium *Medic. Collect. Lib. 13.* Paulum Æginetam, *de re Medica Lib. 5. cap. 64.* & *Lib. 7. in voce Τόρρυρος*, Aetium *Tetrabib. I. sermone 1. cap. 1.* & *Tetrabib. 4. sermone 1. cap. 79.* Aetuarium, *Lib. 5. Methodi medendi, cap. 12.* &c.

Ab Arabibus
medicis
in usus
medicos,
sed exte-
riores vo-
catum.

Primi omnium Medici Arabes ausi sunt Mercurium exterius adhibere : Tum ad pediculos enecandos, ut constat de Rhase. *Lib. 9. ad Amanforrem* : de Serapione, *Libro de simplici Medicina, cap. 385.* de Avicenna, *Lib. 2. Tract. 2. cap. 47.* & de Ilaaco, *Lib. 4. Practic. c. p. 9.* ubi pro-

po-

ponitur adversus pediculos argumentum ex argento vivo plerumque cum additis cineribus filicis & aceto: Tum ad scabiem, herpetem, cæterasque cutis defædationes sanandas, ut liquet ex Avicenna, & Serapione, locis jam laudatis & ex Mesue, in *Antidotario*, *distinctione* 11. ubi ad scabiem, imperiginem & plegma grossum, ut aiebant, duo adducuntur unguenta ex multis quidem aliis composita, sed quibus immixtum inest argentum vivum saliva extinctum.

In utroque Mercurii usu Arabes Medicos fere omnes sectatores habuerunt, qui in Europa ante renata litterarum studia claruere. Sic in pediculorum perniciem unguenta mercurialia præscribuntur a Guillelmo Varignana, qui Genuæ Medicinam cum laude fecit circa annum 1300. in *Secretor. sublimium Tract.* 3. cap. 9. a Bernardo Gordonio, qui Montispeisuli cum fama docuit anno 1305. *Lilii particul.* 2. cap. 9. a Guidone de Cauliaco, summorum Pontificum Clementis VI. & Urbani V. Capellano & Medico, ab anno 1348. ad annum 1363. *Chirurgie magnæ Tract.* 6. *Docrin.* 1. cap. 3. *in fine* a Valesco de Taranta, qui Medicinam Montispeisii professus est anno 1418. *Philonii Lib.* 7. cap. 74. Sic etiam unguenta similia contra scabiem, variasque scabiei species, ut *malum mortuum*, *pblegma salsum*, *asaphati &c.* adhibita fuerunt a Rogerio Parmensi, Medico circa annum 1250. *Chirurgie Lib.* 1. cap. 42. *de Morpheæ alba*; a Rollando Capelluto, Medico circa annum 1268. *Chirurgie Lib.* 1. cap. 15. *de Rima seu Ruffa capitis*; a Theodorico, Medico celebri circa annum 1280. qui dein post additum nomen Ordini Fratrum Prædicatorum ad Episcopatum Cervientem promotus est, *Chirurgie Lib.* 3. cap. 49. *de Malo mortuo*; ab Arnaldo de Villanova, circa annum 1300. *Medic. Practic. Lib.* 2. cap. 43. *De scabie seu pruritu*; a Guillelmo de Varignana, eodem circiter tempore, in *Secretis sublimibus, Tractat.* 3. cap. 1. a Bernardo Gordonio, anno 1305. *Lilii particul.* 1. cap. 24. *rubric.* 1. & cap. 25. a Guidone de Cauliaco anno 1363. *Chirurgie magnæ Tractat.* 6. *Docrin.* 1. cap. 3. *rubric.* 1. 2. & 4. a Valesco de Taranta, anno 1418. *Philonii Lib.* 7. cap. 35. & 36.

Inter unguenta mercurialia tunc temporis usu receptissima famolum fuit unguentum Saracenicum, ideo sic dictum dubio procul quod ab Arabibus seu Saracenis acceptum haberetur. Extat sequens hujus formula apud Guidonem loco laudato.

R. Euphorb. & Litbargyrii ana lib. 3.

Staphid. agræ quartam β.

Argenti vivi quartam j.

Axungia porci veteris lib. j.

Incorporando in mortario fiat unguentum, de quo eger inungat se semel in septimana. ...

Debuit unguentum illud cuti illitum, ut quod Mercurio constaret ad nonam partem salivationem movere in plurimis; & sane constat etiam nec Guidonem, nec Theodoricum hunc unguenti effectum lauisse, nam uterque diserte monuit *hoc linimentum facere educere superfluitates per os balneando (bavando) & per subascellas refudando*, additque Guido *argentum vivum nocere membris principalibus, & dentibus atque gingivis*, ideoque varia proponit gargarismata, quæ ab ore interiore noxam arcerent. Illos autem ambos primos fuisse opinor, qui salivationem observarint, cujus antiquorum nullum Medicum, nisi forsitan Alsaharavium, meminisse credimus, & qua tamen notabile incrementum Medicinæ accessit, detecta nempe noxa & antiquioribus Medicis incognita novæ evacuationis via.

Unde ad
curatio-
nem luis
venereæ
accom-
moda-
tum ex
analogia.

Oportuit hæc sigillatim memorare, quandoquidem constat inde olim petitam fuisse ex analogia methodum illam curatoriam, seu therapeiam mercurialem, quæ nunc ad luis venereæ curationem usu potissimum viget. Cum scirent enim Medici, qui primis luis venereæ temporibus vixerunt, unguenta mercurialia ad impetiginem, herpetem, scabiem, phlegma falsum, malum mortuum, cæterasque cutis defædationes, tum ab antiquioribus Medicis jam pridem cum successu adhibita fuisse, tum a seipsis quotidie feliciter adhiberi, inde pronum ipsis fuit hæc eadem accommodare ad curationem morbi novi, cujus initio præcipua symptomata & maxime obvia pustulæ erant, accacoethea ulculcula, quibus cutis deturpabatur, atque adeo qui a scabie, herpete, malo mortuo &c. parum differre credebatur.

Possent in testimonium adduci Medici multi & celebres, quibus plerisque luis venereæ exordia videre contigit, ut Gaspar Torella, anno 1500. in *Dialogo de Dolo in pudendagra*; Vvendelinus Hock, anno 1514. *De Morbo Gallico*, cap. 15. Jacobus Cataneus de Lacu Marcino, anno 1516. *Tractatus de Morbo Gallico* cap. 7. Joannes Manardus, circa annum 1525. in *Epistola ad Michaelem Santannam, Chirurgum*; Joannes Benedictus, circa annum 1550. *De Morbo Gallico*, cap. 4. Gabriel Fallopius, anno 1560. *De Morbo Gallico*, cap. 76. Sed unum instar omnium esse censeo Joannem de Vigo, qui Chirurgiam cum laude exercuit, qui ipsi morbi venerei ingressui coætanæus vixit, qui *Tractatum de eodem affectu* circa annum 1503. conscripsit, ubi sic expressis terminis loquitur, *Practica Lib. 5. de Morbo Gallico, cap. 3. Quicquid boni inventum fuit tam de localibus, quam universalibus auxiliis pro curatione hujusmodi Morbi Gallici, (& crede mihi tanquam experto in tali re) a Theodorico Capitulo de malo mortuo, & Arnaldo de Villanova Capitulo de cura scabiei accepimus.*

Hydrat-
yrum.

Debuit sane Mercurius in unguenta ad luem veneream citissime ad-
mitti

mitti, & ab ipso morbi ingressu, cum Gilinus in *Opusculo de Morbo Gallico*, anno 1497. Torella in *Tractatu de Pudendagra*, anno 1498. Aquilanus in *Tractatu de Morbo Gallico*, anno eodem Benivenius in *Libro de abditis morborum causis*, anno 1507. Vvandelinus Hock in *Libro de Morbo Gallico*, cap. 15. anno 1514. unguenta varia mercurialia laudent vel proponant.

Idcirco vix in eam opinionem adduci possum, ut putem Joannem Carpum, seu ut vero nomine appellem, Joannem Berengarium, Carpenlem, Medicum & Professorem Chirurgiæ Ticinensem, Mercurii in curanda lue venerea adhibendi primum inventorem fuisse, aut ut ait Fallopius, *De Morbo Gallico*, cap. 76. solum coluisse secretam hanc medicinam. Sed facile crediderim & hunc & Joannem de Vigo huic coztaneum egregios fuisse mercurialis therapejæ promotores, qui ea methodo ægrotantes quamplurimos curandos susceperint, & perfecte sanaverint, unde sibi comparavere & famam & divitias opimas. Narrat enim Fallopius de Jacobo Carpenli loco laudato, ita opulentum redditum fuisse solo illo questu, ut moriens testatus fuerit numeratam pecuniam 40000. scutatorum, præter argenteam materiam, quæ omnia Duci Ferrariæ reliquit; omnis enim aqua ad mare currit. Joannes vero de Vigo refert ipse, *Practica Lib. 5. cap. 2. se certum mercuriale sua descriptione ordinatum milles expertum fuisse cum honore & utilitate non parva.*

Initio quidem Medici Mercurium in unguentis cautissime adhibuere, post convenientem præparationem & dosi parcissima, ut qui pro ægrotantibus metuerent a remedio nondum satis explorato. Sic in unguento, quod a Torella proponitur, Mercurius vix cedebat in quadagesimam partem reliquæ materiæ; in decimam quintam vel decimam quartam ad summum in unguentis, quæ a Gilino aut Aquilano proferuntur; demum in unguentis, quæ prostant apud Vvandelinum Hock, ad octavum, quod maximum erat. Parciore quidem erat Mercurii quantitas, sed quæ potuisset prudenter deinde augeri duce experientia, ut auctam fuisse certum est, atque ea ratione pedetentim ad debitam dosim deduci. Sed placuit Empiricis, improbißimo & consideratissimo hominum generi, præcipitantia omnia perdere, nullis præmissis universalioribus remediis Mercurium temere illinendo: Imo cum Mercurium a Medicis parcius illicitum ad curandam luem veneream plerumque inefficacem esse deprehenderent, in contraria peccando ægrotantes nimia & præcipiti hydrargyrosi ita opprimere, ut remedii vehementia mortem obirent non pauci, cæteri vero, qui valentissimi vel felicissimi erant, pyralismo, diarrhæa oris ulceribus, capitis inflammatione confecti. macilentis, luridi, squallidi, edentati, balbutientes, ore obligato capistrati post miserias diuturnas & miserrimas lente convalescerent.

Hinc

Sed parcissima dosi, & cautione maxima.

Fa me-
rhodus
cito in-
famata
sunt Em-
pirico-
rum im-
pruden-
tia, in
quos Me-
dici ac-
riter inve-
sti sunt.

Neque
immeri-
to si Hut-
tenum
audia-
mus.

Hinc factum, ut Medici in Sycophantas tot miseriarum auctores acriter investi sint. *Advertant*, inquebat Gilinus loco supra laudato, *bi qui confidunt in istis imperitis, ut barbitonsoribus, sutaribus, ac cerdo- nibus, & maxime viatoribus, qui nostratum carniunt sunt carnifices* qui humorem facientem morbum non evacuant, sed solum cum localibus has passiones curare volunt. Aromatarii, ajebat Torella in dialogo de dolore in pudendagra, herbarum collectores, caterique mechanici ac vagabundi & impostores. his temporibus hujus mali veras & perfecte curatores seipsos esse profitentur, & quia nihil sciunt, nihil dubitant, & mirabilia pollicen- tur; quos si audires, mortuos suscitare crederes, & paulo post spes ina- nis eris, nam repentina ac insperata mors intercipit.

Neque credes Medicos illos in Empiricos sui temporis acrius stoma- chatos fuisse, si Huttenum audire velis narrantem infortunia syphilitico- rum, qui Mercurio curabantur, quæ ipse miserrima vidit & quorum pars magna fuit, utpote luem venericam per novem annos imple passus, & undecies unctus. Linimento, inquit ille *De curatione Morbi Gallici per ad- ministrationem ligni Guaiaci, capite 4.* ex variis remediis præparato unge- bant brachiorum & crurum juncturas: " Aliqui spinam ac cervicem: non-
nulli tempora etiam, item & umbilicum: Atque iterum alii univer-
sum corpus: Quibusdam semel die, quibusdam bis, nonnullis tertio
iterum die, aut quarto. Claudebantur ægri in æstuario, quod ca-
lebat assidue atque intensissimè, alii viginti, triginta alii totos dies,
nonnulli plures. Perunctum lecto, qui intra æstuarium sternebatur ap-
ponebant, ac multa superinjecta veste sudare cogebant. Ille vix iterum
accepto unguento cepit languescere mirum in modum, tanta ungu-
ti vis erat, ut intra stomachum, quod in summo corpore morbi fuisset,
compelleret, inde sursum ad cerebrum, unde per gulam & os deflue-
bat morbus tanta tamque violenta injuria ut dentes deciderent, qui
non accurate ori intendissent. Omnibus certe exulcerabantur fauces,
lingua & palatum, intumebant gingivæ, dentes vacillabant, sputum
per ora sine intermissione profluebat, omni protinus fœtore olentius,
tanto contagio ut quicquid oluisset, statim inquinaret ac pollueret.
Unde & labia sic contracta ulcus trahebant & intus buccæ vulneraban-
tur. Fœtebat omnis circa habitatio, atque adeo durum erat hoc cu-
rationis genus, ut perire morbo complures, quam sic levare mallent.
Quamquam vix centesimus quisque levabatur, recidivo ut plurimum
ægro, cum vix paucos ad dies duraret ejus juvamentum.

" Hoc autem in unctione miserrimum fuit, *pergit Idem paula post*, quod
qui sic medebantur, medicinam ipsi non callebant. Neque enim Chi-
rurgici hac tantum utebantur, sed ut audacissimus quisque, aut aliis
viderat, aut ipse tulerat, ita circuibat Medicum agens. Uno quopiam

ad

ad omnes unguento utebantur ; & , ut ait ille , uno calces omnes
 calceabant , uno collyrio omnes sanabant . Si quid accideret interim
 ægro , consilii inopia quid suaderent non habebant . Ferebanturque
 latrones , ut in publico errore , cum obmutescentibus Medicis experiri
 omnibus , quid vellent , liberum esset . Itaque nullo ordine aut præ-
 scripto , nisi quod æstu ac vapore cruciabant , similiter omnes nul-
 lius neque temporis neque corporum qualitatis habita ratione cura-
 bantur ægri . Neque incii perunctores , materiam quæ morbi causa
 esset , ducta alvo subtrahebant , aut circa esum ac potum temperan-
 tiam aut ullum victus discrimen indicabant . Tandem eo incommo-
 di res veniebat , ut dentium usus adimeretur , ipsi vacillantibus .
 Os alioqui torum uno occupante ulcere cibi appetentiam , frigesto
 stomacho & turbante fœtore , amitterent ægri . Cumque sitis esset in-
 tolerabilis , tamen quod ad stomachum faceret , potionis genus nul-
 lum inveniebatur . Multis ad vertiginem , quibusdam ad insaniam
 usque infestabatur cerebrum . Tremebant inde non manus tantum ,
 sed pedes etiam & universon corpus , ac lingua balbutiem trahebat ,
 nonnullis immedicabilem . Multos in media curatione interire vidi ,
 & quemdam novi sic medentem , qui tres una die viros agricolas ,
 cum intro hypocaustum plus æquo æstuans conclusisset , ac illi sa-
 lutis , quam sic adepturos se sperabant , studio patientium quam par
 erat consistenter , donec defectis per caloris vehementiam cordibus
 mori non sentirent , misere jugulavit . Alios vidi intumescere ad
 fauces gutture , cum exitum non haberet sanies primum quam in
 sputo deijci oportuit , deinde ipse etiam spiritus suffocari ; quos-
 dam , cum meire non possent , mori . Omnino pauci convaluerunt ,
 arque illi hoc periculo , hac amaritudine , his malis .

Haud igitur mirum est si Guaiacum & lignum sanctum , anno 1517 . Inde fa-
 si radix Chinæ , anno 1535 . si Sarsaparilla eodem circiter tempore ; si
 Salsafra paulo post in orbem nostrum illata miro cum applausu excepta
 fuerint tanquam humani generis fœteria . Credebantur enim miserrimos
 ægrotantes & a morbo difficili & a remedio morbo difficiliore libera-
 tura . Sed o spes hominum fallaces ! Brevi compertum fuit lues vene-
 reas dari non paucas adeo virulentas , vel inveteratas adeo , ut elusa omni
 remedium illorum exoticorum efficacia soli cederent hydragyrosi le-
 gitimæ . Sic statuebat Alfonsus Ferrus anno 1538 . *Lib. de ligno sancto , cap. 6.*
Ad inunctiones Mercuriales veniendum esse postquam ex medicina ligni sancti
bis terve sumpta cognitum fuerit ægrotum non convalescere . Sic Fallopius Tra-
ctatu de Morbo Gallico cap. 76. referebat anno 1560. se vidisse adolescen-
tem laborantem Gallico , in quo omnia regia (hoc est medicinæ ex Guaiaco
China &c.) inselicitè experta sunt , quem Empiricus hydrargyro curavit .
Quare

Inde fa-
 ctum ut
 Guaiacum
 radix Chi-
 næ , sarsa-
 parilla , & sal-
 safras
 miro
 cum ap-
 plausu
 excepta
 fuerint
 aliquan-
 diu .

Quare pergit ille, in rebellibus affectibus & desperatis usus sum & præcipue, cum tentarim prius alias vias per omnia genera medicamentorum.

Sed com-
perta li-
gnorum
illorum
ineffica-
cia ad
hydras-
gyrosim
redeun-
dum fuit.

Itaque magis explorata semel iteratis experientiis Guaiaci & Chinæ vi, meliusque cognita eorumdem inefficacia, atque adeo remediis illis in dies vilefcentibus, necesse fuit Medicis, ut quibus jam nulla alia efficacia remedia suppetere, inunctiones mercuriales, aliquandiu si non omiffas, at certe neglectas, ad usum revocare. Rem totam ingenue confitetur Antonius Fracantianus, in Libro de Morbo Gallico, quem anno 1564. edidit. *Alius, inquit, sanationis modus habetur ex inunctionibus hydrargyrum recipientibus, quæ quidem licet quandoque sanare videantur, tamen tanquam nimis violentum & periculosum, jam non erat amplius in usu, sed nunc secundus agitur annus Morbo Gallico rebeli & contumaci maxime facto, quod multi sunt coacti, & quidem doctissimi vi-ri, iterum ad prædictas inunctiones devenire.*

Abhinc Mercurium & omnia Mercurialia præparata sub Medico censu retinere, tamquam vera luis veneræ rhizotoma; iis fidere, iisque uti, sed ea prudentia, qua par erat; denique mercuriales inunctiones adhibere, sed cautiore & tutiore methodo Medicis omnibus in Europa solenne fuit. Usus vero decoctorum ex Guaiaco, radice Chinæ, Sarfa-parilla, Sassafras &c. huc tandem omnis recidit, ut ad morbos veneræ, locales, incipientes, leves propinentur, vel ad summum, nec unquam nisi præmissis Mercurialibus, ad eas luis veneræ species, quæ cum strumosa vel scorbutica constitutione implicatæ sunt, ut suo loco videbimus.

Duplex
Mercurii
usus, ex-
terior &
interior.

Moris fuit Mercurio uti duobus modis, vel foris cuti illito aut quomocunque admoto, vel intro ore sumpto devoratoque.

Primo. Exterior Mercurii usus ingressu luis veneræ antiquior, hujus morbi curationi ex analogia tantum accommodatus est, uti modo diximus. Suam in illo administrando methodum veteres olim habuere; suam recentiores hodie habent non parum disparem.

Mercurius
foris
adhibetur
triplici
forma.

Lini-
menti si-
ve un-
guenti.

I. Mercurius extrinsecus olim adhibebatur triplici forma, nempe unguenti sive linimenti, emplastri sive cerati, & demum suffumigii.

1. Linimenti basis erat Mercurius extinctus, ea quantitate ut sextam vel octavam reliquæ materie partem constitueret. Ne vi frigida, qua pollere putabatur, nervis noceret obstupefaciendo vel relaxando, adhibebantur sexcenta alia e numero calefacientium, attenuantium, discutientium, rarefacientium, incidentium &c. ut axungie; adipisve porci, anseris, ursi &c.; medullæ butyrumve; oleum chamæmelinum, anethinum, laurinum, rutaceum, mastichinum, vulpinum, lumbricorum terrestrium, petrolzum; ciclamen, aristolochia, staphysagria; radices zedoariæ, ebuli, enulæ campanæ, bryoniæ, iridis florentinæ; pirethrum, zingiber; bdellium, euphorbium, ammoniacum, aloë, styrax, mastiche;

lithar-

lithargyrium, sulfur vivum, tartarum rubrum, cineres famentorum, theriaca &c. quæ singula diverso numero & dosi in variis linimentis varia, in mortario probe comminuta & commista in formam linimenti subigebantur. Unguento istiusmodi calide ad ignem illinebant artuum juncturas, artusque usque ad axillas vel inguina, imo corpus universum, abstinendo tantum a partibus, quas *principales* vocabant, nempe ab abdomine, thorace, & capite, sic pluries iterando donec manifesta imminerent ptyalisimi indicia.

2. Materies cerati sive emplastri mercurialis eadem erat ac linimenti, hoc uno tantum discrimine quod parcius esset axungie quantitas, Cerati
sive em-
plastri. cera vero suppleret quod de axungie quantitate decedebat, ut ea ratione emplastro debita firmitas conciliaretur. Famosum & uxu maxime receptum olim fuit Ceratum a Joanne de Vigo descriptum, *Prælicæ Lib. 5. cap. 2.* quod se *millies expertum esse ait cum honore & utilitate non parva*, & quod dicit *elise nobilissimæ operationis*. Hujus formula obvia est in pharmacopæis omnibus nomine *Emplastri de Vigo*, sed in quo componendo solet augeri adhibiti Mercurii quantitas, seu ut ajunt, *quadruplicari*. Hoc emplastro seu cerato super alutam extenso artuum juncturas, artus ipsos, totumque corporis habitum contegebant, exceptis ut modo dictum de linimento, venire; thorace & capite, neque detrahebant nisi prima apparerent imminenti ptyalisimi indicia.

3. Suffitus ex simili parabantur materie, nempe ex Mercurio saliva aut terebinthina extincto, vel Cinnabari, quibuscum admiscebantur alia, quæ oleosa & pingui qualitate igni concipiendo fovendoque, fumoque emitendo paria essent: 1. Resinæ vel gummata, ut thus, mastiche, olibanum, myrrha, styrax, benjuinum, opopanax, gummi juniperi &c. 2. Aromatica, ut nux moschata, macis &c. 3. Ligna pingua, ut aloes, juniperi, pini, santalorum &c. quæ singula pulverata vel mucilagine tragacanthi formabantur in trochiscos, vel terebinthina excipiebantur in formam opiatæ: Cum iis utendum erat, ægrum plane nudum in conopeo, papilione, seu laconico, vulgo *l'arçhet*, stantem vel sedentem, conclusio vel exerto capite pro ratione virum constituebant; in appositum ad pedes crucibulum prunis candentibus plenum, per fenestram ad hunc usum paratam, aliquot suffumigii trochiscos vel tabellas per vices conjiciebant, ita ut fumo exhalanti æger tandiu totus exponeretur, dum sudor eliceretur copiosus, nisi forsan immineret deliquii periculum. Ægrum inde deductum in lecto calido collocabant, & stragulis tegebant, ut sudor uberius provocaretur, quem post horam unam aut alteram probe abstergebant, ut æger nutrimentum fumeret, sic per dies aliquot iterando quotidie, donec ptyalisimus appareret.

Quid usu
mutatum
sit in tri-
plici illo
Mercurii
toris ad-
hibendi
modo?

II. At vero in illis methodis haud pauca emendata sunt & in melius revocata rerum usu & ævi posterioris diligentia.

1. Sic jam pridem obsolevit usus obtegendi totum corpus emplastris ad provocandum pytalismum, tum quod inde cutis calens, rubefacta, erysipelatoſa in puſtulas ſeu eſthymata pruriginofa exaſperaretur, cum maximo ægri tædio, nec ſine febris periculo; tum maxime quod ea methodus tarda & ad movendum pytalismum parum efficax eſſet, propter Mercurium a cera cæteraque craſſiore emplaſtri materie ſtrictius irretitum. Solent tamen emplaſtra eadem certis & peculiaribus locis etiamnum applicari, ſi tumor durior, ſkirrhus, ganglion, nodus, exoſtoſis reſolvenda ſint, aut dolor veneris fixus dilcutiendus.

2. Sic etiam jam pridem ceſſatum eſt in uſu ſuffumigiorum, ut quæ ægros peſſime haberent, ſudoribus incaſſum conſicerent, pytalismum plerumque inefficacem moverent, maxime vero capiti & pulmonibus plurimum nocerent, ſi exciperentur capite intra laconicum incluſo, ut moris erat. Suffumigia tamen aliquando etiamnum adhibentur, ad reſolutionem ſkirrhi, ganglii, exoſtoſeos, vel doloris veneris in parte quadam fixi, ut modo dictum de emplaſtris mercurialibus.

3. Sic demum linimentum ſeu unguentum mercuriale, quod ſolum nunc uſu viget ad promovendam ſalivationem, ſimpliciore quam olim methodo dudum præparatur: Excluſa nempe inutili, imo noxia illa calefacientium & incidentium ſarragine conſicitur ex ſolo Mercurio puriſſimo, & ſi fieri poſſit, e cinnabari redivivo, ſaliva ſola vel pauciſſima terebinthina extincto, cum axungia porcina recente, non ſalita, in mortario diu trito, piſto, ſubaſto. Poſteſt autem Mercurii proportio ad axungiam varia eſſe, ut Medico viſum fuerit: Sed niſi in contrarium imperetur, ſolet ut plurimum eſſe ut 1. ad 1. ita ut unguentum ex æqualibus Mercurii & axungiz partibus; vel ut 1. ad 2. ita ut unguentum ex una Mercurii & duabus axungiz partibus componatur.

Quæ cau-
tiones
jam ad-
hibean-
tur in
admini-
ſtranda
hydrar-
gyroſi?

Conſtans nunc eſt Medicorum ſere omnium ſententia illitionibus mercurialibus rarius vel frequentius, pluribusque vel paucioribus utendum eſſe pro ægri ætate, temperie, viribus; morbi natura, gravitate, inveteratione; affectuum una implicatorum qualitate aut vehementia. Sunt nempe quos oporteat quotidie inungere, ut uber pytalismus proliciatur; ſunt quos altero, tertio aut quarto quoque die, ut pytalismus levior ſit; ſunt demum quos tantum octavo quoque die, ut nullus cieatur pytalismus imo quos identidem purgare expediat, ſi pytalismus apparuerit, ut deturbata ad inferiora materia, arceatur ſalivatio imminens, vel incipiens ſupprimatur.

Cautio-
nes ex-
dem An-

Sed eædem cautiones neque olim ignorabantur a Medicis, qui cordati erant, ut abunde liquet ex Vvandelino Hock, anno 1514. *De Morbo Galli.*

Gallico cap. 15. Joanne Almenar, 1516. De Morbo Gallico cap. 4. & 6. tiquiori-
Petro Maynardo, 1518. De Morbo Gallico cap. 3. Aloysio Lobera, 1540. bus olim
De Morbo Gallico cap. 11. Guillelmo Rondeletio, 1560. De Morbo Italico, notę fue-
cap. de Unguentis. Nicolao Massa, 1563. De Morbo Gallico, Tractat. 4. a plenis-
cap. 2. & 4. Julio Palmario, 1578. Lib. de Hydrargyro, cap. 7. Ambrosio que lau-
Parzo, 1585. Operum Libro 19. cap. 12. qui omnes jubent & inunctio- datz.
 nes fieri tantum tertio vel quarto quoque die, ne salivatio moveatur, & salivationem, si nimia sit, imo quandoque si appareat, cathartici exhibitione cohiberi.

Secundo. Paulo tardius ceptum est Mercurio uti ad interiora: Obstatat *Ufus*
 procul dubio Antiquiorum auctoritas, qui statuerant quasi ex tripode hy- *Mercurit*
 drargyrum *potum vim pernitiālem habere, & interanea suo pondere perrodere.* interior,
 Sed demum facto periculo, ubi compertum fuit Veteres ea in re falsos *olim du-*
 esse, mos sensim invaluit Mercurium intro sumendi multiplici forma. *plex tan-*
tum.

1. Debetur locus antiquissimus Mercurio præcipitato rubro, hoc est solutione in aqua stygia, vaporatione ad siccitatem & candefactione in pulverem rubrum redacto, seu ut loqui amant, præcipitato. Ea quidem præparatio descripta prostat apud Joannem de Vigo circa annum 1503. in *Nempe*
Antidotario seu Lib. 8. Practicę cap. 13. Sed Joannes de Vigo, cum corrosi- *forma*
 vę hujusce præparati acrimonię probe gnarus elset, pulverem hunc *præcipi-*
rum inter phagedænica, quę fungosis ulcerum carnibus mederentur, re- *tati ru-*
 ferendum esse ipse fatebatur. *brī, seu*
Isse pulvis, inquit, licet inter medicamina cer- pulveris
rosiva domesticę corrosivis possit connumerari, quoad ejus effectum inter rubei Jo-
fortiora corrosiva primi ordinis connumerari potest. Et audeo dicere, per- annis de
git ille, quod hujusmodi pulvis inter medicamina corrodentia carnem ma- Vigo.
lam, meretur ferro coronam: Et propterea dico quod est secretum secreto- rum
corrodentium medicamentorum, cum quo in tempestate nostra multas lu- tratus sum pecunias, & honores non parvos consecutus.

Mirum inde forsā videbitur, nec immerito, ut opinor, id ipsum remediū genus ab eodem Vigone intrinsecus præscribi, *Chirurg. Compend.*
Lib. 5. adversus pestem, tanquam mirabilem & egregiam Medicinam ad
dosim granorum iij. vel iv. cum theriaca: Imo vero proponi ibidem
& Copios. Lib. 2. cap. 20. ad dolorem colicum, tanquam acceptum a
fide digna persona, ad dosim granor. ij. cum scrupulo j. Diacymini,
vel cum 3 g. Philonii Persici. Nullus quidem dubito quin ea opinio
de mercurialis pulveris usu in dolore colico fluxerit primum a Paulo
Ægineta, apud quem legere est, Lib. 7. de re Medica, argentum qui-
dem vivum ad medicum usum non adsumi, cum venenum existat, verum
ustum & in cineres redactum aliisque speciebus permistum quosdam colicis
& iliacis bibendum dedisse. Sed certissimus sum pulverem ejusmodi ad
sanam Mercurio pariendam infelicissime delectum fuisse, cum enim

natura drasticus sit, adeoque vehementissima & periculosa operationis, præconceptis præjudiciis fovendis potius quam elevandis comparatus fuisse.

Ignoratur quo successu pulvis ille rubeus & in peste & in dolore colico a Vigone olim adhibitus fuerit, si tamen credere est adhibitum unquam fuisse. At certe constat numquam ab eodem in morbis ullis veneris intro usurparum esse, sed foris tantum, *Copiosa Lib. 5. cap. 1.* ad virgæ pustulas seu conicrosa penis ulcuscula, eodem plane modo, quo solenne est eodem hodie etiam uti.

Notis fuit ejusdem pulveris processus Nicolao quoque Massæ, circa annum 1536. quem Joanni de Vigo se non acceptum debere gloriatur, sed a quodam alio viro Alchimista sene accepisse, qui ut ille ait, *De Morbo Gallico, Tractatu 6. cap. 6.* erat mirabilis experimentator. Hunc quidem pulverem angelicum vocandum censet propter mirabilem ejus operationem, & angelicum in Morbo Gallico..... Huic enim medicamini, subdit ille, non est par, quoniam si cum ipso procedes, usque ad perfectam cuius generationem ducit, ut ego sæpe expertus sum, & est nobile in virgæ ulceribus malignis. Sed vel inde liquet Nicolaum Massam, sicut Joannem de Vigo, Mercurio præcipitato rubro extrinsecus tantum usum fuisse.

Primus antiquiorum Medicorum, quos noverim, si forte non solus, Petrus Andreas Matthiolus fuit, qui in *Opusculo de Morbo Gallico* circa annum 1536. pulverem illum ad interiorem usum adducere ausus sit, sed quem prius ideo jubebat probe lavari aquis stillatitiis plantaginis & acetosæ, & aliquandiu ignis tortura exsiccari, quoniam, ut aiebat, ex pulvere isto plurimæ possent contingere noxæ assummentibus ipsum, nisi prius debita facta esset præparatio. Hunc autem pulverem ita præparatum in catapodio præscribebat ad grana v. & illius usu asseribat fore ut dolores Gallici brevi eliderentur, pituita, ut aiebat, & atra bile vomitu nec non alvi defectione evanescente. Proponebat etiam usum ejusdem medicamenti tanquam efficacissimi ad pestem, quartanam contumacem, melancholicum morbum doloresque colicos & iliacos.

Sed in his sectatores nullos inter Medicos Matthiolus olim habuit, censeo vero multos, ut Hieronymum Fracastorium, anno 1546. *Lib. 3. de Morbis contagionis, cap. 10.* Gabrielem Fallopium, anno 1560. *Tractatus de Morbo Gallico cap. 79.* Alexandrum Trajanum Petronium, anno 1565. *Lib. 6. de Morbo Gallico, cap. 23.* Michaellem Joannem Paschaliu, anno 1566. in *Opusculo de Morbo Gallico*. Julium Palmarium, anno 1578. *Lib. de Hydragyro, cap. 6. &c.*

Et nativa forma
in pilulis
Barbarossa.

II. Præcipitato rubro successit Mercurius nativa forma, seu, ut ajunt, crudus, qui olim adhibitus fuit in famosis pilulis mercurialibus Barbarossæ, ideo, ut opinor, dictis, quod iis usus esset Chairedinus ille Barbarossa

barossa, Rex Algerii & rei maritimæ apud Turcas Præfectus, Francisco I. Gallorum Regi suppar. Et sane constat testimonio Petri Bayri, Medici Caroli II. Ducis Sabaudicæ, in *Enchiridio de medendis corporis affectibus, capite de doloribus musculorum ex Morbo Gallico genitis*, circa annum 1537. edito, receptam illarum pilularum fuisse ex Turcia apportatam.

Hæc autem erat ratio pilulas hæc conficiendi juxta Bayrum.

R. Argenti vivi 3xxv.

Rhabarb. elect. 3x.

Diagrid. 3ij.

Moschi & ambre ana 3j.

Farina frumenti, 3ij.

Cum succo limonum s. massa pilularum, ex qua formenter pilula magnitudine ciceris, & detur una pro vice omni die per boram ante cenam.

Refert Bayrus hæc pilulas contra Morbum Gallicum in aliquibus (ex ulceribus & nodositasibus multum exterminatis) mirabilem fecisse operationem; neque tamen dissimulat primum, qui inter Christianos bis usus est pilulis, cecidisse repente mortuum super pontem Avenioni, cum ipse ibi profugus esset propter prælia, anno 1537. Grave quidem infortunium! sed quod pilularum illarum usui attribui jure nequaquam potuit, cum unicuique vix inessent quatuor grana Mercurii; quod tamen pilulis illis ex præjudicio attributum fuisse non miror, cum Rondeletius, qui & ipse pilulas easdem, sub alia tamen, sed parum diversa formula proponit in *Tractatu de Morbo Italico*, advertat quod, si post decem annos aliquo morbo corriperebantur qui hoc remedio usi essent, huic impingeretur ac imputaretur.

III. At jam quidcumque ad internum Mercurii aut Mercurialium usum pertinent, in melius relata sunt, quandoquidem Pharmacia inventis Chemiæ locupletata multa & efficacia Mercurii præparata nunc suppetunt, quibus uti tuto licet, si ita e re esse Medico videatur.

1. Mercurius sublimatus dulcis, sive Aquila alba, cujus dosis a granis xij. ad xx. vel xxiv. si usus aliquoties repetatur, sanguinem mundificat, virus oppugnat, alvum subducit, ac demum præalissimum movet.

2. Panacea Mercurialis, cujus dosis a granis xv. ad xxx. quæ alvum quidem non subducit, si rite præparata sit, sed repetita præalissimum excitat.

3. Æthiops mineralis vulgaris cum sulfure communi tritu, seu quod præstat, igne paratus. Dosis est a granis xv. ad xxx. non purgat, imo neque salivationem ullam plerumque ciet, præsertim si solo tritu confectus fuerit, quoniam mercuriales atomi tunc male colligatæ ventriculi calore in guttas facile coeunt, quæ tum mole tum gravitate ab ingressu in venas lacteas excluduntur.

K

4. Æ.

Nunc
vero
multi-
plex, cum
Pharmacia
inven-
tis
Chemiæ
locuple-
tata sit.

natura drasticus sit, adeoque vehementissima & periculosa operationis, præconceptis præjudiciis fovendis potius quam elevandis comparatus fuisse.

Ignoratur quo successu pulvis ille rubeus & in peste & in dolore colico a Vigone olim adhibitus fuerit, si tamen credere est adhibitum unquam fuisse. At certe constat numquam ab eodem in morbis ullis veneris intro usurpatum esse, sed foris tantum, *Copiosa Lib. 5. cap. 1. ad virgæ pustulas seu conerosa penis ulcuscula*, eodem plane modo, quo solenne est eodem hodie etiam uti.

Notis fuit ejusdem pulveris processus Nicolao quoque Massæ, circa annum 1536. quem Joanni de Vigo se non acceptum debere gloriatur, sed a quodam alio viro Alchimista sene accepisse, qui ut ille ait, *De Morbo Gallico, Tractatu 6. cap. 6. erat mirabilis experimentator*. Hunc quidem pulverem angelicum vocandum censet propter mirabilem ejus operationem, & angelicam in Morbo Gallico..... Huic enim medicamini, subdit ille, non est par, quoniam si cum ipso procedes, usque ad perfectam cutis generationem ducit, ut ego sæpe expertus sum, & est nobile in virgæ ulceribus malignis. Sed vel inde liquet Nicolaum Massam, sicut Joannem de Vigo, Mercurio præcipitato rubro extrinsecus tantum usum fuisse.

Primus antiquiorum Medicorum, quos noverim, si forte non solus, Petrus Andreas Matthiolus fuit, qui in *Opusculo de Morbo Gallico* circa annum 1536. pulverem illum ad interiorem usum adducere ausus sit, sed quem prius ideo jubebat probe lavari aquis stillatitiis plantaginis & acetosæ, & aliquandiu ignis tortura exsiccari, quoniam, ut aiebat, ex pulvere isto plurime possent contingere noxæ assumptibus ipsum, nisi prius debita facta esset præparatio. Hunc autem pulverem ita præparatum in cataportio præscribebat ad grana v. & illius usu asserebat fore ut dolores Gallici brevi eliderentur, pituita, ut aiebat, & atra bile vomitu nec non alvi dejectione evanescente. Proponebat etiam usum ejusdem medicamenti tanquam efficacissimi ad pestem, quartanam contumacem, melancholicum morbum doloresque colicos & iliacos.

Sed in his sectatores nullos inter Medicos Matthiolus olim habuit, censores vero multos, ut Hieronymum Fracastorium, anno 1546. *Lib. 3. de Morbis contagionis, cap. 10.* Gabrielem Fallopium, anno 1560. *Tractatus de Morbo Gallico cap. 79.* Alexandrum Trajanum Petronium, anno 1565. *Lib. 6. de Morbo Gallico, cap. 23.* Michaellem Joannem Paschaliū, anno 1566. in *Opusculo de Morbo Gallico*. Julium Palmarium, anno 1578. *Lib. de Hydrargyro, cap. 6. &c.*

Et nativa forma
in pilulis
Barbato-
rossæ.

II. Præcipitato rubro successit Mercurius nativa forma, seu, ut ajunt, crudus, qui olim adhibitus fuit in famosis pilulis mercurialibus Barbato-rossæ, ideo, ut opinor, dictis, quod iis usus esset Chairedinus ille Barbatossa

barossa, Rex Algerii & rei maritimæ apud Turcas Præfectus, Francisco I. Gallorum Regi supp̃ar. Et sane constat testimonio Petri Bayri, Medici Caroli II. Ducis Sabaudia, in *Encbiridio de medendis corporis affectibus*, capite de doloribus musculorum ex Morbo Gallico genitis, circa annum 1537. edito, receptam illarum pilularum fuisse ex Turebia apportatam.

Hæc autem erat ratio pilulas hæc conficiendi juxta Bayrum.

℞. Argenti vivi 3xxv.

Rhabarb. elect. 3x.

Diagrid. 3iij.

Moschi & ambra ana 3j.

Farina frumenti, 3ij.

Cum succo limonum s. massa pilularum, ex qua formenter pilulae magnitudine ciceris, & detur una pro vice omni die per boram ante cenam.

Refert Bayrus hæc pilulas contra Morbum Gallicum in aliquibus (ex ulceribus & nodositatibus multum exterminatis) mirabilem fecisse operationem; neque tamen dissimulat primum, qui inter Christianos bis usus est pilulis, cecidisse repente mortuum super pontem Avenioni, cum ipse ibi profugus esset propter prelia, anno 1537. Grave quidem infortunium! sed quod pilularum illarum usui attribui jure nequaquam potuit, cum unicuique vix inessent quatuor grana Mercurii; quod tamen pilulis illis ex præjudicio attributum fuisse non miror, cum Rondeletius, qui & ipse pilulas easdem, sub alia tamen, sed parum diversa formula proponit in *Traſſatu de Morbo Italico*, advertat quod, si post decem annos aliquo morbo corriperentur qui hoc remedio usi essent, huic impingeretur ac imputaretur.

III. At jam quidem quæcumque ad internum Mercurii aut Mercurialium usum pertinent, in melius relata sunt, quandoquidem Pharmacia inventis Chemicæ locupletata multa & efficacia Mercurii præparata nunc suppetunt, quibus uti tuto licet, si ita e re esse Medico videatur.

1. Mercurius sublimatus dulcis, sive Aquila alba, cujus dosis a granis xij. ad xx. vel xxiv. si usus aliquoties repetatur, sanguinem mundificat, virus oppugnat, alvum subducit, ac demum pyralismum movet.

2. Panacea Mercurialis, cujus dosis a granis xv. ad xxx. quæ alvum quidem non subducit, si rite præparata sit, sed repetita pyralismum excitat.

3. Æthiops mineralis vulgaris cum sulfure communi tritu, seu quod præstat, igne paratus. Dosis est a granis xv. ad xxx. non purgat, imo neque salivationem ullam plerumque ciet, præfertim si solo tritu confectus fuerit, quoniam mercuriales atomi tunc male colligatæ ventriculi calore in guttas facile coeunt, quæ tum mole tum gravitate ab ingressu in venas lacteas excluduntur.

K

4. Æ.

Nunc
vero
multi-
plex, cum
Pharmacia
inventis
Chemicæ
locuple-
tata sit.

4. *Æthiopes alii minerales numero multi, qui parantur e Mercurio iterato tritu cum pinguibus, resinosis aut gummosis quibuscunque corporibus subacto & extincto. Solent illi Æthiopes pro diversa additi remedii facultate diversis notari nominibus non sine ostentationis suspicione, verbi gratia Mercurii alkalisati, si cum pulveratis ostrearum testis; Mercurii anti-phibisi, si cum balsamo Peruviano sicco; Mercurii anti-scorbutici, si cum gummate Guajacano; Mercurii vidi dulcis, si cum manna calabrina; Mercurii diuretici, si cum gummate juniperino vel ammoniaco; Mercurii cathartici, si cum scamonio aut resina jalappii Mercurius subigatur &c. Sed horumce singulorum efficacia opinione plerumque minor, quod mercuriales atomi laxè coercitæ sponte reviviscant in ventriculo in majores guttas, quarum pancæ, imo forsan nullæ sanguinem subeunt.*

5. Mercurius violaceus seu Mercurius arte sublimatus ex Æthiope minerali igne præparato & cum æquali salis ammoniaci parte commixto. Hujus dosis a gr. xx. ad xxx. Blandior est, at vero simul penetrantior Æthiope minerali.

6. Mercurius præcipitatus albus ex Mercurio aqua forti vel spiritu nitri soluto & affusa muria præcipitato paratus, tepidaque optime elorus. Remedii quidem genus & efficax & satis tutum, quod si cum quadruplo iacchari commisceatur & ad dosim vj. ix. vel xij. granorum præscribatur, alvum subducit, & plerumque vomitum blande movet.

7. Ptilana sudorifica vulgaris ex decoctis Guajaco, Salsa-parilla, China &c. præparata, & soluto Mercurio sublimato dulci vel panacæ Mercuriali saturata ad optatam dosim. Experientia enim compertum est præparata Mercurialia istiusmodi, in ptilana cæterisque liquidis aqueis ebullitione ex toto dissolvi contra vulgarem opinionem, si quod prima vice indissolutum superest, quodque duas tertias partes totius in summa æquat, iterum iterumque supra porphyritem lavigetur, ac ebullienti liquori iterum iterumque infundatur.

8. Solutio Mercurii per deliquium parata mediante tantum sale ammoniaco, & aquæ instar pellucida, cujus processus explicabitur infra Lib. 4. cap. ultimo. Potest tuto quidem ea solutio ore exhiberi, ut cui nihil omnino insit, quod facultate, nedum corrosiva, sed ne aciore quidem peccet: At vero solet nullo vel minimo successu plerumque exhiberi, quod perpaucam Mercurii soluti copiam in se contineat, quæ nec ipsa forte tota potest in sanguinem penetrare.

Quantumvis
etiam
nullo loco
habe-

IV. Haud satis novi an inter remedia quæ ad morbos venereos faciunt, connumerari debeant Arcana multigena, quæ ab Agyptis & Circumforaneis magnifice venduntur, ut stolidum vulgus deludant, quippe pleraque vel inefficacia sunt, atque ideo probati remedii ne nomen quidem

dem merentur, vel quod pessimum est, acriora sunt & deleteria, atque ideo habent vim veneni. Porro autem ut varia est multiplex Agyrtarum gens, maxime Lutetiae, quo velut agmine undique confluunt, sic etiam varium est & multiplex arcanorum genus, quibus superbiunt. Si qua utilia sint & virtute aliqua polleant, quod tamen rarissimum, dudum nota sunt, & in Medicorum libris passim obvia, sed quae de industria fucare ipsi amant, ut possint agnolci. Cætera meræ quiskuliz sunt, vel quod deterrimum, nec tutæ, nec innocuæ. Possunt autem fere cuncta, quæ ab illo hominum genere proposita novi, ad sequentia revocari.

antur ar-
cana
multige-
na, quæ
ab Agyr-
tis satis
temere
vendi-
tantur.

1. Panaceas mercuriales multiplices, quæ licet processu operosiore præparentur vel præparari dicantur, vulgari nihilo efficaciores sunt. Inter cæteras commendatur 1. Panacea solaris & lunaris Michaelis de la Vigne, Medici Regii Parisiensis a Friderico Hoffmanno laudata, *Pharmacopœa Medic. Chymica Lib. 3. cap. 15. §. 22.* 2. Panacea N. de la Brune a Gervasio Ucay D. M. Tolosano descripta *Traité de la Maladie Vénérienne*, ad libri calcem, & a Joanne Devaux Chirurgo Parisiensi, *Tome 3. de l'Abbrégé de la Médecine pratique de J. Allen.* Cujus utriusque Panaceæ processus infra proponentur *Lib. 4. cap. ultimo.*

2. Solutionem Cinnabaris vel præcipitati Mercurii rubri in menstruo quodam corrosivo seu aqua forti correctæ, qualis est spiritus ille, qui Lutetiae *Les Gouttes du General la Motte* dicitur, unde paratur Tinctura rutilans, purpurea, carbunculo concolor, cujus guttæ aliquot aqueo vehiculo, infuso *verbi gratia* foliorum Theræ instillantur ad usum quotidianum per mensem unum aut alterum, nullo quidem quod sciam periculo, sed nullo quoque successu.

3. Præparata Mercurialia ex acriorum genere, nempe Mercurium præcipitatum rubrum; luteum sive Turpethum minerale; præcipitatum viridem sive venereum; arcanum corallinum &c. quæ ad debellandam luem veneream numquam sufficiunt, periculi vero semper plena sunt quod corrosiva, caustica, deleteria sint, atque adeo, nisi caute & in robustis adhibeantur, viscerum anxietates, inflammationes, erosiones, hypercatharses, hyperemetos, cardialgiam, spasnum, syncopen lethalem non raro advocant.

4. Præcipitatum rubrum solare, per se & sine menstruo confectum, qualis a Gervasio Ucay describitur, *Traité de la Maladie Vénérienne, chap. 8.* cujus processus infra proponetur *Lib. 4. cap. ultimo.* Quod remedii genus, licet paulo blandius agat præcipitato rubro vulgari, neque tamen ipsummet satis tutum est.

5. Aquas mercuriales, quas illi parant gemina methodo. 1. Guttas viij. x. vel xij. solutionis sublimati corrosivi unciis octo decocti hordei vel avenæ infundendo & ægris ore exhibendo per aliquot dies, a quo

peſſimo facinore non abſtinent Agyrtæ Londinenſes nonnulli, ſi fides adhibenda ſit Richardo Vviſeman, *Treatiſe of lues venerea*, chap. 3. pag. 10. & Danieli Turner, *Differtation on the venereal Diſeaſe*, pag. 99. 20. Semunciam, imo unciam unam aut alteram ſolutionis Mercurii in ſpiritu nitri affundendo libris duabus piſtanæ ſudorificæ, quas mane jejunò ventriculo ægrotantibus propinandas exhibent, quod ſcelus cum præcedente ferme compar refert de Chirurgo quodam Pariſienſi Joannes Devaux, ipſe quoque Pariſienſis Chirurgus, in præceptis generalibus, quæ ſubjunxit ad calcem *Synopſeos univerſæ Medicinæ* J. Allen, quam e Latina Gallicam fecit anno 1728.

CAPUT VIII.

Qualis ſit Mercurii & Mercurialium vis & efficacia, & quæ illius efficacia cauſa?

Effectus
Mercurii
in huma-
no cor-
pore.

EXperientia compertum eſt, quod ſane ratio nunquam ſuggeſſiſſet, nempe Mercurio, ſeu * intro ſumatur chimice præparatus in pulveres tuto potabiles, ſeu extinctus & æxungia exceptus corpori foris illinatur, varios & multiplices effectus produci.

1. Sanguinem, ſingulaſque ſanguinis partes atteri, comminui, liquari, atque inde morboſo lentiori tum rubræ tum limphaticæ cruoris partis efficacem medicinam fieri.
2. Vaſa quæcumque corporis, ſanguifera; limphatica, ſecretoria & excretoria, etiam minima & indefinite parvâ pervadi; ſi qua infartæ ſint, liberari gravamine; ſi qua obſtructa, reſerari; atque adeo omnia libere pervia effici.
3. Cordis & arteriarum pulſum majorem, validiorem, pleniorẽ reddi; at vero ſimul etiam molliorem, æquabiliorem, magis eurithmum, ita ut diaſtoles, ſyſtoleſque, ſingulæ ſingulis magnitudine, duratione, celeritate, intervallo &c. perfecte conſonent.
4. Secretionum, quæ a ſanguine fiunt, ubertatem promoveri maxime humorum qui ſeroſi ſunt aut limphatici, ut urinz, ſudoris, limphæ ſtomachalis & inteſtinalis, ſalivæ &c.
5. In ore præcipuam ſcenam eſſe, cujus interiora calent, rubent, dolent, in papulas arealve eryſipelatodæas tument, rimas ulcerofas agunt, phlyctænis phagædenicis dehiſcunt, & ulcuſculis ſerpentibus, quæ in me-

* Noverat quidem Ferneliuſ ſalivationem hydrargyro foris illito moveri, ſed neſciebat intro ſumpto perinde exitati. *De Lue venerea Cuiat. ſep. 71*

medio candicant, depascuntur, unde salivæ spissæ, viscosæ, limpidae & albumini ovorum similis uber effluxus seu *Pyralismus*.

6. Invalescente pyralismo secretiones cæteras quæcumque imminui & supprimi, exceptis ad summum diuresi & diaphoresi; imo vero ne illis quidem exceptis, quandoquidem constat & eas multo uberiores futuras esse, si salivatio vel nulla vel parcior foret.

7. Aliquando tamen, sed raro nullam, vel perexiguam salivationem cieri, & oris interiora nullomodo vel parum affici, quamvis cæteroqui Mercurius & debita dosi & modo debito adhibeatur: Sed tunc plerumque paulo largiores esse vel cæteras omnes secretiones, vel saltem unam alteramve, quæ idcirco sunt velut vicariæ deficientis salivationis.

8. Inde sive salivatio succedat sive deficiat, dummodo legitima fuerit Mercurii administratio, intra mensem resolvi partium tumores, ganglia, nodus, tubercula, exostoses, hyperostoses; discuti dolores rheumaticos, arthriticos, ischiadicos, qui ab impura venere ortum ducunt; sanari cutis pustulas, rhagades, ulcera; cohiberi ossium caries, & ad calum properare; ac demum quod in votis est, sanguinem ab omni semini venerei labe purum & immunem præstari.

Effectus illi sunt oppidò mirabiles, & in medicina non ante visi, Explicari possunt ex notis Mercurii nec qui ab insulso & inodoro corpore, qualis est hydrargyrus, videntur expectandi. Eos tamen e notis Mercurii qualitatibus facili mechanismo deduci posse confidimus; modo diligenter attendatur ad Mercurii qualitates sequentes Mercurii proprietates, quæ usu obviæ & experientia confirmatæ sunt.

Postulatum I. Mercurium substantiam esse metallicam, fluidam, mobilem, ponderosam, a vi premente, conterente, comminvente in guttas indefinite parvas divisibilem.

Postulatum II. Discretas guttas singulas globosam figuram natura assectare, eo quidem perfectius sphericam vel ad sphericam propius accedentem, quo mole minores sunt.

Postulatum III. Guttulas illas liquoribus fere omnibus, sanguini vero maxime immiscibiles esse, unde fit ut Mercurius dici soleat, *Aqua non madesaciens*.

Postulatum IV. At vero invicem facillime jungi, & in majores guttas coire, si vel unico puncto sese mutuo intime contingant; sed in novas minutias nova vi denuo facile resolubiles esse.

Postulatum V. Guttulas omnes, ut-ut indefinite parvæ supponantur, pro nativo Mercurii pondere aqua, atque adeo sanguine circiter quater & decies graviore esse in specie.

Inde velut ex postulatis totidem eruenda sunt, quæcumque ad explicandam Mercurii efficaciam pertinent. Nimirum 1. Quibus viis &

quanta copia Mercurius admittatur in sanguinem. 2. Qua virtute semel admissus vasorum infartui & sanguinis vitio medeatur una circulando. 3. Qua facultate sanguinem alterando summa petat quasi ex electione, & excitatis in ore sordis ulcusculis largam & jugem salivationem moveat.

Primo. Ut Mercurius gemina methodo adhiberi solet, extrinsecus cuti videlicet illitus unguenti specie, & intrinsecus ore scilicet haustus pulveris aut catapotii forma, sic varias geminalque vias esse necesse est, quæ ingressuro præsto sint.

Quibus I. Mercurio quidem, si illinatur, haud defuturi sunt aditus, per quos intro subeat. Vidimus enim supra *hujus Libri cap. 3.* cutem totam poris innumeris densissime perviam esse, quibus tanquam emissariis exeant quidem effluvia, quæ corpore vivente jugiter exhalant, sed quibus etiam tanquam immissariis possint motu contrario, si vi superiore urgeantur, introire quæcumque corporis habitui admoventur. Guttulis ergo illiti unguenti facilis quoque per eisdem poros aditus primus intra cutem, unde possint a pone sequentibus ultra promotæ vel in vasa sanguifera capillaria, quæ per cutem numerose ludunt, recta pergere, vel quod corporis œconomix magis consentaneum videtur, vasa lymphaticis exceptæ, quæ ab ipsis emissariis cutaneis ortum habent, una cum limpha in majores venas conveyi.

Ratio æstimandæ quantitatis Mercurii quæ hac via introducit. Cum ea mercurialis linimenti introductio effectus sit correlativus, qui simul dependeat a dispositionibus tum cutis, quæ Mercurium admittit, tum Mercurii, qui cute admittendus est; de conditionibus tum cutis, tum Mercurii ex utraque parte judicium ferendum est, ut inde certa ratio iniri possit & celeritatis, & copix, qua Mercurius admittendus esse videatur.

Ex parte quidem cutis attendendum est, 1. Ad amplitudinem partis, quæ unguento mercuriali oblinitur; quo enim latius extensa est, eo plures poros offert ingressuro Mercurio.

2. Ad tenuitatem cutis, quæ quo tenuior, eo pluribus & amplioribus poris pervia est.

3. Ad ejusdem munditiam: quo enim cutis magis deterfa est, eo liberius patent illius pori.

4. Demum ad calorem partis; pori enim partis eo amplius hiant, quo ipsa calore impensius rarefcit.

Sic ergo conditiones omnes, quæ se habent ex parte cutis, futuræ sunt in ratione composita 1. Amplitudinis partis, quæ inungitur; 2. Tenuitatis; 3. Munditiei; 4. Et caloris cutis inunctæ.

Ex parte vero Mercurii pari ratione attendendum est, 1. Ad quantitatem tum Mercurii, qui unguento inest; tum unguenti, quo cutis illi-

ni-

nitur. Quo alterutra enim major est, eo plures cæteris paribus mercuriales guttulas intromissum iri consequens est.

2. Ad mobilitatem Mercurii latentis in linimento, qui quo purior est, quo pauciore plumbagine inquinatus, quo ad penetrandum expeditior, eo uberius intromitti debet.

3. Ad gradum motus quo intro pellitur: Quo enim fortius & diutius cuti affricatur, eo debet copiosius cute imbibiri.

5. Demum ad moram quam trahit in parte inuncta: Eo enim majore copia admittendus est cæteris paribus, quo majore cura cavetur ne cutis semel illita extergatur.

Sic ergo conditiones alteræ, quæ se tenent ex parte Mercurii, futuræ sunt similiter ratione composita 1. Quantitatis; 2. Mobilitatis; 3. Motus Mercurii; ac 4. Moræ quam trahit in parte inuncta.

Proinde admittæ Mercurii quantitates, cum ab utroque conditionum ordine perinde dependant, æstimari debent in diversis individuis ex ratione composita tum rationis compositæ prioris ex conditionibus, quæ ad cutem; tum rationis compositæ prioris ex conditionibus, quæ ad Mercurium spectant. Haud mirum ergo si totuplici conditionum combinatione totuplicia emergant discrimina, atque adeo si contingat aliquando magna illi unguenti quantitate nullum effectum præstari in uno; in altero vero pauca magnam & inexpectatam salivationem moveri; quæ notare vel ideo visum est, ut inde tanto certius liqueat, quam caute vel expertissimis procedendum sit in administrando eo remedio, cujus effectus tot ac tam variis de causis variare possunt.

II. Mercurio vero, si ore fumatur pulveris vel pilularum forma, Quibus viis Mercurius intro sumptus ad sanguinem traducatur? multæ patent in intestinis viæ quas ingrediatur, nemini non notæ. Vasa enim chyliſera, quibus defæciator dulciorque coctorum alimentorum liquor, sive chylus a primis viis in sanguinem traducitur, præsto sunt, quæ mercuriales atomos una cum chylo absorbas communi alveo in sanguinem convehant.

Quantitas Mercurii hac altera ratione introducti pendet, sicut in præcedente casu, a geminis dispositionibus, tum vasorum quæ admittunt, tum mercurialium partium quæ admittuntur. Hinc ergo uberius vel parcius futura est ex altera quidem parte, 1. Pro numero; 2. Et amplitudine osculorum, quibus vasa illa chyliſera hiant in intestinorum cavum; 3. Aut gradu systoles alternæ vasorum eorundem, quæ fortius & celerius oscillando apposita liquida avidius exsugunt. Ex altera vero, 1. Pro quantitate, 2. Tenuitate, 3. Mobilitate partium mercurialium, quæ per intestina fluunt; aut 4. Pro gradu pulsionis, quam a contractis intestinorum tunicis experiuntur, & qua in huiusmodi vasa chyliſera urgentur.

Itaque sicut in superiore casu, sic & in isto, introducti Mercurii quan-

titas æstimanda est in individuis diversis in ratione composita ex rationibus duabus aliis compositis; altera quidem conditionum, quæ a parte vasorum chyliiferorum; altera vero conditionum, quæ a parte mercurialium atomorum se habent.

Mercurium intro sumptum parcius & difficilius in sanguinem traduci, quam foris illi.

Paradoxum forsitan videbitur, si dixerò Mercurium ore haustum parcius difficiliusque in sanguinem transfundi, quam si cuti illinatur unguenti specie; attamen nihil certius est aut experientia magis confirmatum. Neque ratio, si res introspecitur, in contrarium pugnat: Multa enim officiant ingressui mercurialium partium ab intestinorum cavo in vasa chyliifera, quæ obstant minime ne Mercurius cuti illitus in obvios cutis poros libere subeat.

1. Mercurialium partium cum chylo immiscibilitas gravitasque, quæ eidem præponderant: Cum enim præcipientes ruant ad imam intestinorum partem, nec in vasa chyliifera facile penetrare possunt, quæ sunt in superiore aut laterali facie, ut a quibus descensu abscedant, nec in ea quæ sunt in inferiore, ut quæ pondere Mercurii nimio opprimantur & aggraventur. Inde est quod Mercurius crudus, etiam ad aliquot libras intro sumptus salivationem nullam unquam moveat; paucam vero & raro Æthiops mineralis, etiam magna dosi datus, potissimum si solo tritu confectus fuerit.

2. Vis cathartica, quæ plerumque præparata Mercurialia pollent: Cum enim intestinorum tunicas in motus peristalticos citatiores agant stimulando, deorsum deturbari necesse est motu nimis præcipiti, quam ut possint vasis chyliiferis affatim insinuari. Inde est quod Mercurius sublimatus dulcis cieat ut plurimum paucam salivationem.

Panacea una est præparatorum mercurialium, quæ cum chylo omnium maxime miscibilis, levissima, nulla purgandi facultate prædita sit, atque adeo quæ ore sumpta omnium copiosissime cum chylo sanguini transfundi, & salivationem efficacissime excitare valeat; unde fit ut omnium maxime usu recepta sit. Nihilominus tamen nec ipsius panaceæ efficacia efficaciam unguenti mercurialis æquat ullomodo: Constat enim senuncia una Mercurii unguenti forma cuti ex arte illita largiorem salivationem moveri & cum minore erethismo, quam senuncia pari Mercurii in panaceam arte Chimica conversi, & irritatis dosibus exhibiti; quæ sane discriminis ratio inter utrum interiorem & exteriorem ejusdem remedii mira est, nec unquam alias, quod sciam, observata.

Secundo. Atomis mercuriales semel admixtæ, quacumque introierint aut undecumque veniant, nota regione viarum, venis scilicet vasivæ lymphaticis ad cor cito convehuntur, unde repetito circulationis motu actæ partes suas paulatim obeunt sequenti ordine.

Effectus

Lemma I. Alterno cordis & arteriarum motu jactatæ cum sanguine promi.

miscere ita confunduntur, ut in singulas columnas cruoris, qui per magnam arteriam fluit, in singulos arteriarum furculos, in quos arteria illa dispergitur, & in singulas partes, ad quas minutissimi arteriarum furculi pertinent, æquali ratione distribuuntur.

Lemma II. Eliquatis fervore sanguinis terebinthinæ & axungię partibus, si quæ tamen Mercurii partes in ipso sanguine etiamnum coerceant, nativa Mercurii forma sponte reviviscit, in guttulas sphericas, lævissimas, roris instar tenuissimas. Sic videmus sub oculis Mercurium regenerari ex unguento mercuriali, quoties levi ignis calore colliquefcit.

Lemma III. Pari modo pulverulentæ atomi præparatorum Mercurialium, excussis spiculis salinis quibus infixæ horrent, larvam ipsæ quæ deponunt & in nativam Mercurii formam redintegrantur, difficilius tamen, tardius, minusque perfecte, quam guttæ unguenti mercurialis, ut in quas spicula salina intimius penetrent.

Lemma IV. Mercuriales guttulæ sanguini, qui a corde contracto in aortam excluditur, interspersæ, pari cum eo velocitate feruntur, dum exeunt. Habent ergo singulæ eam motus quantitatem, quæ sit ad quantitatem motus guttarum sanguinis ejusdem molis in ratione directâ ponderum respectivorum, atque adeo quater & decies majorem quantitatem motus, quam guttæ illæ sanguinis molis ejusdem, cum ex *Postulato 5.* Mercurius sit quater decies specificè gravior sanguine?

Lemma V. Iloperimetra tum Mercurii, tum sanguinis guttulæ inter circulandum de motu primum indito deperdunt singulæ singulis instantibus pro modo superficiæ, atque adeo ex æquo, cum superficies æqualis in utrisque supponatur. Itaque, si ea decrementa æqualia ex quantitibus motus inæqualibus utrimque detrahantur, ratio quantitarum motus superstitis in mercurialibus guttis, ad quantitates respectivas motus, qui superest in guttis sanguinis, major futura est successive singulisque instantibus. Sic ergo velocitas guttarum Mercurii, quæ primum eadem fuit, major fiet singulis instantibus velocitate guttarum sanguinis æqualium & circumfularum.

Lemma VI. Ea discriminis ratio inter velocitatem guttarum Mercurii, guttarumque sanguinis una interspersarum nec unquam major esse potest, quam dum maxima est motus tarditas in guttis sanguinis; nec ullibi, quam in tenuissimis extremorum vasorum capillamentis, ubi constat sanguinem lentissimo gradu procedere.

Lemma VII. Sic igitur momentum guttarum Mercurii, quod primo instanti, quandiu velocitas una fuit, superabat momentum guttarum æqualium sanguinis ratione solius gravitatis, qua mercuriales guttulæ guttulis sanguinis in specie præponderabant, jam eodem intensius futurum est rationem ponderis majoris, tum citatoris velocitatis; atque adeo
licet

licet absolute decreverit a primo gradu eadem ratione, qua decrevit primigenia ejusdem velocitatis, nihilominus tamen respective majus futurum est singulis instantibus successivis. Sic ergo cum primo instanti quater decies majus tantum sit in aortæ trunco, momento partium sanguinis ejusdem molis, plus quam centies majus futurum est momento partium eademdem in extremis arteriarum capillarum ramis.

Lemma VIII. Mercuriales guttulæ agunt in obvia inter circulandum instar solidi corporis, & ideo majori momento, quo majori mole. Quapropter quo plures in grandiores guttas una coierint, eo fortius in obvia arietantur.

Effectus
secunda-
rii.

Ex his colligi possunt Corollaria sequentia:

I. Mercuriales guttulas inter circulandum pervia corporis vasa quoscunque generis, etiam tenuissima permeaturas esse, cum præ divisibilitate possint vasorum quorumcunque angustis facile accommodari *ex Postulato 1.*

II. Impeto facto penetraturas etiam in obstructa vasa, quæ sanguini invia sunt, modo opposita resistentia minor sit momento, quo Mercurius sanguini prævalet, per *Lemmata 4. & 7.*

III. Si quod vas obstructum resistentiam majorem opponat, collectis ad ostiolum præ hærentia & mora pluribus Mercurii guttis, quæ in unam coierint sunt, *ex Postulato 4.* velut agmine facto, atque adeo validiore ariete per *Lemma 8.* obiectum obicem pulsatum iri, dum fiat via vi.

IV. Sic ergo ita redituque referatis sensim, disjectis, perruptis obicibus vasa omnia corporis, etiam angustissima, libere permeabilia futura esse.

V. Liquida omnia corporis, sanguinem, lympham, humores recrementitios & excrementitios, si qua crassiora viscidioraque fuerint, momento majore, quo Mercurii guttæ ubique pollent per *Lemmata 4. & 7.* & celeritate majori, qua moventur in extremis vasis per *Lemma 6.* atterenda & comminuenda esse, atque adeo eliquanda, & ad nativam fluiditatem paulatim omnia revocanda.

VI. Sic ergo tutam, certam, celerem vitiofo sanguinis, lymphæ, humorum recrementitiorum & excrementitiorum lentori medicinam affore.

VII. Porro mercuriales guttulæ tunicas quoque vasorum pro momento & celeritate majori fortius impetituras esse, atque adeo ad oscillationis motum efficacius sollicitaturas, unde illorum pulsus major & citatior futurus est.

VIII. Sic ergo liquida quævis, sanguinea, lymphatica, recrementitia & excrementitia jam fluidiora, & ab oscillantibus vasis fortius propulsa progressura & circulatura esse velocius, facilius, liberius, atque adeo infar-

factus quovis, quibus vasa omigena gravantur, expediendos esse.

IX. Sanguinem attritum & comminutum, disiectis in latius spatium moleculis, rarefaciendum esse, magis quidem minusve pro majori minorive mercurialium guttarum efficacitate, aut majori minorive partium sanguinis spissitudine.

X. Sic ergo pulsum 1. Majorem & pleniorum futurum esse, quoniam sanguine impensius rarefcente arteriarum tunica & plenius replentur & magis dilatantur: 2. Frequentiorem, æquabiliorem & magis Eurithmum, quoniam vasa omnia libere pervia, solitoque tono oscillantia faciem, constantem, æqualem viam fluxuro cruori permittunt.

XI. Singulas, quæ in toto corpore fiunt, secretionones inde largiores fore multiplici de causa, 1. Pro aucta humorum fluxilitate, *ex Corollario* 8. 2. Pro majore vasorum omnium secretoriorum & excretoriorum permeabilitate, *ex Coroll.* 4. 3. Pro citatiore & frequentiore sanguinis appulsu *ex Coroll.* 10. & 4. Pro validiore momento quo appellit *ex Corollario eodem.*

XII. Sic ergo virus, contagium, feminiumve venereum, qualecumque sit, quantumcumque in corpore supponatur, ubicumque lateat in sanguine, vasis, glandulis &c. iterato guttularum mercurialium incurfu disiectum, attritum, comminutum, exturbandum, profigandum & secretoriis quibuscvis emissariis eliminandum esse.

XIII. Proinde reddita fluidis quibuscumque fluxilitate; referatis vasis, ductibus, poris, emissariis; promotò olcillatorio partium motu; accelerata humorum circulatione; attrito, comminuto, eliminato contagio venereo; id est sublata causa morbi antecedente, conjuncta, continente, discussum iri morbosos humorum decubitus, atque adeo dolores rheumaticos, arthriticos, rheumatico-arthriticos; Præternaturales tumores tum mollium, tum ossæarum partium, atque adeo ganglia, nodos, phygethla, gummata, melicerides, atheromata, steatomata, skirrhus, exostoses & hyperostoses; Ulcerosas partium erosiones, atque adeo serpigines, herpes, pustulas, ulcera, caries; Uno verbo omnia luis venereæ symptomata cessatura esse, aut ad perfectam sanationem properatura.

Cæterum, quæ de Mercurii effectibus diximus, nolim ita accipi quasi virtutem Mercurii vero nullis coacercentur limitibus. Certe cum momentum, quod maximum mercuriales guttulæ in sanguinem, vasa, objectosque obices possunt exercere, finitum sit, finitam quoque fore ejusdem momenti efficaciam consequens est. Sic ergo Mercurius referendis obstructionibus, discutendis infarctibus, resolvendis tumoribus satis quidem est, quoties impacta hærensque materies mollis adhuc & cerea Mercurii momento cedere apta est: Minime vero, si durior firmiorque pertinacius eidem relictetur; & inde est quod ganglia, nodi, skirrhi, exostoses & hyperostosis.

Virtutem
Mercurii
certis li-
mitibus
coerecti.

roftoses, si inveteratione nimis induruerint inunctionibus mercurialibus, etiam ex arte administratis aliquando superint, seminio tamen venereo plane profligato.

Quo modo Mercurius salivationem ciat.

Tertio. Jam restat ut rationem reddamus salivationis, purgationis scilicet genere novæ, antiquis plane intentatæ, nec in Medicina unquam visæ ante usum Mercurii, cui soli quidem propria est, sed non semper. Licet enim a Mercurio solo producat, & producat sæpissime, ab illo tamen semper non produci experientia compertum est; cum ægrotantium nonnulli Mercurii efficacitatem interdum constanter eludant, 1. Cur Mercurius salivationem moveat sæpissime, quod sane explicatu difficile est: 2. Cur non semper moveat, quod explicatu forsan difficilior.

1. Dicebamus modo usu Mercurii secretiones omnes promoveri, *Vid. Corol. XI.* unde licet colligere & ipsam salivæ secretionem uberorem fore. Inde tamen non putamus salivationem arcessi posse, qualis inunctis Mercurio solet advenire, cum augmentum illud paucum, sit, neque salivæ præ cæteris humoribus peculiare. At saltem censemur inde ducendum esse salivationis primordium, quæ deinde sequentibus de causis intendatur.

Itaque 1. Inter secretiones cæteras secretio humorum lymphaticorum, salivæ nempe & humoris stomachalis atque intestinalis, debet eo nomine uberrima esse, quod sanguis, dum Mercurio atteritur, in lympham, lymphaticamve laticem fere totus resolvatur.

2. Ipsa vero salivæ secretio per secretionem humoris stomachalis & intestinalis debet ideo largior esse, quod nempe, cum saliva ut in os confluit, ita sine mora expuatur, secretoria & excretoria glandularum salivalium vasa liberiora inde sint, atque adeo magis pervia, quam vasa secretoria & excretoria ventriculi & intestinorum, ut quæ a materie ibidem collecta & stagnante, sive jam ante secreta, sive aliunde devescæ premanant & offerantur.

3. Sic ergo omnibus subductis saliva secernetur uberius ab usu Mercurii cæteris omnibus humoribus, & in os largiter affluet, unde frequens & importuna sputatio, quæ primis inunctionis diebus plerumque observatur, & quæ legitimæ salivationi solet præcludere.

4. Porro saliva illa copiosior, quæ in os jugiter confluit, quam Mercurii virtus ab attrito sanguine vi elicit, quæ in syphiliticis quidem virulenta, in iis vero qui perfecte sani sunt, acris est, salsaque, tenuissimis osculis valorum muciferorum, quibus os interius confutum est, latenter illapsa collecto muco vitiosam acrimoniam impertitura est, qua futurum ut ille sua tacite rodât conceptacula. Hinc in locis oris, ubi conceptacula istiusmodi mucifera plurima prostant, in labiis, buccis, gingivis, palato, imis faucibus, ac præsertim lateralibus linguæ partibus primum

ca-

calor, rubor, tumor ac demum exulceratio varia, multiplex, serpinginosa, phagedænica.

5. Doloris autem sensus, qui ulceratis partibus perpetuo inest, qui subinde intenditur acrioris salivæ affluxu, linguæ motu, dentium allis, potulentorum aut esculentorum attractu, fortiores citatioresque motus oscillatorios in vasis staminibusque glandularum salivalium, parotidum, maxilliarum, raninarum &c. ex notis sympathiæ legibus sollicitaturus est, unde promota uberiore & celeriore secretionem continuus & largus futurus est effluxus rivi instar salivæ spissæ, viscosæ, limphidæ. Sic pipere linguæ admoto salivam extundi, sic fumo lacrymas elici notum est. Hinc pyralismus legitimus tandiu duraturus, donec oris ulcera, quibus fovetur, sponte vel arte consanescant.

6. Invalescens in hunc modum salivæ fluxu, imminui, imo suppressi necesse est secretionem cæteras omnes fere; sanguis enim, quo largius salivationi sufficit, eo parcius cæteris potest sufficere: Unas tantum excipimus diuresim & diaphoresim, quæ tamen solent etiam ipsæ haud levem decessionem inde pati.

II. Rarum est, sed tamen indubia experientia compertum, ut modo dictum fuit, Mercurium effectibus suis magnam partem quandoque destitui, licet arte, methodo, dosi debitis administratur, frustrataque medentium & ægrotantium spe nec ulla inferre ulcera in ore, vel paucæ, cutanea, levia; nec ullam salivationem excitare, vel perexiguam & spuationi potius quam salivationi similem. Mirum profecto tam quiete intra corpus aliquando adesse remedium idem, a quo tantas tempestates concitari solenne est. Si quid autem conjecturis valeo, videtur id totum repetendum esse ab una aut altera causarum sequentium.

Qua ratione Mercurius salivationem non movet?

1. Si cutis densa, compacta, vasis nimium turgidis constipata ingressuro Mercurio minus pervia sit, quem ideo parce, parcissime admittat.

2. Si sanguis natura siccior, quantumvis a Mercurio atteratur, paucam, paucissimam limpham suggerat, quæ salivationi fovendæ vix ac ne vix quidem sufficiat.

3. Si qua alia evacuatio, *verbi gratia* per sudores, urinam, alvum &c. natura, casu, arte solito uberior sit, unde limpha alio averfa, qua motus liberior est faciliorque, salivationem imminui, imo suppressi necesse sit.

4. Si salivales glandulæ natura vel morbo densæ, pressæ, compactæ, duræ, skirrholdæ limphæ salivali appellenti difficilem, ideoque tardam viam permittant.

5. Si naturali vel vitiosa sanguinis diathesi saliva, quæ in his confluit, ita crassa, viscosa, pinguis sit, ut salibus strictè irretitis acrimoniæ expers fiat

fiat, nec ullam proinde muciferis oris vasculis noxam inferre apta sit

6. Si angustiora vasorum illorum oscula virus latens in saliva non imbibant, vel ita parum imbibant, ut inde vel nulla vel levissima labes conceptaculis inferatur.

7. Si desit vel æquo debelior sit sympathia, quæ inter oris interiora glandulasque salivales solet intercedere. Sic enim nec irritatio, nec exulceratio oris salivationem ullomodo moturæ sunt. Quod si mira forsan videatur ea variatio in sympathiis, qualem hic admittimus attendatur, velim, sympathias certis nullis teneri legibus, sed in variis varias esse: & hinc non raro causam esse cur alii aliis facilius difficiliusve ab emetico vomant, a fumo lacryment, ab errhino sternuant &c.

Mercurium huiusmodi veneræ efficaciter mereri sine salivatione.

Cæterum experientia omni ratione major Medicos jam pridem docuit Mercurium, etiam dum nullam salivationem ciet, cæteroqui tamen eisdem effectus in sanguine præstare, ac si salivatio legitima mota foret, modo debita copia ad sanguinem penetraverit, & proinde attenuatis liquidis, referatis vasis, restituto oscillatorio partium motu, disgregatis obicibus, profligato seminio morbofo luem veneream radicitus perinde extirpare.

C A P U T IX.

De eligenda facillima, tutissima, efficacissima medendi Methodo.

HAud satis est methodos curatorias recensuisse, quas in curanda lue venerea hætenus adhibitas fuisse novimus: Præstat insuper expendere quo loco unaquæque habenda sit, & pensatis singularum emolumentis & incommodis, paucis indicare quæ omnium optima, quæ tutissima esse videatur.

Jam dictum est supra cap. 6. hujus Libri methodos illas curatorias tres omnino esse, nimirum 1. Therapejam illam methodicam, qua Medici olim usi sunt primis morbi temporibus: 2. Administrationem lignorum, radicumque, quæ vi sudorifera pollent: 3. Usum Mercurii atque Mercurialium. De prima mora quidem nulla est, neque enim puto quemquam esse, qui hodie arbitretur luem veneream, morbum sane præ magnitudine herculeum & vulgaribus medicinis plane superiorem, iis remediis debellari posse, quæ neque adversus scabiem paulo difficiliorem satis valerent.

Id unum ergo in quæstionem primum venire potest, utra luis veneræ curandæ methodus potior sit, an administratio lignorum & radicum, an Mercurii & Mercurialium usus; Causa vero Mercurio semel addita, ulterius dispiciendum erit, quænam ex omnibus Mercurii adhiben-

di

di rationibus tutissima & efficacissima sit, atque adeo præferenda?

Primo. Non miror usum Mercurii administrationi lignorum a plerisque postpositum fuisse decimo sexto sæculo. Vigeant tunc præjudicia in Mercurium pridem concepta, necdum satis notat erat recta illius adhibendi ratio; unde modo parcius tardiusque, atque adeo plerumque irritum; modo largius celeriusque administrabatur, atque adeo plerumque funesto successu. Adde Guaiacum, Chinam, Sarsam-parillam, Sassafras nova tunc fuisse remedia, satis temere quidem, sed maxima tamen æmulatione vulgo laudata; miramque esse in plerisque novitatis illecebram, in omnes publici applausus potestatem.

Uter utri præstet, an Mercurii, an lignorum sudoriferorum usus?

I. Inde nata probra illa atque maledicta, quibus tum Mercurium, tum eos qui Mercurio utebantur, olim vexatos fuisse legimus, ut videre est apud Gasparem Torellam, *Dialogo de Dolori in Pudendagra*, anno 1498. Joannem Baptistam Montanum, *Traſſat. de Morbo Gallico*, anno 1550. Benedictum Viſtorium, *Lib. de Morbo Gallico cap. 7.* anno 1551. Joannem Ferneliū, passim in Operibus, sed præsertim *De luis venereæ Curatione, cap. 6. & 7.* anno 1556. Gabrielem Fallopiū, *Traſſat. de Morbo Gallico cap. 75.* anno 1560. Dominicū Leonem, *Methodo curandi febres tumoresque præter-naturam*, anno 1562. Bernardinum Tomitanum, *De Morbo Gallico Lib. 2. cap. 13.* anno 1566. Julium Palmarium *Lib. de Hydragyro, cap. 7.* anno 1578. Joannem Baptistam Silvaticum, *controversiarum Medicar. 34.* anno 1590. Aurelium Minadom, *Lib. de Virulentia venerea, cap. 39.* anno 1596. &c.

Mercurius olim a multis damnatus.

Non defuere tamen vel hoc eodem tempore, qui de Mercurii usu re-
ctius senserint, ut Hieronymus Fracaſtorius, *Syphilidos Lib. 2. in fine*, anno 1530. Joannes Paschalis, *Lib. de Morbo Gallico, cap. 6.* anno 1534. Petrus Andreas Matthioli, *Opusculo de Morbo Gallico*, anno 1535. Alphonsus Ferrus, *De ligno sancto Lib. 1. cap. 6.* anno 1538. Joannes Benedictus, *Libell. de Morbo Gallico, cap. 4.* anno 1550. Antonius Musæ Brassavolus, *Lib. de Morbo Gallico*, anno 1563. Michael Joannes Paschalius, *Traſſat. de Morbo Gallico*, anno 1555. Antonius Fracantianus, *Lib. de Morbo Gallico*, anno 1564. Augerius Ferrerius, *De Pudendagra Lib. 1. cap. 11.* anno 1594. Alexander Trajanus Petronius, *de Morbo Gallico Lib. 6. cap. 7.* anno 1566. Prosper Borganutius, *Methodi de Morbo Gallico cap. 13.* anno 1566. &c.

Laudatus a pluribus.

Sed inter ceteros consuli potissimum velim Nicolaum Maſſam, qui *De Morbo Gallico Traſſat. 4. cap. 1.* anno 1563. affirmat inunctiones cum argento vivo, *etsi multis ingratae sint, profecto tamen, si cum observatione ipsa, & conditionibus requisitis quis utatur, esse infallibilem & securissimam viam sanandi hanc aegritudinem.* Antonium Chalmetæum, *Method. Morbi Venerei curandi, cap. 5.* anno 1564. ubi postquam affirmavit eos, qui tanto-
pere

pere Mercurii usum improbant, aut numquam, aut non ut decet illius periculum fecisse, addit Mercurii usum ipsum numquam fecisse, qui quamplurimos ab hac detestanda lue etiam inveterata Dei beneficio liberavit. Guillelmum Rondeletium, qui anno 1565. Librum de Morbo Italico concludit sequentibus verbis: Ex supradictis, inquit, satis apparet argentum vivum antidotum & maxime accomodatum remedium ad Morbum Italicum esse, quomocumque administretur, morbum curat. Leonardum Botallum, qui in Tractatu, cui titulus est De ratione luis venereæ curandæ, cap. 17. anno 1565. testatur remedia cum hydrargyro arte composita curare mirifice humana corpora lue venerea infecta, si arte sint administrata, humores e corporibus excludendo subtiles & cuti proximos per balitum, viscidos vero atque intimos per fauces & alvum, sic ut mirum videatur quam celeriter bellegue id præsent. Ambrosium Paræum, qui Operum Lib. 19. cap. 9. anno 1575. ait inunctionum methodum omnium utilissimam & tutissimam esse repetitque cap. 10. mox laudata Rondeletii verba, argentum nempe vivum esse luis alexipharmacum propriumque antidotum, quod opportune exhibitum vires habeat admirandas: curare enim quocumque modo appositum partium tenuitate exsiccando & sudores movendo.

Omnium tamen disertissime Mercurii utilitatem prædicavit Epiphanius Ferdinandus, in Historiis sive observationibus & casibus medicis, quas numero centum edidit anno 1621. ubi scripsit Historia 17. centum & quinquaginta Gallicos omnis ætatis & sexus, temperamenti varii, & in variis anni partibus hydrargyri usu a se perfanatos fuisse, nullo symptomate superstiti: Nominatque ibidem Medicum alterum Joannem Laurentium Protopanam, qui juratus ipsi retulerit se plusquam mille Gallicos curasse felicissimo successu unguento mercuriali, unde colligit grates Deo agendas esse, a quo ad tantum morbum tam efficacem medicinam detegi permissum fuerit.

Ab omnibus jam dudum lignorum usus præteritur, duce experientia.

II. At vero, licet Mercurii causa tum numero, tum momento suffragiorum potior olim fuisse videatur, fatendum tamen toto sæculo decimo sexto quæstionem illam magnis utrumque Auctoribus controversam fuisse, & plenam diffensionis inter doctissimos. Id scilicet condonandum illis temporibus, quibus ne latum quidem unguem ab Antiquorum opinione recedere licebat, & nefas esse ducebatur remedio uti, quod ab iis infamatum fuisset. Sed tandem discussis præjudiciis prævaluit superiore sæculo experientia rerum magistra, ac repetitis exemplis apertissime comperitum est lignorum quidem administrationem ad curandam luem veneream confirmatam, imparem & efficacem esse; contra vero usum Mercurii tutum, certum, efficacissimum, modo rite adhiberetur; unde factum ut Medici, tum qui in Antiquorum verba jurare parati erant

ὡς ἀπορρίπτειν Δυμῶν vi veritatis omnes tandem adacti sint Mercurio primas

mas

mas deferre, ejusque usum in extirpanda omni lue venerea lignorum administrationi perpetuo præferendum esse uno ore confiteri.

Huic conclusioni suffragatur & ipsa ratio, quæ in rebus Medicis, si sola sit, parvi quidem; si vero experientiz adstipuletur, magni semper faciendi est. Nam, 1. Partes integrantes, seu potius guttulæ decocti lignorum, cum non agant in sanguinem gravitate, ut quæ sanguinis partibus proxime æqui-ponderent, non possunt in illum agere nisi qualitate altera, figuratione nempe specifica, cujus ope acres, aromaticæ, lixiviosæ, quicquid spissum densum, viscidum cruori inest, solvere ac eliquare aptæ natæ partes seminio venereo inquinatas corrigan, imo vero seminium ipsummet paulatim destruant: Ac sane ea est una agendi ratio, quam in decocto lignorum ab omnibus admitti certum est. At inde multiplex mali labes; partes enim illæ decocti debent sua eadem figuratione tum solida tacite deradere & erodere, tum vitiosum liquidis acrimoniam impertiri: Unde summa corporis emaciatio, extenuatio, consumptio; unde pulmonum calor, irritatio, exulceratio; unde jecinoris, cæterorumque viscerum æstus, phlogosis, inflammatio; unde renum & vesicæ irritatio & phlogosis cum gravi dysuria; unde in sæminis immoderata menstruatorum eruptio; unde demum, ut paucis contraham, universa illa incommoda, quæ lignorum administrationi solent adesse vel succedere.

2. Guttulæ eædem decocti, cum momento satis debili pellantur, utpote parum ponderosæ, nequeunt sæpe in vasa aut valorum glomeramina sive glandulas penetrare, quæ spissiore humore, nimiumque densato oppleta sunt, neque adeo hærentem & vitiosum humorem ibi congestum ullomodo corrigere. Hinc ergo labes altera præcedente pejor, liquidem humor ille pridem infectus, si casu vel temporis decursu sensim eliquetur & circulationi reddatur, luem veneream alteram non raro renovat priore male extincta nihilo mitiorem.

Neutrum vero metuendum est a Mercurio; nam 1. Cum omnis acrimoniæ expers sit, agatque solo pondere, neque liquidis acredinem, neque erosionem solidis ullam ex se inferre potest. Certe si alterutra læsio ex ejus usu videatur unquam emergere, ea non Mercurio tanquam materiali causæ accepta referenda est, sed nimiz humorum ipsorummet acrimoniæ aut virulentiz, quam diluentibus & edulcantibus prius temperare satis diligenter curatum non fuit. In summa duplex tantum a Mercurio periculum imminet, ne partium pondere nimio viscera molliora aggraver, & momento validiore valorum tunicas nimium distentas dilcindat. Sed utrumque præcavere facile est depletis prius venæ sectione vas, relaxato emollientium usu solidorum tono, Mercurio parce & partiter adhibito &c. sed de his alibi.

2. Mercurius, cum momentum exerceat momento sanguinis decies

L

&

Ratione
ipsa co-
mitte.

& quater validius, vasa quævis tenuissima, quæ occlusa & sanguini ipsi invia sunt, aperit, recludit, permeat, atque adeo virus omne undique extundit, profligat ubique, extirpat radicitus. Quod si qua vasa in toto corpore impervia superesse possint, quod quidem ramum est, sed quod tamen de vasis duriorum exostosium, gummatum, nodorum &c. interdum verum est, ea certe tantum, quæ cum momento Mercurii ineluctabilia sint, vi nulla alia debiliore unquam in posterum referenda sunt, & quæ proinde pro vasis omnino obliteratis haberi debent, humorque iisdem impactus pro humore numquam resolubili, & a quo nullum recidivæ periculum futurum sit.

Qua ratione olim factum est ut Guajacum in Hispaniola pro præfenti luis venereæ remedio habitum fuerit?

III. Mirum fortasse videbitur nonnullis Guajacum ipsum nullo discrimine cum cæteris lignis confundi, & nullius efficaciz ad luis venereæ curationem nunc censerî remedium idem, quod olim in Insula Hispaniola tantopere initio valuit ad eundem morbum.

Sed 1. Non satis constat de antiqua illa Guajaci virtute. Novi quidem unum esse aut alterum Scriptorem, (a) qui memoraverint in Insula Hispaniola Guajacum ab Indigenis ad luem veneream cum successu adhibitum, & Hispanis olim indicatum fuisse, qui eodem feliciter usi sint. Verum suspicio est, neque vana, Scriptores illos morbi mitigationem pro radicali (b) curatione habuisse, qua in re a plurimis in Europa quoque olim peccatum fuisse certum est.

2. Esto tamen. Demus Guajacum ad curandam luem veneream efficaciter olim valuisse: Quid tum? Num potuit Guajacum recens excisum, ideoque succi plenum virtute ea pollere olim in Hispaniola, qua destituatur in Europa, ubi exsuccum & evanidum administratur, quod sane videtur subodoratus esse ipse, qui primus Guajaci usum in orbem nostrum induxit? Qua de re vide Ulrichum Huttenum, *ubi supra cap. 6.*

3. Adde luem veneream, licet in Europa Guajaco non cedat, potuisse tamen in Hispaniola cedere, dum ibi natura mitior sit & curatu faciliior, teste Gonfalso Hernandez de Oviedo, *loco mox laudato*, & Fallopio, *Tract. de Morbo Gallico, cap. 1.* quorum hac de re testimonium potest exemplis confirmari. Exploratum est enim luem veneream in austrinis regionibus & lenius sævire & facilius sanari, quam in regionibus ad septentriones propriis sitis.

4. Denique quorsum tam multa? Sperantne, qui hæc obijciunt, se unquam effecturos ut experimentis numero paucis antiquis, male comper-

(a) Antonium Musam Brassavolum, in *Respons. ad quæst. Alexandr. Fontanae*.
Ulrichum Huttenum, *De Morb. Gallic. curas. per ministr. ligni Guajaci cap. 6.*
Gonfalsum Hernandez ab Oviedo, *Hist. nat. Indicar. region. Lib. 10. sect. 1. cap. 2.*
(b) Sane testatur Sydenhamius in *Epistola Responsoria 2.* usum Mercurii usui Guajaci jam præferri in ipsis Insulis Antillis.

pertis, in alieno orbe institutis, quæ ambigua sunt, fidem elevent experimentorum quæ plurima & certissima sunt, quæ nunc, quæ quotidie, quæ apud nos fiunt, & quæ contra Guajacum apertissime testantur.

IV. Ne tamen Guajacum suis laudibus defraudasse videar, lubens concessero, 1. Ejus decoctum, quod de pituita quoque dictum velim quæ e China, Sarsa-parilla, Sassafras &c. præparatur, facere ad morbos venereos locales & incipientes, ut ad gonorrhœam, bubonem, ulcusculam venerea, & porros, in quibus seminio morbofo extirpando plerumque sufficit, cum & paucum & recens sit. Cauto tamen opus est, ne temere adhibeatur in macilentis, exsuccis, retorridis, biliosis, picrocholis, iisve qui pulmone, renibus, vesica jam male habent.

Casus, ad
quos deco-
ctum
Guajaci
utile est.

2. Decoctum idem utilissimum esse, sed sub cautione eadem, ad dolores dissipandos, si qui ab impura venere olim oriundi hydrargyrosi superint, sive solum præscribatur, sive addito lacte vaccino ex arte temperetur, pro nota scilicet ægrotantium temperie humidior vel ficiore, serosiore vel saliore.

3. Denique decoctum illud necessario quandoque exhibendum esse post hydrargyrosim legitime administratam, si lues venerea cum strumosa aut scorbutica cachexia ita conjuncta fuerit, ut symptomata morbofa ab utraque causa dependant. Mercurius enim, quo virus venereum potenter exterminatur, plerumque attingit quidem strumofum vel scorbuticum seminum, quod utrumque Guajaci decocto feliciter cedit. Sic observavi syphiliticos nonnullos, qui strumis vel scorbuto simul laborabant, ab hydrargyrosi legitima perfectæ valetudini restitui non potuisse, nisi postquam per mentem usi fuerunt decocto meracior, nunc quidem solius Guajaci, nunc vero Guajaci cæterorumque lignorum, cum additis plantis quibusdam anti-scorfulosis, aut anti-scorbuticis.

Opinor ad prius luis venereæ genus, scilicet ad strumofum, pertinere observationem illam, quam profert in *Præfatione Editioni Lugdano-Batave Aloysii Luisini præfixa* vir doctissimus Hermannus Boerhaave, scriptis suis aureis & perpetua semper dignissimis *vita de re Medica*, si quis alter optime meritis, cujusdam scilicet ægri, qui incassum optimorum Medicorum consilia sequutus atque frustra hydrargyrosim expertus pro desperato relictus fuerat, & qui tamen recte convalescit usu decocti Guajaci ex Methodo ab Huttenio descripta in Libro cui titulus est *De Morbi Gallici curatione per administrationem ligni Guajaci*. Sane ut suspicer luem eam, de qua agitur, e strumofarum genere fuisse, id potissimum facit, quod, ut ipse Boerhaave narrat, in diversis corporis locis ossa essent adeo tabefacta, ut in digito manus articulus unus exoideris, in crure vero plurima loca cariosa spectarentur. Licet enim ea ossium labe luis venereæ, quæ strumosa est, non sit propria, ut ajunt, quarta modo, experientia tamen compertum est in

illa frequentius usu venire, quam in alia ulla. Quod si vera conjicio, jam observatio a Viro doctissimo proposita inefficaciam Mercurii in profliganda lue venerea nullomodo probatura, quæ tamen sola in quæstione versatur; sed probatura solum Mercurii inefficaciam in curandis strumis & strumosa cachexia, de qua nullatenus ambigitur.

Expen-
ditur sen-
tentia vi-
ri doctis-
simi Her-
manni
Boerhaa-
ve de vir-
tute Mer-
curii.

Cætera vero argumenta, quæ in *Præfatione eadem* adversus vim Mercurii in omni lue venerea, afferuntur, Auctoris nomine magna quidem, re tamen tanta non sunt, ut a sententia dimovere valeant „ Argentum vivum, inquit *Vir doctissimus*, sola vi vitæ actum hoc malum sanat, motu expellit. Ideo & ejus medicata potestas haud valet corrigere venereum tabum, quando ille figitur in locis, ad quæ actio cordis & arteriarum vix pertingit. Hinc cariem diploes cranii non sanat, sed in cellulas ejus osseas consumpto pingui vacuas, iners effusus stagnat. Inde & ossium medullam inquinatam hoc malo vix repurgat. „ Gonorrhœas in sola cellulosa penis fabrica hærentes, per quas vix ulus circumeuntium humorum impetus, numquam sanat, licet luem simul dominantem perfecte eo tempore tollat. „ Ossicula tenerrima, solis tenuibus testæ membranis....servare nequit, ne excidant....sed „ mala venerea, quæ latitant in locis, per quæ arteriæ rubræ, flavæ, se- „ rosæ, pellucidæ, cæteræque per quas liquida cum idonea velocitate „ ruunt, argentumque vivum admittere in se possunt, atque illud forti- „ ter urgere vitali potestate, perfecte sanari queunt Mercurii virtute. „ *Hætenus ille.*

Sed 1. Quandiu in parte corporis quavis, etiam a corde remotissima, vita est, hoc est quandiu in illa solidorum oscillatio & liquidorum motio reciproca viget, quibus vita debetur, tandiu mercuriales atomi liquidis interjectæ & eadem, qua ipsa, vi actæ, moventur cum celeritate, quæ major sit celeritate liquidorum ipsorum ex *Lemmate V. præced. capit.* & momentum exercent, quod adhuc multo majus sit momento æqualium partium liquidorum ex *Lemmate VII.* ac proinde tandiu aptissimæ sunt ad atterenda, comminuenda, dissolvenda liquida quævis hærentia, inspissata, impacta in ea parte; ad solidorum oscillationes promovendas & intendendas; uno verbo ad seminium venereum exturbandum, si quod ibi lateat, & ad reparandos semini venerei effectus, si qui ibi sint ulla arte reparabiles. *Valet ergo Mercurii medicata potestas, præ altero quocumque remedio, corrigere venereum tabum quacumque figatur in parte, dummodo ea pars vivat, hoc est dummodo ad illam actio cordis & arteriarum pertingat.*

2. Quod si pars corporis quædam sufflaminata solidorum oscillatione & suppressa motione liquidorum plane emortua sit, aut carie latenter erosâ, vel abscessu suffossa, tunc sane mercuriales atomi, quæ in hærentibus

bus in parte fluidis minutissimæ fluitant, pulsionis defectu sibi applicitæ & pondere deciduæ in guttas conspicuas una coituræ sunt, quemadmodum in defunctorum cadaveribus observatur post largam hydrargyrosim. Inde frequens est in iis qui Mercurio inuncti fuerunt; Mercurium colligi intra oisâ, si qua cariola sint, aut partes quascunque, si abscessu vel ulcere saucientur: Ut testantur Joannes Langius *Epistolar. Lib. 1. Epist. 43.* Joannes Fernelius, *De luis venereæ Curatione cap. 7.* Gabriel Fallopius, *Traſtat. de Morbo Gallico, cap. 76.* Alexander Trajanus Petronius, *Lib. 6. de Morbo Gallico, cap. 1.* Itaque jure merito ait Hermanus Boerhaave Mercurium in cellulas cariosæ diploes inertem, effusum stagnare.

3. Collecto huic Mercurio via cita plerumque paratur qua effluat citra noxam, deraſa ſcilicet carie vel aperto abscessu. At vero, utcumque aliquandiu retineretur, nihil inde immineret periculi, ut jam pridem docuit experientia, quæ Antiquorum præjudicia de vi argenti vivi venenosa falli convicit. Siquidem Mercurius est, teste ipſo Boerhaave loco laudato, *omnium ſorte cognitorum corporum minime rodens, vel acre.* Ideoque juxta Alexandrum Petronium Trajanum, *De Morbo Gallico Lib. 6. cap. 3.* cujus ſententiæ ſuffragatur experientia, *ſi poſt inunctiones in humano corpore intus relinquitur, propterea tamen, ubi ad ſe redierit, & alicubi firmes permanſerit, non magis obſeſſe, quam plumbum, ubi ſorte in aliquo hominis membro retinetur.*

4. Minime poteſt Mercurio vitio verti, ſi *cariam diploes cranii non ſanet*: ſi *offium medullam inquinatam hoc malo vix repurgat*: ſi *gonorrhœas in ſola cellulosa penis fabrica hærentes...* numquam ſanet. Cum ea enim ſymptomata a ſeminio venereo dependeant non tanquam a cauſa conjuncta continente, ſed tanquam a cauſa conjuncta ſimpliciter, poſito quidem ſeminio ipſa poni poſſunt, ſed illo ſublato eadem auferenda eſſe non conſequitur. Nempe opus habent ulteriore curatione & diuturniore tempore, caries offium quidem, ut corrupta offis facies exfoliari; gonorrhœa vero ut proſtatarum, veſicularum ſeminarium & cellulosa penis fabricæ ulcera detergi; ambo demum ut callus vel cicatrix feliciter coire poſſit. Satis eſt ſi Mercurius *luem dominantem eo tempore perfecte tollat*, ut ab illo tolli teſtatur ipſemet Boerhaave. Siquidem ea ratione proſtigato ſemel ſeminio, a quo ſolidarum partium vitia fovebantur, futurum; ut caries & exulcerationes ſuperſtites quæcumque, quæ ante veneræ erant & remediis ſuperiores, in meliorem naturam mutatæ remediis ordinariis jam tandem cedant.

5. Neque meliori jure objicitur in Mercurium, quod *officula tenerrima; ſolis tenuibus teſta membranis, puta vomerem & turbinata officula interiorum narium, ſervare nequeat, ne excidant.* Ea enim officula vel tota ſubſtantia, quæ præ tenuitate ſere perpetuum eſt, vel alterutra tantum facie

corrupta sunt & cariola, quod rarissimum. Si prius, non magis potest integritas ipsis arte restitui, ne excidant, quam vita mortuo: Frustra igitur a Mercurio id exigas, quod a nullo remedio obtinere possis, & quod est supra naturæ vires. Si posterius, decisa ea ossis facie quæ cariola est, potest altera quandoque superesse, quod sane a Mercurio æque tuto præstari potest, ac ab alio quocumque remedio, atque adeo Mercurii conditio, si non melior, at certe haud pejor inde censenda est.

6. Quid multa? Licet vel ex ipsius Boerhaave verbis egregium pro Mercurio suffragium elicere, cui lubentes subscribimus. Ille enim ultro fatetur perfecte sanari posse Mercurii virtute mala venerea, quæ latent in locis, per quæ distribuuntur arteriæ rubræ, flavæ, serosæ, pellucidæ, ceteraque per quas liquida cum idonea velocitate ruunt, argentumque vivum admittere in se possunt, atque illud fortiter urgere vitali potestate. Sed per omnia corporis loca distribuuntur arteriæ rubræ, flavæ, serosæ, aut pellucidæ; sed in singulas illas arterias, quandiu vitali motu fruuntur, liquida ruunt cum idonea velocitate: sed in singulas argentum vivum libere admittitur, ac fortiter urgetur vitali potestate. Consequens est ergo, vel auctore ipso Boerhaave, mala venerea posse Mercurii virtute perfecte sanari in omnibus corporis locis, quandiu iis vita inest; ac proinde si forte Mercurius conceptas spes unquam frustraretur, ut sane frustratur aliquando, id inde deducendum esse, non quod extirpandæ lui venereæ impar sit, sed quod minus sit comparatus ad virus strumofum vel scorbuticum profigandum, quorum alterutrum cum lue venerea conjunctum tunc lateat, quorum utrumque suis propriisque remediis opus habeat præter Mercurium, ut extirpetur.

Uter utro potior sit an interior ex-
teriorve Mercurii
usus? *Secundo*, Multa egimus, dum primas Mercurio detulimus; sed non peregrinamus. Potest enim Mercurius ipse bitariam administrari: intro scilicet ore haustus forma pilularum aut pulveris; & foris corpori applicitus quomodocumque. Hinc ergo existit hoc in loco quæstio altera, utra utri præster administrationis ratio, quæ præcedente quidem non minus gravis est, sed solutu facilior, & in qua dirimenda interior Mercurii usus exteriori apud cordatos omnes causa cessurus est, multiplici argumento.

I. Quod præparata Mercurialia deglutita spiculis acidis, quibus horrent, ventriculi tunicas pungant, irritent, laceffant, atque adeo lædant & debilitent. Inde est quod stomacho plerumque male habeant, quicumque Mercurialibus intro sumptis diutius usi sunt.

II. Quod particulæ præparatorum Mercurialium, pro ea dosi, qua assumuntur, parce, quin etiam parvissime transfundantur in sanguinem per venarum lactearum oscula, ex capite præcedente, atque adeo paucam debilemque vim exerant in sanguinem & in virus cum sanguine confusus.

III. Quod

III. Quod atomi præparatorum Mercurialium in sanguinem tandem transfusæ, cum spiculis acidis alte adactis configuntur, ægre, tarde, parce ad nativam Mercurii formam redeant *ex Lemmate II. cap. præcedent.* atque adeo minus efficaciter sanguinem corrigant & virus debellant, cum ex laudato capite tota Mercurii vis ab ea forma dependeat, qua divisibilis est in minutias indefinite parvas, quarum singulæ globosam figuram liberrime affectent.

IV. Quod mercuriales illæ atomi spiculis horridæ, dum in sanguine fluitant, itu redituque tenuissima molliorum partium vasa pungant, irritent, stimulent, unde calor, irritatio, phlogosis, erethismus multiplex pulmonum, cerebri, ventriculi, jecinoris, renum & vesicæ, atque etiam uteri in mulieribus.

Hinc itaque liquet præparatis Mercurialibus intro sumptis ventriculum quidem lædi, & multiplicem noxam pulmoni, cæterisque visceribus inferri, atque adeo illorum usum numquam plane innoxium esse: Inde tamen nec sanguinem perfecte corrigi, nec virus altius repositum efficaciter profligari, atque adeo usum eorumdem lui inveteratæ curandæ imparem esse. Quocirca haud mirum si interiori Mercurii usui, ceu minus tuto & minus efficaci, præferatur exterior, a quo nihil simile metuendum est, imo vero a quo contraria omnino expectanda sunt, utpote quo Mercurius in sanguinem subeat 1. Intacto ventriculo, 2. Via facili & expedita, 3. Sub nativa forma; ac 4. Omnis acrimonix expers, adeoque ingressus opem laturus sit certam, præsentaneam, efficacem & ex se plane innocuam.

Facessant ergo cum suis mendaciis qui panaceis, præcipitatis, magisteriis, pilulis, pulveribus, arcanis, elixiriis, tincturis suis mercurialibus se luem veneream confirmatam radicitus curaturos esse audent polliceri, cessentque demum Medicinam contaminare & abusu pessimo egregia infamare remedia, quæ multis saluti fuere, & quæ multis salutis futura sunt si rite exhibeantur. Neque enim is ego sum, qui præparata Mercurialia intro sumpta ullatenus improbem; quin potius ea proficua esse censeo, quoties iis adhibentur morbis, ad quos valent, & ea adhibentur methodo, qua par est.

His quidem morbis, ad quos valent, nempe 1. Morbis venereis incipientibus & localibus, ut gonorrhœæ, buboni, ulcusculis, porris, &c. quia tunc spes est nec inanis virus, quod paucum est & recens admissum, ea therapeja posse eradicari.

2. Confirmatæ etiam & universali lui venereæ non curandæ quidem, sed si nimium sæviat, mitigandæ tantum, dum otio liceat morbo certiorum medicinam facere; quod sane non est supra notam & exploratam illorum præparatorum vim.

Ea vero methodo, qua par est, scilicet 1. Abstinendo a præparatis Mercurialibus drasticis mochlicisque, & idcirco a præcipitatis Mercurialibus fere omnibus, ut quæ vomitiones & cathartes immodicas moveant; stomachum pervertant, imo non raro erodant; convulsivos solidorum erethismos, & abnormes liquidorum ataxias in variis partibus inducant, quæ numquam periculo vacant.

2. Inter cætera ea seligendo quæ blandiora & leniora sunt, ut Mercurium sublimatum dulcem, panaceam mercurialem, Æthiopem mineralem igne præparatum, quæ non minori forsitan energia agunt, quam vehementiora, sed minori certe tumultu, atque adeo semper minori periculo.

3. Diligenter cavendo ne hæc ipsa quanquam blandiora, dosi nimia, usuve diuturniore aut frequentiore pulmonibus, ventriculo, vesicæ, utero &c. noceant; sed singulis modum adhibendo ex artis legibus pro ægrotantium temperie, statu, viribus; morbiq; natura & gradu.

Cæterum, quantacumque cautio sit, ne putes vel in allatis ipsis casibus interiorum Mercurialium usum usui exteriori unquam æquiparandum esse; hunc enim semper tutiorem, & efficaciorum, atque adeo cæteris paribus præstabiliorem esse tum ratione manifestum est, tum experientia exploratum.

Quæ optima sit Mercurii foris adhibendi ratio, suffumigiorum, emplastrorum, an linimentorum forma?

Tertio. Progredientibus ambages novæ. Potest Mercurius extrinsecus adhiberi triplici ratione, suffumigiorum, ceratorum sive emplastrorum, & linimentorum sive unguentorum forma. Constituendum itaque quæ omnium facillima, tutissima & efficacissima, atque adeo quæ sit optima adhibendi Mercurii methodus.

I. Constat ex iis quæ supra dicta sunt *cap. 7. hujus Libri* eam sane laudem haud debere suffumigiis, non dico acribus, quæ ab omnibus semper damnata sunt, sed ne lenissimis quidem ex sola cinnabari cum thure. Si enim instituuntur capite intra conopeum concluso, periculi plena sunt, cum fumus mercurialis oculis, capiti, pulmonibus, noceat; si exerto, inefficacia plerumque, cum mercuriales atomi & quantitate pauca & motu debili introducantur exhalando; demum utroque modo ægrotantibus valde incommoda, ut qui æstu nimio torreantur. Inde factum ut quidem in desuetudinem abierint, nec jam unquam adhibeantur, nisi summum ad partem aliquam particularem suffundendum, si skirrhus, exostosi, ulcere, gummate, aut dolore venereo difficili laboraverit.

II. Idem ferme judicium de ceratis sive emplastris mercurialibus ferendum est ex *laudato capite*. Licet enim minus periculi habeant quam suffumigia; tamen neque majore pollent efficacia, neque salivationem movent feliciorem; quandoquidem atomi mercuriales crassioribus & unguinis emplastrorum partibus arctius irretitæ, nec frictione ulla, sed

calore solo corporis excitatæ & parcius & lentius intro subeunt. Adde & ægrotantibus incommoda esse, quos inde angi certum est calore, prurigine, varis, erysipelate, imo furunculis, propter nimiam emplastrorum acredinem, aut perspirationis inhibitionem. Ideo jam dudum ab universalī eorum usu desitum est, neque, jam ea admoventi unquam solent, nisi ad tumores skirrhosos, exostoses, gummata &c. in parte quadam particulari resolvenda.

III. Unus est linimentorum seu unguentorum usus, in quo optatam tum facilitatem, tum efficaciam una repetire est. Unguenta enim majorem minoremve recipiunt Mercurii quantitatem ut lubet; inunguntur ad dosim, quæ videtur utilis; repetitur inunctio pro usu, nullam in cute uredinem excitant; sed ad summum levem & fugacem calorem; Mercuriales atomi in unguentis laxè ligantur, extricantur facile, fricationis motu alte adiguntur &c. Usus ergo linimentorum mercurialium cæteris omnibus præferendus est, ut sane constat jam dudum præferri, non modo ad curandam luem veneream, quæ confirmata & universalis est, sed etiam ad morbos venereos quoscumque locales, sed ad luem veneream particularem & incipientem.

Ut autem præparatio & administratio Unguentorum istiusmodi optime instituat, sequentibus legibus standum est.

1. Eligendus Mercurius purus, a sordibus & plumbagine quam maxime defæcatus, & si fieri possit e cinnabari redivivus, ut inde in tenuissimas atomos tanto facilius dissilabilis sit.

2. Extinguendus saliva sola in mortario æneo, vel summum paucissimis terebinthinæ guttis, ut partes laxius irretitæ ad pristinam formam promptius redeant.

3. Admiscendus cum axungia suilla, insulsa, recente, quæ nulla acedine, ut a rancida quandoque fit, cutem exurat, aut varos pruriginosos ad pilorum radices excitet.

4. Æger illinendus ad ignem, qui flamma ardeat, & post fricationem siccam, unde pars rubescat, eo fine ut pori amplius pateant, & Mercurium magis imbibant.

5. Illinendus fricatione cum spissore unguento, non penicillo pingendus cum liquidiore; ut mercuriales atomi motu & calore fricationis excitatæ altius penetrent.

6. Fricatio quævis tandiu producenda; dum cutis illita videatur exarescere fricando, & fricantis manibus minus lubrica fiat.

7. Expedit non ab ægro fricationem fieri, ut a quibusdam suaderi audio, sed a ministris, qui ad opus habiliores & alacriores sunt; manibusque nudis, non chirotecha munitis, ut calor major fricatione accedat. Non clam me est ministrum ipsum venire in discrimen salivationis, si idem

Leges in
admini-
strandis
inun-
ctioni-
bus ser-
vandæ.

idem pluribus fricandis in die vacaverit; at nullum periculum esse probe novi, si uni tantum serviat, præsertim si ut primum finita est frictio, curet manus probe eluere.

8. Oblita pars calidis femoralibus contegenda, ne illitum unguentum detergatur; & æger per horam unam a frictione lecto calide continentus, ut Mercurius vi caloris altius introducatur.

9. Sunt quibus placeat unguentum, quod cuti illitum superest, de industria extergere finita quavis frictione, ne odore quem spirat prodatur remedii genus, quod occultari opus est; & id quidem facile condonandum quoties iustis de causis ægro necesse est, adhibitam Medicinam cautissime dissimulare, ac se quotidie coram amicis aut propinquis præsentem sistere. At vero simul attendendum est 1. Ut paulo major obliniatur unguenti dosi frictione qualibet; 2. Ut dosi oblita paulo diutius affricetur, donec unguentum videatur penitus exarefcere, atque adeo duplici illa via pensetur quicquid de remedii efficacia detrahitur præpropere unguenti deterfione.

Utrum
utro tu-
rius sit
saliva-
tionem
movere
an nul-
lam ex-
citare?

Quarto. Tandem superest novissima quæstio, scilicet an majoribus, crebrioribus, quotidianis inunctionibus uber pryalismus arte proritandus sit, an contra parciores & rariores inunctiones de industria adhibendæ, ut salivationis fluxus præcaveatur, vel parciore fiat. Dudum habuit, habetque etiamnum opinio utraque auctores suos, & utraque quidem egregios. Facillimum tamen licet tantam componere, si ad ea, quæ duobus ultimis capitibus jam adducta sunt, æquo animo attendatur.

I. Salivationem, modo de admissa intra corpus debita Mercurii quantitate constiterit, ad exterminandum morbum absolute necessarium non esse, ut supra probavimus, *cap. præced.* contra quam olim a multis creditum fuit, & etiamnum a nonnullis creditur.

II. Nihilominus tamen salivationem evacuationem esse, qua ceu via tutissima facillimaque virus, quod in sanguine latet, maximam partem evacuatur; atque adeo cui, si desit, opus sit evacuationes alias quasdam quasi vicarias substitui, natura quidem per sudorem vel urinam; arte vero per ælvum, ut virus qua data porta possit effluere.

III. Imo vero salivationem medentibus cynosuræ instar esse unde possint certius colligere, tum quanta Mercurii copia admissa sit, tum quantam vim Mercurius admissus exerat in sanguinem; atque adeo unde sciant remedii efficaciam pro natâ morbi natura aut inveteratione tutius moderari.

IV. Videri proinde utroque nomine salivationem proritandam esse, si cætera consentiant, tum ut exiturienti seminio morbofo via permittatur facillima, & quam remedii vis sibi ipsa sponte facit; tum ut liceat in-
de Medico conjicere quid jam actum sit, quid ultra agendum esse videatur,

tur, ne andabatarum more cæca nocte cogatur in morbum pugnare.

V. Salivationem potissimum requiri, quoties in gravi, antiqua, inveterata lue virus penetravit altius, ac plurimas partes jam invasit. Tunc enim cum morbus difficilior sit majori quoque opera entendum est, ut virus alte repositum evellatur radicitus, & evulsus omnino eliminetur, atque adeo, ut vulgari fertur adagio, malo nodo malus cuneus quærendus est.

VI. Caute tamen salivationem semper temperandam esse, & si c re esse videatur catharricis coercendam, ita ut & pauca fiant in ore ulcera, nec profunda; & ejectæ quolibet die salivæ copia unam aut alteram libram non excedat. Quorum enim ægros tædio, ærumnis, vigilia, dolore salivatione, temere nec sine vitæ periculo conficere, macerare, torquere, exhaustire, si curari possint æque tuto, & majori compendio?

VII. Quin imo tarda & parca Mercurij administratione de industria declinandam, aut si appareat arte reprimendam esse catharticis, si æger ad phthisim inclinet, aut epilepsia laboret; si gingivæ scorbuto male habeant; si collum, collique confinia glandulis strumosis obsita sint; si mulier uterum gerat; si vires infirmæ diuturno pyralismi tædio tolerando impares esse videantur &c. Sed de his fusius alibi.





DE MORBIS VENEREIS.



LIBER TERTIUS.

De Ætiologia, Diagnosi, Prognosi & Thera-
peja Morborum Venereorum localium,

S I V E

De Lue Venerea incipiente.

C A P U T P R I M U M.

De Gonorrhœa virulenta.

§. I. DESCRIPTION.

Descri-
ptio go-
norrhœæ
in viris.



Uotiescunque Gonorrhœa virulenta a concepto seminio
venereo affutura est, toties paucis post impurum coi-
tum diebus, 4. 8. 12. primum defillat guttatim per
urethram non sine aliquo voluptatis sensu serum pin-
gue, limphaticum, viscidum, sed paucum, quo extre-
mæ canalis oræ conglutinantur; summa urethræ rima
rubet, calet hiatque præter naturam; inassueta percipitur in genita-
libus titillatio, præsertim inter mejendum, sine dolore quidem, sed
cum aliquo caloris sensu, qui ad dolorem in dies propius accedit.

II. De

II. Deinde gliscit paulatim morbus; tenditur, rigescit, induratur nervus sine causa, at non sine dolore; manant liquidioris seminis aut humoris seminalis guttæ multæ, spissæ, densæ, maxime cum post emissam urinam vesica fortius exprimitur; crescit in dies urinæ difficultas cum mordaci acrimoniæ & caloris sensu in urethra tota.

III. Postea omnia intensius urgent; perineum tumet, calet, dolere prematur; ardor urinæ mejentem urit, discruciat; erectio frequens est, involuntaria dolorifica, cum sensu validæ constrictionis imo vero quandoque cum distorsione penis incurvati; uber adest proflusus seminis, aut seminalis humoris calentis, diluti, acris; modo colore cinerei & puriformis; modo punctis, striis, filamentis sanguineis notati; modo graveolentis, flavi, viridi, vere purulenti.

IV. Demum deservescente caloris vi, paulatim mitescunt & remittuntur omnia; humor gonorrhoeicus plactius fluit, magis albicat, spissior est, exhausta sensim scaturigine penitus exarefcit, ejectis prius floccis seu ramentis pluribus, tenuissimis, limphaticis, sero innatantibus.

Quæ de viris diximus, pari ferme modo in mulieribus succedunt. Siquidem I, Initio concepta labe madent paucis post diebus muliebria insolito humore, & frequens adest in vulva pruriginis sensus cum calore conjunctus, qui ab urinæ ardore propius abest in dies.

Descriptio gonorrhoeæ in fœminis.

II. Dein aucto vaginæ calore, ardore, rubore, dolore, vetri admissio vix toleratur; urit acrimoniæ sensus inter mejendum, plerumque tamen remissius quam in viris; profluit copiosus humor seminalis, calens, liquidus, acer, modo puriformis; modo sanguinolentus; modo flavus, viridis, graveolens, vere purulentus.

III. Inde imminuta sensim vaginæ & appositarum partium phlogosi, ac mitescente dysuria, perseverat tamen aliquandiu putris, vel purulenti seminis aut seminalis humoris effluxus, sed in dies magis magisque albicantis, donec pedetentim tandem cesset post emissos floccos limphaticos, tenuesque, qui urinæ velut ramenta albicantia innatant.

§. II. SEDES, DIFFERENTIÆ, CAUSÆ.

I. Manat in gonorrhœa ex urethra in viris, e vulva in fœminis, I. Sedes seminalis humor non modo calens, acer, mordax, sed etiam multus, uber, copiosus. Inde liquet ergo feminaria conceptacula, quæ sunt primæ seminis aut seminalium humorum scaturigines, unde semen aut seminales humores in urethram in viris, in vulvam in fœminis profunduntur, vel omnia vel pleraque vel ex iis unum quodvis male affici: Siquidem certissimum est axioma, *Ibi morbi sedem esse, unde profluit humor morbose vitiatus.*

I. Sedes gonorrhœæ in viris.

Hæc

Hæc autem feminis conceptacula in viris quatuor sunt. 1. *Vesiculae feminariae* geminae, ad latera principii urethrae hinc & inde sitae, quae semen prolificum in testibus secretum in suis recessibus recondunt, ac in urethram gemino, quo patent, ostiolo juxta caput gallinaginis effundunt cum opus est. 2. *Geminae prostates*, seu potius *prostate unica*, vesicae collo substrata & lateraliter adlita, unde feminale fluidum in ipsa secretum & duodecim capsulis coercitum foraminibus totidem in urethram ejicitur. 3. *Ambae glandulae Cowperianae* sub acceleratoribus musculis prope anum sitae, quae feminalem humorem ab ipsis secretum longo & obliquo utrimque ductu in eundem urethrae canalem evomunt ad penis radicem, & uno circiter pollice ultra emissaria vesicularum seminariarum & prostatarum. 4. *Demum cellulae multiplices*, quibus interna urethrae facies consistit, & quae feminalem humorem vix disparem ab humore glandularum Cowperianarum ipsae quoque eructant. Cæterum harumce cellularum nomine comprehendi velim glandulam ab Alexio Littre (a) descriptam, quae citra prostatam locata, urethrae adnata & inter utramque tunicam sita, in hunc canalem multiplici foramine patet, unde jugiter manant guttae aliquot humoris seminalis, qui cum humore glandularum Cowperianarum congener est.

(a) Mémoires de l'Académie des Sciences, ann. 1700

Sedes gonorrhoeæ in feminis.

Totidem sunt in mulieribus conceptacula, unde feminales humores in vulvam possunt confluere, sed alio situ disposita. 1. *Prostate*, vel potius *prostate*, quae in feminis urethram ambit, & in vulvam subter clitoridem dehiscit duobus ostioliis, sive *lacunis* hinc & inde ad urethrae latera. 1. *Glandula Cowperianae* in perineo sive intersemineo prope anum sita, quae juxta caruncularum myrtiformium radices bino ductu patefcunt in vulvam ad vaginae principium. 3. *Glandulae botryformes* racematim per vaginam consistae, quae secretum humorem tenuibus & discretis osculis eructant in vaginam, unde in vulvam loci declivitate defluit. 4. Denique *cellulae* per urethrae faciem dispersae, quae in feminis tamen paucae sunt, cum urethra brevis sit, atque adeo quae si forte unquam, certe rarius quam in viris gonorrhoeam solae advocant.

Gonorrhoea multiplex est ratione sedis tum in viris, tum in feminis.

Inde sequitur 1. Gonorrhoeam in viris quadruplicem esse posse ratione sedis, nempe vesicularum seminariarum, prostatarum, glandularum Cowperianarum, & cellularum urethrae, prout partes illae singulae singularim afficiuntur.

2. Gonorrhoeam in mulieribus pariter totuplicem esse posse, nimirum prostatarum, glandularum Cowperianarum, glandularum botryformium vaginae, & cellularum quibus urethrae facies interna consistit, si tamen hæc ultima sedes sola affici, aut affecta gonorrhoeam possit unquam sola inferre.

3. Inde plures emergere in utroque sexu gonorrhoeae compositae species,

et, quoties accidit in utroque sexu, accidit autem frequentissime in gonorrhœa ut simultanea vel gradaria & successiva labe plura seminis conceptacula, duo, tria, imo quatuor, adeoque omnia simul afficiantur.

4. Simples quidem gonorrhœas raro dari, quoniam rarum est seminis conceptacula, cum ratione officii, naturæ & humoris, quem continent, inter se convenient omnia, & simili causarum earumdem efficaciz singula pateant, plura a præsentē causa simul non affici.

5. Si quando vero dentur, rarissime simplices perstare toto morbi decursu, quoniam cum prope adsint invicem conceptacula seminaria, humoresque inde deflui in urethra inter se communicent, rarissimum est labem ab altero in alterum non propagari.

6. Singulas gonorrhœas tum simplicis, tum compositæ species, tametsi symptomatis pathognomonicis una semper convenient; gradu, numero, genere eorundem symptomatum non parum invicem plerumque discrepare.

Quæcumque hætenus de gonorrhœæ sedibus dicta sunt certissimis confirmantur argumentis. Constat enim in viris, qui gonorrhœa virulenta laborant, perinæ tumere, calere, dolere, quod prostaticum, vesicularum seminariarum aut glandularum Corporis prostatici inflammationem arguit. Constat in iisdem malum non raro in testes devolvi, qui inde tumescunt, calent, intense dolent, quod probat malum prius fuisse in vesiculis seminariis, quibuscumque artum testibus intercedit commercium per vasa deferentia seu ejaculatoria. Constat similiter in fœminis gonorrhœa ægrotantibus extrema lacunarum oscula urethræ hinc & inde apposita manifestis phlogosi & inflammatione aliquando, imo non raro ulcere affici, ac in vulvam seminalem humorem semi-putrem infundere, unde liquet prostaticas ad quas lacunæ pertinent, tunc morbo tentari. Constat quoque in iisdem vaginam aliquoties calere, dolere, & præternaturaliter madere humore seminali purulento, unde palam est morbi sedem tunc ibi esse. Constat demum observatione in cadaveribus eorum obvia, qui gonorrhœa ægrotabant dum mortui sunt, conceptacula seminis modo descripta in utroque sexu, male semper se habere ex tumore, renitentia, rubore, phlogosi, inflammatione, exulceratione, suppuratione vel apostemate, &c.

Sed ne mea fide loqui videar, consuli velim (a) Alexium Littre (a) Med. Doctorem Medicum, qui testatur se compertum habuisse observationibus iteratis in cadaveribus eorum institutis, qui dum fato functi sunt, gonorrhœa actu laborabant.

1. In gonorrhœa virulenta seminis conceptacula nunc omnia, nunc pauciora, nunc singularia male affici.

2. Quæcumque affecta sunt, tensa, dura, tumida, rubra, inflammata deprehendi.

Quibus argumentis, confirmantur, quæ de sedibus gonorrhœæ dicta sunt.

Annales de
l'Académie des
Sciences,
ann. 1711

3. Modo quidem humore putri, albo, flavo, viridi referta esse; sed tamen integra & absque ullo suppurationis aut exulcerationis indicio; quod rarum.

4. Modo vero suppurata, abscedentia, erosa, multifariam exulcerata, & purulento humore diversicolore turgida, quod frequens est.

5. Emissaria, quibus conceptacula morbida in urethram hiant; phlogosi & inflammatione semper, imo non raro ulcere tentari in extremo fine qui in urethram abit.

(b) In Epistola de suis venerabilis historia & curatione.

6. Denique faciem internam urethræ ab emissariis illis ad summum usque glandulis apicem humore eodem obduci, quo morboſa conceptacula turgent & rubram eſſe atque phlogodeam, imo vero ſæpius phlyctænoideam & ulcerofam.

Quid a
variis in
hoc erra-
tum sit.

Errant proinde 1. Quicumque credunt (b) cum Thoma Sydenhamio contagionem veneream in viris *earnofam virge substantiam primum ad-
viri, quam corrumpens, eidemque primo inflammationem, mox ulcerofam
diatbefim fenfim inducens efficiat, ut fanies, qualis in gonorrhœa cernitur,
in urethram lenite exsiliet: quod nulla ratione cum rei veritate stare
poffe jam lippis atque tonforibus notum eff.*

(c) *L'Art de guerir les Maladies Veneriennes*

Part. 2.
chapp. 6
& 10.

2. Quicumque putant cum (c) Nicolao de Blegny gonorrhœæ sedem in mulieribus uterum esse, in quo confundit errore manifesto fluorem album sive muliebrem & virulentam gonorrhœam, affectus quidem specie similes, sed tamen re diversissimos, natura, causa, sede & therapeja.

(a) *De virulentæ
gonor-
rhææ
sympto-
matis .*
Part. 1.
cap. 3.
& 4.

II. Causa
conjun-
ctæ go-
norrhœæ
in utro
que sexu

3. Quicumque existimant cum (a) Guillelmo Cockburne Doctore Medico Anglo, gonorrhœæ sedem in viris quidem in urethra tantum esse, numquam in prostaticis, vesiculis seminariis, aut glandulis Cowperianis: In fœminis vero in vagina tantum, numquam in prostaticis glandulisque Cowperianis, in quo certissimis observationibus nullo argumento, sed ex præjudicio tantum repugnat.

11. Profuit in gonorrhœa semen aliquando calens, acre, dilutum, puriforme. Prodit ergo tunc et conceptaculis æstuantibus, irritatis, laceffitibus, motu systaltico frequenti sese constringentibus, uno verbo et conceptaculis phlogosi vel inflammatione affectis.

Profuit in gonorrhœa semen aliquando calens, acre, puriforme; punctis, striis, filamentis sanguineis notatum, vere sanguinolentum. Prodit ergo tunc e conceptaculis, in quæ variis valorum circumreptum scissuris sanguis effunditur, hoc est quæ non modo inflammata sunt, sed quod gravius est, in quæ sanguis extravasatur.

Profluit tandem in gonorrhœa semen calens, acre, flavescens, viridescens, graveolens; vere purulentum. Prodit ergo tunc e conceptaculis, quæ non modo inflammata sunt, & inflammata cum extravasatione sanguinis, sed quæ simul erosa sunt & suppurata.

Hinc

Hinc ergo sequitur 1. Tres gonorrhœæ species distinguendas esse ratione causæ: *Primam*, quæ a phlogosi vel inflammatione simplici conceptaculorum feminis: *Alteram*, quæ ab eorundem conceptaculorum inflammatione, sed graviore, & in qua sanguinea vasa $\rho\eta\chi\epsilon\iota$ discindantur, vel διασπῶνται dilacerentur; unde sanguinis extravasatio: *Tertiam*, denique, quæ ab eorundem conceptaculorum exulceratione vel suppuratione dependeat.

Gonorrhœa multiplex est ratione causæ.

2. Tres illas diversas gonorrhœæ species, cum solo gradu differant, inter se ita proxime convenire, ut nisi morbi vehementia cito refrenetur, prima in secundam, secunda in tertiam facile convertatur in gravescente tum causarum tum symptomatum atrocitate.

3. Singulas illas gonorrhœæ species suos habere variosque vehementiæ gradus majores minoresve, pro extensione vel intentione inflammationis; pro numero vel amplitudine vasorum quæ aperiuntur, & aperturarum unde sanguis manat; tandem pro numero, extensione, altitudine exulcerationum.

III. Phlogosis & inflammatio cujuscumque partis quadruplex esse solet, prout cum cæteris tumorum generibus diversimode concurrat; nimirum *phlegmonodæa*, *erysipelatodæa*, *adematodæa*, aut *skirrhopodæa*. Idem ergo statuendum quoque de phlogosi sive inflammatione conceptaculorum feminis, qua gonorrhœa inferitur, atque adeo & ipsa quoque in toridem species pari modo distinguenda est.

III. Differentiæ gonorrhœæ in utroque sexu.

Hinc sequitur 1. Ratione speciei inflammationis, a qua gonorrhœa pendere potest, quatuor nova gonorrhœæ genera constituenda esse, nempe gonorrhœæ. 1. Quæ ab inflammatione *phlegmonodæa*: 2. Quæ ab inflammatione *erysipelatodæa*: 3. Quæ ab inflammatione *adematodæa*: 4. Quæ ab inflammatione *skirrhopodæa* producitur.

2. Proinde futurum esse, ut symptomata, quæ ad singula illa gonorrhœæ genera pertinent, multiplici ratione variant; numero, gradu, genere, pro diversa inflammationis specie, a qua pendebunt.

Sic ergo, ut paucis contraham quæ diffuse dixi, plura sunt summa gonorrhœæ genera pro diversa sede, causa, specie causæ, quæ quidem singula suas habent differentias, numero multas, ut modo dictum est; sed ex quibus, si binæ aut terna una combinentur, multo plures emergunt.

Ne quis autem rot ac tam multiplices differentias gonorrhœæ temere afferri putet, velim attendat totuplices in morbis quibuscumque inflammatoriis a practicis vulgo admitti.

Sic 1. Inflammatio pulmonum in peripneumonia diversum pulmonum lobum, aut diversa ejusdem lobi loca: Sic inflammatio intestinorum in dysenteria diversa intestina, aut diversas ejusdem intestini partes occupant.

Quæ dicta sunt confirmantur exemplis similibus.

pat, ut modo dicebamus de inflammatione conceptaculorum seminis; qua gonorrhœa producitur. Et hinc *prima* classis differentiarum tum peripneumoniz, tum dysenteriz, nimirum *ex sede morbi*.

2. Sic aliquando pulmones levi tantum phlogosi tentantur, & tunc sputa copiosa, calentia, acria, puriformia, attamen mere pituitosa seu limphatica tussiendo ejici; ut in catarrho; quod respondet primæ gonorrhœæ speciei ratione causæ: Aliquando vero gravior inflammatio extravasationem infert, & tunc sputa calentia, acria, puriformia; sed simul punctis, striis, filamentis sanguineis notata, aut vere sanguinolenta expectorari, ut in principio peripneumoniz; quod cum secunda gonorrhœæ specie quadrat: Demum aliquando inflammatio in suppuratum abit, & tunc supra calentia, acria, graveolentia & vere purulenta educi solent, ut in peripneumonia suppurata, quod convenit cum tertia gonorrhœæ specie.

Idem de inflammatione intestinorum dicendum est in dysenteria, unde si inflammatio simplex fuerit, mucus multus, acer, calens, sed pituitosus; ut in dysenteria incipiente: Si inflammatio cum extravasatione sanguinis conjungatur, mucus multus, calens, puriosus, sed sanguine periusus; ut in dysenteria confirmata: Tandem si inflammatio suppuretur, aut exulceretur, mucus multus, calens, sed putris, imo vere purulentus excernitur, ut in dysenteria suppurata vel ulcerosa. Et hinc *altera* classis differentiarum peripneumoniz & dysenteriz *ex causa*.

3. Denique sic inflammatio, qua pulmones in peripneumonia, & intestina in dysenteria tentantur, nunc phlegmonodæ, erysipelatodæ, œdematodæ, aut skirrhotodæ est, ut modo dictum fuit de inflammatione conceptaculorum seminis, quæ gonorrhœam creat: Et hinc *tertia* classis differentiarum peripneumoniz & dysenteriz *ex specie inflammationis*.

Causa
antece-
dens go-
norrhœæ
est virus
venere-
um.

Jam porro, ut in explicanda gonorrhœæ ætiologia procedamus, modo descripta in utroque sexu seminis conceptacula nec phlogosi, nec inflammatione, nec suppuratione aut exulceratione tentari possunt post impurum concubitum, ut in gonorrhœa virulenta, vel omnia vel pleraque tentari certum est, nisi acres, phlogosticæ, corrosivæ particule perverterint naturalem indolem seminis, fluidorumque seminalium, quæ illa continent, quibus jugiter madent, quibus solis possunt impeti. Fatendum ergo in iis, qui ex impuro concubitu gonorrhœam contrahunt, semen cæteraque seminalia fluida inquinari ab admistis infusisque partibus acribus, phlogisticis, & corrosivis, quæ e virulento alterutrius coeuntium semine exhalantes, & cum sano altero communicatæ *venereum* illud *contagium* constituunt tantopere famosum, quo sensim propagato luem veneream diffeminari supra diximus *Lib. 2. cap. 1.* & quod unicam causam efficientem gonorrhœæ & cæterorum affectuum venereorum esse credimus.

Potest autem virus illud semini ac seminalibus fluidis commisceri via gemina: *Altera brevior & faciliore*, qua in viro quidem a corruptæ scēminæ vagina ad genitalia per urethram ascendit in substantia vel saltem tenuis auræ forma; in muliere vero ab ejecto & intra vaginam admissio corrupti maris semine ad vicina seminis scēminei conceptacula illabitur vel exhalat: *Longiore altera*, qua corrupti seminis guttulæ sanis genitalibus per coitum applicitæ, ac per multiplices poros sensim introgressæ, sanguinem circumfluunt primum, ac inde massam sanguinis totam ita inficiunt, ut semini, dum in sanguine latet, propter analogiam confusæ, una simul ad memorata conceptacula deferantur, ubi sibi permixtæ vires suas exerant eo, quo jam dictum est, modo. Neutram quidem ex his communicationis viis rejectam volumus, cum neutra aliqua veri specie destituatur, quamquam tamen videatur prior, quæ brevior & certior est, cum structura partium, de quibus quæstio est, & cum modo, quo gonorrhœa contrahitur in utroque sexu, magis congruere.

I. Potest autem contagium venereum, quod genitalibus illabitur in actu venereo, vel aura morbifica, quæ ab eodem tunc exhalat, diversa seminis conceptacula afficere, nunc plura, nunc pauciora; 1. Pro uberiore aut parciore copia, majore aut minore energia, ratione quarum vel omnia simul vel pauciora tantum adoriri potest: 2. Pro diversa amplitudine osculorum seu emissariorum, quibus conceptacula singula cum urethra in viris, aut cum vulva in mulieribus communicant, unde virus venereum auramve morbificam facilius uberiusque admittunt, vel contra: 3. Pro diverso compressionis gradu, quo a rigescentibus corporibus cavernosis laudata emissaria varie, hoc est aut hæc aut illa, magis minusve constringuntur & coarctantur, in actu venereo, dum miasmata venerea præsto adsunt in obvia quævis impetum factura: 4. Tandem pro diverso conceptaculorum tono, quæ quidem, si densa sint & sana, afflato veneno magis repugnant, idem vero, si mollia sint & fungosa, altius faciliusque imbibunt.

Hinc ergo futurum est, ut in viris aliquando gonorrhœa in prostaticis, in vesiculis seminariis, in glandulis Cowperianis, imo in cellulis urethræ singularem sedem habeat; aliquando vero pluribus locis simul insideat; quæ de scēminis quoque pari modo debeat intelligi mutatis mutandis.

II. Virus conceptum in actu venereo variis conceptaculis seminis, in quæ admittitur, labem variam varie illaturum est, 1. Pro diversa copia, aut diverso energiæ gradu, quocum agit in singula: 2. Pro diverso tono partium in quas agit, nempe ut molliores vel firmitiores sunt; sensu polent acutiore vel obtusiore: majore vel minore, citatiore vel tardiore oscillatione exercentur: 3. Pro diversa sanguinis indole & quantitate,

Quibus viis virus illud venereum ad conceptacula seminis illabatur?

Quomodo nunc diversa seminis conceptacula.

Nunc eadem, sed diversimode.

aut diverso motus gradu quo truditur, scilicet ut acrior est aut insulsius; copia magis minulve abundat; celerius vel tardius movetur; æstuat impensius parciusve &c.

Hinc ergo futurum est ut in utroque sexu gonorrhœa qualemcumque sedem habuerit, modo phlogodæa tantum, aut simpliciter inflammatoria; modo inflammatoria cum adjuncta sanguinis extravasatione; modo tandem ulcerosa vel suppuratoria sit.

Nunc demum eadem & eodem modo, sed gradu intensiōis diverso affectat.

III. Inflammatio, qua gonorrhœa producitur, diversę speciei futura est, 1. Pro tono partis inflammatę, ut natura mollior erit aut densior; 2. Pro natura & indole sanguinis, ut acrior erit falsiorque, impensiusve rarefcet, aut e contra: 3. Pro copia sanguinis, quę vasis inest, uberiore vel parciore: 4. Pro motus gradu quo agetur, & pro momento quo appellet, nempe ut impetu nūquē majore vel minore in affectas partes arietabit.

Hinc ergo futura est inflammatio conceptaculorum seminis, a qua gonorrhœa pendet, phlegmonodæa, erysipelatodæa, œdematodæa, vel skirrhodæa.

§. III. SYMPTOMATA.

Gonorrhœę, sicut ceterorum morborum, quatuor sunt periodi, principium, augmentum, status, & declinatio, unde varia est symptomatum ratio, gradus, vehementia.

I. Principium morbi levioris.

1. Stillicidium seminis.
2. Extremæ urethrę rubor & calor.

In augmento.

3. Titillatio, prurigo, phlogosis genitalium.

4. Inflammatio conceptaculo.

I. Initio gonorrhœę 1. Acres & corrosivę contagii partes recens admisse conceptacula seminis, in quę insinuatę sunt, ad majores & citatiores contractiones sollicitant punctiunculis: Unde uberior secretio, atque inde *stillicidium seminalium fluidorum dilusiorum*. Sic & pari profus ratione fumus lacrymas ab oculis, piper salivam ab ore elicit.

2. Stillaticię illę humoris seminalis guttulę, quę rarioribus guttis tacite depluunt, extremas urethrę oras, ubi hærent suspensę, primum agglutinant, ac deinde vi phlogostica inflant & rubefaciunt, unde *extremæ urethrę calor & rubor*.

3. In morbi augmento, invalescentibus in dies moribus a latente seminio illatis, internę conceptaculorum tunicę in majores majoresque crispationes gradatim adiguntur, quibus necessum est extremos articularum fines comprimi, complicari, constringi, atque ideo sanguinem in arteriis capillaribus hære, stagnare, congeri; unde phlogosis conceptaculorum, in quę seminium venereum introgressum est, atque adeo una cum phlogosi *calor, prurigo, titillatio genitalium*.

4. Quin imo diuturna causarum earundem præsentia consequens est ut singula in dies intenduntur; conceptacula fodientur altius; stamina, fibrę, membranę in crispationes adigantur magis enormes; sanguis a

solitis viis penitus præcludatur, præclususque, qua data porta in lateralialia vasa lymphatica tandem irrumpat. Hinc ergo *inflammatio* proprie dicta *conceptaculorum seminis*, cum acuto caloris & acrimonie sensu.

rum (seminario-
rum.

5. Contingit plerumque ut urethra simul & eodem modo ipsa quoque inflammetur. Saltem ubi primum inflammata sunt seminis conceptacula, debet & ipsa, quæ in utroque sexu illis contigua est, cito inflammari. At vero inflammata urethra debent fibræ nervæ, quæ urethræ intertextæ sunt, magis tendi, atque ideo a præterfluente urina vividius succuti. Hinc ergo inter mejendum acer, mordax, urens doloris & caloris sensus in urethra, sive *dysuria*.

5. Dysuria.

6. Acutior doloris sensus in urethra inter mejendum involuntariam spinsteris vesicæ constrictionem advocat ex noto sympathiarum mechanismo. Hinc ergo supprimitur involuntarie urinae fluxus, sed qui suppressus momento temporis denuo permittitur voluntatis imperio, similibus de causis iterum iterumque deinceps & supprimendus & permittendus alternatione eadem. Hinc ergo fit, ut urina non æquali tenore & fluxa continuo emittatur in gonorrhœa, sed laboriose, interruptis vicibus, subsultim, guttatim, & quasi per stillicidium, hoc est ut *stranguria* cum dysuria conjungatur.

6. Stranguria.

7. Calentia & inflammata seminis conceptacula ipsa quidem acutius sentiunt; vividius vero percelluntur a semine aut seminali fluido, quo turgent, acris & calidiore. Hinc ergo liquet multiplicari & intendi utraque causa veneræ genitalium titillationes, acceleratores proinde & erectores musculos ex sympathiarum legibus in contractiones majores & frequentiores agendos esse, penemque sponte identidem inflandum & tendendum esse, unde *frequens & involuntaria erectio*.

7. Frequens & involuntaria erectio in viris.

8. Simili mechanica sponte & sine præviis veneris illecebris excitatur in mulieribus, quæ gonorrhœa laborant, frequens & involuntaria contractio fibrarum carnearum vaginæ, tum longitudinalium, tum circularium, unde frequens & involuntaria *vaginæ rigescencia* & *clitoridis semigo*, etiam dum libidinose non cogitant.

8. Vaginæ & clitoridis semigo infœminis.

9. Sed dum penis, erigitur, necesse est urethram distrahi, & prostates, vesiculas seminales, & glandulas Cowperianas, quæ peni appositæ sunt, comprimi. Illæ vero partes, cum ex dictis inflammatae sint, neque distrahi, neque comprimi possunt sine acuto dolore. Ergo necessum est *erectionem penis*, quæ in gonorrhœa frequenter supervenit, *dolorificam tunc esse*.

9. Erectio dolorifica.

10. Pari quoque modo in fœminis, dum riget & tenditur vagina turgine, interior illius membrana complicatur, premunturque prostatae & glandulæ Cowperianæ, quæ vaginæ adjacent. Sed nec membrana illa complicari, nec prostatae glandulæque Cowperianæ premi possunt citra dolo-

10. Vaginæ turgigo dolorifica quæ.

rem seivum, quippe quæ inflammatione tentantur. Igitur & in foeminis quoque rigida *vulva & vagina sentigo dolorifica* futura est in gonorrhœa.

11. Difficilis usus rei venereæ in utroque sexu. 11. Quandiu inflammatio verendorum aestu viget, nec in viro penis erigi, aut erectus intrudi; nec in foemina vagina dilatari, aut dilatata succuti potest sine dolore, cujus intensio inflammationis intensiori respondeat. Non possunt ergo, nec vir, nec foemina, quandiu gonorrhœa inflammatoria laborant, *veneri indulgere sine dolore*.

12. Copiosus effluxus seminis, vel humoris seminalis. 12. Quandiu manet inflammatio conceptaculorum seminis, tandiu fluida seminalia debent uberius secerni gemina de causa, tum quod majoribus & vehementioribus arteriarum oscillationibus fortius exprimantur per colatoria, tum quod ab hærente & stagnante cruore colatoris suggerantur uberius. Hinc ergo *copiosus & perennis effluxus seminis aut fluidi seminalis*, dilutoris, calidioris, acrioris, cujus jugi distillatione omnia ingravescent & exacerbantur.

13. Effluxus seminis vel humoris dilutioris & acrioris, sed qui colorem naturum retinet. 13. Semen autem, fluidave seminalia, quæ in hac gonorrhœæ specie a genitalibus distillant, quanquam diluta, acria, calentia sint, nativum tamen *colorem fere retinent*, nimirum, *albicantem* vel ad summum ex *albo cinereum*, quoniam sincera sunt nec ullam alieni humoris mixturam experiuntur, quo possit nativa facies corrumpi vel inquinari. Sic in peripnervmonia incipiente vel levi, ubi nulla adest extravasatio aut suppuratio, sputa licet caleant & acria sint, attamen mere pituitosa sunt, atque adeo e cinereo-albicantia, quandiu sunt impermixta.

• Ea solet esse morbi periodus in leviori gonorrhœa quæ fit a phlogosi vel a simplici conceptaculorum seminis inflammatione sine extravasatione & exulceratione, & quæ maxime in ægotantibus optime constituta, & in quibus tum a sanguine vitium, tum ab affectis partibus abest antecedens labes, intra mensem unum plerumque sanatur, modo inflammatio, quæ affectis partibus inducta est, provido remediorum usu & diætæ regimine sine graviore noxa resolvatur.

• II. In morbo graviore & difficiliore. II. Contra vero si nimia fuerit admissi contagii acrimonia vel copia; si inflammationi nullis vel inefficacibus remediis occurratur; si error admittatur in diætâ gravis, multiplex; si sanguis in ægotante peccet acrimonia, aut si loca affecta labe aliqua male prius habuerint, omnia solent inde intendi, in pejus gradatim ruere, & ad eum gradum tandem deduci, qui summus est morbi status.

1. In viris perinæum in foeminis vulva & vagina calent & dolent. Nempe 1. *Perinæum* quidem in viris, in foeminis vero *vulva & vagina impense calent, tument, dolent*, quod in viris substrata perinæo, in foeminis adita sint vulvæ ac vaginæ conceptacula seminis, quæ gravi tentantur inflammatione.

2. Interna conceptaculorum facies semini moribus objecta violentis crispationibus discinditur, vel iteratis punctiunculis tandem eroditur.

ditur. Tunc ergo rorant ex hiulcis vasis guttulæ sanguinis, quibus dilutus, confusus, intime commixtus natus seminis, aut seminalis fluidi color inficitur. Hinc *crocea, flava*, aut *subflava sunt fluida illa seminalia*, quæ in gonorrhœa gravi distillant; haud dispari ratione ac in peripneumonia sputa flava, seu potius rubiginosa tussii ejiciuntur, quoties infuso sanguine pauco vitiata sunt.

3. Ingravescentibus sensim primis illis scissuris, ulcuscula in conceptaculis generantur, lata vel exigua, alta vel superficialia, pauciora vel numerosiora, pro contagii vi, sanguinis acrimonia, aut partis ipsius mollitie; unde pus saniesve jugiter manant, quibus fluida seminalia jam flava viridi vel ex flavo viridi colore tinguntur. Hinc *profluvium humoris spissioris, acrioris, corrosivi, purulenti, viridis aut ex flavo-viridescentis*, qui ex semine vel seminali fluido, paucissimis sanguinis stillis & aliquot puris guttis componitur. Sic in peripneumonia sputa solent ex flavo virescere, quoties latet in pectore suppuratio vel exulceratio.

4. Jugi defluxu humoris istiusmodi, uberioris, acrioris, vere purulenti necessum est urethram magis ac magis inflammari in dies; imo vero ulcusculis non paucis interdum affici, potissimum in extremis emissariis, quibus ab inflammatis conceptaculis morbosus humor urethræ infunditur, & quibus adhærescit diutius. Hinc ergo futurum est ut vividius a præterfluente lotio percellatur inter mejendum, unde non leve augmentum accedet *dysuria & stranguria*.

5. Urethra graviter inflammata aut ulcusculis faucia non potest in erectione penis vi distrahi sine acerbo doloris sensu; quantumcumque vero distrahatur, non potest unquam peni in erectionem nitenti coextendi: Quamobrem necessum est penem erigi cum dolore summo, & cum maxime riget deorsum inflecti & incurvari quasi chorda subtrinsa, unde tunc *gonorrhœa chordata* dicitur.

6. Quandoque vero accidit, sed raro & in gravissima tantum gonorrhœa, ut ligamentum membraneum, quo dorsum penis commissuræ ossium pubis alligatur, quin imo alterutrum e corporibus cavernosis, quæ penem constituunt, inflammatione afficiantur; quæ si eveniant, necessum est & penem cum dolore distendi, & *distentum vel sursum reflecti, vel ad alterutrum, latus oblique declinare*.

7. Cum urethra inflammatione vel exulceratione laborat, haud rarum est post erectionem guttulas striasve sanguinis cum semine aut seminali fluido, quæ a genitalibus manant, commisceri, quæ a discissa urethra disruptivæ ulcerum labris proveniunt.

8. Quod si inflammatio ab urethræ superficie altius penetret & ad celulosam usque substantiam, qua urethra cingitur, gradatim promoveatur, inde futurum est ut membranaceæ illius substantiæ cellulæ expansioni

2. Effluxus humoris, flavi, crocei, subflavi.

3. Imo viridis, aut ex flavo-viridescentis.

4. Acerbiores dysuria & stranguria.

5. Gonorrhœa chordata.

6. Incurvatio vel distortio penis.

7. Effluxus sanguinis post erectionem.

8. Sensus constrictionis in erectione.

fioni valide repugnent, dum penis tenditur, & si forte cedant, gravem ab expansione dolorem experiantur. Unde *dolor ille, sensusque valide constrictionis*, qua penis stringi videtur, cum in erectionem nititur.

9. Dolor similis in vagina.

9. Debent hæc eadem de mulieribus intelligi, quæ ipsæ quoque *acutum doloris & adstrictionis sensum solent experiri in vagina & in vulva*, si partes illæ involuntaria tentigine rigescant, quandiu inflammatae sunt.

10. Tunc ergo venenis usus in utroque sexu valde dolorificus.

10. Proinde neque vir neque femina *veneris usu frui possunt in graviore gonorrhœa, nisi cum dolore ac labore summo*, & quod plerumque pejus est, cum manifesta morbi exacerbatione.

Cum gonorrhœæ malitia, vi seminii morbofi, ægrotantis incuria, medentium culpa aut alio quocumque fato eo ulque processit, cauta ac diligenti therapeja opus est, quæ inflammationi & erethismo genitalium occurrat, quæ symptomatum vehementiam leniat, quæ conceptacula tabo disfluentia detergat, quæ latentes seminii reliquias profliget & eliminet, demum, quæ ulcera cicatrici repugnantia consolidet, sed hæc singula, cum sint factu difficilia, multi temporis indigent.

III. In morbi remissione.

III. Si ea ex votis succedant, 1. Remittente inflammatione *remittent pari passu calor, dolor, erethismus genitalium*.

1. Dolor minor.
2. Humor feminalis candidior.
3. Flocci limphatici in lorio.

2. Seminalis humor, qui profluit, in dies futurus est *sincerior, spissior, candidior, minus acer & mordax*, semini aut feminali fluido magis analogus, cum semine tandem perfecte concolor & congener.

4. Cessat seminis profluvium.

3. Cum ulcus ad coitionem properat, fere perpetuum est *emitti limphaticos floccos florum instar spissos, densosque*, qui velut ramenta urinæ innatant, & qui limpha nutritia constant, quæ dum ulcera resarcit, in ipsis conceptaculorum canaliculis in floccos inspissata conformatur.

4. Denique resoluta inflammatione & ulceribus cicatrice obductis, *sponse cessat seminis, seminalis fluidi puriusve profluvium*, & omnia naturalis œconomiz munia instaurantur.

§. IV. DIAGNOSIS ET PROGNOSIS.

I. Diagnostis gonorrhæ in viris.

I. *Diagnostis gonorrhææ virulentæ facilis est in viris*: In illis enim quicquid ex urethra defluit, vel a conceptaculis seminariis manat; ut semen, feminalis fluida, pus &c. in gonorrhœis; vela vesica, uretheribus, renibusque ut pus, sanies, mucus, & mucosa pituita in variis renum & vesicæ affectibus. Utcunque vero materiz, quæ ex utroque loco ejiciuntur, conveniant aliquando specie, forma, indole, quod tamen perpetuum non est, certe differunt semper modo quo ejiciuntur. Hæc siquidem nunquam nisi cum urina defluunt, atque adeo nunquam nisi dilatato vesicæ sphinctere, quod nempe a loco proveniant ultra sphincterem posito; illæ vero seorsim ab urina prodeunt solæ, etiam cum sphincter maxime contractus est, quod a conceptaculis manent citra sphincterem sitis.

Hinc

Hinc ergo obvium est discrimen, quo gonorrhœæ quævis a variis puris aut muci stillicidiis ex velica dignoscantur. Sed neque operosius est quod superest conficere, nempe gonorrhœas diversas distinguere; *simplices*, quæ inassuetæ potationi cerevisiæ; equitationi nimis; immo-derato usus veneris; etiam puræ; aut clysteri calidius admissio succedunt: Et *virulentas*, quæ usus impuræ veneris contrahuntur contagione. Prior-
es enim sine erethismo invadunt, sine dolore fluunt, cito & sponte ces-
sant, nec ulla stipantur malignitate. Posteriores vero gravem dysuriam
advocant in principio, diuturnæ sunt difficilesque, ac manifesta acrimo-
niæ & virulentæ indicia præbent tota ægrotatione.

At vero non ita certa est in scæminis gonorrhœæ virulentæ diagno-
sis. Quæcumque ad vulvam in iis confluunt, vel a vesica per urethram, Et in scæ-
minis.
ut in vesicæ, renumque affectibus modo declaratis; vel ab utero per
vaginam, ut in fluore muliebri; vel demum a prostaticis, glandulis
Covvperianis, glandulisque botryformibus vaginæ desluunt, ut in go-
norrhœis cujuscumque speciei. Quæ modo quidem diximus circa viros,
valent hæc eadem in scæminis quoque, tum ad discernenda puris aut
muci stillicidia, quæ a vesica prodeunt, a gonorrhœis quibuscumque,
quæ a conceptaculis seminariis manant; tum ad distinguendas diver-
sas gonorrhœæ species, nempe simplicis aut virulentæ. Verum solet in
scæminis gonorrhœa cum fluore albo, qui ab utero per vaginam ma-
nat, sæpissime confundi, ad quem sane, ut primum inflammationis ve-
hementia remisit, videtur ipsa proxime accedere; & cui errori favent
mulieres, quæ morbi causas, vel ignorant aliquando bona fide, vel
data opera plerumque mala fide dissimulant.

Itaque si rei veritas, notitiæque primævæ indolis morbi ex ægrotæ con-
fessione elici non possit, vel propter ignorantiam, vel propter dissimula-
tionem pessimam, tunc una superest veri indagandi ratio, nimirum si
vulva introspectiatur. Monuimus enim supra tres in mulieribus sedes esse
gonorrhœæ, prostaticas, glandulas Covvperianas, & glandulas vaginales.
Quamobrem si purulenta materies ex prostaticis per lacunas in superiorem
vulvæ partem, aut ex glandulis Covvperianis in inferiorem exprimitur,
inde palam futurum est scæminam gonorrhœa laborare, non fluore albo,
quoniam in illo materies putris ab utero per vaginam promanat. Quod
adhuc certius constabit, si qua simul appareant inflammationis aut saltem
phlogoseos signa in iis vulvæ locis, quibus prostaticæ aut glandulæ Covvpe-
rianæ adident, dum cætera vulvæ loca ab omni labe immunia sunt.

At si gonorrhœa vaginalibus glandulis forsan insideat, ut insidet sæpe;
ultra consistendum est ne vulvæ quidem inspectione a fluxu muliebri ul-
lo pacto distingui posse, quippe qui & ipse viam eandem conspurcet:
Unde tunc futurum est ut res in ambiguo sit, donec aperta confessio ægro-
tæ;

tæ, mariti aut viri cui consuevit, verum tandem prodat; vel mali natura conjecturis saltem definiatur captis ex diuturnitate & difficultate morbi, aut ex symptomatis, quæ pedetentim superveniant, & quæ veneream causam attestari videantur.

Haud me latet tamen quid a Scriptoribus *, nonnullis vulgo afferatur ad instituendam, ut ipsi putant, certissimam utriusque morbi diagnosim. Volunt nempe fluxum gonorrhœicum & virulentum esse, quoties permanet conspicuus fluentibus etiam catameniis: Contra vero fluorem muliebrem seu album esse, quoties evanescit, seu potius videtur evanescere prodeuntibus menstruis, non rediturus nisi postquam menses cessaverint.

Sed hæc, quantavis proferantur confidentia, ad gonorrhœam virulentam fluore muliebri dignoscendam nequaquam possunt conducere: Neque enim satis vera sunt de fluxu gonorrhœico, qui a prostaticarum aut glandularum Cœvperianarum labe dependeat; at vero certissime falsa sunt de gonorrhœico omni fluxu, qui a vaginalibus glandulis scaturiat.

1. *Non satis vera sunt* de gonorrhœico fluxu, qui a prostaticis fœmineis, glandulisve Cœvperianis manet: Licet enim virulentæ materiei scaturigo a vagina, quæ catameniorum via est, nonnihil tunc distita sit, cum iisdem tamen quandiu profluunt, maxime si profluant uberit, debet ea materies ita commisceri in vulva, atque adeo atro seu purpureo colore ita infici, ut plerumque nulla ratione possit jam amplius dignosci in mulieribus, quandiu menstruantur.

2. *Certissime falsa sunt* de gonorrhœico fluxu, quicumque a botryformibus vaginæ glandulis scaturit; cum etenim materia virulenta, quæ inde defluit, cum menstruo sanguine ab utero vel a vagina depluente & diu & per intima subacta confundatur in ipsa etiam vagina haud dispari modo quam limpha ipsamet, quæ in fluore albo distillat ex iisdem locis, inde necessum est ut gonorrhœicus fluxus iisdem plane vicissitudinibus obnoxius sit, quibus fluxus ipse muliebris, atque adeo de utroque perinde verum sit, quodcumque de alterutro. Quapropter liquet nulla inde erui posse signa, quæ morbum a morbo dijudicent & distinguant, in quo consentientem habemus experientiam.

II. De sede gonorrhœæ nullis constat indicibus certis; neque magnopere opus est ad curationem, cum ubivis gonorrhœa sedem habuerit, eadem fere remedia ex usu futura sint. Haud inanibus tamen conjecturis potest colligi, gonorrhœam insidere.

1. *Prostata & vesiculis seminariis*, quæ ejusdem mali consortes esse solent propter viciniam, nempe quoties materies uber est; tumor dolorque perinzum longe lateque occupant, & altius sepulti videntur; testes sine cau-

* Præsertim a Charletoſon in *Genealogia Rheumatismi uterini, seu fluvii albi Historia.*

causa vel saltem levi de causa in morbi societatem veniunt; denique symptomata omnia dolor; calor, erethismus genitalium intense urgent. Conjicitur autem vesicula alterutra tantum affici, si alteruter tantum testis caleat, doleat, tumeat, utraque, si uterque.

2. *Glandulis Cowperianis*, quæ mole parvæ sunt & situ cutaneæ, quoties tumor & dolor minus extensi, magis superficialii, & ad anum propius adpositi sunt; pauca defluit materies; symptomata remissa sunt. Conjicitur pari modo utramque glandulam Cowperianam simul ægrotare, si tumor, calor & dolor ani confinia occupent ad utrumque latus raphes; alterutram vero, si ad alterutrum tantum.

3. *Cellulis urethræ*, quoties paucissimus humor distillat, nullusque in toto perinæo tumor, dolor aut calor percipitur. Vix tamen credo ab affectis solis urethræ cellulis gonorrhœam ullam unquam induci posse, præter gonorrhœam illam, quæ sicca dicitur, & de qua infra.

4. Demum *omnibus simul partibus* memoratis, quoties omnia memorata indicia una concurrunt, atque adeo gonorrhœa intensissimo genitalium calore, ardore, erethismo stipatur.

III. Causa triplex, qua gonorrhœam produci dictum est, non tam ex diversa symptomatum natura dignoscitur, quæ plerumque æquivoca videri possit, quam colore diverso humoris distillantis, de quo certum esse potest iudicium.

III. Diagnostica
causæ
gonorrhœæ.

Sic 1. Humor pellucidus, albicans, vel ex albo cinereus, uno verbo coloris retinens, qui semini aut feminali fluido naturalis est, *phlogosim* aut simplicem tantum *inflammationem*.

2. Humor idem croceus, flavus aut obscure flavescens, atque adeo confusus, dilutis & intime commixtis sanguinis guttulis tinctus *inflammationem*, quæ cum *extravasatione* conjuncta sit.

3. Denique humor ex flavo virescens, viridis aut atro-viridis adeoque puris admixti præsentia contaminatus *ulcerosam* aut *suppuratoriam inflammationem* arguit.

IV. Haud dispari ratione de specie inflammationis conjiciendum est.

Nempe 1. *Oedematodeam* esse, si copiosa manet materia, sed serosa, diluta, parum mordax; si dysuria, calor, erethismus genitalium mediocres sint, cum molli perinæi tumore.

2. *Phlegmonodeam*, si materies non quidem minus uber distillet, sed spissior ac mordacior; si dysuria, calor dolorque genitalium acerbiores sint; cum manifesto & firmo perinæi tumore.

3. *Erysipelatodeam*, si dysuria, calor, dolor & erethismus genitalium intensissime urgeant; si fluat materies pauca, sed acerrima, mordacissima & summe flava; neque tamen perinæi tumor symptomatum vehementer respondeat.

IV. Diagnostica
differen-
tiarum
gonorrhœæ.

4. Ultimo *Skirrbo*deam, si tumor manifestus & renitens perinæum occupet; si pauca profluat & spissa materies; si dolor, calor, crethismus genitalium moderati sint; si remittente dysuria supersit stranguria propter compressionem a skirrhosis prostaticis aut vesiculis seminariis appositæ urethræ illatam.

I. Prognosis gonorrhææ in genere.

Prognosis. I. Cum gonorrhæa morbus sit inflammatorius, debet & ipsa pro more cæterarum inflammationum, quatuor modis judicari, *resolutione, suppuratione, skirrbo, gangrena.*

1. Optimum quidem est *resolvi* inflammationem, quæ gonorrhæam parit: Inde enim cita ac perfecta curatio sine ulla labe, quæ in affectis partibus supersit. Sed resolutio raro succedit, nec fere unquam nisi in levioribus gonorrhæis, & in quibus ægri tum iteratis sanguinis missionibus ultro acquiescunt, tum a regula & præscriptione diætæ ne latum quidem unguem discedunt, quod in ægrotantibus perrarum, præsertim cum (a) propter adolescentiam minus vident, magis impense cupiunt, consulunt parum.

(a) Tendent. A. delph. Act. 5. Scen. 9.

2. Gravius est vero inflammationem in *ulcus* vel *suppuratum* abire, ut in omni gonorrhæa, si a principio negligatur, fere perpetuum, & in gravi haud infrequens est quantacumque cura adhibeatur. Tunc enim 1. Curatio tardior est diuturniorque, quia ulcus vel apostema inde genitum pedetentim & gradario progressu detergendum, carnis obplendum, cicatrice obducendum est. 2. Minus perfecta, quia, etsi cætera incommoda abessent, at certe cicatrix supersutura est, quæ si nimis dura, aut æquo fungosior fuerit, urethram perinde angustatura est, unde stranguria, gonorrhææ pedissequa.

3. Idem impendit periculum, si inflammatio in *skirrhum* convertatur; nam pars skirrhodæa urethram, cui adjacet, ita mole comprimit, ut illa exiturienti urinæ ægre pervia sit, unde stranguria habitualis in ischuriam facile degenerans.

4. Demum de ægri salute fere conclamatum est, si inflammatio in *gangrenam* desinat, ut cui cum in occulto lateat, efficaciter mederi difficillimum sit. Absit tamen de gonorrhæa vix unquam tam male ominari, nisi fato pessimo inflammatio urens, deleteria, intensissima sit; nisi omnia omnino auxilia omittantur; quin imo nisi pars inflammata diuturna equitatione, aut coitione immodica, compressa, contusa, male habita fuerit.

II. Prognosis gonorrhææ pro diversa sede.

II. Cæteris paribus gonorrhæa levior est, si quod tamen rarum est, *glandulas Cowperianas* tantum afficiat, quia cum parvæ sint & cuti proximius subjectæ inde morbus minor est, & topicis remediis non inaccessus; seminis purulenti effluxus parciore; & abscessus, si forte acciderat, curatu faciliore cunctis incisis.

Con.

Contra vero *gravior* est *gonorrhœa*, quę sedem habet in *prostatibus* aut *vesiculis seminariis*, tum quia cum majores sint, inde quoque major est & latius extensa inflammatio, uberiusque seminis putridi effluvium; tum quia si loca affecta abscendant, sanatio difficilior & lentius successura est.

De prognosi gonorrhœę, quę *solis urethrę cellulis* insideat, vix quidquam dicendum occurrit, cum hujus tractatio ad secundum sequentis capituli articulum pertineat, ubi de *gonorrhœa siccā*.

III. Gonorrhœę fata, discrimina, therapeję differunt quoque inter se pro diversa inflammationis specie, a qua morbus dependet.

Nimirum 1. Si ab *ædematodea*, nec acerbā egrotatio, cum omnia lenia vel saltem moderata sint, nec curatio difficilis futura est, cum plerumque nulla, vel ad summum levis tantum fiat exulceratio. Quamobrem parcius sit sanguinis missio, rarius diluentium & humectantium exhibitio; contra vero purgatio frequens, iterata, sicut & usus prisanę sudoriferę ex lignis Guajaci & Sassafras, radicibusque Chinę & Salsę-parillę; alioquin enim metuendum foret, ne per relaxata sero conceptacula, aut conceptaculorum emissaria aquosius semen distillaturum sit, etiam post curatam gonorrhœam.

2. Si a *phlegmonodea*, majus imminet periculum futurę suppurationis, ideoque præmissis venę sectionibus pluribus largiter exhibenda diluentia, demulcentia, anodyna, a quorum usu non prius desistendum quam genitalium calor & erethismus manifeste remiserint.

3. Si ab *erysipelatodea*, jure metuendum est, ne gravis succedat partium affectarum exulceratio, ideoque præmissis venę sectionibus, non diluentibus modo, demulcentibus & anodynīs insistendum est, ut in casu præcedenti, sed etiam narcoticis, quę acutiorem partium dolentium sensum obtundant minuantque.

4. Tandem si a *skirrnodea*, non omittenda quidem remedia, quę hætenus indicata sunt, sed diligentissime curandum, ut interno usu præparationum mercurialium, ac potissimum externis perinę inunctionibus cum unguento mercuriali materia in affectis conceptaculis hærens & impacta discutiatur & resolvatur.

IV. Ceterum gonorrhœa qualiscumque, modo medicina adhibeatur opportuna, periculo vacat, ac feliciter sanatur, tardius citiusve pro symptomatum vehementia, contagii venerei acrimonia, varia sanguinis diathesi &c.

2. Verumtamen si gravior fuerit, ac diutius repugnaverit remediiis, curatę solet plerumque superesse involuntarium & habituale seminis stillicidium, ob erosa, dilatata, vel relaxata prostatare aut vesicularum seminariarum emissaria.

3. Gonorrhœa lucem veneream numquam inducit, modo semen aut semi-

III. Diagnōsis gonorrhœę pro diversa specie inflammationis.

IV. Diagnōsis gonorrhœę pro natura symptomatum.

seminale fluidum contagio venereo contaminatum ubertim & libere profluat, quia admissum virus exhauritur, potissimum quidem, si simul ea usurpentur remedia, quæ eidem scopo accommodata sunt.

4. At vero si virulenti seminis aut seminalis fluidi effluxus supprimatur aut imminuatur, tunc refluxu morboſi ſeminii ſanguinem contaminari neceſſum eſt, atque adeo luem veneream contrahi. Supprimitur autem vel imminuitur effluxus ille pluribus de cauſis, 1. Superventu febris, unde aucta partium affectarum inflammatione ſeminis emiſſaria obſtruuntur: 2. Callo vel fungo in exulceratis conceptaculis ſeminaris oborto, quo eadem emiſſaria comprimentur vel offi- ciuntur: 3. Præpoſtero aſtringentium uſu, quibus emiſſaria eadem conſtipantur. 4. Inflammatorio vel ſkirrhotico teſtium tumore, quo ſemen congeſtum retinetur.

5. Gonorrhœa cujuſcumque ſpeciei fuerit, ſolet in ſœminis toleratu faciliore eſſe, cæteris paribus, quam in viris: Quod illæ nulli vel ad ſum- mum levi dyſuriæ obnoxie ſint, nulli quidem, ſi gonorrhœa ſedem ha- beat in glandulis vaginalibus vel Cœvperianis, vel urethra hinc longe diſtet; ad ſummum vero *levi*, ſi ipſi proſtatae inſederit, quamvis enim urethra ab omni inflammatione tunc immunis non ſit, attamen præceps urinae rivus per urethrae ductum, qui brevior eſt latiorque in ſœminis, nulla vel minima noxa facile tranſiit. Contra vero in viris, cum affecta conceptacula omnia cum urethra communicant, quæ proinde mali ſemper conſors eſt, ſit inde ut in his non modo dyſuria perpetuo adſit, ſed etiam ſemper gravior ſit acerbiorque, quoniam præterfluens urina eo vividius urethrae illidis in viris, quo via anguſtior eſt quam in ſœminis, ac illiſus eo pluries repetit, quo via eadem longior eſt.

6. Pari quoque ratione gonorrhœa cujuſcumque ſpeciei ſit, minus gravis eſt in ſœminis, quam in viris cæteris paribus. In viris enim calor & erethiſmus genitalium, qui dyſuriæ morſu induci vel ſaltem intendi ſolent, ſuppurationem aut exulcerationem difficilem plerumque advocant. Tum vero in iſſdem carunculae, hyperſarcoſes, cicatrices, fungi, aliaque id genus, quæ in ulcerola urethra, aut in conceptaculorum emiſſariis adnaſcuntur, viam urinae non raro præcludunt vel anguſtant, unde habitualis ſtranguria, quæ in iſchuriam ſæpe degenerat eſt. Quorum malorum neutrum in ſœminis videtur poſſe cadere, ex iis quæ præcedenti articulo dicta ſunt, vel quæ ſaltem in illas cadunt rariffime.

7. Tandem gonorrhœa cujuſcumque ſpeciei ſit, difficilior curatur in ſœminis cæteris paribus, quam in viris; ſive quod muliebria, quæ natura molliora ſunt, & quæ ut de utero vulgo dicitur, ſunt totius corporis veluti ſentina, ſi ſemel venereo ſeminio laſa ſint, nativo tono difficilior reſtituantur quam virilia; ſive potius, ut mihi videtur, quod

quod scemina facile negligent stillicidia, quæ male curatis gonorrhœis superfunt, ut quibus plerisque naturali vitio familiare sit vulvam ac vaginam humore perfusas experiri; cum e contra viri remediis non parcant, quandiu vel unica humoris guttula e genitalibus profluit, unde sciunt nihil quidquam naturaliter prodire.

§. V. CURATIO.

Tres sunt gonorrhœæ periodi in instituenda curatione caute distinguendæ; Prima *incipientis & consistentis*, in qua calor & erethismus genitalium intense urgent cum gravi dysuria: Altera *remittentis*, in qua urina liberius ejicitur & cum minori dolore, ac pure semen vel feminale fluidum facilius & copiosius profluit: Tertia demum *desinens*, in qua pacato genitalium fervore purulenti seminis vel feminalis humoris scaturigo incipit exarescere.

Curatio
gonor-
rhœæ.

I. In prima periodo, simul ac apparet gonorrhœa, omni ope atque opera minuenda est inflammatio facta vel fiens & futura præcavenda, temperandus urinæ ardor, demulcenda seminis aut feminalis humoris acrimonia, &c.

I. In pri-
ma pe-
riodo.

In hunc finem 1. Sanguis e brachiorum alterutro statim mittendus est, quod perinde ac in inflammatoriis quibuscunque morbis, debet tunc primis diebus pluries iterari, pro ægrotanti viribus ac temperamento; & symptomatum vehementia. Sic enim depletis vasis sanguiferis, & imminuto sanguinis circulantis momento, minor futura est inflammatio & tensio, adeoque calor & dolor tum conceptaculorum seminis, tum urethræ ipsius.

2. Licet operæ pretium sit in omni gonorrhœa sanguinem mittere, largius tamen mitti debet in eis gonorrhœæ speciebus, quæ ab inflammatione erysipelatodæa ac phlegmonodæa dependent, ubi summus est genitalium calor, ardor, erethismus, cum gravissima dysuria, & in quibus proinde haud segnius, parciusve venam tundendam esse opinor, quam in ipsa peripneumonia vel dysenteria.

3. Præscribenda simul pro potu ordinario ptisana ex levi decoctione plantarum aliquot refrigerantium & demulcentium, ut radicum cichorii silvestris, acerosæ, nymphæ, althææ &c. foliorumque parietariæ, agrimoniz, lactucæ &c. addendo pro singulis decocti libris semi-drachmam vel drachmam unam crystalli mineralis, salis prunellæ vel nitri depurati.

4. Alvus si natura aut usu ptisanæ liquida non sit, blande subducenda quotidiana injectione clysteris ex eodem decocto, quo ptisana paratur, vel sincero, vel cum instillato pauco aceto, cum solutis salis prunellæ vel crystalli mineralis ʒj. vel ʒij. aut cum diluta medulla cassiæ recente ad ʒj.

5. Quod si inflammationis ardor tantus sit, ut huic mitigando non suffi-

sufficiat largus ptisanæ usus, tunc exhibendæ bis in die mane scilicet & vesperti emulsiones ex contritis in mortario marmoreo seminibus melonum, agni casti, cannabis, papaveris albi, lini &c. ana ad 3. vel 3ß. vel 3j. & dilutis affuso ad lib. j. decocto florum nymphææ, post colaturam diluendo syrupi de nymphæa 3ij. pro duabus dosibus.

6. Quin imo si omnia intensissime urgeant, conducet cuilibet dosi emulsionis, sed præsertim vespertinæ narcoticum, adjici, quo acutior partium dolentium sensus sopiatur vel saltem obtundatur ut *verbi gratia* syrupi de diacodio unciam semissem, tincturæ anodynæ guttas xv. aut xx. laudant dissoluti gr. j. pilularum de cynoglossa dissolutarum grana v. &c.

7. At vero si debilior stomachus nimium hunc refrigerantium usum non ferat, ut sæpius accidit, tunc omissis emulsionibus sola ptisana utendum erit; imo si ptisana quoque stomacho gravis sit, sola aqua communi, fontana vel fluviatili, assatim hausta, & cui aliquantulum crystalli mineralis vel nitri purificati admixtum fuerit.

8. Verum si morbus remedia vincat & videatur in dies ingravescere, quod tamen numquam fere evenit, nisi maxima ægrotantium intemperantia; si urethra graviter inflammetur, ut in gonorrhœa chordata; si purus putulve sanguis ex descissis ruptisque ejusdem valis promanet; si perinæum caleat, tumeat, doleatque præter modum; si dysuria miserrime urat; tunc iteratis pro Medici prudentia, venæ sectionibus, ac temperato, quantum fieri poterit, genitalium æstu internis remediis, nimirum emulsionibus & ptisana, ut supra dictum est, ad externa quoque sive topica remedia confugiendum erit; itaque 1. Mentula & genitalia lacte tepido fovenda, imo & lacti immersa continenda sunt in infessu: 2. Perinæo admovendum cataplasma de mica panis cum lacte & croco; vel de oryza cum butyro cocta & infuso croco alterata. 3. Decoctum radices althææ, aqua spermatis ranarum dissolutis aliquot sacchari Saturnini granis levissime albescens; vel lac caprillum decocto radices althææ dilutum & infuso croco tinctum &c. in urethram syphone identidem injicienda sunt, impulsu lenissimo, minimè.

9. Conducit quoque usus internus camphoræ & sacchari Saturnini, quæ anodyna & anti-phlogistica facultate mire temperant, & æstum compescunt. Usurpantur autem forma pulveris, vel etiam boli excepta conserva florum nymphææ, vel rosarum ana a gr. vj. ad ʒß. sed cautissime adhibeantur velim, dosique minima, præsertim saccharum Saturninum, cum ab omni noxa non vacet. Prodest etiam aqua Rabelii *capite ultimo Lib. 4.* infra describenda, si ptisanæ refrigeranti ad gratam aciditatem guttatim instilletur.

10. Allato remedium apparatus gonorrhœa, si levior fuerit, intra paucos dies plerumque curatur, restitutis scilicet sanguini naturalis circui-

cuitus viis, ac proinde feliciter resoluta inflammatione conceptaculorum seminis. Tunc evanescentibus derepente dysuria, genitalium fervore, dolore, erethismo, seminisque effluxu æger tam perfecte convalescit, ut dubitet ipse nonnumquam an gonorrhœa virulenta laboraverit.

11. Cæterum toto hoc primo morbi stadio, quod brevius aut longius, gravius aut levius esse solet pro contagii natura & copia, aut ægrotantis constitutione vel continentia, imperanda est diæta tenuis & humectans, nimirum æger pitisanæ non parcat, sed vinum & liquores omnes spirituosos, ex toto sibi circumcidat, exercitiis vehementioribus & veneri valedicat, ac cibis utatur eupeptis & euchymis, quales sunt carnes juniorum animantium, pullulorum præsertim, elixæ vel assatæ, falsis piperatisque condimentis prorsus ablegatis.

II. In altera gonorrhœæ periodo, cujus initium dignoscere facile est ex inflammationis remissione, dysuriæ mitigatione, raritate ac leniore dolore erectionum, denique liberiore seminis aut seminalis humoris effluxu, eo debent indicationes omnes collineare, ut admissi contagii pars maxima facili purulenti seminis manatione eliminetur; cætera portio purgantibus alio avertatur; reliquæ tandem, si quæ forte supersint, ita profligentur ac corrigantur vi adhibiti Mercurii, ut intra sanguinem tragædias agere numquam possint.

II. In secunda periodo.

Itaque 1. Æger identidem purgandus est, principio quidem cathartico blandiore, ne remissa inflammatio recrudescat, *verbi gratia* cum ꝑ ij. medullæ cassiæ in duobus cyathis pitisanæ vel seri lactis depurati dilutæ pro duabus dosibus intra tres horas mane sumendis jejuno ventriculo. Postea vero si ita e re esse videatur, addi poterunt ad efficaciorum catharsum movendam jalappium vel diagridium ad gr. x. vel xij. aut aquila alba ad gr. xx.

2. Valuit olim apud omnes, valetque etiamnunc apud nonnullos usus exhibendi præparata Mercurialia, quæ catharticæ virtutis expertia sint, ut Panaceam vulgarem, sive Mercurium sublimatum dulcem duodecim laboribus exaltatum; Æthiopem mineralem, sive Mercurium sulfure fixatum ignitione; Mercurium violaceum, sive flores ammoniacales Mercurii &c. quorum singulorum dosi in adultis a gr. xv. ad ꝑ j. singulis diebus vel alternis tantum pro Medici prudentia; sed quæ conserva vel syrupo excipiebantur sub forma boli, ne dentes nigrore inficerent illita, imo quod pejus est carie tentarent.

3. Per usum præparatorum Mercurialium istiusmodi diligenter cavebatur, ne aeris humiditate aut frigore ventove vehementiore diaphoresis, quam Mercurialia movebant, cohiberetur, unde fluxiones ac catarrhi graves accidissent. Quocirca jubebatur æger, si tempestas frigidior esset, cubiculo se continere.

N

4. Ubi

4. Ubi primum continuato Mercurialium usu prima apparebant pyralismi indicia, purgatio exhibebatur præcedenti similis vel præcedente paulo validior cum infuso folliculorum fennæ, additis sale vegetabili & manna; vel cum diagridio sulfurato & jalappio syrupo aut conserva exceptis formam boli: eo fine ut versus inferiora deturbaretur materies, quæ ad os irruens pyralismum motura fuisset.

5. Ea methodo alternans præparatorum Mercurialium & purgantium usus pluries repetebatur, ut morbi gradus & symptomatum vehementia poscere videbantur, donec fluxus gonorrhœicus omnino evanesceret, vel abiret tandem in simplex seminis stillicidium aliis remediis coercendum.

6. Verum frequentior illa & iterata præparatorum Mercurialium exhibitio videtur in dies obsolescere; neque injuria, meo quidem judicio. Comptum est enim illorum remediorum usu non modo ventriculi tonum debilitari, viresque infringi, quod sane magnum est, sed etiam quod maximum, sanguinis acrimoniam ita intendi, ut ulcera, quæ in conceptaculis feminis latent, aucta sanguinis dyscrasia, nedum sanentur, sed maligniora fiant & curatu difficiliora. Certe pluries ipse expertus sum, & mecum expertos esse Medicos cæteros nullus dubitet usu Mercurialium caute etiam exhibitorum dysuriam jam remittentem, fluxumque gonorrhœicum satiscientem recruidisse, cum nova humoris manantis virulentia, quam flavus viridifve color, auctaque acrimonia satis indicabant.

7. Ideo ablegatis vel saltem rarius usurpatis præparatis Mercurialibus ore exhibendis, usu jam receptum est frictionibus mercurialibus externe uti, perinæum, genitalia, clunes, inguina in viris; in foeminis vero perinæum, clunes, inguina, pudendi labia, imo nisi gravius inde doleant, vulvam ipsam unguento sive linimento mercuriali ad ignem inungendo. Solent frictiones istiusmodi tertio tantum vel quarto quoque die repeti, adhibita dumtaxat una vel altera unguenti drachma, ne illitus frequentior aut cum majore unguenti dosi pyralismum concitet. Demum ut unguenti reliquæ cuti adhæreant, nec indusio abstergantur, inducenda sunt femoralia, quæ toto curationis tempore gestentur.

8. Ea sane methodus & efficax est & commoda. Efficax quidem, quia atomi mercuriales in cutis spiracula, in vasa limphatica a cute oriunda, in ipsum demum affectarum partium contextum illitu sensim insinuata corrosivas contagii venerei particulas, quibus morbus inducitur, efficaciter impetunt, infringunt, destrunt: Commoda vero, quia eandem mercuriales atomi illitus ope, via brevissima & sine ulla ventriculi noxa ad partes deducuntur, ubi latet seminium venereum, quod neutrum convenit præparatis Mercurialibus interne sumptis, vel saltem minus convenit.

9. Quod si pyralismus videatur inde forsan imminere, adhibita leni

catharsis cum manna vel cassia in sero lactis aut pitana supprimi debet, antequam invalescat; ac postea eidem methodo, sed minore unguenti dosi & longiore frictionum intervallo denuo insilendum est per duas aut tres hebdomadas, vel per mensem unum, donec seminio venereo penitus debellato aut eliminato, gonorrhœa tandem perfecte curetur.

10. Porro in adhibenda ea therapeja cauto opus est, si frigidior tempestas fuerit, ut æger domi & cubiculo sese contineat, quandiu frictionibus utetur; nam Mercurius sanguini per illitum infusus, diaphnoem auget, ut de præparatorum usu modo dicebamus, quæ si frigidioris aeris tactu intempestive reprimeretur, periculum inde foret, ne gravis decubitus aliquo fieret.

11. Dum frictiones illæ adhibentur, non omittenda cætera auxiliorum genera, quæ ad reliquias inflammationis conceptaculorum feminis resolvendas, si quæ supersint; quæ ad detergenda ulcera; quæ ad demulcendam sanguinis acrimoniam utilia sunt; sed e contra eo majore diligentia ab ægotante adhibenda, quod jam ab interno Mercurialium usu vacet.

12. Quod si, dum ea geruntur, recrudescat genitalium inflammatio, aut virulenti seminis fluxus supprimatur, quod utrumque ægotantium intemperantia non raro accidit, potatione, coitione, aut exercitatione nimia; tum omiſsa inutili imo nociva therapeja, opus ab integro instituendum est eandem telam redordiendo, hoc est ea omnia, quæ primo gonorrhœæ stadio conferre diximus, in usum revocanda sunt, donec mitigata inflammatione suppressus humor libere denuo profluat.

13. In hac altera gonorrhœæ periodo eadem ac in præcedente vitæ continentia servanda est. Potest ad summum ægotantibus, si stomacho langueant, concedi usus vini oligophori, & multa aqua diluti, modo cætera omnia prospere procedant, nec ulla supersint fervoris indicia, quamquam tamen, (a) *quia prodest raro, nocet sæpiſſime melius esset non adhibere omnino.*

III. Demum ubi primum sedato ac restincto genitalium æstu, resolutaque inflammatione, ægotans ab erectione involuntaria, tentigine, dysuria &c. liber est, humorque seminalis spissior, lenior, parcius, magisque albicans destillat, tum tertium adest morbi stadium in quo hæc sunt Medici partes, ut ulcera interna detergat deterſaque consolidet, ac tandem acrimoniam, quam sanguis & semen contagii venerei afflatu contraxere, demulcentium & diluentium usu temperet & corrigat.

Ad hunc scopum conferunt 1. Balsama & balsamica omnia identidem ore exhibita per tres quatuorve dies continuos, ut Terebinthina Chia vel

N 2

Vc-

III. In
tertia pe-
riodo.

(a) Cicero de Nat. Deor. Lib. 3.

Veneta a 3ß. ad 3ij. modo sola, modo cum Rheo pulverato a 3ß. ad 3j. aut quæ si non re, saltem nomine præstant, Balsamum Copaivanum, vel Balsamum Canadense ad guttas sex, decem, viginti, triginta, hoc est a 3ß. ad 3ij. Hæc autem triplici ratione possunt exhiberi, nempe ovi vitello diluta in liquore quovis dissolvi; vel syrupo cuicumque, *verbi gratia* syrupo capilli veneris superaffusa uno haustu ex cochleari exorberi; vel demum saccharo pulverato obvoluta boli instar deglutiri.

2. Lac asininum, caprillum aut vaccinum, purgato prius corpore mane jejuno ventriculo exhibitum, imo si stomachus ferat, vespertim etiam ante decubitum, primum quidem & alterum sincerum & impermixtum; tertium vero alteratum aqua secundaria calcis, aut levi decocto radicum Chinæ vel Salsæ-parillæ in pituitosis & adiposis; & levi decocto radicum tormentillæ, consolidæ majoris, bistortæ, vel fragariæ in biliosis, melancholicis & macilentis.

3. Aquæ minerales, acidulæ, vitriolicæ, ferrugineæ, quales sunt in Gallia *les Eaux de Camarets, de Capverd, de Caranfac, de Forges, de Passy*, & aliæ consimilis facultatis, alibi non obviæ, quibus, si per quindecim aut viginti dies epotentur, quidquid acrius falsiusve superest in sanguine vel in semine eluitur sensim & everritur.

4. Quod si ea curandæ gonorrhææ imparia videantur, poterunt interneri adhiberi astringentia, ut corallia rubra præparata, succinum, diaphoreticum minerale, crocus Martis astringens, lapis hæmatites, ossepiæ, sanguis draconis, terra Japonica, vulgo *Catechu* sive *Cachou*, alumen rupeum &c. quorum singulorum dosis a gr. x. ad gr. xx. vel 3j. Ex his numero pluribus vel paucioribus intime mixtis contritisque, & conserva rosarum rubrarum vel syrupo cydoniorum exceptis paratur bolus per duodecim aut quindecim dies devorandus alternis diebus, superbibendo haustum infusi theiformis foliorum siccorum menthæ, vel duo aut tria cochlearia aquæ stillatitiæ menthæ a Quercetano descriptæ in *Pharmacopœa* & a Lazaro Riverio sæpius laudatæ in *suis Observationibus*, cuius processum infra proferemus ad calcem Libri IV.

5. Quin imo, si humor qui a genitalibus diutius aliquando distillat, post discussum æstum ac fervorem paucus sit, tenuis, albicans, viscidus, seminis instar adhærens, vere feminalis, tunc licebit impune uti injectionibus in urethram in viris, in vaginam in feminis, non quidem astringentibus stypticisve, a quibus semper cavendum esse rbitror, sed mere deterfisivis, scilicet ex levi decocto herbarum variarum, ut bugulæ, saniculæ, marrubii, gerani, alkimillæ &c. cu soluto melle rosaceo; vel ex aquis thermalibus, iis maxime sulfureæ sunt, decocto hordei alteratis.

6. Si quis plura desideraverit ad exhauriendas contumacioris gonorrhææ

rhœæ reliquias, adire poterit vel hujusce Libri *caput III. ubi de feminis stillicidio*, quod gonorrhœæ non raro superest, vel sequentis Libri *caput X. ubi de gonorrhœa quæ post bydrargyrosim reliqua est*, agitur.

IV. Cum ad perfectam artis notitiam opus sit, non scire modo quid in curandis morbis agendum, sed simul etiam nosse quid cavendum sit, ideo probe notari velim multa in curanda gonorrhœa virulenta plerumque peccari.

IV. Quid peccari soleat in curanda gonorrhœa?

1. Purgantia mollicha temere præscribendo, ut præcipitata Mercurialia, rubrum, album, luteum, viride; Trochiscos alahandal &c. quæ ventriculi tonum semper debilitant ac pessundant, facultatemque pervertunt; quæ supervomitiones, superpurgationes, dysenteriam, hæmoptoem, lipothymiam, asphyxiam, mortem etiam quandoque inferunt; quæ numquam tuto, quæ raro impune exhibentur; quæ si unquam adhiberi possint a prudente Medico, in robustis tantum, athleticis, rusticis, militibus &c. adhibenda sunt.

2. Decocta, quæ vulgo sudorifica dicuntur, & quæ parantur ex lignis Guajaci & Sassafras, radicibus Chinæ & Sarsæ-parillæ, omnibus indiscriminatim exhibendo. Valent ea quidem ad exsiccanda ulcera in pinguibus & pituitosis, quibus sanguis crassior est aut nimio phlegmate luxuriat: At vero noxia sunt in macilentis, melancholicis, biliosis, quibus sanguis siccior est & falso-acrior, unde insolenti orgasmo, quem cuncti in sanguine, renovant genitalium æstum & inflammationem, & purulenti feminis fluxum augent, acrimoniam intendunt non sine magno ægrotantium detrimento.

Cæterum decocta istiusmodi, si quando conducere videantur, solent subsequenti formula præscribi.

℞. Lignorum Guajaci & Sassafras, ana ℥ij.

Radice. China & Sarsæ-parillæ ana ℥j ℔.

Antimonii crudi crassiuscule triti & nodulo inclusi ℥j ℔.

Ligna & Radices incidantur, & infundantur omnia tepide per noctem in aq. fontanæ lib. ix. Deinde bulliant moderato igne ad tertiam partis consumptionem, addendo sub finem coctionis.

Follicul. fenæ ℥℔.

Radice. liquiritiæ vase ℥j.

Colatura servetur ad usum, ter in die usurpanda ad ℥viii. mane jejuno ventriculo, hora quinta vel sexta pomeridiana, & ante decubitum.

3. Præparatis Mercurialibus interne immoderatus utendo, vel abutendo potius, iis etiam quæ blandiora sunt, ut Aquila alba, Panacea, Æthiope minerali, Mercurio violaceo &c. Hinc enim non modo gravis noxa ventriculo infertur, ut supra dictum est, sed etiam maxime in con-

stitutione falso-acri, sanguinis exandefcentia & seminalis humoris acrimonia adeo intenduntur, ut genitalium ulcera, quæ cicatricem proxime tractura videbantur, aliquando recrudescant & coitioni pervicacius inde repugnent.

4. Denique adhibendo præpostere injectiones astringentes in vaginam in feminis, in urethram in viris, cum lapide medicamentoso Crollii, Colcothare, aut pulvere de VERNY infra describendo *Lib. IV. cap. ultimo*, aliisve id genus pulveribus styptiais, vitriolicis, alumniosis &c. quibus solet tum urethra morbose constringi, unde gravis stranguria, quæ gonorrhœæ plerumque pedissequa est, tum etiam lues venerea inferri, quoties semini aut seminali humori, cujus fluxus supprimitur, vel minima contagii pars adhuc inest, quandoquidem seminum illud intro coercitum cogitur sanguinei, in quem refluit, latente vitio ineluctabilem noxam inurere.

C A P U T II.

De Empiricis gonorrhœæ curandæ Methodis, ac de commentitiis ejusdem Prophylaxi.

§. I. DE EMPIRICIS GONORHOEÆ CURANDÆ METHODIS.

P*rimo.* Proposuimus hætenus Therapejam, quam ad curandam gonorrhœam tutissimam, efficacissimam, experientia maxime comprobata, atque adeo cæteris omnibus jure præferendam esse censuimus. Ne quid tamen in re ita gravi omisisse videamur, lubet & cæteras methodos curatorias, quæ veluti compendiarie a nonnullis commendantur, paucis proferre, ac de iisdem judicium candide simul apponere, ac inani buccinatorum pollicitatione incautionibus fucus fiat. Sed omisis antiquioribus therapeutis, quæ primis luis veneræ temporibus olim adhibitæ sunt, at vero quas dies jam pridem delevit, iis tantum insistemus, quæ vigent hac ætate nostra, & quibus novimus ægrotantes etiam nunc sæpissime deludi.

I. Carolus Musicanus (*) laudat quasi specificum remedium, quo intra triduum gonorrhœa sanetur, & quod spem numquam frustretur, injectionem in urethram sequenti modo præparatam.

R. *Aq. Plantagin. ʒ viij. quibus dissolv. Mercurii sublimati dulcis in alcool redacti ʒij.*

Varia
varias
adhibent
metho-
dos cura-
torias ad
gonor-
rhœam.

Injectiones
in urethram
cum dissolutis
preparatis
Mercuriali-
bus.

Agi-

(*) *De morbis veneris, Lib. 1. cap. 2.*

Agitentur simul, & liquoris illius turbidi ac repidi ℥j. syphone eburneo in urethram injiciatur sex in die.

Asserit Musitanus hac injectione sola, citra omnem alium remedium apparatus, imminetentem vel incipientem gonorrhœam statim reprimi ac veluti sufflaminari, modo abjecta cunctatione injectio adhibeatur ubi primum putridum semen fluere incipit; imo vero antequam quidquam distillet, & statim atque genitalia post suspectum concubitus insolita prurigne titillantur.

Prostat (b) in *alteto praxeos Mayernianæ synagmate* haud dissimilis injectionis formula ad gonorrhœam virulentam, quæ sequentibus verbis exprimitur.

R. *Aq. calcis ℥vj.*

Mellis rosati ℥ij.

Mercurii dulcis in alcohol redacti ℥j.

M. f. inde Injectio in urethram, qua Mayernius ait gonorrhœam virulentam certo sanari præmissis præmittendis, & qua asserit Equitem quemdam, nomine Sir Kenelmum Digby intra quinque dies perfecte curatum fuisse ex gonorrhœa.

Facilis profecto & expeditus gonorrhœam curandi vel præcavendi modus, si veritate niteretur, sed quem maximo gæconum infortunio tum ratio, tum experientia perinde falsi arguunt.

1. *Ratio* quidem. Neque enim verisimile est injectiones istiusmodi contagio venereo jam suscepto mederi posse, tum quod in urethram tantum penetrant, atque adeo ad virus usque venericum non pertinent seminariis conceptaculis jam insinuatam, ubi tragœdias incipit agere; tum quod etsi hucusque forsitan penetrarent, vix possent corrosivas contagii partes tam subito destruere, corrigere vel hebetare, ut mutata natura ab inflammandis seminis conceptaculis illico desisterent. Quin potius meruendum foret nec inani, ut opinor, fundamento ne salinæ & punctoriæ panacæ Mercurialis & crystalli mineralis particulæ, quod de partibus Mercurii dulcis fixioribus magis adhuc verum esset, urethræ interiora & conceptaculorum seminariorum emissaria durius vellicando imminetentem aut incipientem phlogosim seu inflammationem præcipitarent vel intenderent.

2. *Experientia* vero; experimentum enim ipsimet fieri aliquoties justissimum sed sine successu, non quidem in incipientibus aut imminetentibus gonorrhœis, circa quas Medicos adiri rarum est, sed in recentibus; non iisdem quoque formulis, quas modo tradidimus, sed minore Mercurii dulcis aut panacæ dosi, ea scilicet prudentia, quæ Medicum semper de-

N 4

cet

(b) *Trahas, 4. De lue venerea cap. 3.*

cet in experiundo; Numquam vero vel detrimentum vel emolumentum ullum insigne inde accessisse observavimus.

Quapropter conjicerem opinionem de efficacia illarum injectionum inde conceptam fuisse, quod adhibita fuerint in casu ubi nulla imminerebat gonorrhœa, vel si gonorrhœa jam inciperet, in casu ubi gonorrhœa hæc erat e genere leniorum & facile resolubilem, unde socordia aut vaniloquentia temere creditum fuerit, harumce injectionum ope imminentes gonorrhœas præcaveri aut incipientes supprimi, cum revera tamen laudatæ injectiones nihil ipsæ præstiterint, aut ad summum felicem eventum, qui sponte futurus erat, non corruperint.

Si cui tamen rem denuo experiiri lubuerit, per me quidem facile licebit, modo periculum fiat non in gonorrhœa admodum virulenta, cum urethra & conceptaculis seminis graviter inflammatis dysuria adeit urens, mentula velut subtenfa chorda retracta deorsum incurvatur, abscissus in perigo imminet &c. sed in leni & incipiente gonorrhœa, ubi cum omnia mitiora sint, delictum levius posset minori damno permitti, si forsan committeretur experiundo.

H. Thomas Bartholinus (a) commendat in gonorrhœa virulenta sequentem infusionem, quam ipse quoque Fridericus Hoffmannus (b) approbat.

R. Cantharidum pulveratar ʒj.

Infund. in vini Rhenan.

Vel spiritus vini ʒiij.

Stent in infusione per aliquot dies, deinde per chartam bibulam filtrantur. Ex colato liquore coclear unum septem aliis coclearibus seu vini seu cerevisiæ admisce. Ex hoc mixto primo die coclear unum, altero die duo, & sic deinceps propinentur.

Martinus Listerus quoque in *Exercitatione Medicinali de lue venerea*; videtur nec ipse usum infusi cantharidum reformidare, quo se bis usum fuisse refert in egrotis scilicet 11. & 12. In priore quidem casu *drachma una cantharidum digeritur cinere calido cum multis aliis in speciebus in spiritus vini rectificatissimi libra semisse*; Infusum filtratum per chartam bibulam bis in die præscribitur ad guttas xxx. in cerevisiâ tepida. In posteriore vero *cantharidum drachma una digeritur per diem balneo mariæ cum cocbenilia in vini Rhenani lib. j. & hujus infusi coclear unum cum decocto Guajaci bis quotidie exhibetur.*

Constat similiter cantharides in substantia a Paulo Hermannò (c) in *Cynofura materie Medice* proponi ad corrigendam gonorrhœam virulentam, incipiendo a dosi minori, scilicet a gr. β. & si fiat cum agri levamine ad gr. j. vel,

(a) *Hist. Anatomicar. Centur. 4. Epistol. 53. Et Centur. 5. Hist. 82.*

(b) *Pharmac. Medic. Chemic. Lib. 5. Sect. 4. §. 76.*

(c) *Part. 2. in verbo Cantharides.*

vel ij. Laudatur etiam ab eodem Infusum cantharidum, cujus unicam^{us} semissem, miscendam cenfet cum aquarum nymphaeae, portulacae & graminis ana ʒij. & olei terebinthina gutt. v. quam mixturam successive exhibendam else ait ceu extremum remedium in gonorrhœa virulenta inveterata cum ulceribus sordidis, imo etiam per penem injiciendam.

Demum Michael Albertus, in Academia Hallensi Professor Medicus, (a) proponit else quoque essentiam cantharidum Bartholinianam in subiectis robustioribus ad gonorrhœam valde contumacem & refractariam, modo cum aliquo moderamine adhibeatur.

Miror equidem a tot tantisque Viris remedium ad gonorrhœam proponi, non dico tam infidum, sed tam aperte perniciosum. Cantharides enim, si interne usurpentur vel dosi minima, verbi gratia, quarta parte grani unius, renes, vesicæ collum, aut urethram phlogosi, inflammatione, exulceratione plerumque afficiunt, vel ipso (b) eorumdem testimonio, a quibus tam temere laudantur ad gonorrhœam. Cantharides ergo, sive in substantia sive in infuso interne exhibeantur, conferre numquam, nocere semper debent in gonorrhœa virulenta, in affectione scilicet phlogodea, inflammatoria, ulcerosa urethrae.

Sed qui reprobat^{ur}, tanquam perniciosus.

Inquiet forsitan, qui contra sentiunt cantharides deterforia pollere facultate, atque adeo conducere in gonorrhœa contumaciore ad detergenda ulcera dyspepulota. Sed eam detergendi facultatem cantharidibus ipse numquam concessero, qui probe sciam cantharides ad ulcera tantum inferenda, ad detergenda vero numquam externe adhiberi. Esto tamen: Detergant cantharides. Quid tum? An ideo utendum erit remedio detergente istiusmodi, quod inflammationem renovare, quod exulcerationem augere, quod ad gangrœnam omnia deducere potest; quod sepe inflammationem renovat, exulcerationem auget, omniaque ad gangrœnam deducit? Non certe, ne quidem si alia deficerent omnia detergentia; minime vero, cum tot alia suppetant efficacissima & ab omni periculo plane immunia.

Sed obvia, ni fallor, erroris causa. Nempe in omni gonorrhœa adest dysuria gravis, quæ cum stranguria non raro conjungitur. Utrique visum fuit occurrere usu diureticorum, ceterisque tutioribus cantharides, ut quæ facultate diuretica egregie polleant, præferre placuit, errore sane pessimo, cum loco diureticorum temperantium & demulcentium, quæ frigida dicuntur, & quæ sola in inflammatoria dysuria ex usu else possunt,

ad

(a) *Therapeje Medic. Sect. 8. cap. 18.*

Et Materia Medic. Sectione 2. cap. 1. §. 9.

(b) *Vid. Hoffmann. & Hermannum loc. supra laud.*

Et Albertum, in Praxis extemporanea, Casu 24.

adhibitum fuerit diureticum phlogisticum, corrosivum, deleterium; quo omnia exacerbari & ingravescere necessum sit.

Ceterum quamvis nescius non sim cantharides interne olim exhibitas fuisse cum (a) ab Hippocrate, tum (b) a Galeno, haud diffitebor ab interno earumdem usu caute semper abstinuisse in gonorrhœa quavis virulenta, nec auctorem esse velle cuiquam, ut eisdem interne exhibeat, cum tot alia remedia ad gonorrhœam præsto sint, opportuna, præstantia, tuta; internusque cantharidum usus gonorrhœa qualicunque semper pejor sit & periculosior.

III. Ex-
hibitio-
nem co-
cheniliz
in sub-
stantiva
vel in in-
fuso.

III. Idem Martinus Listerus in *Exercitatione eadem*, quam modo laudavimus, tum ad gonorrhœam, tum ad affectos alios venereos Cocheniliam adhibet in Observationibus *quatuor*, 8. 11. 12. & 14. In prima præscribit cocheniliam in substantia, & dosi quidem maxima scilicet ad ℥iv. cum *ossis sepiæ optime levigati* ℥ij. pro dosi qualibet, nisi forsan error sit in numeris, in secunda & tertia exhibet *infusum cochenilia*; demum in quarta cocheniliam decoquit in *valentissimi Guajaci decocto*.

Cum primus ille sit omnium quos novi, qui cocheniliam ad curationem gonorrhœæ proposuerit, haud inanis conjecturæ locus esse videtur *medicamentum* illud specificum, quod ait in *Præfatione Exercitationibus præfixa a se editum esse in Exercitatione illa de lue venerea*, & quo asserit *se a multis annis cum successu usum fuisse ad gonorrhœam comprimendam*, ipsissimam esse cocheniliam; neque enim reperire est in illa Exercitatione remedium ullum alterum, quod novum sit, quod jam prius cognitum non fuerit.

Sed quæ
conce-
ptam
spem
plane
frustra-
tur.

Sed multa sunt quæ suadeant Listerum hac in re lapsum, & de cocheniliæ efficacia in curanda gonorrhœa nimia neque satis explorata pollicitum fuisse. Siquidem compertum est cocheniliam nihil esse præter animalcula Tung, sive Opuntio majori spinoso innascentia in America, scarabæis similia; quæ fumo exsiccata, & calis pedibusque truncata confractione in globosa grana conformantur. Debet ergo cochenilia, ut & cetera omnia, quæ ab animalibus, ab insectis potissimum proveniunt, sale scatere alkalino volatili, quod sane instituta analysis testatur facit. Hinc deducenda est facultas cardiaca, alexiteria, sudorifica, qua cochenilia pollet non minore, imo vero efficaciore quam grana Kermes, quibuscum colore convenit; sicut & virtus anti-epileptica, si ea valeat, ut (c) Stephano Clerico, Genevensi Medico, olim visum fuit. Hinc ergo deducenda quoque via diuretica, quæ in cocheni-

ni-

(a) De internis affectionibus, cap. 38. edit. Charter.

Et de ratione vitæ in acutis, textu 104. ejusd. edition.

(b) Comment. in loc. Hipp. posteriorem.

Et de simplic. Medicamentis, facult. Lib. 11. textu 44. edit. ejusdem.

(c) Mangetus Biblioth. Medic. in verba Cochenilia.

nilia non minus conspicua est, quam in plerisque diaphoreticis, & qua certe asellos sive millepedes cochenilia superat.

Primæ quidem illæ cocheniliæ facultates nullius utilitatis sunt in gonorrhœa: At vero potuit hæc ultima fucum facere Listero, quasi diuretica cocheniliæ vis ad dysuriam & stranguriam gonorrhœicam valeret. In quo tamen cum errore maximo duci manifestum est ex supra dictis, quod dysuriæ & stranguriæ phlogodæ, inflammatoriz, ulcerosæ, qualis in gonorrhœa perpetuo adest, non frigida diuretica, sed calida, qualis cochenilia est, adhibenda censuerit, quibus morbi causam intendi, atque adeo morbum ipsum ingravescere necesse est.

Nihilominus tamen, cum ab exhibita cochenilia exigua tantum noxa immineret, visum est rei periculum aliquoties facere, non quidem primo gonorrhœæ stadio, cum omnia fervore summo exæstuant, sed secundo aut tertio, ubi omnia remissiora sunt; neque vero ea dosi, quam Listerus proponit, sed dosi minore *verbi gratia* ad grana xv. pro dosi qualibet.

Hinc autem experientia compertum habui, quod animo prius conjecteram, nempe cocheniliam curandæ gonorrhœæ prodesse nihil, sed nocere potius, quod dysuriam, genitalium phlogosim, ac seminalis humoris, qui distillat, acrimoniam & virulentiam intendat.

IV. Carolus Musicanus laudat (a) ubi supra, quasi specificum ad veteres gonorrhœas Mercurium præcipitatum viridem, quem exhibendum censet a gr. ij. ad iv. & quo recentes gonorrhœas una dosi, inveteratas quatuor ad summum dosibus curari asserit.

Cum eo consentit Paulus Hermannus, (b) qui & ipse ait hisdem fere verbis *Mercurium viridem specificum esse in gonorrhœa virulenta, ratione forte cupri propter terram vitriolicam, exhibitum a gr. iij. ad v.*

Sane novi medicastro, seu potius agyrta non paucos, qui eodem remedio tanquam palmario uti soleant ad gonorrhœas extirpandas: Sed quid de illo sentiendum sit jam supra abunde indicatum fuit, ubi de usu purgantium mochlicorum, inter quæ vehementia eminet Mercurius ille viridis, cujus vi drastica non modo hyperemetos & hypercatharsis, sed quod magis est, cujus vi caustica phlyctænæ & ulcerosæ scissuræ ventriculo inferuntur sæpenumero. Adde gonorrhœam, si ea ratione sistatur, ut sæpe sisti experientia comprobatum est, sisti tantum violenta humorum metastasi, quam vomitio vel purgatio nimia concitant; non vera humoris profligatione: cum una aut altera dosi præcipitati viridis, ad gr. ij. vel iij. quibus vix unum Mercurii crudi granum continetur, non possit sanguinis massa tora pervadi, neque atomi omnes contagii veneri, quæ va-

IV. Mercurium præcipitatum viridem ore exhibitum.

Sed qui numquam satis innoxius est.

riis

(a) Tract. de Morbis venereis, Lib. 3. cap. 2.

(b) Cynosura materiæ Medic. Part. 2. in vetbo, *Mercurius viridis*.

V. Resinam Guajaci, quæ laudatur quasi specifica. riis in locis nidulantur, corrigi & eliminari, unde fit ut apparens, non vera sit gonorrhœæ sanatio, quæ idcirco vel sponte recrudescit, vel luem veneream tacite ingenerat.

V. Resina Guajaci, quam alii gummi vocant, & quæ ex corticibus extracta vel sponte sua manans, arida est, friabilis, subnigricans, pellucida, saporis acris, odoris grati, præsertim si igni imponatur, gonorrhœæ specificum dicitur (a) a Paulo Hermannno, si a Dj. ad Dij. in substantia exhibeatur. Quin imo non veretur ille ad resinam Guajaci præcipitatum viridem adicere dosi granorum quinque in sequente formula.

R. Resine Guajaci Dj.

Mercurii præcipit. viridis gr. v.

Sacchari Saturnini ℥ß.

Succini preparat. gr. xv.

Terebinth. seu balsam. Peruvian. q. s.

M. f. Pilula contra gonorrhœam pro j. dosi.

Laudatur quoque usus ejusdem resinæ a Carolo (b) Musitano ad gonorrhœam.

Sed liquet resinam illam seu gummi Guajaci, nec aliter, nec efficacius valere quam intensum decoctum ejusdem ligni, quo quidquid ligno resinofum inest, coctura dissolvitur. Vidimus autem supra decoctum istiusmodi nec ad omnes gonorrhœæ species, nec in omnibus ægrotis conducere: Imo potius quandoque nocere, humorum seminalium acrimoniam, & genitalium fervorem intendendo, unde morbi vis, quæ jam remissa erat, solet recrudescere. Quocirca idem quoque sentientum est de resina Guajaci, quæ sane ideo rari usus est.

VI. Si Fridericus Hoffmannus audiatur (c) Saccharum Saturni in oleo Terebinthina solutum & leni calore cinereum digestum egregium & fere divinum præbet in gonorrhœa remedium, imprimis, si aliquid addatur camphoræ.

Erat apud Mayernium (d) compar remedium ad gonorrhœam sub sequente formula.

R. Camphor. ℥ß.

Sal Saturni Dj.

Sal. tartar. gr. xij.

Cass. fistularis ℥ß.

Terebinth. Venet. ℥j.

M. f. bolus qui, si in Austro fides sit, gonorrhœam curat intra paucos dies.

Deni-

(a) Cynosura mar. Meicæ Parr. 1. in verbo Cortex Guajaci.

(b) Ubi supra.

(c) Pharmac. Med. Chim. Lib. 3. cap. 13. §. 158.

(d) In alio syntagm. Tract. 4. cap. 3.

Denique vidimus modo saccharum quoque Saturninum a Paulo Hermannō (a) interne exhiberi ad gonorrhœam dosi \mathfrak{ss} . pro una dosi.

Et profecto Saturnina remedia in ultimo morbi stadio nequaquam contemnenda sunt, ut quæ feliciter adhiberi possint in gonorrhœa habituali seu contumaciore feminis aut feminalis humoris stillicidio, quod gonorrhœæ virulentæ aliquando superest; sed iis numquam utendum esse cenfeo, nisi dosi minima, v.g. balsamo Saturnino Hoffmanni ad guttas viij. vel xij. aut saccharo Saturnino ad grana iv. vel vi. caute attendendo num ab exhibitis cardialgia, morsus oris ventriculi, nausea &c. ægrum angant, quæ si forte acciderent, ab ulteriore exhibitione temperandum esset, quandoquidem experientia exploratum est Saturnina remedia numquam interne satis tuto esse, ut verbis ipsis utar Joannis Boecleri in additionibus ad Cynosuram Pauli Hermannii, Parte 2. in verbo *Plumbum*.

VII. Nicolaus Chesneaut, Medicus Massiliensis haud incelebris suo tempore sequentem methodum proposuit (b) gonorrhœæ virulentæ, ut ille ait, *sine cassia, sine emulsionibus, sine venæ sectione* curandæ quam cæteris omnibus tutiorem & compendiosorem credit.

VII. Methodum compendiarium Nicolai Chesneau.

℞. *Mercurii dulcis* gr. xij.

Diagridii vapore sulphuris castigari gr. iij.

M. cum s. q. syrup. rosarum purgativi F. bolus mane devorandus, sumendo jusculum post duas horas.

Die insequente idem bolus iterandus est, sed aucta tum Mercurii, tum Diagridii dosi duobus granis: Iterandus quoque die tertio, sed aucta denuo eorumdem remediorum dosi duobus aliis granis, nisi forsan prima exhibitione alvus copiose deposita fuisset.

Post triduanam illam purgationem, quæ quo magis ventrem moverit, eo utilior futura est, utendum sequente opiata.

℞. *Campbor.* \mathfrak{ss} .

Cremor. Tartar. \mathfrak{z} vj.

Sal. Prunellæ \mathfrak{z} ij.

Terebintb. \mathfrak{z} ij \mathfrak{ss} .

M. omnia & dividantur in sex doses æquales per sex dies continuos mane sumendas tribus horis ante pastum, pulverato saccharo obvolutas.

Si post usum opiatæ perleveret adhuc penis dolor cum dysuria & fluxu seminis purulenti, subflavi, aut viridescantis, iterandæ purgationes, ut prius, cum Mercurio dulci, aucta ejusdem dosi ad grana xx. vel xxiv. non aucta vero Diagridii dosi ultra gr. vj. sed si æger difficiliter purgetur, addito cochleari uno syrupi rolarum solutivi.

At

(a) Ubi supra.

(b) Observation. Lib. 1. observ. 38.

At vero ubi primum semen profluet albicans & sincerum, licet aquosius sit, potissimum vero si jam cessaverit dysuria, serio de sustenda gonorrhœa cogitandum, in quem finem Auctor ille plurimum commendat crocum Martis astringentem, ex limatura chalybis, cui aqua fortis affusa sit, paratum juxta processum Beguini, per triduum dosi ℥j. quolibet mane exhibendum sub forma boli conserva rosarum exceptum.

Sed quæ
gonor-
rhœæ
perfecte
curandæ
imparef-
se vide-
tur.

Hætenus Nicolaum Chesneau diligenter excerptimus. Jam vero ut ingenue proferamus quæ sentimus, videtur proposita therapeja 1. Periculosa in gonorrhœæ vehementioris principio; neque enim validiora purgantia satis tuta sunt, cum inflammatio conceptaculorum seminis intensa est, cum genitalia æstuant, cum omnia nimio fervore deurentur & immodico erethismo graviter dolent. 2. Parum efficax in vetustiore gonorrhœa, in qua inflammatio in suppuratum degeneravit; cum teste experientia raro derepente cedat purgantibus nisi mochlicis, inter quæ minime locum habere potest bolus ex viginti aut viginti quatuor granis Mercurii dulcis, & sex granis Diagridii.

Si cui tamen magnificis Nicolai Chesneau promissis persuaso, suo periculo sapere placeat, monitum velim ut ab experiundo absteineat, dum prima morbi ferocia venæ sectione, refrigerantibus & demulcentibus remisit, postea enim vel nulla vel minor noxa metuenda est a præpostero hujusce methodi usu, nisi forsitan nimia croci astringentis dosi gonorrhœæ fluxus citius cohiberetur, sed ab errore tam manifesto sibi cavere difficile non est.

VIII.
Tandem
usum re-
bebinthi-
næ cum
Mercurio
dulci,
quod re-
medii ge-
nus tu-
tum est,
& potest
interdum
utile esse.

VIII. Denique usu receptum est apud Medicos (a) Chirurgoſque non paucos per ostiduum ℥j. exhibere opiatæ sequentis.

℞. *Terebinth. Venetæ* ℥iv.

Rhei elect. & pulverat. ℥iij.

Mercurii dulcis ℥j.

M. simul F. Massa in octo doses dividenda.

Quod sane remedii genus & tutum est & salutare, modo tertio vel ad lummum secundo morbi stadio exhibeatur, cum remittente fervore & dysuria opus est ut ulcera detergantur, & deserta obducta cicatrice solidentur. Attamen nulla ratione præferendum esse censemus levioribus inunctionibus mercurialibus, quæ externe illiniuntur eodem ipso tempore, quo balsamica ore exhibentur juxta methodum supra propositam, unde eadem omnia emolumenta accedunt, quæ ab opiata, sed certiora & efficaciora, minore noxa, & sine ullo ventriculi damno.

§. II.

(a) Devaux in Annotationibus ad Lib. Carol. Musitani *De morbis veneris*, cap. 2.

§. II. DE COMENTITIA GONORRHOÆ,
PROPHYLAXI.

Secundo. Jam vero ut de prophylaxi gonorrhœæ cæterorumque morborum venerorum pauca proferamus, constat antiquiores Medicos, ubi primum exploratum habuere affectiones omnes istiusmodi solo veneris usu contrahi, in id omni ope atque opera olim incubuisse ut ingressuro contagio vias arte præcluderent atque, ea ratione orituros inde morbos remediis averruncarent. Potest in exemplum unus instar omnium adduci Gabriel Fallopius, qui operis sui *de Morbo Gallico* cap. 89. sic præfatur. (b) *Ego, inquit, nihil fecisse videor, nisi doceo vos quomodo quis videns pulcherrimam sirenam, & coeans cum ea, etiam infecta, a carie & lue Gallica præservetur. Ego enim semper sui hujus sententiæ, quod adsit ratio præcavendi ne per contagium hujusmodi ulcuscula (venerea) oriantur. Deinde multis ea remedia prosequitur, quæ ad luis prophylaxim valere putat; laudatque inter cætera linteolum decocto remedium vulnerariorum, astringentium, Guajacinorum & Mercurialium imbutum, quod balano apponi vel principio urethræ intrudi jubet. Ait autem se fecisse experimentum in centum & mille hominibus, & Deum testatur immortalẽ nullum eorum infectum fuisse.*

Prophy-
lactica
luis ve-
neræ re-
media
non mi-
nori dili-
gentia
conquisi-
ta sunt,
quam
thera-
peutica.

Cum Fallopio consentit Petrus Angelus Agathus, qui Fallopii opus Scholiis & Annotationibus auxit anno 1564. Ipse enim proponit tanquam vere prophylacticum non in viris modo, sed in mulieribus quoque usum tum linteï haud dissimili decocto imbuti, quo balanus aut vulva obtegatur post opus, tum suffumigii mercurialis, quo suffiantur loci veneriei post opus eloti. Sic ergo gratissima sane incolumitatis spes ostensa est hominibus libidine perditis, quos nota vulgivaræ veneris discrimina terrebant, quam spem temere conceptam uti abhinc foverent, suisque sollicitationibus interdum incederent, multis semper curæ fuit, quos minime pudet dubia, inania, falsa confingere atque comminisci, dummodo ex aliena credulitate quæstum faciant qualemcumque.

Sed ut tandem aliquando fraudibus ac fallaciis finis fiat, operæ pretium futurum esse visum est, paucis sed diligentia, qua possumus, summa sequentia duo capita seorsim expendere, quibus universa quæstio de prophylaxi morborum venerorum circumscribi & definiri videtur: Nimirum 1. An revera dentur remedia quibus possit contagio in ipso impuræ vel suspectæ veneris usu certo præcaveri? 2. An si dentur remedia istiusmodi, Medico liceat, qui probus sit & religionis amans, illa quæ-

De illis
duo quæ-
ri pos-
sunt an
dentur?
An liceat
eadem
divulga-
re, si den-
tur?

(a) Fallopius ideo duriter vapulat iudicio Henrici Stephani. *Apologie pour Herodote,* Liv. 2, chap. 12. sed an jure an injuria infra videbitur.

Probatur
circa
prius
non dari.

quærentibus indicare, proponere, imo etiam scriptis editis vulgare?

Circa *Prius* 1. Indubium est gonorrhœam, cæterosque omnes affectus venereos præcaveri non posse, nisi remediis quibus curantur: Neque enim ingressum venenum retundi potest remediis aliis, quam quibus constat idem jam ingressum ac tumultus agens in sanguine debellari, domari, destrui. Itaque in prophylacticorum remedium numerum ea tantum venire possunt, quæ adversus virus venereum valere supra diximus: Præparata scilicet Mercurialia, vel decocta sudorifica Guajaci, Sassafras, Chinæ & Sarsæ-parillæ ore exhibita: Inunctiones mercuriales externe illitæ genitalibus, ubi potissima ac prima impendens tragediæ scena futura est: Suffumigia & emplastra mercurialia iisdem partibus admota, aut lintea decoctis vulnerariis & anti-venereis imbuta, qualia a Fallopio laudari modo dicebamus: Tandem injectiones cum decoctis sudorificis lignorum & radicum, aut cum præparatis Mercurialibus blandioribus, ut aquila alba vel panacea in decocto hordei vel radicis althææ, in urethram in viris, in fœminis vero in urethram & vaginam syphone immittæ, quales a Carolo (a) Mustano proponi supra vidimus, quales esse probabile est illas quæ a Guillelmo (b) Cockburne tam impense laudantur.

2. At vero, ut ea remedia optatum effectum præstare valeant, 1. Dosi eadem vel saltem dosi fere proxima adhibenda sunt, ac dum morbus præsens adest, quandoquidem non minor in remedio exigitur energia, ut contagio ingressum molienti obnitatur, quam ut medeatur jam admissio. 1. Iisdem quotidie insistendum est sine intermissione, quando suspensæ veneris usus frequens est & fere quotidianus, quandoquidem periculum cæteroquin foret, ne quando oblatum contagium in loca indefensa irreperet.

3. Sed ea methodo non tam præcaveretur malum quod reformidatur, quam perpetuum induceretur, quoniam ne quando forsitan opus futurum esset remediis anti-venereis ad gonorrhœam jam contractam, quæ porro rarius obvenit; iisdem utendum foret quotidie, sine intermissione, toto vitæ tempore, vel saltem quando libido effrænata dominaretur; quæ tamen sine manifesto nocumento quotidie adhiberi non possunt, & quod foret profecto miserrimum vitæ genus, in quo videlicet ægrotatio semel incideret, continuo ægrotandum esset.

4. Adde futurum esse ut corpus & humores, qui corpori insunt, Mercurialibus sensim assuescerent; atque adeo ut purgantia & narcotica frequentius exhibita effectum non præstent nisi aucta dosi, sic & Mercurialia quoque frustra fore, nisi dosi in dies majori ac majori exhiberentur, unde

ne-

(a) *Ubi supra.*

(b) *De gonorrh. virul. symptom. natur. causa & curatione*, Par. 2. cap. 1.

necesse futurum sit ut ne quando brevi temporis spatio & dosi moderata Mercurialia forsitan essent adhibenda, iisdem toto vitæ cursu uti necesse esset & dosi quidem maxima, hoc est ut exiguum, breve, incertum malum declinaretur; sese præsentī & maximo infortunio mactare quotidie.

5. Quin imo neque tamen inde, quantacunque diligentia omnia præmunita viderentur, satis certa unquam futura esset prophylaxis. Cum enim tam multa loca simul munienda essent, periculum immineret, ne venenum venereum copia vel acrimonia prætermodum invalescens impete factō vim aliqua facturum foret. Sic plerumque solent, ut exemplo rem patefaciam, quicumque adstant propugnando vallo, quod longius exporrectum est, ab hostibus si denso agmine incurrant, prosterni & superari, quod in plura loca dispersi & distributi collectæ turmæ pares ubique esse non possint.

6. Ex his itaque colligendum est alexiteria, quæ a gonorrhœa, cæterisque morbis venereis incolumes præstent sine detrimento, nulla dari, certa, tuta, efficacia: Si qua darentur, morbo ipso vel saltem incerti morbi periculo pejora esse; neque adeo ab ullo, qui consultor providusque sit utilitatum & opportunitatum suarum unquam adhibenda: Unde factum ut lintea illa anti-venerea a Gabriele Fallopio tam impense laudata, suffumigia Mercurialia a Petro Angelo Agatho probata, injectiones in urethram similis virtutis a Carolo Mustitano, & Guillelmo Cockburne propositæ, uno verbo prophylactica omnia remedia, si qua unquam a credulis in usum vocata fuerint, jam pridem in desuetudinem abierint ceu nullius efficaciz.

7. Proinde una tantum est sibi cavendi ratio, quæ certa sit, nempe ut vita casta sit, temperans, ab impura suspecta, vulgivaga venere abstinens: Quod si vero male suada libido scortationis pericula adire jusserit, dubia, incerta, formidolosa omnia semper futura sunt, unde emersuri sint paucissimi, quantacunque celeritate opus conficiant, ut sese periculo citius subtrahant; quantacunque diligentia confecto opere virilia vel muliebria aqua tepida vel urina sua eluant, & ab aspersis sordibus mudent, ut nulli vel paucō contagio pateant.

Audio a perditissimis ganeonibus, qui meretricios amores effrænatē sectantur adhiberi (a) nuper in Angliā folliculos e tenui & inconspicua pellicula in vaginæ formam confictos, & Anglice *Condom* dictos, quibus congressuri obvolutum penem loricant, ut a periculis pugnæ semper dubiæ tutos se præstent. Aucumant scilicet ita cataphractus hastisque eo modo clypeatis se vulgivagæ veneris discrimina subire impune posse.

Sed errant quidem maxime. Etenim 1. Perit opera ex toto si folliculi pellicula alicubi hiulca aut discissa sit, vel in opere usquam hiet aut discindatur; si tenuior allabenti tabo venereo, quo madet, pervia fiat, dum frictione iterata maceratur, ac venenum alte imbibit; quæ singula debent

O

fre-

(a) Daniel Turner. *Dissertation on the venereal Disease*. pag. 107.

frequenter usu evenire. Memini haud infcite olim quæri ab Antiquorum quodam num inter mortuos recenseri deberent, qui alto mari navigant, ut qui a morte tantum distarent lignea tabula quatuor digitos lata: Haud minori jure quæri posse arbitror, num inter infectos connumerari debeant, quicumque ab infectione quotidie non absunt nisi pellicula subtili, bibula, permeabili, plerumque lacera. Illis sane non pellicula fragilis, sed *robur* & *es triplex* esse deberet circa penem, qui partem eam tam facilem ad contagionem impurissimo meretricum barathro amant *committere*.

2. Esto tamen; Perstet toto opere folliculus & integer & impervius: Nondum tamen omnia satis tuta. Nec pubem eam, nec inguina obvestit ille: Prostant ergo loca ea obnoxia attactui illabentis humoris spermatici, in quem mulieres colliquefcunt dum veneri litant, unde si veneno infectus sit, periculum futurum est grave ne (*) bubones generentur atque inde lues venerea, hoc est ne conduplicato scœnore verifura tandem solvatur. Quid olim profuit Achilli reliquum corpus vulnerari non posse, si calca-neum vulneri paruit, unde cecidit? Quid pariter profuturum est ganeonibus illis mentulam ingressuro contagio inperiviam esse, si contagium idem possunt admittere pubes ac inguina, unde ab imbibito veneno bubones & a bubonibus lues ipsa perinde concipiantur?

3. Sed quid multa? Age porro, liceat scortatoribus illis, si ita lubeat, in obscena sua spurcitie sibi plaudere. Optabat olim Virgilius ut Mævii amarent carmina, quicumque Bavium non odissent: Sic ipse optandum esse puto, ut illis quibuscumque circa jecur ulcerosum maleficus amor sævit, venerem eo tantum pacto experiri detur, quo venerea voluptas, quæ in intimo contactu residet, ita obtunditur & hebetatur, ut concumbentium neuter hymenæum canat, vel canat uterque fere sine sensu. Certe minoris constat caste vivere, vel permiffa ac secura venere tantum uti, quam ita turpi putidoque invento, nec tamen sine periculo, tam cassa, levi & evanida voluptate potiri.

Probatur
circa po-
sterius, si
darentur,
licere
Medico
ea divul-
gare.

Posteriori quæstioni hæc eadem satisfaciunt, quæ de priore diximus. Neque enim opus est de jure anxie multumque quærere, scilicet an liceat alexiteria remedia adversus affectiones venereas indicare, proponere, exhibere, si semel de facto negative constiterit, nempe nulla dari remedia istiusmodi, quæ cum emolumento certo & efficacia esse possint.

1. Attamen si qua forte darentur, libere dicam & ingenue videri non modo licere Medicis, quorum est opiferos esse, ea exhibere & vulgare, sed illos etiam ne ea celarent, religione ipsa obstringi, cum ea ratione adversus contagionis pericula præmuniri possent, quod in votis bonorum omnium esse debet, tot nutrices impuros suspectosve infantes lactaturæ, tot alumni ab infectis suspectisve nutricibus lactandi, tot uxores, quæ eæ

ma-

(*) Vid. intra cap. 5. hujus Libri.

matrimonii debito cum maritis morbo contaminatis tenentur concumbere, quibus omnibus accidit sæpius, ut sine culpa in affectus venereos miserime incidant.

2. Probe tamen novi quid in contrarium vulgo opponatur, nimirum vulgatis semel alexiteriis illis remediis, libidinis frænos laxari, excusso salutari morbi metu, quo intemperantia coercetur. Sed quid est cur ea, etsi vera forent, reciderent in Medicos, a quibus alexiteria vulgarentur, si abulis nullomodo conficii sua remedia ad justos tantum legitimisque usus destinarent, si sincere cuperent, ut justis legitimisque tantum usibus adhiberentur? Quasi vero æquum foret inventoribus rerum quæ ad humani generis utilitatem prodesse possunt, pessima eorum imputari consilia, qui rebus iisdem in perniciem suam suamve infamiam abuterentur.

3. Verum tamen, ne quid dissimulem, neque futurum illud effrænationis libidinis periculum, quantumvis exaggeretur, ad remedia prophylactica proscribenda sufficiens esse videtur, nisi simul eademque opera proscribere velint remedia quoque therapeutica, quæ & ipsa libidinis intemperantiæ aperte ideo favent, quod facilius morbi curatio morbi metum minuat. Certe & castius & temperantius viveretur, si experientia semel compertum foret, venereos morbos remediis numquam superari, ac infectis ineluctabilem celeremque mortem semper obeundam esse.

4. Sane nobiscum sentire videntur, qui rei publicæ administrandæ præsumunt, cum scortilla triobolaria lue venerea infecta de medio removeri jubent, ut curentur. Licet enim palam sit minui ea ratione pericula, quibus scortatores subjacent, verentur tamen illi minime, ne dum consulunt publicæ incolumitati, insimulentur unquam, quod depulso vel imminuto salutari luis venereæ metu, civibus ad nequitiam fenestram patefecerint.

5. Quocirca invigilent ii, ad quos cura de moribus pertinet, ut cæcos mortalium animos ab impudicitia avocent monitis, præceptis, documentis; at vero liceat Medicis, qui corporis valetudini serviunt, concives non modo a præsentibus morbis liberare, sed si qua forte daretur via, ab imminenti incolumes sospitesque præstare.

C A P U T III.

De duabus aliis gonorrhææ speciebus, quæ rarius occurrunt.

§. I. DE GONORRHOEA VIRULENTA SICCA, sive DYSURIA VENEREA SICCA.

PRæter gonorrhæam virulentam modo descriptam, est & alia urethræ affectio venerea, ad gonorrhæam quodammodo pertinsens, in qua
Descriptio gonorrhææ siccæ.

qua dysuria acris & urens ægrum discruciat sine ullo liquidioris aut purulenti feminis vel seminalis tumoris fluxu, vel saltem cum fluxu paucissimo. Hanc vulgo dicunt *dysuriam venericam siccam*, imo etiam quandoque *gonorrhœam siccam*, quæ ultima denominatio vere impropria est, cum contradictorium sit gonorrhœam sine fluxu esse, sed quam tamen retinere necessum est, quoniam ului parendum, quem *penes arbitrium & jus & norma loquendi*.

Cum dysuria urgentissima, quæ istius gonorrhœæ signum est perpetuum & essentialiale, conjunguntur signa alia, sed quæ inter se variant, imo vero pugnant. Modo enim simul adest cum dysuria gravi stranguria, quam calor, dolor, rubor, tumor perinæ, imo sæpe etiam totius penis comitantur; modo vero dysuria sola urit cum leviori stranguria, sine ullo nec penis tumore aut rubore manifesto.

Dux sunt
illius gonorrhœæ
species.

Hinc palam est gonorrhœam siccam in duas species distinguendam esse, quarum prior ab inflammatione seu phlegmone prostaticarum aut vesicularum seminariorum dependeat; & illa vehementiores gonorrhœas virulentas vel incipientes præcedit, vel suppressas sequitur: Posterior vero a phlogosi erysipelatodæ urethræ producatur, & hæc potest quidem gonorrhœæ virulentæ symptomatice præludere, sed plerumque essentialis est nec ullius alterius morbi comes aut prænuntia.

1. Symptomata
prioris.

1. Dysuria
gravis.

2. Stranguria
frequens.

3. Tumor,
calor &
dolor in
perinæo.

4. Imo in
toto pe-
ne.

5. Nullus

1. In priorie quidem 1. Urit dysuria gravis, tum quod tensa & inflammata interior urethræ facies vel levissimas urinæ præterfluentis morsunculas acutissime sentiat; tum quod urina, quæ vesica concluditur, æstu inflammatarum partium calorem & acrimoniam majorem contrahat.

2. Stranguria frequens affligit, tum quod inflammata & tumida prostata & vesiculæ seminares viam exiturientis urinæ angustent urethræ ductum comprimendo; tum quod dolor acer quem urina infert exeundo, advocato juxta notas sympathiæ leges spirituum fluxu in sphincterem vesicæ, convulsivas & involuntarias illius contractiones proriter, quæ mictionem interturbant, imo identidem supprimunt.

3. Adsunt tumor, calor, rubor, & dolor perinæ: Hæc enim sunt pathognomonica signa inflammationis, adeoque perinæ ea supervenire minime mirum est, quando prostata & vesiculæ seminares, quæ in perinæo latent, gravi tentantur inflammatione.

4. Imo vero tumor, calor, rubor & dolor totum penem aliquando occupant, cum venæ pudendæ externæ & internæ gravi prostaticarum & vesicularum seminariorum tumefactione compressæ, difficiliorem sanguinis regressum permittunt tum a cavernosis corporibus penem constituentibus, tum a cutaneis integumentis cavernosa corpora involventibus.

5. Demum nullus est puridi seminis fluxus, quia prostaticarum & vesicularum.

larum seminariarum emissaria nimia harumce partium inflammatione ita constipantur, ut viam omnem denegent semini pauco, quod intro admitti vel ibidem secerni potuit. Si pari ratione ferme nulla in peripneumonia expectoratio speranda est, quandiu intensior est pulmonum inflammatio.

II. In posteriore vero gonorrhœæ siccæ specie 1. Atrox dysuria discruciat ægotantem sicut in priore & propter easdem causas.

2. Torquet similiter frequens stranguria, non ideo quidem quod urethræ canalis multum angustetur, cum phlogosis erysipelatodæa, a qua hæc altera gonorrhœæ species dependet, sensibilem nullum tumorem inferat; sed ideo tantum quod dysuria involuntarias & convulsivas sphincturis vesicæ contractiones advocet, quibus urinæ fluxus coarctetur, voluntatis imperio in contrarium frustra nitente.

3. Nullus est tumor, aut rubor nec in pene nec in ipso perinæo, quia phlogosis erysipelatodæa, quæ internam urethræ fistulam obsidet, ad externa usque integumenta non protenditur; dolent tamen & calent tum perinæum, tam penis, propter viciniam urethræ affectæ, quæ calet ipsa doletque.

4. Denique nullus est seminis fluxus, sive quod prostaticæ & vesiculæ seminariæ ab omni labe immunes sint, sive quod ut verosimilius aut saltem frequentius est, ab erysipelatodæa urethræ phlogosi emissaria prostaticarum & vesicularum seminalium ita constringantur, ut semini via non pateat.

Cæterum liquet utramque gonorrhœæ siccæ speciem, a contagio venereo similiter produci, quod in objectam partem vim suam corrosivam, inflammatoriam, phlogisticam perinde exerat, cum utraque ab impuro concubitu perinde inducatur, sed ab eodem veneno diversas in diverso casu partes affici, cum diversa sit morbi sedes ex dictis. Videtur autem hujus discriminis ratio ex triplici fonte repetenda. 1. Ex diversa contagii venerei volatilitate, 2. Ex diversa angustia emissariorum, quibus vesiculæ seminariæ & prostaticæ hiant in urethram. 3. Demum ex diverso coitionis tempore, quo virus suscipitur. Itaque priorem gonorrhœæ speciem contrahi credimus, si virus venereum fixius sit; si ideo cum tardius exhalet, urethræ non instelletur nisi post peractum ejaculationis opus, dum vacuæ prostaticarum & vesicularum cellulæ possunt venenum altius imbibere; demum si ita hiulca sint & pervia prostaticarum & vesicularum emissaria, ut inspiratum venenum largiter admittant: Contra vero posteriorem gonorrhœæ speciem induci, si virus acius & volatilius sit; si ideo celerius & ante emissum ejaculatione semen urethræ insinuetur, dum prostaticæ & vesiculæ semine turgent & ingressuro veneno magis relictantur; si demum angusta & nimium constricta prostaticarum & vesicularum emissaria paucissimum venenum possint intro suscipere.

seminis fluxus.

II. Symptomata posterioris.

1. Atrox dysuria.

2. Frequens stranguria.

3. Sed nullus tumor aut rubor nec in pene,

nec in perinæo.

4. Neque ullus seminis fluxus.

Causæ utriusque.

Diagno-
sis.

Diagnosis. Gonorrhœam virulentam siccam dignoscere facile est, quæ accidit ut acris & urens dysuria cum stranguriâ frequente divexet paucis diebus ab impuro vel saltem a suspecto concubitu; sine ulla alia causa manifesta: Ab utra vero causa gonorrhœa illa dependeat eruere æque facile est ex præsentia vel absentia tumoris & ruboris in perinzo & in pene.

Prognosis.

Prognosis. Sicca gonorrhœa gonorrhœa fluente semper periculosior est, tum quia venenum non fluens, sed intus retentum radices agit altiores, tum quia affectas partes gravius rodit & labefactat.

Prior gonorrhœæ siccæ species, quæ a phlegmone prostaticarum & vesicularum seminalium dependet, nisi inflammatio brevi resolvatur, aut provocato seminis fluxu mitigetur, in abscessum perinzi facile degenerat, ob prostaticarum aut vesicularum suppurationem.

Posterior vero species quæ ab erysipellate urethræ producitur, nisi cito resolvatur, in sphacelum abit ut inflammatis membranis solenne est, quod in interna parte fere perpetuo lethiferum est.

Curatio.

Curatio. Omni opera annitendum est ut phlegmone vel erysipellatodæa phlogosis resolvatur aut mitigetur; edulcetur urinæ acrimonia, & contemperetur affectarum partium æstus.

1. Ad hunc finem prodest præcipue sanguinis missio larga & frequens, & initio saltem quarta quaque celebranda; neque enim aliud quicquam præstantius aut efficacius novimus ad inflammationem minuendam, & hærentis sanguinis resolutionem promovendam.

2. Debent genitalia, penis, scrotum, perinzum foveri identidem lacte subtepidio vel decocto radicis althææ & seminis lini; quin imo ex lacte, vel ex hoc decocto debent semicupia seu infessus parari.

3. Cum ægrorans nec semicupio semper insidere possit, nec dolentes partes fovere semper, apponenda sunt cataplasmata anodyna, ut de mica panis cum lacte & ovi vitello; vel de lactis cremore recenti & subtepidio; vel de medulla cassiæ &c. quæ affectas partes late contegent atque comprehendant, & quæ mutantur sæpius in die, ne siccitate nimis indurentur.

4. Alvus sæpius abluenda enemate refrigerante & anodyno, ex decocto radicis althææ & seminis lini cum cassiæ medulla, addito paucis nitro purificato, vel sale prunellæ.

5. Licet mictio dolorifica sit & difficilis, & ideo non videatur adaugenda urinæ copia, præstat tamen urinam diluere & temperare, ne si acrior esset rodendo morbum intenderet dum emitteretur. Conducit itaque frequens potatio prisanæ refrigerantis paratæ ex infuso radicis althææ, seminis lini, florum malvæ &c. cujus libris singulis grana aliquot nitri depurati vel salis prunellæ addi possunt.

6. Injicienda in urethram lac vaccinum aqua dilutum, vel serum lactis, vel decoctum radicis althææ subtepidum, vel aqua spermatis rana-

rum

rum, modo possit injectio instituti sine insigni doloris augmento, quod levi & suspenſa manu explorandum est.

7. Demum narcotica adhibenda sunt, ut syrupus papaveris albi, laudanum, tinctura anodyna &c. doſi conveniente, quæ dolores intolerandos compellant, conſtrictiones urethræ convulſivas cohibeant & liberioſorem remedioſorum uſum permittant.

8. Hac therapeja, ſi caute & celeriter adhibeatur, morbi ferocia intra tres quatuorve dies vel ad ſummum intra ſex mitigata, vel optatus ſuccedit ſeminis putridi fluxus, qui partium inflammatarum relaxationem denotat, vel ſine fluxu ullo qui conſpicuus ſit, phlogofiſ ſenſim reſolvitur.

9. At vero ſi morbus tenore eodem eademque vehementia ſex ſeptemve dies excedat, periculum imminet, ne inflammatio in ſuppurationem, aut phlogofiſ in gangrænâ degeneret.

10. Quamobrem tunc, ſi qua appareant ſuppurationis incipientis indicia, perinæo admovenda cataplaſmata maturantia & putrefaciencia ex pulpa radicum liliſorum alborum & althææ &c. folioſorum acetofæ, malvæ, betæ &c. cum oleo liliſorum, quibus fermentum acrius vel unguentum baſilicum adjici poterunt, ſi ita e re eſſe videatur.

11. Quamprimum autem vel leviſſima latentis puris fluctuatio percipietur, pars alte incidenda, ne puſ diutius coercitum ſinus agat periculoſos, ſed de his ſuſius infra, cap. 4. §. 2. ubi *De abſceſſu perinæi*.

12. Quod ſi in altera gonorrhœæ ſictæ ſpecie, quæ ab eryſipelate urethræ dependet, poſt ſex ſeptemve dies, dysuria & ſtranguria, quæ antea urgebant intenſe, derepente ceſſent, & ſi urethræ ductus in perinæo, qui antea fortiter tenſus dolebat ex leviſſimo attractu, jam magis obſequioſus & minus dolens ſit, merito timendum eſt ne præſens mejendi libertas laxitati urethræ a ſphacelo induſtæ accepta debeat, quod periculi plenum eſt.

13. Quapropter ſimul ac prima nigroris indicia in perinæo obvia fuerint, vel citius, ſi graves de latente ſphacelo conjecturæ urgeant, immiſſo in urethram ſulcato cathetere, perinæum ad Raphes alterutrum latus incidendum eſt, ſicut in lithotomia. Dein vulneris labia levioribus vel profundioribus ſcarificationibus pro rei neceſſitate diſſecanda, ac calide fovenda decocto ariſtolachiz rotundæ & fuliginis ſplendentis in vino rubro, cujus libræ cuilibet unciz tres ſpiritus vini camphorati, totidemque tincturæ myrrhæ adjectæ ſint.

14. Demum vulnus tractandum cum digeſtivo ſequentē.

R. Digetiſivi vulgaris ex Terebinthina lota, & vitellis ovi parati ʒiv.

Add. Unguenti de ſtyrace ʒß.

Olei Hyperic. ʒj.

Tincturæ Aloe & Myrrhæ ana ʒj.

Miſceantur omnia probe. F. Digetiſivum cum linteo carpto vulnere admo-
vendum.

Hocce digestivo utendum est donec oborta suppuratione eschara a subjecta parte secedat, quo tempore adhibendum est digestivum simplex vel balsamum Arczi.

15. Cæterum probe notandum est in gonorrhœa quacumque virulenta sicca anti-venerea, quæ ad gonorrhœam virulentam fluentem supra proposita sunt, præsertim vero Mercurialia forma unguenti perinzo illita, quæ cæteris efficacia præstant, caute sed diu usurpanda esse, ubi primum mitigata symptomatum vehementia illorum usum permiserit. Si quidem cum in hac gonorrhœæ specie susceptum virus nullomodo effluat, sed intra corpus totum cohibeatur, inde tanto diligentius attendendum est, ut specificis remediis corrigatur & superetur.

Fœminæ
quoque
eidem
gonor-
rhœæ
speciei
sunt ob-
noxiz.

Quæ de viris diximus, accidunt eadem in fœminis quoque, sed mutatis mutandis; Nunc enim omnibus gonorrhœæ virulentæ symptomatibus tenentur, dysuria, & dolore, calore, tubore prostaticum in superiore, vel glandularum Cowperianarum in inferiore vulvæ angulo, sine ullo tamen humoris effluvio, vel cum effluvio perpaucis; & tunc palam est prostates vel glandulas Cowperianas vere inflammari, quod cum priore gonorrhœæ siccæ specie in viris convenit: Nunc vero illæ cæteris muliebrium locis, laborant tantum ex vagina, quæ calet, dolet, tentigine perpetua rumpitur cum dolore acri & importuno; & tunc liquet internam vaginæ faciem phlogosi erysipelatodæ affici, quod cum altera gonorrhœæ siccæ specie in viris congruit.

Proinde facile est eruere ex supra dictis tum causas atque symptomata, quæ utrique illi affectioni venereæ propria sunt in fœminis, tum curatorias methodos, quæ ad utramque faciunt.

§. II. DE GONORRHOEA SPURIA, sive DE VENEREO STILLICIDIO E BALANO.

Gonorrhœa spuria, in qua stillicidium venereum a balano manat.

Observata fuit tum a Sydenhamio, tum a Vercellono.

Datur & tertia gonorrhœæ species in viris non raro obvia, quæ spuria dicitur, & in qua non ab urethra, sed a corona balani, quæ dolet & inflammatur, promanat humor limphaticus, subviscidus, purulentus, non ubertim quidem sicut in gonorrhœa vulgari, sed tamen satis copiose; unde vocari potest *venereum stillicidium a balano*.

Constat illam gonorrhœæ speciem observatam fuisse tum olim a Thoma Sydenhamio, in *Epistola secunda Responsoria*, ubi sic legitur. *Ipse vidi virulentam hujusmodi materiam per substantiam glandis porosam exudare, non per urethram ejectam, nulloque ulcere vel glandem occupante vel præputium*: Tum recentius a Jacobo Vercellono, in *Terrabiblio de pudendorum Morbis & Lue venerea capite 3. articulo 2. §. 1.* ubi ille sic ait, *Memini ego etiam plurimorum, qui in membro in ejusmodi latrinis (pudendo scilicet mulierum lue* inf.

infectarum) solum leuius intincto, alba sanie postmodum plorant per substantiam glandis porosam, etiam circa, (lego citra) ullum ulcus.

Conjicio mulieres ipsas quoque huic gonorrhœæ speciei obnoxias esse, in qua humor gonorrhœicus non e prostaticis, vagina, glandulisve Cowperianis, ut in vulgari gonorrhœa, sed ex ipsa vulvæ facie sola extillat. Certe vidi nuper puellam decem vel undecim annos natam, quæ anno ante a maleferiato quodam constuprata, morboque contaminata, sed quæ, inaccessa propter arctitudinem vaginæ, in vulva tantum vim passa fuerat, fluxu gonorrhœico virulento tentari, non a lacunis, vagina, aut glandulis Cowperianis, sed ab ipsa tantum vulvæ facie prodeunte, ut facili experimento compertum habui. Vulva enim prius probe deterfa, observavi humorem non ex memoratis locis profluere, sed ex ipsa vulvæ facie guttatim exudare, si pudendi labra molli tactu comprimerentur.

Reperitur etiam in mulieribus.

Non est dubium quin ea gonorrhœæ species a venereo contagio originem ducat in utroque sexu, cum impuro concubitu superveniat, & anti-venereis remediis curetur. Sedem habet propriam in sebaceis seu odoriferis glandulis, in viris quidem ad radicem sive coronam balani aditus, in fœminis vero per totam vulvæ faciem confitis, quæ acri veneno venereo irritatæ, lacescitæ, inflammatae frequenti & iterata oscillatione copiosiores humoris illius proventus suggerunt, viscidum, glutinosum, sebaceum; sed qui tunc dilutior est liquidiorque, & cui commiscetur aliquando nonnullæ puris guttulæ ab erosa balani vel præputii facie in viris, aut vulva in fœminis deciduæ. Sic eodem plane mechanismo piper linguæ admotum, salivam; fumus oculis exceptus lacrymas movet: Vel potius quod ad rem magis facit, sic inflammata & irritata in ophtalmia glandulæ, quæ palpebrarum oras ambiunt, copioso viscidoque humore genas irrorant in lippis.

Sedes illius gonorrhœæ in utroque sexu.

Contrahitur autem hæc gonorrhœæ species ex causa triplici. 1. Si sebaceæ seu odoriferæ glandulæ modo descriptæ laxiores fuerint, rariores & nimis hiulcæ conformationis vitio, adeoque virus venereum, quo madefiunt in impuro concubitu, altius & copiosius imbibant. 2. Si præputium nimis longum non absterfas ichoris virulenti guttulas, quæ coronæ balani post coitum hærent, arctius constringat & intemius applicet glandulis sebaceis. 3. Demum si causæ hę geminæ una simul concurrant, ac proinde agant ideo tanto efficacius.

Causæ in viris.

Nec dispari ratione potest gonorrhœa eadem a fœminis concipi triplici de causa. 1. Si sebaceæ vulvæ glandulæ laxioribus osculis pateant. 2. Si semen ab infecto viro emissum vulva tantum excipiat, de quo iis plerumque cura est, quæ a prægnatione sibi cavent. 3. Si utraque causa una forsan coincadat.

Et in fœminis.

Falsa hæc gonorrhœa cum fluente vel sicca modo conjungi solet, modo vero

vero sola & seorsim accidere. In priore casu adfunt symptomata omnia, quæ supra recensuimus, & quæ gonorrhœam utramque, fluentem & siccam comitantur: In posteriore vero desunt omnino, & nihil quidquam observatur præter dolorem, tumorem, calorem & levem erosionem inflammatae coronæ balani in viris, & vulvæ in fœminis.

Diagnosis. Facile est gonorrhœam spuriam dignoscere & in viris & in fœminis, cum vel ipsa inspectione tum morbus, tum morbi sedes innotescant.

Prognosis. Gonorrhœa spuria, modo prudens adhibeatur medela, periculo plerumque vacat.

At vero si omittantur remedia, superficialiæ glandularum sebacearum erosiones, gliscente celeriter labe, in ulcuscula cancrofa degenerant, quibus balani corona cingitur in viris, quibus vero in fœminis vulva obfideatur, unde affectus periculosior.

Imo etiam, si calli ulculculis undique succrescentes solitum sanguinis & limphæ regressum inhibeant a balano vel a præputio in viris, aut a nymphis, carunculis myrtiformibus vel pudendi labris in fœminis, continget non raro in utroque sexu phimosis, paraphimosis, vel crystallina, ut infra suo loco videbitur, unde grave imminet periculum.

Curatio. *Curatio.* 1. Venæ sectio in brachio alterutro semel atque iterum celebranda est, pro morbi vehementia, scilicet ut præfens balani vel vulvæ inflammatio mitigetur, & præcaveatur imminens.

2. Retracto præputio balanæ, corona balani & interna præputii facies in viris, in fœminis vero vulva sæpius abluenda sunt decocto hordei, vel foliorum agrimonie, vel radices althææ melle Narbonensi temperato. Poterit quoque, si dolor nimius discruciet, vel serum lactis recens, vel lac ipsum in hunc finem satis commode usurpari.

3. Quin imo, si dolor acrior urat, facile erit & alia non pauca paregorica remedia adhibere ad acrimoniam & inflammationem mitigandam. v.g. Balanum denudatum præputio in lacte tepido detinere; vel linteo quod lacte perpetuo madeat, contegere; vel cataplasmate de mica panis, aut cerato refrigerante Galeni supra telam extenso obvolvere &c.

4. Post dies aliquot pacato inflammationis fervore, anti-venereæ omnia, quæ ad gonorrhœam fluentem proposuimus, eodem ordine in usum advocanda, quæ virus venereum subigant, alterent, corrigant; evacuent.

5. Hac methodo solet ut plurimum sponte cessare humoris fluxus, qui a glandulis coronæ balani vel vulvæ promanat. Si quid tamen viscidius inde extillaverit, ut naturalis tonus & glandulis & glandularum emissariis restituatur, utile erit balanum vel vulvam per dies aliquot identidem eluere vel fovere decocto ligni sancti sive Guajaci; vino rubro in quo serum candens aliquoties extinctum sit; vel levi salis aut sacchari Saturnini solutione in aqua plantaginis.

6. Quod

6. Quod si vel remediorum prætermiffione vel morbi vehementia, corone aut vulvæ inflammatio in ulcuscula degeneret, quæ phimosim, paraphimosim, aut crystallinam inferant, tunc remediis utendum erit, qualia infra proponemus ad illarum affectionum curationem.

Poffem nec temere quidem cum gonorrhœa spuria modo descripta conferre ophthalmiam virulentam, quasi inoculatione contagiosa propagatam, cujus raram sed certam observationem habeo. Adolescens quidam dudum confueverat singulo mane oculos abstergere urina sua calente, ut oculorum firmaret aciem. Post contractam ex infortunio gonorrhœam virulentam, a consueto usu minime abstinuit, nihil mali sibi inde metuens. Urina tamen virulentis miasmatis inquinata labem eandem cum conjunctiva & palpebris cito communicavit, qua genitalium interiora affecta erant; unde ophthalmia gravis & venerea, cum acri & involuntario lachrymarum & lippitudinis fluxu, quæ ambo iisdem remediis tandem perfecte curata fuerunt, quibus ipsa gonorrhœa.

Observatio ophthalmiæ venereæ.

CAPUT IV.

De morbis, qui gonorrhœæ virulentæ solent succedere.

§. I. DE TUMORE TESTIUM VENEREO,
sive HERNIA VENEREA.

Contingit frequenter iis qui gonorrhœa vel lue venerea laborant, ut testiculorum alteruter vel uterque tumeat, infletur, distendatur, caleat, doleatque, uno verbo vere inflammetur. Hæc autem singula symptomata, adeoque morbus ipsemet inflammatorius, a quo dependent, varie variant, tum intentione, tum extensione: *Intensione* quidem, cum magis vel minus urgentia sint: *Extensione* vero, cum modo testes ambos, modo unum tantum, modo totam testis substantiam, modo aliquam dumtaxat testis partem occupent.

Descriptio tumoris phlegmonodæi testis.

Hinc autem testium tumor phlegmonodæus, qualiscunque sit, a gemina causa producitur. 1. Quidem a suppressione vel coercitione putridi & virulenti seminis, quod a prostaticis & vesiculis seminariis manare debet in gonorrhœa. 2. A virulentis & venereis miasmatis, quæ in syphiliticis semen, quod inficiunt, inspissant in testium vasculis, & ibi congestum detinent.

Gemina est tumoris illius causa.

Itaque 1. Si fluxus gonorrhœæ quomodocunque suppressus vel cohibitus fuerit, de quo vide quæ dicta sunt supra cap. 1. virulentum semen, quod a testibus in vesiculas seminarias & a vesiculis in urethram profluebat, cogetur subsistere; retentum ea ratione semen vascula testium, quibus coercetur, infarciat, distendat & tumefaciat; distenta & tumefacta vasa spermatica arterias venasque juxta repentes compriment; demum compressis venis arteriisque, sanguis continuo fluxu appellens in lateralia

Nempe gonorrhœa suppressa

lia limphatica vasa cogetur arietare, & via vi facta novum iter sibi cudere; sic ergo a primo ad ultimum inflammatorius testium tumor producet. Hæc est prior morbi causa, quæ a gonorrhœa semper dependet, quæ cum eadem sæpe conjungitur.

Vel lues
venerea
latens.

2. Si virus venereum, quod ut jam dictum, natura falso-acidum est, lateat in sanguine, semen, quocum ex analogia multum commiscetur, inde plerumque inspissabitur, ut ab acidis quibuscvis solenne est sulphureos humores inspissari; ac inspissatum in numerosissimis, stric-
tissimis, & glomeris instar multifariam contortis & complicatis vasibus spermaticis hærebit & subsistet; unde nimia illorum vasorum distensio & tumefactio, venarum & arteriarum compressio, sanguinis hærentia & insolens per limphatica vasa circulatio, ac demum inflammatorius testium tumor. Hæc est altera morbi causa, quæ a lente syphilide dependet, sed quæ sine præsentē gonorrhœa solet accidere.

Sympto-
mata

prioris
speciei
tumoris
testium.

1. Testis
inflam-
matio.

2. Inien-
sor calor
& dolor.

3. Facili-
or resolu-
tio.

4. Vel sal-
tem sup-
puratio.

5. Sym-
ptomata
posterio-
ris.

6. Rari-
or minor-
que in-
flamma-
tio.

7. Obtusior
dolor, &
calor

remissior.

8. Tardior
& diffici-
lior resolu-
tio.

9. Skir-
rhus.

Liquet inde 1. *Priorem* quidem tumoris speciem, cum a subita seminis retentione inferatur, seu, ut Antiqui loquebantur, *fluxione* fiat, esse magis inflammatoriam.

2. Proinde pro more tumorum inflammatoriorum intensiorum caloris & doloris sensum excitare.

3. Sed ideo quoque felicius resolubilem esse; & si resolvatur, perfectius resolvi, ac plerumque sine ulla aut fere ulla duritie superstitie in teste, potissimum si renovato gonorrhœæ fluxu via fiat inspissato & grumefacto spermati.

4. Si resolutio non successerit, sæpius in suppuratum abire, ruptoque abscessu in fistulosum ulcus degenerare.

5. Cæterum hanc tumoris speciem dextrum vel sinistrum testem occupare, prout semen in vesiculis feminariis vel dextri vel sinistri lateris retinetur; utrumque vero, si in vesiculis utriusque lateris semen coerceatur.

6. Contra vero *posteriorem* tumoris speciem, cum a tardiore seminis hærentia producatur, seu ut cum Antiquis loquamur, *congestione* fiat, minus inflammatoriam esse.

7. Proinde minorem in affectu teste caloris & doloris sensum producere.

8. Sed eo quoque nomine nec tam facile resolubilem esse; nec si resolvatur, tam perfecte resolvi, & duritiem aliquam in teste plerumque relinquere, cum nulla sit spes in provocato seminis fluxu per gonorrhœam.

9. Superstitem duritiem dimissis sensim tenuioribus partibus frequenter in skirrhum indurari, qui hydrocelen, pneumatocelen, sarcocelen &c. non raro inducit: imo qui quandoque validioribus arteriarum interrepentium oscillationibus, fortuito attritu; humorum acrimonia &c. lancinante dolore tandem percelli & in carcinoma mutari solet.

1. Hanc

10. Hanc alteram tumoris speciem dextrum sinistramve testem invadere, prout laxior contextus, aut fortuitus alterutrius attritus hgentiæ feminis locum dat.

11. Ceterum in utroque tumoris genere Epididymides sive parastatas promptius affici quam testes, quia vasa Epididymidum laxiora sunt, atque adeo subsistenti semini facilius cedunt; contra vero vasa cætera spermatica testem componentia, quæ tunica albuginea arcte concluduntur & firmantur, semini efficacius resistunt.

12. In Epididymidibus vero sive parastatis globum seu angulum inferiorem frequentius inflari, quam superiorem, quoniam difficilior est feminis regressus ab inferiore angulo, propter majorem declivitatem.

13. Molestum ponderis sensum percipi, quia tumefactus testiculus reipia magis ponderat; sensum autem illum ad inguina usque protendi, quia testiculi pondere funiculus spermaticus qui & ipse inflammationis pariceps est, distrahitur.

14. Demum febrem accendi, sive quod acutus doloris sensus, quo eger torquetur, frequentiores cordis contractiones sympathice sollicitet; sive quod sanguis a sanguiferis testis inflammatis vasibus præclusus, citatius per cætera vasa circulet, atque adeo frequentiore cordis systolen promoveat.

Diagnosis morbi, & gradus morbi inspectione: Causarum vero egritudine relatione manifesta est.

Prognosis. Tumor inflammatorius testium numquam periculo vacat, cum febrem comitem habeat, ac in graves affectus, abscessum, fistulam, skirrhum, hydrocelen, sarcocelen, carcinoma testium possit degenerare.

Tumor, qui ab inhibita gonorrhœa dependet, acutior est, & citius proinde stadia sua percurrit: Tumor vero qui a syphilide latente producit, magis chronicus est, & lentius movetur, sed habet uterque sua sibi que propria pericula, de quibus modo satis fuse diximus.

Curatio. 1. Venæ sectio e brachio sæpius iteranda pro ætate, viribus, temperamento egrotantis; morbi natura & intensione; & febrilis orgasmus incandescencia. Sane nec præstantius nec promptius ullum aliud est auxilii genus, quo inflammatio resolvi, discuti, vel minui & mitigari possit.

2. Largus potus præsens imperandus est, qualem supra ad gonorrhœam propoluimus, egerque digesta tenuissima, hoc est solis jusculis ex pullo & vitulina carne confectis nutriendus. Alvus demum enemate laxanda cum medulla cassiæ.

3. Missis remediis internis mochlicis & purgantibus, sicut externis astringentibus & reperioculentibus quibuscumque, anodynis tantum iustificandum sub forma lotionum, fomentorum, cataplasmatum. In hunc finem

11. Parastata præ cæteris, testis partibus afficiuntur.

12. Et in parastatis globus inferior præ superiore.

13. Sensus ponderis in teste.

14. Aliquando febris.

Diagnosis.

Prognosis.

Curatio.

finem conducunt decoctum radicis althææ, & seminis lini, vel lac subtepidum, quibus scrotum identidem foveatur; vel cataplasma anodynum de mica panis, aut emolliens cataplasma ex radicibus liliorum, folisque hyoscyami, malvæ, brancæ-ursinæ ad putrilaginem coctis, quarum pulpæ lini farina, oleumque lumbricorum terrestrium vel liliorum admisceatur.

4. Quod si in hac prima morbi periodo dolor acutius discruciet, utendum narcoticis, ut syrupo de diacodio, de karabe, laudano, tinctura anodyna &c. dosi conveniente.

5. Remittente inflammationis, ac proinde febris & doloris vehementia, æger lenti cathartico purgandus est, v. g. diluto decem drachmarum vel unciz unius & semissis medullæ cassiæ in feri lactis depurati lib. j. pro duobus haustibus.

6. Tunc possunt sine periculo admoveri cataplasmata leviter resolventia, inter quæ laudatur sequens, ex quatuor farinis resolventibus

℞. Farin. Hordei.

Lupinorum.

Feni græci.

Et Secalis ana ℥ij.

Seminis Cumin. pulverat. ℥ij.

Cog. in aqua comm. ad formam pulvis spissioris, admisce olei lumbricorum ℥ij. F. Cataplasma.

Laudatur quoque ea terræ cimoliz species, quæ colligitur in stulis culturariorum, & quæ cotis & ferri ramentis constat; hæc supra linteum expansa, ac debite calefacta tumentis testiculo cum successu admovetur.

7. Jam quoque in usum tuto possunt advocari anti-venerea quæcumque interne sumpta, quæ virus venereum alterando nativam semini hærenti fluiditatem possint restituere. Sed hæc repeti possunt ex cap. præcedente, ubi de gonorrhæa.

8. Tandem de resoluta testium inflammatione superest ut plurimum durities quædam, major minorve, præsertim in epididymidum angulis, quæ ab indurato inspissatoque semine procedit. Huic discutiendæ multa possunt conducere, 1. Inunctione ex balsamo sulfuris succinato, vel ex oleis mastichino, rutaceo & menthaceo ana commistis, & si ita videatur, addita cera paululum inspissatis in formam unguenti. 2. Emplastrum de vigo quadruplicato Mercurio, emplastrum de ranis cum Mercurio, emplastrum de cicuta, emplastrum diabotantum &c. quæ possunt vel seorsim, vel una simul ea qua lubuerit proportionem temperata, applicari. 3. Inunctio simplex cum Mercuriali seu Neapolitano unguento, identidem repetenda cum debitis cautelis, ne pyralismus advocetur. 4. Imo vero omissis resolventibus fortioribus, mira

quan-

quandoque præstant sola relaxantia ut emplastrum de mucilaginis, de spermate ceti vel ranarum &c.

9. Dum ea adhibentur medicamina, debent testiculi suspensorio cingulo contineri, ne in assueto pondere vasa spermatica nimium distrahant, & extendant, atque ideo ipsi obstant resolutioni feminis quo turgent.

10. Quod si adhibitis incassum remediis anodynis, resolventibus, discutientibus, inflammatus testis in suppuratum vergat, quod patet ex phlegmones diuturnitate & ex symptomatum redintegratione, quæ puris confessionem comitari solet; tunc iterato venæ sectionis usu, si morbi vehementia ita exigat, continuandus est usus cataplasmatum emollientium qualia præscripsimus supra cap. 3. §. 1. Imo etiam adaugenda est maturans eorundem efficacia, additis unguento basilico, fermento veteri, vel cochleis terrestribus testa exemptis & in putrilaginem contusis.

11. Deinde ubi primum levi partis cujusdam mollitiæ, vel obscuræ quadam fluctuatione, vel symptomatum urgentium remissione constitit, pus jam alicubi confectum latere, via ipsi cito paranda, ne mollem testis substantiam funditus corrumpat: Solent in hunc finem nonnulli cauterium adhibere potentiale, sed parum laudabili consilio, quoniam deleteriæ cauteriæ partes testis tunicas admodum sensiles rodendo graves convulsiones erechismo sæpenumero excitant: Quapropter satius est phlebotomo partem incidere, levi quidem manu, ne testis substantia altius fanciesur, & mediocri apertura, quæ puris effluxu sufficiat quidem, testis vero substantiam nimium non pessundet.

12. Educto pure, abscessus cavum bis in die detergendum est injecto decocto hordei cum melle rosaceo, ac penicillis molliter replendum, qui levi & anodyno digestivo madidi sint ex terebinthina Venerea vitello ovi & guttis aliquot olei de hyperico, una mistis & subtractis. Dein finita suppuratione, dum carnes succrescunt, ulcus eluendum est aquis Thermalibus, Balerucanis, Borboniensibus, Baregianis &c. & curandum balsamo Arcæi, cui guttæ aliquot balsami viridis Metensium poterunt adjici, ut firmior cicatrix inducatur.

13. Verum si inflammatus testis incipiente gangræna corripitur, si suppuratione nimia funditus corruptus sit, aut si skirrhus jamdudum affectus carcinomatodes fiat, abjecta omni cunctatione, abscindendus erit castratione.

14. Denique si fistulosum ulcus in suppurato teste super sit, si testis totus skirrhus remaneat, aut si notabilis & skirrhus durities testis vel Epididymidis partem aliquam occupet, necessario adhibendæ sunt inunctiones mercuriales, quæ sunt in morbis venereis contumacioribus tanquam sacra anchora: Hac enim methodo sola potest sanguis efficaciter alterari; semen crassius, quod in teste hæret, atteri, ac demum corrigi virus venereum

reum, quod vel jam quidem latet in sanguine, vel eidem saltem recentius commistum fuit ob gonorrhœam suppressam, & a quo supersites morbi reliquæ foventur.

§. II. DE VENEREO PERINÆI ABSCESSU.

Quot
partes in-
flammen-
tur in go-
norrhœa?

Tres partes sunt quæ in Gonorrhœa inflammatione afficiuntur modo simul, modo seorsim, ut supra vidimus, nimirum vesiculæ seminariæ, prostata, & glandulæ Cowperianæ. Si gravior ergo & nimium virulenta gonorrhœa contracta sit; si conveniens gonorrhœæ curatio diutius negligatur; si omisissis venæ sectionibus & anodynis remediis, mochlica, drastica, vehementiora purgantia præpostere adhibeantur; si imprudenti veneris usu, potatione vini meracioris aut liquorum ardentium, equitatione, exercitio nimio &c. morbus exasperetur; si virulenti seminis effluviū injectionibus stypticis & astringentibus temere cohibeatur, in his singulis casibus grave periculum imminet, ne partes distractæ & inflammatæ, sanguinis hærentis copia, arteriarum distentarum pulsatione vehementiore, ac collecti seminis virulenti & acrimonia discendantur, atque tandem putrefacto sanguine qui a discissis effluit & virulento semini permiscetur, in verum abscessum abeant in perineo latentem.

Quot lo-
ca sole-
ant ab-
scedere
in gonor-
rhœa &
cur ab-
scendant?

Possunt ergo, imo debent hæc omnia inter causas abscessus perineï enumerari, qui supervenit gonorrhœæ, maxime quidem si in egrotante accidant, cujus acrior sit sanguinis diathesis, aut qui vesiculas seminarias, prostates, glandulas Cowperianas prægressa multiplici gonorrhœa labefactas habeat.

Attamen experientia compertum est gonorrhœam quidem, quæ in vesiculis seminariis tantum aut prostaticis sedem habuerit, rarius in abscessum degenerare; sive quod major firmiorque illarum moles dilacerationi, sine qua suppuratio nulla fit, magis resistat; sive quod multa, lata, breviora emissaria, quæ ex illis partibus in urethram aperiuntur, liberiores vi hærenti & corrupto semini præbeant, unde minori efficacia concludentes cellulas debet erodere: Contra vero gonorrhœam, in qua glandulæ Cowperianæ affectæ sunt, in abscessum frequentius abire, ratione contraria, sive quod minor & mollior illarum moles facilius corrumpatur; sive quod semen inibi collectum, cum longo, obliquo, angusto ductu in urethram effundatur, diutius in ipsis resistet, atque adeo ipsarum contextum promptius perfundet.

Sympto-
mata ab-
scessus in
perineo.

Ceterum 1. A quacumque causa, & in quacumque perineï parte suppuratio fiat, symptomata omnia, quæ gonorrhœam comitantur, ut dysuria urens; tumor, calor, dolor, tenio, rubor perineï, imo ipsius penis multum intenduntur; nec mirum, cum suppuratio incipiens sit ultimus inflammationis gradus.

2. Quin imo accedit dolor pulsativus manifestus, quoniam arteriæ per

per partem inflammata & suppurationi proximam distributa, cum stagnante sanguine turgeant, ab eo qui jugiter appellit qualibet cordis systole, & magis & validius dilatantur, ac proinde alternatione eadem dolentes partes vehementius & dolorifice quatunt.

3. At vero facta semel suppuratione, remittuntur symptomata omnia quæ recruduerant, cessatque pulsativus dolor, quia soluta continui unitate, fauciatæ & discissæ partes jam minus tenduntur, ac circumstanti sanguini debilius obstant.

4. Pus in abscessu latens, pro qualitate magis vel minus acri, sinus sibi cudit varios partium juxta positarum erosionem, vel introrsum, & tunc ex urethra effluit; vel extrorsum, & tunc a perinæo manat; vel in utramque partem, & tunc utrinque profluit, & ab urethra, & a perinæo. Quin etiam vidimus non semel cuniculos istiusmodi in urethra & in perinæo multiplicari, imo vero pertusis recti tunicis in podicem aperiri, ita ut urethræ principio & ani extremo cum perinæo per vias latentes communicantibus, urina, pus, fæces alvinæ liquidiores, flatusque urethra, podice, aut perinæi fistulis promiscue excernerentur.

5. Calli varii sinuum latera cito obsident, quoniam hærentis puris particulæ non paucæ lympham per confinia circumstantem ita inspissant, ut inassueta durities inde concilietur, quod promptius solet accidere, si urina aut fæces in sinus illos irrumpant.

6. Hinc ergo multiplices perinæi fistulæ; varie cum urethra, cum ano, inter se communicantes; quæ modo paucum, modo multum, modo serosum & tenue, modo viscidum, modo sanguinolentum pus profundunt; inflammantur modo, modo inflammationis expertes sunt, pro diversis erratis in victu aut in usu rerum non naturalium.

Quæcumque de viris hætenus dicta sunt, debent hæc eadem de mulieribus intelligi, sed mutatis mutandis. Fiunt in illis ex suppuratione gonorrhœæ abscessus in prostaticis, quorum pus nisi per lacunas evacuetur, viam sibi seorsim cudit vel in urethram vel in vaginam. Idem accidit in interfœmineo, si glandulæ Cowperianæ, quæ ibidem in fœminis latent; ex gonorrhœa virulenta inflammantur & suppurentur, & tunc abscessus vel in vaginam, vel in podicem, vel in utramque partem aperiri solet. Quod ad botryformes vaginæ glandulas, quæ in fœminis tertiam gonorrhœæ sedem præbent, vix permittit conformationis ac situs ratio, ut in abscessum abire possint, sed venerea vaginæ ulcuscula inducunt, si inflammata suppurentur, ut infra suo loco probabimus.

Diagnosis. Abscessus siens dignoscitur exacerbatione symptomatum omnium, quæ inflammationi propria sunt; factus vero symptomatum eorundem mitigatione, partis inflammatae mollitie, obscura pun-
 zio.

Exterior & quasi subcutanea puris fluctuatio ad ani confinia *Covvperianas* glandulas; Interior & profundior vesiculas seminarias, aut prostates affici demonstrat; Has quidem, si ano; illas vero, si penis radici proximior sit; dextras sinistrasve, prout in dextro vel in sinistro latere percipitur.

Fistulosa perinzi ulcera externa oculis patent; situs, numerus, commercia eorumdem vel ex accidentibus manifesta sunt, vel immisso specillo explorantur. Interna vero ex frequenti puris effluxu per urethram, ex obscuro doloris sensu in perinzo, ex frequenti urethrz inflammatione cum stranguria, quæ puris exundatione cessant, demum ex prægressu gonorrhœis, & methodo qua curatz fuerunt abunde conjiciuntur.

Prognosis. Abscessus quivis in perinzo periculosus, quia partes glandulas afficit, quas ad cicatricem perducere facile non est.

Eo periculosior, quo major & profundior: hinc periculosiores abscessus vesicularum seminariarum & prostaticarum, quam glandularum *Covvperianarum*.

Periculosissimus, si pus conclusum diutius lateat, quia hinc multiplex & callosus sinus progerminat, quo urethrz principium, podex & perinzum multifariam corumpuntur.

Ulcus externum & fistulosum perinzi haud facile, internum, quod in urethram apertum est, difficillime curatur; & neutrum fere unquam, nisi inciso perinzo & detecta morbi sede.

Multiplicia & fistulosa perinzi ulcera, quæ cum urethra & ano communicant, vix debent curanda suscipi, cum non liceat intimos morbi recessus perscrutari, sine quo tamen luditur opera, vel saltem non liceat, nisi cum maxima partium deperditione, & incisione multiplici, quod semper periculosum est. Proinde ut plurimum satius est *palliativam* curationem adhibere, ne infametur operatio, quæ multis saluti fuit, quod maxime verum est de ægrotis morbo diuturniore exhaustis & emaciatiss, & in quibus sanguis vitio non vacat.

Curatio. Therapeja quadruplex ad quadruplicem morbi statum reperrunda est. 1. Ad suppurationem imminentem, quam omni ope atque opera oportet præcavere, si præcaveri possit; 2. Ad abscessum in perinzo genitum, unde pus semel confectum educi debet quam ocysissime; 3. Ad cuniculos multos, varios, quos pus diutius conclusum egit in varia loca finitima, & quos incidere necesse est; 4. Ad mitigationem palliativam morbi, si ad curationem desperati aggredi non liceat.

I. Nihil non tentandum est ut imminens perinzi suppuratio præcaveatur. Venæ sectiones iterandæ frequenter & largiter; diætæ tenuis, & corporis quies imperanda; causæ externæ, unde inflammatio recruduit, diligenter amovendæ; larga potatio pitisanæ refrigerantis, de qua supra *cap. 1.*

præ-

Prognosis abscessus in perinzo.

Curatio abscessus in perinzo.

I. Suppuratio præcavenda.

præscribenda; paranda fomenta & semicupia emollientia, temperantia, anodyna, ex decocto althææ, brancæ ursinæ, malvæ, violariæ, aut ex lacte tepido; admovenda cataplasmata anodyna, relaxantia, de mica panis, aut ex emollientibus pulpis radicum althææ, nymphææ liliorum alborum &c. foliorumque malvæ, brancæ ursinæ, betæ violariæ &c. Injiciendi clysteres cum decocto emolliente, cum sero lactis, cum medulla recenter extracta cassiæ ad ʒj. &c. Adhibenda narcotica, ut syrupus diacodii, tinctura anodyna, laudanum &c. quæ dolorem leniendo resolutioni faveant &c.

II. Abscessus incidendus.

II. Quod si frustrato remediorum successu inflammatio in suppurationem abierit, puri latenti, ubi primum certa sui dederit indicia, via paranda est, ne sinus sibi cudad, ac varios callos inducat.

Itaque 1. Immissio in urethram cathetere, locus abscessus aperendus est sectione, quæ sit ad raphen parallela, brevior vel longior, magis minusve alta pro ipsius abscessus situ, extensione, altitudine sed ab urethra, quam catheter indicat, caute declinando.

2. Immisso in vulnus digito, si qui sinus adsint, incidendi; si quæ ligaturæ, dissecandæ, ac omnia quantum fieri poterit, ex arte ita complananda, ut pus nullibi lateat, ut remedia quocumque penetrent, ut omnia conspici, vel saltem facile explorari possint.

3. Quinimo, si qui calli lateant, excindendi si loci ratio permiserit, vel saltem digitis conterendi, aut quod præstat, summo scalpello sacrificandi, ita ut procurata suppuratione sponte evanescant, neque adeo opus sit adhibendis cathæreticis, quæ ulceris oras depascendo & suppurationem in dies renovando, coitionem impediunt vel morantur.

4. Vulnus carpto tormento opplendum prima curatione; deinde curandum cum vulgari digestivo, si omnia satis sana esse videantur; sin minus, cum digestivo, cui oleum hyperici, tinctura myrrhæ aut Ægyptiacum, admista sint, si putrefactio nimia in gangrænam videatur vergere.

5. Procedente suppuratione, ulcus mox injectionibus detergentibus nempe decocto hordei cum melle rosato, & postea vulnerariis, ut decocto hyperici, agrimonix, faniculæ, bugulæ &c. quotidie eluendum est; ac demum adhibito balsamo Arczi, imo vero balsamo viridi, si molliores carnes succrescant, ad cicatricem deducendum.

6. In hac autem curatione ea præcipue cautio adhibenda est, ne quis sinus, utcumque exilis, curantem Chirurgum superstes fallat; ideoque perpetuo attendendum est ad indolem copiamque puris, quod effluit; ad indolem carniæ, quæ progerminant; ad laxitatem duritiæve partium quæ ulceri contigux sunt; ut inde signa colligi possint, quæ sinum alicubi latentem arguant, vel quæ ab importuno metu tandem liberent medentes.

III. Verum si ægrotantium incuria, vel negligentia medentium pus III. Ulcerum.

ra fistulo-
sa disse-
canda.

diutius coercitum cuniculos in finitima loca latenter egerit, tunc non dissimili, sed tamen paulo difficiliore operatione opus erit, quam variam pro vario ulcerum fistulorum situ, & vario eorumdem commercio cum vicinis partibus institui necesse est.

Nam 1. Si ulcus vel ulcera interne cæca extrorsum tantum aperiantur, tunc eadem plane methodo quam proposuimus, operatio instituenda est, hoc uno tantum discrimine quod ad cuniculos omnes dissecandos, & ad callos vel forfice excindendos, vel suppuratione dissolvendos, vel absumendos cathæriticis tanto cautius ac diligentius attendendum sit, quanto plures & frequentiores tum hi, tum illi in fistulosis ulceribus adesse debent.

2. Si ulcus vel ulcera utrimque pervia, & extrorsum & introrsum in urethram simul aperta sint, ab incidenda urethra tunc abstinere nullo modo licet: Quapropter immisso cathetere sulcato, ulceratæ pars urethræ & perinæi longitudinali plaga secundum catheteris sulcum, scapello seu lithotomo dissecanda, non secus ac in lithotomia. Dein cætera omnia, ut in præcedente casu peragenda; sinus & cuniculi omnes incidendi; calli excindendi, & si qui supersint vel suppuratione vel cathæreticis absumendi; vulnus demum arte eadem, iisdemque remediis curandum. Hæc una est discriminis ratio, quod cum dissecta sit urethra, catheter in vesica detinendus sit, quemadmodum in lithotomia ex usu esse consuevit, ut ea arte urina ab ulcere quantum fieri potest avertatur, cui sale suo ammoniacali multum noceret, donec tandem coalitio internorum labiorum urethræ catheteris usum inutilem faciat.

3. Si ulcus vel ulcera externe oclusa introrsum tantum in urethram conniveant, plane eadem operatio instituenda est, ac cautiones eadem adhibendæ, ut morbus perfectam absolutamque curationem recipiat. Cæterum notari velim abscessum istiusmodi in perinæo, qui illæsa cute in urethram tantum pateat, rarum esse, ideoque cum purulento prostaticarum aut vesicularum seminarium stillicidio ab incautis confundi posse, a quo tamen videtur satis aperte distinguui, 1. Quod puris profluvium uberius sit; 2. Quod tumor mollis adsit in perinæo cum fluctuatione collecti humoris, 3. Quod tumor ille crescat cum urina emittitur, parte scilicet lotii illuc illabente ab urethra qua difficilius decurrit. 4. Quod pressus detumescat pure cum lotio per urethram exundante, quæ singula abscessus præsentiam, ejusdemque cum urethra commercium abunde arguunt.

4. Denique si ulcus vel ulcera, quæ extrorsum patefunt, non modo cum urethra sed cum podice etiam communicent, operatio, si forte tentanda videatur, eodem modo tunc celebranda est ac in casu præcedente, sed cuniculorum ductum sequendo ad podicem usque extendenda est, ubi

ubi sectio eadem institui debet, ac in ani fistula. Cæteroqui cautiones omnes eadem ac in præcedentibus casibus adhibendæ.

IV. Demum si malum radicale & absolutam curationemmittere non videatur, ut cum ulceribus multis, obliquis, fistulosis, callosis, sinuosis, cum urethra & podice hinc & inde communicantibus perinæum totum suffosum est, maxime si æger valetudine infirmus & cachecticus sit, atque febre lenta qua contabescit valde extenuatus, palliativam saltem therapejam adhibere necessum est, quæ morbi augmento obviam eat, vitamque licet miserrimam possit producere: Ad quem finem valent,

IV. Malum si in sanabile sit, palliativis remediis mitigandum.

1. Quæcumque muriaticam sanguinis acrimoniam minuunt, eluunt, vel demulcent; ut diætæ tenuis, humectans, refrigerans; abstinentia a vino, venere, exercitiis, equitatione, pathematis animi vehementioribus; balnea tepida aquæ dulcis; juscule aut apozemata refrigerantia; lactis usus etiam pro omni alimento; iterata cathartica blanda ex diluto ꝑij. mellæ cassiæ in seri lactis depurati lib. j. vel ex mannæ calabrinæ ꝑij. in cyatho ptisanæ dissolutis, addita salis vegetalis 3j. si ita esse videatur.

2. Quæcumque ulcera detergunt, ut aquæ minerales acidulæ & ferruginei saporis; ptisana vel bochétum ex radicibus & lignis sudorificis; infusiones *Traumaticæ* seu vulnerariæ ut saniculæ, bugulæ, alkimillæ, salviz, menthæ &c.

3. Quæcumque balsamica sunt, adeoque cava ulcera explant & ad cicatricem deducunt; vel saltem compescunt, cohibentque ne serpent, ut Terebinthina Chia vel Veneta ad 3j. Balsamæ de Copaii, Peruvianum, Canadense &c. ad gutt. vj. viij. x. xij. saccharo pulverato obvoluta in bolis, vel una cum syrupo capillorum veneris confusa ut uno haustu exsorbeantur.

4. Quæcumque partium affectarum tonum firmant, humoresque ibidem congestos liquefaciunt, ac ideo utroque nomine circulationi tum sanguinis tum limphæ promovendæ idonea sunt, ut fofus vel embroche perinæi cum aquis thermalibus, Balerucanis, Baregianis, Borboniensibus &c. aut inunctiones suspensa manu identidem repetendæ cum unguento mercuriali.

§. III. DE SEMINIS STILLICIDIO, sive DE GONORRHOEA QUAM HABITUALEM DICUNT.

Qui gravi & diuturna, vel frequentiore gonorrhœa laborare, solent non raro mensibus & interdum annis aliquot, imo quandoque toto vitæ tempore involuntarium seminis profluvium pati sine ullo venereæ voluptatis sensu, vel saltem cum sensu minimo; modo quidem copia paucum sed perpetuum, quod jugi fluxu distillet, cum ambulant, sedent, aut aliæ quævis munia obeunt; modo vero rarius sed simul uberius, quod

Descriptio præternaturalis stillicidii seminis.

guttis majoribus exundet, cum ad egestionem etiam parum difficilem nituntur: cum libidinosè cogitant; aut cum tento veretro ad venem sese comparant.

Quomodo semen defluit, e vesiculis seminariis aut e prostaticis manare; secundum quidem & prolificum ab illis, in quas a testibus convehitur per vasa deferentia; infœcundum vero & mere limphaticum ab his, ubi secernitur. Vesiculæ autem seminae cum urethræ ductu communicant binis emissariis, unaquæque suo, inter quæ exigua interjacet prominèria *caput Gallinæ* sive *Veru-montanum* nuncupata. Prostatae vero in urethram hiant osculis duodecim, numerosioribus quidem sed etiam angustioribus, ut serosius tenuiusque semen, quod recondunt, arctius concludant.

Cæterum hæc seminis emissaria interjectis fibris muscularibus, quæ sphincterum vice funguntur, ut multi putant, vel solo circumpositarum partium elatere ita occluduntur in statu naturali, ut ne gutta quidem seminis extillare inde possit, nisi vesiculæ seminae aut prostatae valide comprimantur, tum systaltica membranarum circumvestientium constrictione, tum simultanea musculorum erectorum & acceleratorum superincumbentium contractione, ut in ejaculationis opere solenne est.

Quæ sint stillicidii præternaturalis causæ.

Liquet inde seminis stillicidium præternaturale, de quo agitur, gemino emissariorum vitio produci, 1. Si nimis ampliata & dilatata sint, atque semi-aperta in urethram continenter hiant. 2. Si partium ambientium inertia & laxitate debilius constringantur, unde nimis laxè conniveant, nec semen vi constrictoria coerceant satis efficaci. A priorè quidem vitio dependet perpetuum & stillatitium profluvium seminis; a posteriore vero profluvium alterum, quod identidem recurrit, simul ac vesiculæ seminae aut prostatae vel leviter premuntur, ut in egestionem paulo difficiliore, vel parumper constringuntur, ut in prima venereæ voluptatis promulside.

Solet autem vitium utrumque emissariis conceptaculorum seminariorum a gonorrhœa gravi, diuturna, frequente induci, atque adeo nequaquam mirum est alterutrum seminis stillicidium gonorrhœis istiusmodi superesse. Nam 1. Semen purulentum debet in gravi aut diuturna gonorrhœa emissaria, unde effluit, vel copia dilatare, vel acrimonia corrodere, ac utroque modo eadem prætermodum ampliare; 2. Partes, quibus emissaria eadem cinguntur, inflammatione adjacientium prostaticarum & vesicularum seminarium tumefactione, continuoque puris copiosi transfluxu distractæ & elongatæ ultra tonum, debent inde debilius constringi, atque adeo emissaria ignavius occlusa seminis stillicidium ex levissima pressione frequenter permittere.

Quibus.

Hæc utraque causa stillicidii seminis plerumque fovetur, tum vitio semi-

mi-

minis ipsius, si a veneno venereo aut remediis phlogisticis tantam acrimoniam contraxerit, ut vesiculas & prostates ad frequentiore & fere continuam expressionem irritando sollicitet: tum vitio ipsarum prostaticarum & vesicularum, si diuturna & assidua phlogosi affectæ acutius sentiant, ac facilius in erethismum adigantur, quo collectus humor ad egressum perpetim urgeatur. Sic notum est lippitudinem, quæ a glandularum palpebras ambientium laxitate dependet, ab eadem phlogosi & humoris lemosi acrimonia non parum intendi.

Symptomata. 1. Si perpetuum adsit seminis stillicidium, utcumque paucum, rarior inde futurus est ad venerem stimulus: quia semen in vesiculis seminariis & prostaticis parcius collectum, copia, calore, moriunculis venerem rarius sollicitabit.

2. Hoc autem maxime verum est, si vesiculæ seminariæ afficiantur, minus vero, si solæ prostaticæ: quia semen, quod vesiculis seminariis continetur, magis actuosum, energeticum, efficax est, & proinde ad venerem magis facit; contra vero prostaticarum semen vappidius est inertiusque, & ideo ad venerem minus efficax.

3. Quod si seminis profluvium continuum non sit, sed identidem tantum rariusque recurat, haud tanta futura est ad venerem frigiditas: quia semen in conceptaculis copiosius colligi, ac proinde paulo majori efficacia libidinem accendere poterit, præsertim si semen quod profluit, non a vesiculis seminariis, sed a prostaticis tantum promanet.

4. Verum si tento veretro in armis aliquandiu standum sit, semine citius quam par esset profluente, atque adeo subtracito veneris stimulo languidus penis brevi flaccisset ante aggressum opus, unde manifestata saltem ad venerem minus parabilem impotentia.

5. Demum si copiosum sit seminis profluvium, consequens est exhausta sensum balsamica & spirituosâ sanguinis parte marcorem, phthisim, tabem dorsalem inducenda esse, ratione eadem eademque de causa ac in iis, qui venere immoderata sese extenuant.

Diagnosis. Morbus & causa morbi primaria, gonorrhœa scilicet, Diagnosticantur ægrotantis confessione.

Geminæ morbi species ex se patent, atque inde colligere facile est, quoniam vitio seminis emissaria laborent, cum stillatitium profluvium ab emissariarum laxitate dependeat, quæ inertius occlusa sunt.

Tandem haud arduum est utrà ex vesiculis seminariis prostaticis in vitio sint dignoscere. Semen enim tenue, serosum, limpidum a prostaticis; spissum vero, viscidum, albicans a vesiculis defluit.

Prognosis. Seminis stillicidium raro periculosum est, nec unquam nisi nimium sit, quod rarum est.

At si non periculosum, saltem incommodum est, potissimum iis, qui

nam cau-
sis stilli-
cidium
foveatur?

Sympto-
mata
stillicidii
1. Segni-
ties ad
venerem.
2. Ad ve-
nerem
inertia.

3. Minor
aliquan-
do frigi-
ditas ad
venerem

4. Erectio
tamen
neque
firma,
neque
diuturna
5. Marcor
& tabes.

Diagno-
sis

Prognosis.

dolent funeratam vel funeri proximam eam partem habere, qua se Achilles esse gloriabantur.

Curatu difficilior est stillicidium seminis perpetuum, quam profluvium identidem recurrens, cum difficilior sit latiorum emissariorum amplitudinem minuere, quam partibus inertia peccantibus tonum reddere.

Curatio.

Curatio. 1. Cum experientia docuerit perpetuum seminis stillicidium, præter emissariorum laxitatem, a levi prostaticarum & vesicularum seminariarum, aut earundem emissariorum phlogosi quandoque foveri, sicut in lippientibus vitiosam lemarum secretionem a simili glandularum, quæ palpebras cingunt, affectione dependere diximus, præstat initio unam aut alteram venæ sectionem præmittere, qua methodo vidi non semel recens seminis profluvium feliciter curatum fuisse.

2. Simili de causa, cum seminis acrimonia a veneno vel a remediis contracta stillicidium plerumque intendat, demulcentia adhibenda sunt, ut balnea domestica, aquæ minerales acidulæ, iuscula vel apozemata diluentia & temperantia, serum lactis chalybeatum & succo fumaris alteratum, lac ipsum semel aut bis in die, imo etiam pro omni alimento.

3. Inde ad vulneraria & balsamica deveniendum, quæ ulceris reliquias, si quæ in seminis conceptaculis lateant, detergant & ad cicatricem perducant. In hunc finem utilia sunt infusa levia ex vulnerariis herbis Helveticis, vel sola vel lacte affuso temperata; infusa simili modo parata cum foliis menthæ vulgaris & millefolij; bocheta aut decocta ex radicibus & lignis sudorificis jam supra præscripta, *Cap. de gonorrhœa*; Therebinthina Veneta, vel cocta vel ovi vitello diluta a ʒss. ad ʒj. Balsama varia de Copaii, de Tolu, Peruvianum, Canadense &c. a guttis sex ad duodecim cum saccharo pulverato in bolum conformata &c.

4. Utiliter quoque adhibentur fomenta vel embroches perinei, aut injectiones in urethram cum decoctis vulnerariis, vel quod præsentius est, cum aquis thermalibus, ut hoc modo vitiosa partium laxitas corrigatur.

5. Quod si hæc universaliora minus bene succedant, advocanda erunt in usum styptica & astringentia interna, quæ virtute specifica pristinum tonum emissariis restituant. Hæc virtute pollent corallia rubra præparata, oculi cancerorum fluviatilium, succinum, diaphoreticum minerale, vel quæ efficaciora sunt, cornu cervi philosophice præparatum, spodium, terra sigillata, creta Brianconensis, lapis hæmatites, sanguis draconis, alumen rupeum, crocus Martialis astringens &c. ex quorum tribus quatuorve tenuissime tritis, *ana* ad dosim quindecim granorum præscriptis, & conserva rosarum vel syrupo cydoniorum exceptis boli vel opiatæ parantur, quibus per dies aliquot utendum est.

6. Possunt quoque tuto adhiberi injectiones astringentes, modo semen ab omni seminio venereo immune sit, & proinde possit sine pericu-

lo intius coerceri. Præparantur injectiones istiusmodi ex radicibus bistortæ, tormentillæ, pimpinellæ, gallis, balauftiis, malicorio, cupulis glandium &c. in aqua fabrorum decoctis, unicæ cuilibet decocti addendo grana aliquot sacchari Saturnini vel aluminis rupei. Celebris est ad eundem scopum injectio, quæ fit cum pulvere decocto *de Verny*, cujus semi-drachma in unciiis octo aquæ stillatiæ plantaginis dissolvitur. Hujus autem pulveris conficiendi processum infra proponemus ad Operis calcem, in Mantissa quarto libro adjicienda. Sed de his omnibus fufius infra *Lib. 4. cap. 10.* ubi *de curatione gonorrhææ difficilis*, quæ post administratam hydrargyrosim aliquando superest.

7. Ut curatio profluvii feliciter succedat, servanda est diæta, tenuis, humectans, refrigerans; æger venere, vino, exercitio vehementiore, equitatione diu se abstineat, vel iisdem parce utatur; urinam diutius ne contineat, & alvum, si tenera non sit, enemate emolliente frequenter injiciendam curet.

Cæterum ut in viris, sic etiam in fœminis gonorrhœa gravis aut diuturna solet inferre profluvium stillatitium seminalis humoris, qui a prostaticis, glandulis Cowperianis, vel botryformibus vaginæ glandulis exillat. Sed ipsæ stillicidium istiusmodi parum curant, quod cum fluore muliebri amant confundere, nec medicam opem expectant, cum incommodo muliebrium madori providere soleant ipsæ fotu ex decoctione lithargyrii in aqua fabrorum, vel in aceto. Quod si tamen malum adeo ingravescat, ut a Medico opem cogantur petere, methodo eadem, qualem modo præscripsimus, curandæ venient.

§. IV. DE STRANGURIA CONTUMACI, FREQUENTIORIS GONORRHŒÆ PEDISEQUA.

Gonorrhœam virulentam, diuturnam, frequentiorem, stranguria contumax, & ut vulgo ajunt, *habitualis* non raro sequitur, in qua non pleno alveo, non fluxu æquabili & continuo; sed filo tenui, sæpius interrupto, & bifido urina redditur; non motu facili longe profilit, sed vix prorumpit conatu maximo; non potest in vesica commode diu contineri, sed inquieti & crebra stimulatione ad mictitandum sollicitat.

Hæc tamen, quamdiu modum tenent, tolerabilia sunt. At si Baccho, venere, exercitio, equitatione, vigiliis, acriore diæta, animi pathematis vehementioribus exacerbentur, calere, dolere, reniti perinæm; stranguriam in ischuriam derepente mutari, continuum quidem esse mictuariendi desiderium, sed urinam omnino suppressi; & conatu etiam maximo vel nihilo, vel pauculum quid mucolum, pituitosum, purulentum externi frequenti observatione compertum est, unde febris accenditur; tumet, dolet, tenditur vesica ultra modum plena, cum periculo imminet.

Mulieres quoque seminalis humoris stillicidium obnoxie sunt aliquando post gonorrhœam.

Descriptio stranguriæ quæ gonorrhœæ pedisequa est.

nentis inflammationis; accidit vomitio urinam redolens, ac tandem cætera omnia symptomata ingrunnt, quæ solent ischuria inferri.

Perseverat eadem morbi vehementia longiori vel breviori temporis spatio, pro causarum energia, ægrotantis temperatura, urethræ & vicinarum urethræ partium labe, remediorum adhibitorum successu, donec sensim remittente paroxysmo urina primum stillatim guttis raris & parvis, dein guttis grandioribus & crebrioribus, demum filo tenui sed continuo rursus prodeat. Tunc ubi primum procedente resolutione partium tonus relaxatus est, solet quandoque per unum aut alterum diem quid mucosum, pituitosum, purulentum, saniosum &c. guttatim emitti.

Hæc Cæterum si immisso cathetere urethræ ductus caute exploretur, tum etiam cum omnia maxime libera esse videntur, via quidem in ipsa penis longitudine facile pervia esse solet, sed in perinæo ubi principio urethræ prostaticæ & vesiculæ seminarie adjacent, non unicum, sed duos, tres, quatuorve obices plerumque reperire est, successive & ut sic dicam gradarie dispositos, urethram annularibus ligaturis totidem stringentes, magis minusve duris, magis minusve latis, facilius vel difficilius superabilibus, tandem majori vel minori intervallo invicem diffitis.

Inde ergo necessaria consecutione manifestum est, stranguriam habitalem, quæ a gonorrhœa ortum habet, memoratis in urethra obicibus, si urethræ ductum tantum angustent; ischuria vero, quæ stranguriæ identidem succedit, iidem produci, si tumefacti urethræ canalem penitus constipent. Docet autem tum Anatomica sectio eorum, qui dum in vivis erant, stranguria gonorrhœæ pedisequa laboravere, tum natura gonorrhœæ ipsius, a qua stranguria induci solet, variorumque symptomatum, quæ hunc affectum comitantur, obices istiusmodi in sex genera distinguendos esse 1. Ulcuscula callosa & cacoethæ, quæ in ipsis prostaticarum aut vesicularum seminariorum emissariis pertinacius insident, 2. Callos sive cicatrices duriores & callosas, quas sanata ulcuscula in urethra relinquunt, 3. Carunculas, & excrescentias sive hyperfarcofes, in quas ulcuscula fungosa urethræ abeunt, 4. Verumontanum prætumidum, quod in urethram ultra modum prominet, 5. Prostatas aut vesiculas seminarias duras, callosas, skirrholdæas, 6. Eisdem demum fungosas, spongiosas, & ad frequentem tumefactionem nimium faciles.

1. Abulceribus callosis urethræ.

1. Fere quidem perpetuum est in gonorrhœa, ut supra dictum est, virulenti seminis profluvio ulcera varia produci in variis urethræ partibus, sed præsertim in extremis prostaticarum & vesicularum seminariorum emissariis. Frequenter autem accidit, si gonorrhœa negligatur vel male curetur, ut hæc urethræ ulcuscula perfecte non sanentur, ea vero maxime, quæ in ipsis prostaticarum aut vesicularum seminariorum emissariis sita sunt vel proxime adstant, quoniam affluxu virulenti seminis, quod

quod exinde jugiter stillat, continuo irritantur & foveantur. Debent ergo ulcera, quæ initio levia, superficialia, mollia erant, tractu temporis in ulcera cacoetha, fistulosa callis obstita degenerare, quibus urethræ ductum varie angustari, & urinæ fluxum magis vel minus inhiberi continget, prout errore qualicumque dicitur aucta sanguinis effervescentia vel acrimonia, ulcerum labia magis vel minus intumescunt.

2. Quod si enata in urethra ulcuscula ad curationem feliciter tandem perducere supponamus, ut sæpissime contingere minime negamus, at saltem sanata hæc ulcuscula in cicatrices non raro coibunt nimium duras, quæ in se strictius constipantur, quam esset antea illibata cutis ejusdem loci, circularem urethræ ambitum angustabant corrugando, potissimum vero si ulcera profundiora fuerint, & obductæ eis cicatrices callosæ sint, ut in illis partibus frequenter accidit sufficientis deterfionis defectu. Eo pacto urinæ fluxum stranguria retardari; imo si cicatrices tumescant, ischuria suppressi posse manifestum est. Possumus in confirmationem exemplum adducere haud dissimile, quo constat cicatricibus, in quas oris ulcera in syphiliticis post pyalimum coalescunt, manforiorum musculorum tendines, quibus ulcera inusta erant, ita corrugati & inferiorem maxillam ita sursum retrahi, ut os vix deduci possit, sed quasi freno adstrictum videatur, quod gallice dicitur *estre bride*.

2. A cicatricibus durioribus.

3. Quin imo cum ulcuscula venerea in urethra progerminantia ne dum detergi possint, sed e contra jugi seminis putridi & acrioris urinæ illapsu magis in dies fordescent, haud adeo rarum esse debet superflua carnis luxurie in excrescentias sive hyperfarcosos abire, seu ut vulgo ajunt, *carunculas*, callosas aut fungosas; magnas aut parvas, sessiles aut peniles, in his aut illis urethræ locis sitas, numero plures paucioresve &c. pro vicio vel copia succi nutritii, & pro latitudine, numero, situ ulcerum, unde liquet urinæ fluxum varie retardatum iri.

3. A carunculis urethræ adnatis.

Novimus quidem omnimodam caruncularum in urethra existentiam a plurimis nunc negari, sed non alio forsan argumento, ut est genus hominum varium & mutabile, ac novitatis semper cupidum, quam quod non ita pridem antiquiores Medici carunculas urethræ uno ore omnes haberent pro causa unica stranguriæ, quæ gonorrhœis solent succedere. Sed æque culpabili præcipitantia hinc & inde graviter peccatum est. Antiquorum ignorantie parcendum non censemus, qui cæteras stranguriæ venereæ causas, & graviores & frequentiores prætermisere; sed nec Recentiorum temeritatem excusatam volumus, qui caruncularum in urethra existentiam audent sine causa pernegare, cum analogia ab ulceribus quibuscumque sordidis ducta, imo, quod palmarium est, cum ipsa cadaverum sectio carunculas in ulceribus urethræ quandoque succrescere demonstrent, non tam frequenter quidem ac olim ab Antiquis creditum est &

ab Agyrtis etiamnum creditur, sed satis frequenter tamen, ut carunculas inter cæteras stranguriæ causas recensere necesse sit.

4. A verumontano
skirrholo
& verrucoso.

4. Saltem verumontanum sive caput gallinaginis, quod inter bina vesicularum seminariarum emissaria medium interjacet, in gravi & contumaci gonorrhœa sæpe erodi, tumesceri, inflammari, ac demum si provida inflammationis resolutio & ulcusculorum deterfio negligatur, ut in gonorrhœis, quæ injectionibus astringentibus supprimuntur, in verrucam seu excrecentiam degenerare debet, fungosam, callosam, skirrholdæam, superficie tenus varie exulceratam, quæ varia, multiplici de causa magis minusve intumescet, atque adeo fluenti urinæ obicem opponet perpetuum quidem, sed varie variantem.

5. A vesiculis seminariis,
vel prostaticis induratis & callosis.

5. Constat in omni gonorrhœa prostatica vel vesicularum seminarias, aut utrasque inflammatione aut exulceratione affici. Hinc si frequentior morbi ejusdem iteratio eas partes jam labefecerit, aut si conveniens omittatur therapeja, consequens est tacito mali progressu callosa & fistulosa ulcera in illis partibus productum iri, unde aucta prostaticarum & vesicularum seminariarum mole adjacentem urethram comprimi & exiturienti urinæ obicem ea ratione opponi manifestum est, sed pro varia partium prementium intumescencia varium.

6. Ab illis
vesiculis vel
prostaticis,
carne molli & spongiosa plenis.

6. Demum e contrario, interiora prostaticarum aut vesicularum seminariarum, si alte erosa carnum succrescentium luxurie locum deriderint, nisi caute detergantur carne cito opplebuntur, molli, rara, fungosa spongiæ instar, qualis sordidis & callosis ulceribus solet interdum innasci. Hinc ergo tumescient tum prostata, tum vesiculæ seminariæ, & urethram appositam prement, majori vel minori momento, prout fungosas carnes, quæ prostaticas vel vesiculares replent, magis vel minus efficaciter dilatari & extumescere contigerit.

Symptomata
stranguriæ. 1. Urina profluit tenui filo.
2. Nitendum est ad micturandum.

Sequitur ex allata ætiologia, 1. Urethræ ductum in stranguria, de qua agitur, ab obice qualicumque ex sextuplici genere modo proposito angustari vel comprimi. Ergo urina non jam pleno alveo ut antea, sed tenui tantum filo profluit, magis vel minus crasso pro amplitudine viæ superstitis, quod de ipso quoque semine, dum in actu venereo ejicitur, dictum volumus.

3. Nec tamen
urina longe profluit in arcum.

2. Quo major resistentia exiturienti urinæ obnititur, eo vesicam efficaciori momento contrahi necessum est, ut urina superata resistentia emittatur. Ergo urina jam non motu facili reddetur ut antea, sed nisu valido, qui resistentiæ urethram angustanti respondeat gradu, quod etiam de ejaculatione seminis verum est.

3. Celeritatem urinæ, postquam obices urethræ jam prætergressa est, tanto tardiore esse, quanto magis urethræ via, qua transivit, ab obicibus angustata fuerit. Constat enim ex Physicis liquidum quodcumque, dum ab

an.

angustiore in latiore canalem fluit, eo tardius in latiore moveri, quo canalisis unde fluit, angustior est. Ergo urina emissa jam non in arcum longe profiliet, sed lento reptatu ex urethra vix erumpet; idemque de ejaculatione seminis dicendum.

4. Equabilem urinæ cursum ab obvio in urethra obice in duos rivos scindi, qui licet una rursus coeant, quandiu intra urethræ canale coercentur, singuli tamen suam retinent determinationem, qua ubi primum spatium dabitur, in diversa loca extra urethram divaricantur. Ergo urina jam non rivo unico & cylindrico sed bifido profluet, quod magis vel minus manifestum erit, prout obviu obex in urethram magis vel minus prominebit.

4. Ple-
rumque
divarica-
tur in
duo flu-
enta.

5. Fluentum urinæ in oppositum obicem eo validius arietare, quo urethræ ductus angustior urinæ fluento magis obnuitur. Ergo ea urethræ pars ab incurrente urina tanto fortius succutietur, & si inflammata vel ulcerata sit, atque adeo alterutro nomine sensu acutiore prædita, tanto magis dolorifice sentient, quanto angustior erit urinæ via, unde dysuria frequens vel perpetua. Simili de causa semen ipsum solet emitti cum dolore, in ipso actu venereo.

5. Mictio
dolorifi-
ca.

6. Dysuria, si inter mejendum acrius urat, validam urethræ constrictionem sympathice proritari juxta leges naturalis partium consensus, quæ voluntatis imperio cesset quidem, sed quæ redeat denuo simili urinæ appulsu, ut supra explicatum fuit ubi *de gonorrhææ symptomatibus*. Ergo urina jam non fluxu continuo, sed inæquali & identidem interrupto profluet. Constat simili de causa semen inæquali & interrupta ejaculatione tunc ejici.

6. Stran-
guria per
interval-
la inter-
mittens.

7. Collum vesicæ seu urethræ principium, contracta phlogosi ab affecta urethræ parte quæ confinis est, acutius sentire, ac proinde vividius percipi a calente urina, quæ vesicæ inest, & ejus morfuunculis magis obvium esse. Ergo urina jam diu commode retineri non poterit, sed ad mictitandum crebra stimulatione urgebit.

7. Mictu-
ritio.

8. Urethram angustari modo quidem carunculis, aut veru-montano, aut cicatricibus duris & callosis; vel comprimi prostatitis aut vesiculis seminariis skirrholdæis, unde nihil manare possit; & tunc ab urethra nihil quidquam defluet præter urinam, vel defluet tantum mucosum quidpiam, quod a vesicæ collo mictitando deradetur. Modo vero urethram angustari ulcerculis manantibus, carunculis aut veru-montano ulceratis, vel comprimi prostatitis aut vesiculis seminariis fistulosis, spongiosis, suppuratis, & tunc sub mictionis finem pus aut sanies excernetur, quæ colore, odore, consistentia, copia, qualitate varie varient.

8. Ali-
quando
stillicidi-
um ad-
est, deest
aliquan-
do.

9. Hactenus recensita symptomata intendi omnia & ingravescere, si acriore aut nimium excandescente sanguine ex venere, prava dicta, viciis, animi pathematis vehementioribus; si salisioris lotii acredine ex-

9. Omnia
ingrave-
scunt
multis de
causis.

po-

poratione vini meracioris; si fortiore affectarum partium compressione ex equitatione vel frequentiore coitione; si puris acrioris præsentia, quod sanguis acrior suggerit, obices varii, qui in urethra vel urethræ confinis latent, inflammentur, tumescant, urinæ fluxum penitus intercipient.

10. Et tunc supervenit ischuria.

10. Tunc, quandiu duraverit paroxysmus, calere, dolere, tumere perinæum; stranguria in ischuriam mutata, continuo sed inuili micturienti conatu nihil quicquam excerni, vel excerni tantum quid mucosum vel purulentum, quod ab inflammatis vel suppuratis partibus extillet; demum ut multa paucis contraham, omnia ingruere symptomata, quæ ischuriæ essentialia sunt.

11. Quæ paulatim remittit.

11. Inde vero remittente paroxysmo, & detumescantibus obicibus urethræ viam pedetentim relaxari, & urinæ cursum sensim restituti gradario progressu: Et tunc tandem guttas aliquot ejici, plures paucioresve humoris mucosi vel pituitosi, si ab inflammatis tantum obicibus; purulenti vel saniosi, si ab obicibus ulceratis & suppuratis exprimatur.

12. Quæ mala in fœminis rara quidem.

12. Cæterum rarum est mulieres ex prægressis gonorrhœis etiam contumacibus aut pluries repetitis stranguria unquam vexari, tum quia in ipsis urethræ canalis brevior est latiorque, quam ut possit tam facile angustari vel comprimi ac in viris; tum potissimum quia conceptacula mulieris seminis, ubi gonorrhœæ sedes est, vel ab urethra longe distant, ut glandulæ Cooverianæ & glandulæ bostryformes vaginæ; vel si prope adsint, urethræ tamen non inhiant, neque adeo possunt tam commode cum eadem vitia communicare, ut de prostaticis fœmineis verum est, quæ licet urethræ adnatæ sint & circumpositæ, ductibus tamen ab urethra diversis, quos *lacunæ* dicunt, in superiorem vulvæ partem aperiuntur.

13. Sed aliquando tamen visa & observata sunt.

13. Observavi tamen aliquando mulieres ipsas stranguria istiusmodi ex gonorrhœa laborasse, vitio scilicet prostaticarum, quæ tumidæ & callosæ urethræ ductum, quem ambiunt, prætermodum angustarent. Quia imo semel observavi in fœmina suppuratas & fistulosas prostaticas laterales sinibus in urethram apertas fuisse, unde jugi puris acrioris in urethræ canalem stillicidio stranguria frequens inducebatur.

Diagnos. Stranguriæ. Diagnos. causarum stranguriæ.

Diagnos. Morbus per se obvius est ex tradita descriptione. Obvium est quoque antecedentem morbi causam dignoscere, cum ægri relatione liqueat quot & quantis gonorrhœis jam ante laboraverit.

Verum quod ad causas conjunctas, quibus morbus actu foveatur, hoc est quod ad naturam & qualitatem obicium, qui urethram obsident; cum hæc in obscuro lateant, meris conjecturis possunt inquiri. Itaque si sub mictionis finem quid purulentum aut saniosum effluat, licet conicere obices esse e genere suppuratorum, atque adeo vel carunculas suppuratas, vel ulcuscula in urethra callosa, vel abscessus & fistulas in prostaticis aut vesiculis seminariis callosis, spongiosis, sup.

suppuratis &c. Contra vero si nihil effluat, vel effluat tantum quid mucosum, licet inde colligere obices esse e genere non suppuratorum, atque adeo vel cicatrices duriores, vel carunculas callosas, vel veru-montanum induratum, vel prostates skirrhydæas.

Quod si pus crebris & grandioribus guttis profluat, adeoque industria frequenti lataque macula inficiat, inde probabile fiet fluxum istiusmodi non a levioribus & superficialibus ulcusculis urethræ, nec a carunculis exulceratis scaturire, quæ pus copiosum non possint sufficere; sed a prostaticis ipsis aut vesiculis seminariis ulcerosis, suppuratis, fistulosis, ut evidenter patebit si ea perinæ regio, ubi prostata & vesiculæ seminares sita sunt, paulo tumidior appareat, aut saltem obscure & profunde doleat, dum premitur.

Demum exploratio per catheterem suspensa & prudenti manu instituta, obicium naturam & qualitatem utcumque non demonstrat, tamen aliquando indicat ex qualitate humoris, qui catheteri extremo adhærescit cum extractus est. At saltem certo docet quot numero sint, quibus urethræ locis aditi, qua vi stringant urethram, aut qua mole oppleant, quis major minorve sit, quam latitudinem quilibet habeat, quo intervallo invicem distent &c. quæ singula non modo ad prognosim, sed etiam ad curandi methodum sunt admodum utilia.

Prognosis. Stranguria, quæ a gonorrhœis ortum habet, contumax est, cum difficile sit obices quibus inducitur, vel extirpare vel retundere; & periculosa, cum ischuriam & periculi plena ischuriæ symptomata non raro inferat.

Quo difficilius urina mingitur, & quo frequentius supervenit ischuria, eo periculosior est stranguria.

Similiter eo contumacior, quo urethræ obices numero plures latioresque sunt, aut urethram magis angustant, premuntve fortius.

Cæteris paribus curatu difficilior est & periculosior, quæ sit ab obicibus suppuratis vel exulceratis, quam quæ ab obicibus callosis. Hæc enim ab unico tantum morbo, illa vero a gemino dependet.

Similiter cæteris partibus periculosior est & curatu difficilior stranguria, in qua prostata aut vesiculæ seminares suppuratæ, ulceratæ, callosæ, fistulosæ, skirrhydææ sunt, quam ea in qua leviora ulcera urethram tantum infestant, tum quia in priore afficiuntur partes ampliores, tum quia partes, quæ afficiuntur, ejus conditionis sunt, ut vix sanari queant sine gravi operatione.

Tandem ischuria, quæ stranguriæ succedit, si gravis, si diuturna sit, summè periculosa futura est, cum urinæ suppressione, suppressæ in diversâ loca exundatione, vesicæ plenioris inflammatione, inflammatæ gangræna &c. præfens immincat vitæ discrimen, nisi natura vel arte via cito restituantur urinæ.

Cæ.

Curatio.

Curatio. Cum geminus sit morbi status, gemina quoque proponenda curandi methodus; altera quæ præsentis ischuriæ, altera quæ stranguæ habituali conducatur.

I. Præsentis ischuriæ.

I. In priore casu, qui urgentior est, ea omnia in usum advocanda, quæ sanguinis motum & copiam minuendo, æstum temperando, partem relaxando, fibras nimium tensas emolliendo, suppurationem promovendo, inflammatoriæ urethræ coarctationi mederi & urinæ fluxum restituere valeant.

Idcirco 1. Vena incidenda est in brachio alterutro, & sanguis largiter educendus hora quarta qualibet, quamdiu morbi vehementia postulerit & ægrotantis vires patientur. Qua in re monitos velim Medicos, ut pro celeritate invasionis ipsi in aperienda vena celeres quoque sint, ac præcipiti morbo citam opem providi ferant; nisi enim principiis obstant sero medicina parabitur, & si dilata venæ sectio, primis morbis diebus oscitantius se gesserint, incassum dein inutili sanguinis missione culpam reparare conabuntur.

2. Diætæ tenuissima imperanda est ex solis jusculis & paucis & dilutis; ut ea quoque ratione plethora sanguinis magis exhausta, & ejusdem diathesi fluidiore facta, urethræ inflammatio tanto citius solvi possit.

3. Perinæum jugiter fovendum vel linteis lacte tepido aut decocto althææ & brançæ-ursinæ madidis, vel vesica suilla iisdem liquoribus calentibus plena. Quin imo infusus ex iisdem parandus est, in quem tepidum clunes, perinæum, genitalia immergantur.

4. Clysteres demulcentes, emollientes, refrigerantes frequenter injiciendi, quo prostatarum, vesicularum seminalium, urethræ inflammationem temperent; sed ne intestinorum venis lacteis absorbeantur, ac lotii copiam augeant, cassia identidem admiscenda est, quæ non modo partes efficaciter laxat, sed quæ facultate eccoprotica alvum ad egestionem blande simul sollicitat.

5. Ambigitur anne liceat largam ptisanæ refrigerantis & demulcentis potationem ægrotanti suadere vel permittere. Scilicet negant alii, quia largiore potu lotium uberius suggeritur vesicæ, unde omnia ischuriæ symptomata debent ingravescere: Alii contra affirmant, quia calens, acre, salsum, muriaticum lotium, nisi potu diluatur, demulceatur, temperetur, vesicæ & urethræ phlogosim acrimonia adaucturum sit. Ipse vero si liceat tantas lites componere, crediderim utriusque opinioni aliquid condonandum esse, ac proinde media procedendum esse via, ita quidem ut ptisanæ potus absolute non denegetur, sed nec etiam largissimus concedatur.

6. Similis est de usu balnei quæstio, quem hi conducibilem, ut qui possit partis fervorem compescere & tensionem relaxare; illi contra noxium

xium

xium esse credunt, ut qui sanguinem inspissando & ad interanea repellendo uberiore promoveat urinæ secretionem. Ego vero missa vitiligatione a balneo abstinendum esse censerem, vel eo solo argumento, quod ab infessu, cujus usum suasimus, emolumenta eadem expectanda sint, quæ a balneo, sine ullo nocumenti periculo.

7. Quod si mucosæ, semi-putres, purulentæ aliquot guttulæ ex urethra deciduæ internas partes, quæ inflammatæ sunt ad suppuratum vergere significant, omni opera annitendum est ut suppuratio efficaciter promoveatur, quippe quæ meatum urinarium certissime relaxatura sit. In hunc finem admovenda perinæo cataplasmata emollientia & maturantia, ex pulpis radicum tiliorum alborum, foliorum althææ, malvæ, brancæ urinæ, acerosæ &c. cum oleo liliorum & panis fermento; aut ex contusis limacibus testa exemptis; aut ex medulla cassiæ recenter extracta confecta, quæ identidem renovari debent, ne siccitate indurescant, & partem lædant scabritie.

8. Si ea methodo mitescente inflammationis vehementia, urethra incipiat relaxari, & urina jam guttatim profluat, bonum est. Tunc enim haud inanis spes affulget fore ut eodem remediorum usu restrictoria urethræ aut adjacentium partium inflammatio suppuratio, vel quod præstabilius esset, resolutione penitus tandem evanescat.

9. Verum si morbus diutius protrahatur, si vesica lotio distenta ultra modum tumeat, si urina in sanguinem refluxa ventriculum inundet, & vomitionem concitet, omiſsa omni cunctatione ope catheteris via urinæ celeriter aperienda est. Noluerim quidem hanc operationem primo statim morbi insultu temere & præcipitanter tentari, vel saltem ea tentari pertinacia, ut vulgo tentari solet, quoniam constat inutili & imprudenti fodicatione inflammationem non raro graviter intendi, ad suppurationem deduci, quæ forsân sibi permessa resolutione feliciter dissiparetur. Sed noluerim quoque operationem eandem diutius differri, ne vesica ex distensione diuturniore atoniam contrahat, cui mederi facile non est; imo vero, quod lethale est, ne vesica gangræna afficiatur immedicabili.

10. Catheter solerti & cauta manu immittendus est, non cæco impetu, qui vim inferat, sed prudenti cunctatione quæ viam sensim exploret. Utile est meatum urinarium prius lubricasse injectione olei recentis amygdalarum dulcium, vel mucilaginis semine lini & psyllii. Demum ab instituta operatione deterrere non debent aliquot guttulæ sanguinis, quæ profundi solent, nisi simul dolor gravior inferatur: Vix enim potest unquam catheter in angustatum canalem insinuari sine levi cruentatione. Si ea methodo catheter ad vesicam usque tandem perducatur, & urina effluat, omnia derepente remittent; sed cavendum ut catheter in vesica tandiu detineatur, dum remediorum usu urethræ inflammatio re-

soluzione vel suppuratione evanuerit; dum atonia vesicæ, si qua adsit, emendata fuerit, uno verbo dum ad mejendum vesica efficax & urethra libera fuerit.

11. At si catheter in vesicam introduci nulla prorsus ratione possit, urgeat vero grave gangrænæ periculum, tunc ad alia properandum. Itaque sulcato cathetere, qualis ad lithotomiam adhibetur, in meatum urinarium, quam altissime fieri poterit, immisso, alterutrum perinæi latus sectione linæ raphes parallela ad extremum catheterem lithotomo incidendum, ut in calculi extractione solenne est. Dein per inflictum vulnus insinuandus in urethram catheter, non jam flexuosus ut in viris opus est, sed rectus, quali foeminae solent explorari. Docuit enim frequens experientia ea ratione catheteris introductionem feliciter succedere, tum quod breviorē catheterem quaquaversum detorquere & angusta viarum certius inde explorare liceat, tum quod catheter non obliqua, ut antea, sed recta impulsione in urethram adigatur, adeoque viam tanto facilius sibi aperiat. Cæterum si ea provotis successerint, catheter in vesica detinendus, donec resoluta sit urethræ inflammatio, & restitutus vesicæ tonus; extracta demum cathetere vulnus, quod superest in perinæo, vulgari methodo sanandum est.

12. Verum si catheter nullo pacto possit introduci, unica superest ratio ægrotantis saluti consulendi, si nempe fistula argentea cava, cuspidē ferrea quadrangulāri & prominente intus armata, quod instrumentum vulgo *Troiscar* dicitur, per vulnus perinæi recta in vesicam demittatur secundum notam urethræ directionem, aceducta dein cuspidē, quæ fistulam opplet, per medicam fistulam via urinæ aperiatur. Non diffitemur intrusam in hac operatione fistulam a naturali urethræ ductu aberrare, & discissis ac vulneratis ejusdem tunicis in vesicam introduci. Sed quid tum? Si in præsentī mortis periculo satius sit anceps remedium experiri quam nullum, licitum est a fortiori, cum cætera deficiunt, auxilia dura quidem sed tamen plerumque tuta adhibere; neque enim vulnera urethræ inflicta ejus naturæ sunt, quæ curationem non possint admittēre. Cæterum ut in præcedentibus casibus, sic etiam in isto catheter in vesica tandiu detinendus, dum via urethræ libera, & tonus vesicæ perfecte restitutus fuerit; ac demum educto cathetere vulnera urethræ detergi, carne oppleri, cicatrice obduci debent, juxta artis regulas.

13. Tandem quomodocunque ischuria cesserit, ubi primum liber erit urinæ fluxus, ac febris & inflammatio cessaverint vel notabiliter remiserint, æger identidem purgandus diluto cassiæ ad ʒjß. in sero lactis, quod sine ullo erethismo blande eluat fæcuginosam & muraticam acrimoniam, quam tum sanguis, tum ventriculus ab urina retenta contraxere.

II. Habitualis stranguriz.

Prima Therapeja usu cathartecorum.

Secunda sectione urethre in perineo injecta.

II. Hactenus de curatione urgentis ischuriæ. Superest nunc ut de remediis habitualis stranguriæ differamus, quæ cum prima sit morbi causa, recidivam ischuriam facili negotio denuo posset inferre, si negligeretur. Medentur autem in genere huic stranguriæ omnia quæcumque varios in urethra obices, quibus inducitur, possunt efficaciter & tuto extirpare, abluere, suppurare, delere, comprimere, complanare, aut retundere, in quorum ulum quatuor methodos usurpatas fuisse invenio.

I. Antiquiores, cum in meatu urinario alios obices non agnoscerent, præter carunculas, callos & verrucas, in id unice studebant, ut ea excrescentiarum genera urinæ fluxum retardantia absumerent cathartecis, quæ ope candelarum cerearum introducebantur, & ulcuscula quæ in basi supperant consolidarent epuloticis eadem methodo. Multa quidem prostant apud Auctores Medicos Chirurgosve machinamentorum genera in hunc finem comparata, & multæ unguentorum aut collyriorum cathartecorum vel exsiccantium formulæ eidem scopo destinatæ, circa quæ possunt inter ceteros consuli Amatus Lusitanus, *Centuria 4. Curatione 19. Daniel Sennertus, Lib. 3. part. 8. sessione 1. capite 9. Ambrosius Paræus, Lib. 19. cap. 17. &c.* Sed hæc sigillatim referre piget nec immerito, cum jam ea methodus penitus exoleverit multiplici de causa.

1. Quia convenit solis tantum carunculis & verrucis meatum urinarium obidentibus, minime vero ceteris obicibus eundem canalem angustantibus, a quibus tamen stranguriam gonorrhœæ pedisequam, si non semper, ac saltem frequentissime produci jam apud omnes in confesso est.

2. Quia numquam tuta est; nam catharteca, quæ carunculas absumunt, debent una simul sanam urethræ partem inflammare, erodere, exulcerare. Novimus quidem huic incommodo antiquiores obviam ire conatos fuisse multiplici instrumentorum & remedium apparatu, sed novimus quoque cautiones omnes plerumque frustraneas fuisse, cum apud ipsos non rara exempla reperire sit, eorum qui hac methodo virgæ inflammatione, abscessibus peringî, imo gangræna correpti sunt.

3. Demum, quia plerumque ita nocet, ut stranguria inde gravior fiat, sive quod ulcuscula, quæ in meatu urinario cathartecis excitantur, male deterfa in novas hyperfarcofes sive carunculas succrescant, sive potius quod coeant in duriores & strictiores cicatrices, quæ fistulam urinariam admodum angustant.

II. Huic methodo, quæ jam dudum infamata est, & ab Agyrtis ignaris nunc tantum usurpatur, successit alia, quæ & ipsa brevi abrogata est, quamvis primo intuitu multo utilior esse videretur. Explorato videlicet obicum situ, qui meatui urinario inerant, & notato peringî loco superjecto, sulcatus catheter quam altissime in urethram immittebatur, ad cu-

jus extremum laus alterutrum perinæ secundum raphes rectitudinem incidebatur lithotomo, ut fieri solet ad extractionem calculi; ac inde cathetere viam indicante incisio versus anum producebatur. Hoc ergo modo obices omnes, qui locum obsidebant, oculis ipsi jam obui facile poterant pro diversa natura diversis & specificis remediis curari; cathæreticis quidem, si carunculae, calli, excrescentiae aderant; detergentibus vero & mundificantibus, si ulcuscula sordida urethram depalcebantur. Tandem cum omnia perfecte suppurata, deterfa, cicatrice obducta erant, nec quidquam omnino supererat morbosum, perinæ incisio arte eadem sanabatur ac in lithotomia.

Impro-
batur.

Ea sane ingeniose videbantur excogitata & miris encomiis laudari olim memini, sed experientia rerum magistra jam pridem docuit ea omnia frustranea esse: Constat enim ægros plurimos talem operationem passos, & a Chirurgis diu excarnificatos, absoluta tandem cicatrice, non melius inde valuisse, imo vero graviore stranguria laborasse quam antea; ideo scilicet quod urethrae pars, quæ cathæreticis, detergentibus, mundificantibus male habita fuerat, inducta cicatrice, ita constringeretur, ut viam multo angustiolem urinæ permitteret.

Tertia
introdu-
ctione
turunda-
rum lin-
tearum
in ure-
thram.

III. Omisso igitur tum corrosivorum, tum operationis cujuscumque usu, visum est ea tantum adhibere auxilia, quæ facili mechanismo & sola mole angustatam urethram dilatarent, ac dilatando obices in eadem depactos retunderent. In hunc finem paratur fistula argentea, recta, cava, utrimque pervia, quæ in urethram usque ad obicum principium possit commode introduci. Fiunt simul ex tela lineæ, & tenui, quæ cera calente, vel unguento de Vigo quadruplicato Mercurio inuncta sit, & inter duos asseres lævigatos & calidos strictissime convoluta, turundæ cylindricæ, duræ & firmæ, crassitie & longitudine variz, quarum singulis filum crassum & longum assuitur.

Eligitur initio turunda elixissima & brevissima quæ cavo fistulæ in meatum urinarium jam immissæ insinuata, stylo antroorsum propellitur, donec fistulæ extremum prætergressa in angustarum urethrae partem sensim adigatur. Dein retracta fistula, turunda in meatu urinario quam diutissime retinetur, dum collecta urina ad mingendum sollicitaverit, quo tempore facile potest educi per filum assutum, quod extrorsum propendat. Hæc turunda, dum in urethra horis aliquot hæret, humore qui undequaque depluit multum intumescit, & intumescens urethrae canalem pari passu dilatat, unde via longiori & crassiori turundæ sensim paratur, quæ & ipsa, ubi semel introducta fuerit, ratione eadem tertiz longiori & crassiori locum faciet, atque sic deinceps simili artificio, donec ampliata sensim urethra libere pervia sit, & urinam pleno alveo emitat.

Compertum quidem est iterata experientia propositam methodum uti-
lissi.

lissimam esse, ac facili tutaque ratione strangurias etiam contumacissimas pedetentim quidem sed efficaciter tandem mitigare. Videtur tamen, ut libere dicam, gemino peccare vitio.

Sua patitur incommoda.

1. Quod turanda in meatum urinarium introducta, cum urethram longitudine non æquet, eam quoque æqualiter non explicet, sed eum tantum locum dilatet, quem ipsa replet, contractis eodem tempore hinc & inde extremis partibus ad quas terminatur, & eo fortius quidem contractis, quo validius pars intermedia dilatatur, ut in ductibus quibuslibet extensilibus solenne est, si in una tantum parte distrahantur.

2. Quod operosior sit apparatus, ut turanda in meatum urinarium introducatur, adeoque non possit commode ægrotans huic operationi ipse solus vacare, sed Chirurgi opera semper egeat, quod in diuturna & habituali therapeja qualis est ista permolestum est. Inde factum ut ea methodus faciliiori, expeditiori, efficaciori locum tandem cesserit, ad quam explicandam superest ut aggrediamur.

IV. Parentur ex plumbo ductili decem aut duodecim virgulæ cylindricæ per inæqualia foramina laminæ multiformis, gallice *une filiere*, vi tractæ. Singulæ quidem novem aut decem pollices longæ sint, sed crassitie ita inæquales, ut cum crassissima calamo scriptorio sit paulo major, cæteræ gradatim decrevant. Si æger ad operationem paratus sit, vacuata prius vesica, eligatur virgula omnium tenuissima, quæ oleo recenti amygdalarum dulcium, vel butyro illita in urethram immittatur, & recto tramite ad obicem usque perducatur, intra quos, quam altissime sine dolore gravilicuerit, adigenda est. Si eo pacto in vesicam primo die devenerit, optimum; sed minime malum est, quamvis citra cogatur subsistere intra medios obices, ut plerumque accidit. Oportet tantum diebus sequentibus opus ita urgere, virgulam plumbeam ulterius pedetentim promovendo, ut ad vesicam tandem perveniat. Quolibet autem die virgula tres vel quatuor horas in situ detinenda, donec collecta urina ad meiendum sollicitaverit; & eadem operatio quotidie iteranda est, usque adeo donec virgula & libera introduci possit & libere eximi sine dolore.

Quarta, opera virgularum plumbearum quæ in urethram adiguntur.

Tunc virgula alia paulo crassior eligenda est, quæ sub eadem cautione per dilatatam urethram in vesicam sensim immittatur, atque sic pari prorsus ordine successive adhibendæ virgulæ singulæ, gradatim ad majores ascendendo, donec ad omnium crassissimam deventum sit quæ si ipsa facile introducatur, meatum urinarium dilatatum & ampliatum; obices repressos, complanatos & retusos; viamque urinæ perviam esse arguet.

Cæterum quamquam contigerit ut urina reddatur pleno alveo, curationi nequaquam confidendum est, cum experientia certum sit compressos obices brevi regerminare, complanatos resurgere & dilatatam urethræ fistulam restringi, si semel ab immissione frequenti virgularum cess-

satum fuerit. Quocirca diutissime operi insistendum est; primum quidem quotidie per unam alteramve horam; dein bis aut ter in hebdomade, ac demum ter vel quater in mense. Neque enim ausim perfectam, & ut aiunt, *curativam* istius stranguriæ medicinam unquam polliceri, sed *me-re palliativam*.

Quæ vi-
detur esse
omnium
maxime
commo-
da &
compen-
diosa.

At saltem in allata methodo id commodi inest, quod egrotans possit ipse sibi medicari sequenti ratione; jacens in lecto supinus, complicatis & divaricatis cruribus, virgulam quam elegerit, oleo aut butyro inunctam dextra manu immittat in penem, quem sinistra continet. Facile quidem est hanc recto tramite ad radicem mentulæ deducere, sed tunc perinæum leviter identidem comprimendum, ut apex flexibilis virgæ complicatus viarum anfractu sese accomodet, lento passu eodem modo pergendo, donec ad vesicam sensim perventum sit. Hac metho-
do virgula licet recta intrusa fuerit, urethræ tamen flexuras omnes facile peragrabat, ac dum extrahetur, tortuosa complicatione omnes meatus urinarii flexus in viris apertissime exhibebit.

Modo at-
tendatur
ad cau-
tiones se-
quentes.

Porro tandem ne quid sinistri accadat imprudentia, incuria, præci-
pitantia, priusquam proposita medicatio adhibeatur, ad sequentes cau-
tiones diligenter attendendum est.

1. Ut, si indicii certum, imo vero urgentibus tantum conjecturis probabile sit ægrotantem seminio venereo infectum esse, specifica ad hunc morbum remedia præmittantur, de quibus infra.

2. Ut, si commode liceat, eligatur ad stranguriæ curationem tem-
pestas idonea, verna scilicet vel autumnalis, in qua partium contextus mollior est, neque sanguis ad febrem concipiendam ita comparatus.

3. Ut præmissis universalioribus, venæ sectione videlicet & purga-
tione, sanguinis acrimonia iusculis aut apozematis refrigerantibus, se-
ro lactis, aquis acidulis mineralibus, balneo &c. ante emendetur.

4. Ut toto curationis tempore ægrotans a vino, venere, exercita-
tione absteineat; diætâ sobria humectante, refrigerante utatur; pro-
pitiana poter infusum feminis lini & florum malvæ; demum perinæum relaxet fotu vel infessu emolliente.

5. Ut virgulæ plumbeæ curiosis oculis perspiciantur, & reproben-
tur ex omnes, in quibus fissuræ vel levissimæ conspicuæ sunt, ne si
in urethra forsan dissilirent, perinæi incisione opus esset, ut possent
fragmenta educi.

6. Ut virgulæ plumbeæ non urgendo, non properando, sed gradatim
& suspensa manu introducantur, cum experientia notum sit, si ex præci-
pitantia obicibus inferatur violentia, & meatus urinarius durius tractetur,
ægrum repentino horrore corrigi, cui intensa febris ephemera succedit.

7. Ut vena illico tundatur in orgasmo febrili, si eo modo peccatum
fue-

fuerit; cum hæc unica ratio sit vitandæ inflammationis in meatu urinario & adjectis partibus.

8. Ut si gravis urgeat dysuria aut dolor acrior, anodynæ injectio- nes identidem fiant in urethram, ad quem finem laudatur decoctum radices althææ vel nymphææ, cui infusum sit semen lini; lac vacci- num tepidum decocto hordei dilutum; emulsiones ex quatuor femi- nibus frigidis majoribus, semine papaveris albi aut hyoscyami para- tæ; aut demum injectiones sequentes, quæ sunt efficacissimæ.

℞. *Semin. Lactucæ,*
Papaveris albi,
Lini,
Hyoscyami albi ana ʒij.

Extrahatur mucilago in aquar. Solani,
Plantaginis,
Et Rosarum ana ʒij.

Add. Trochiscor. albi Rbafis ʒj. M. F. Injectio.

Vel

℞. *Succorum depurator. Portulacæ,*
Solani
Et sempervivi ana ʒij.

Albumina ovorum no. iij.

Agitentur diu in mortario Plumbeo cum pistillo plumbeo. Ex qua mixtura
F. Injectio.

9. Ut exulcerationes, si quæ excitentur in urethra aut jam ante adfuerint, unde pus, vel sanies manet, ex arte detergantur, & deter- sæ cicatrice obducantur. Detergantur autem injecto decocto sim- plici hordei, in quo dissolvitur mel Narbonense, vel si impar videat- ur, decocto sequente.

℞. *Horð. non excorticat. p. iij.*
Radic. Aristolocbiæ rotundæ ʒj.
Foliorum plantagin. m. j.
Coq. in s. q. aquæ.

Colatur. Add. Mellis rosacæ ʒij. M. F. Injectio.

Cicatrice vero obducuntur efficacissime, si ad uncias duas hujus de- cocti addatur drachma una sequentis amalgamatis, & una simul tepi- de injiciantur.

℞. *Plumbi ʒij.*
Liquefacto plumbo adde Mercurii ʒij.

F. Amalgama, quod in tenuissimum pulverem conteratur & servetur
ad usum.

10. Denique ut curentur morbi reliquæ, si quæ pertinacius super-
 sint,

sint, usu lactis asinini aut vaccini, vel potatione aquarum mineralium tempore opportuno; & si quid mucosum vel saniosum effluat, usu injectionum exsiccantium & astringentium, quales supra proposuimus ad feminis stillicidium, vel saltem sequente.

℞. *Aquæ secundæ calcis lib. j.*

Lithargyri argent.

Et cerussæ tenuissime pulverat. ana ʒj.

Campboræ pulverat. ʒj.

Misceantur omnia, ex quibus injiciantur tepide drachma quatuor vel sex.

C A P U T V.

De Bubonibus venericis, vulgo Poulains.

§. I. DEFINITIO, DESCRIPTIO ET DIFFERENTIÆ.

Descri-
prio Bu-
bonum.

BUbones venerici sunt tumores glandularum conglobatarum sive lymphaticarum quæ in inguinibus latent, dolentes, duri, renitentes, ad suppurationem lente tendentes, & ex impuro concubitu oborti mediate vel immediate.

Itaque viro sive mulieri, quibus ex impuro concubitu ea morbi venerici species immediate accidit, in alterutro vel utroque inguine aliquot diebus post suspectam coitionem glandulæ modo plures, pauciores modo leviter dolent inter ambulandum, ac si digitis palpentur, tumidæ observantur. Crescit subinde progressu tardiore vel celeriore tumor ille, durus fit, tensus, renitens; inde pars acutius dolet, & præter naturam calet, cute tamen nativum calorem retinente; incessus laboriosior redditur: Tandem bubo manifeste apparet, magis vel minus fastigiatus aut profundus; figura varius, orbicularis, oblongus, teres; magnitudine nunc ovi columbini aut gallinæ, nunc pugni molem æquans.

Differen-
tiæ Bu-
bonum.

Differentia bubonum ex triplici capite repetuntur, 1. A modo, quo invadunt: Alii enim impuræ copulationi soli & immediate superveniunt, & *morbum essentialem*; alii vero gonorrhœæ virulentæ suppressæ parciusve fluentis, aut ulcusculorum penis canerosorum comites sunt, & *morbum symptomaticum*; alii demum citra ullum coitum proxime prægressum sponse contingunt, & *signum latentis luis venereæ pathognomonicum* constituunt.

2. A qualitate, quam præ se ferunt: Alii enim multum dolent, calent, pulsant & renituntur, & *phlegmonodæ*: Alii vero modice calent, dolent, pulsant, renituntur, imo potius molles prementis digiti vestigia & admittunt & servant, & *adematodæ*: Alii denique doloris, caloris, pulsationis expertes duri sunt & valide renituntur, & *skirrnodæ* nuncupantur.

3. Ab

3. Ab exitu, quem varium habent: Alii enim vel sponte vel remedium, quæ adhibentur, energia sensim resolvuntur & evanescent: Alii vero in suppuratum vertuntur, ac pure per aperturam cauterio vel incisione paratam semel evacuato cicatricem recipiunt: Alii tandem maturantium & emollientium vim eludunt, ac duri & retinentes perdurant.

§. II. CAUSÆ.

Inguinales glandulæ tumere non possunt post impurum concubitum & in bubonem indurari, nisi limpha, quæ a vicinioribus partibus illuc convectitur seu in diversorium commune, & quæ per medias illarum cellulas sive vesiculas debet transfluere, ut alio deducatur, ibidem hæreat, stagnet & cumuletur. Sed limpha in glandulis inguinalibus hæere non potest & cumulari, nisi solito crassior, spissior, viscidiorque sit. Sequitur ergo ex impuro concubitu limpham, quæ per glandulas inguinum circulat, crassiorem & viscidiorē effici, atque ideo ibidem cumulatam hæere & bubones venereos inde producere.

At vero nihil novi corpori accidit ex concubitu impuro præter simplicem contagii venerei admissionem. Debet ergo virus illud intra corpus susceptum, ac cum inguinalium glandularum limpha commixtum, spissiorē illam ac crassiorem efficere, cui quidem effectui producendo ex se accommodatissimum est, cum salso-acidam naturam obtineat, cujus ad coagulandos sulfureos humores, qualis est limpha, efficacia nota est.

Potest autem virus intromissum cum limpha glandularum inguinalium commisceri duplici via, longiore altera & intricatiore, nimirum circulatione sanguinis; breviorē altera & magis expedita, ope videlicet vasorum lymphaticorum, quæ in glandulas inguinales tendunt. Priorem quidem, ut quæstioni præsentī resolvendæ parum idoneam rejicimus, quoniam ea semel admissa omnes universi corporis glandulæ conglobatæ sive lymphaticæ pari modo deberent affici ac inguinales, cum limpham ab eodem sanguine perinde haurirent, quod tamen experientia repugnat. Posteriores itaque solam in re præsentī admittendam esse censemus.

Verum, cum triplex sit, ut supra diximus, bubonum species ratione invasionis, una bubonum, qui coitu impuro cito & immediate succedunt; altera bubonum, qui suppressæ vel parcius fluenti gonorrhœæ, aut cancrofis penis ulcusculis superveniunt; tertia demum bubonum, qui a latente lue venerea accidunt sine causa illa manifesta, debet diversitas, quæ inde penes communicationis modum intercedit, paulo fusius explicari.

1. In coitu, externa mulierum pudenda, vulva nimirum, vulvæ labia, & vagina semine a viro injecto irrorantur. Igitur si semen corruptum sit, debet contagium in substantiam partium imbibi & cum limpha

Causæ
bubonum

Deducen-
dæ a con-
tagio lim-
pham in-
spissante.

Quod
conta-
gium in
glandulas
lim-

inguina-
les tradu-
citur.

1. Ex con-
cubitu
impuro.

limpha illac circulante commiseri. Sed illa peculiaribus limphz du-
ctibus ad glandulas inguinales tendit. Debet ergo admissum conta-
gium venereum ad eandem glandulas una simul transferri.

Pari modo viri coeuntis genitalia, glans, mentula, & pubes ipsa
malesunt viscido illo & seminali humore, quem mulieres inter coe-
undum ubertim eructant; quamobrem si humor ille corruptus fuerit,
contagium per genitalium poros insinuatum limpham illac fluentem
pervadet. Hæc autem limpha jugi fluxu ad inguinales glandulas in-
de contendit. Igitur eodem quoque contendet contagium syphiliti-
cum cum limpha permistum.

2. In go-
norrhœa
suppressa.

2. In gonorrhœa suppressa parciusve fluente, prostatz, vesiculæ semi-
nariz, glandulæ Covvperianæ & testes in viris; in fœminis vero prosta-
tiz, glandulæ Covvperianæ, & glandulæ botryformes vaginæ putrido
atque corrupto semine turgent. Debent ergo feminis virulenti partes
aliquæ inde exhalantes limphæ ab iisdem conceptaculis vel a superstratis
partibus, scroto videlicet & perineo in viris, perineo vero totaque vul-
va in fœminis resfluenti inspirari, atque una ad inguinales glandulas
deferri, quo ipsamet conveyitur, bubones ibi cito producturæ, nisi re-
tento semini putrido porta denuo citissime detur.

3. In ulcu-
sculis can-
crosis pu-
dendo-
rum.

Nec dispari ratione in cancrois penis aut vulvæ ulcusculis, limpha
quæ inde regreditur, una secum debet revehere in glandulas inguina-
les, quo ipsa traducitur, non paucas virulenti puris guttulas ab ulce-
ratis partibus haustas, quæ limpham inspissando & glandulas, quibus
continetur, infarciendo, bubonibus locum frequenter dabunt.

4. In lue
venerea
invetera-
ta.

4. Tandem in lue venerea latente, cum semen testium, prostatarum,
vesicularum seminariarum & glandularum Covvperianarum in viris, in
fœminis vero prostatarum, glandularum botryformium & Covvperiana-
rum glandularum seminio venereo infectum sit, debet contagiosis mias-
matis hinc exhalantibus limpha tum conceptaculorum ipsum, tum par-
tium conceptaculis superjectarum ita vitiari, ut in glandulas inguinum
conglobatas delata, limpham ibi congestam pari vitio coinquinando,
bubones productura sit, si afflatum contagium satis efficax fuerit.

Unde bu-
bo nunc
in utro-
que in-
guine.

Cæterum a quacumque causa, vel impuro concubitu, vel gonor-
rhœa suppressa parciusve fluente, vel ulcusculis cancrois, vel demum
lue venerea latente bubo procedat, si contigerit ut limpha in utroque
inguine seminio syphilitico equaliter inficiatur, ac omnia utrimque ad
amissum equalia sint, manifestum est fore ut in utroque latere bubo
perinde subnascatur; si vero ex alterutra parte disparitas quædam in-
terfuerit, in alterutro tantum, dextro sinistrove.

Desumitur autem ea disparitas ex triplici capite:

Nunc in
alterutro

1. Ex vitio partis unde virus transmittitur. Sic constat glandulas dex-
tri

tri finisrive lateris contagio magis inquinari, prout prostatz, vesiculæ seminariz, glandulæ Convverianæ, testis in viro, vel in sæmina prostatz, glandulæ Convverianæ, botryformes glandulæ vaginæ alterutrius lateris virulento semine magis turgent, quia limpha, quæ inde redux est & in glandulas ejusdem lateris convehitur, magis virulenta futura est.

tantum
produci-
tur.

2. Ex vitio partis quacum virus communicatur. Sic constat inguinales glandulas alterutrius lateris magis affici, prout ex nativa conformatione magis adstrictæ, magis anfractuosæ, magis cellulosæ, uno verbo minus perviæ sunt, atque adeo inspissata limpha facilius infarciuntur.

3. Ex casu externo, ut ajunt, mere fortuito. Sic constat omnibus cæteroquin paribus, & glandulis utrimque æqualiter seminio contaminatis bubonem in alterutro latere interdum excitari pressu vel contusione inguinis alterutrius, unde limphæ infectæ congestio promoveatur in alterutra parte; imo etiam solo decubitu in alterutrum latus, unde limphæ ejusdem regressus difficilior tardiorque fiat ex parte minus declivi.

§. III. SYMPTOMATA.

1. Limpha in glandulas inguinales convecta & seminii venerici contagio inspissata debet in illis hære & retineri propter multiplices & anfractuosas cellularum invicem communicantium vias, quæ exiturienti obstant. Inde ergo levis initio morbi *glandularum inguinalium tumor*.

Sympto-
mata, quæ
buboni
superve-
niunt.

2. Glandulæ inguinis tumere non possunt, quin distrahantur; nec distrahi quin doleant magis minusve pro tumefactionis modo & impetu. Hinc ergo in bubone præsertim crescente *inguinalium glandularum dolor*.

1. Tumor
exiguus
in ingui-
ne.

3. Incessus fieri non potest, nisi musculi crus tibiamve antrorsum flectentes cum extendentibus alternatim contrahantur. Sed illi musculi alternatim non possunt contrahi quin suprapositas inguinis glandulas jam tumefactas premant, ac premendo dolorem excitent. *in-
cessus ergo exerceri non potest* in bubone venereo, nisi cum dolore, atque adeo cum labore.

2. Dolor
in ingui-
ne.

3. Inces-
sus labo-
riofus.

4. Glandulæ inguinis semel infarctæ novo limphæ appellentis aggestu magis magisque in dies debent sensim inflari, donec tandem vis, qua glandulæ ulteriori dilatationi resistunt, æqualis sit momento quo appellens limpha eandem molitur. Sic ergo debet *bubo* incipiens in dies crescere, iudurari, extrorsum prominere in fastigium, ac oblique protendi secundum glandularum inguinalium situm, magistamen minusve pro diversa glandularum magnitudine & extensibilitate, aut vario limphæ appellentis impetu.

4. Crescit
in dies
tumor in
inguine.

5. Crescente bubone sanguifera vasa, quæ per mediam glandulæ in-
duratæ substantiam repunt, derepente comprimi necessum est. Sed iis in bubo-
derepente compressis sanguis interfluens tandiu hære debet & reti-
neri, atque adeo calorem fervidiorem tandiu parti conciliare, dum

5. Calor
in bubo-
ne.

novas

novas circulationis vias sibi sensim paraverit. Inde ergo saltem in principio bubonis intensior futurus est *tumefacta partis calor*.

6. Bubo phlegmonodæus. 6. Quin imo si celer glandularum tumefactio & per fluxionem facta sanguinis cursum subito cohibeat, si validus sit arteriarum pulsus ex naturali corporis fabrica aut febre adventitia, demum si sanguis natura calens & æstuans impense rareseat, extremæ guttulæ sanguinis validius pulsus in lateralia vasa limphatica vi irruerunt, unde instituta nova sanguinis devii circulatione *bubo fiet calore, dolore, pulsu, retinentia insignis, uno verbo phlegmonodæus*.

7. Sine notabili rubore in cute. 7. Quoniam tamen in superjecta cute, quæ morbi expers est, vasa sanguinis nullomodo vel parum admodum angustantur, sanguis per ea circuitum solita fere facilitate perficiet, unde *cutis* non inflammabitur, imo vero nec *colorem* ferme mutabit, sed *nativum* aut a nativo parum disparum *retinebit*.

8. Bubo œdematodæus. 8. Si vero tumor lente crescat, si debilis sit & tardus arteriarum pulsus si cruor natura aquosus sit & dissolutus, hinc rivus sanguinis in vasa glandulæ infarctæ debilius & tardius propelletur, & in iisdem lentius, adeoque minus coercebitur: Non stagnabit ergo vel parum stagnabit in vasis circumfusus, ac proinde modicum calorem & dolorem, ac debiliorem arteriarum pulsus inferet; sed vias per quas fluit, sensim ita dilatabit, ut angustia extrinsecus inducta compensetur; vel alias sibi pedetentim vias aperiet in lateralia vasa, in quas derivetur; dimissis tantum in tumoris substantiam vel saltem in tumoris confinia serosis & limphaticis partibus tenuioribus, quibus abundat. Inde ergo *bubo* in glandulis inguinalibus obortus modice calebit, dolebit, pulsabit & renitetur, sed *mollior*, saltem superficie tenus *prementis digiti vestigium facile* admittet & tarde dimittet, uno verbo *œdematodæus* futurus est.

9. Bubo skirrhotæus. 9. Demum si sanguis crassior & siccior crassiore & siccior limpham suggerat, si ea limpha lentissimo gradu in glandulas inguinales pedetentim congeratur, bubo qui inde subnascetur, *skirrhotæus* erit durus scilicet & renitens, quia fiet ab impacta spissiore limpha & diuturnitate temporis magis indurata; calor vero, doloris & pulsus expers, quia nulla circum adest sanguinis hærentia; nam cum lente fiat in glandulas congestio, qua proportionem viciniora vasa comprimuntur, proportionem eadem alia remotiora, quibuscum communicant, sensim dilatabuntur, unde via compensabitur.

10. Bubo phlegmonodæus, facile resolvable. 10. Bubo *phlegmonodæus* facile & perfecte resolvitur: Sanguis enim, cujus stagnatione ex parte inducitur, mobilitate nativa & circulationis restitutæ impetu facile diffilabilis est: Limpha vero quæ glandulis intus impacta retinetur, calore intensiore & validiore arteriarum oscillatione, quæ buboni huic propria sunt, & fluiditatem pertinacius suam

suam tuetur, & ad motum circulatorium fortius urgetur; ac proinde utroque nomine ad resolutionem magis comparata est.

11. Quod si non resolvitur, *saltem* iisdem de causis *haud ægre sup-
puratur*: Nam sanguis, cuius hærentia ex parte fovetur, inrita par-
tium suarum vi fermentativum putrefactionis motum concipere aptus
natus est; limpha vero, quæ glandulas opplet, calore fervidiore, quo
agitatur, & fortiore arteriarum pulsu, quo conquassatur, ad suppu-
rationem efficaciter disponitur.

11. Si non
resolvi-
tur, fa-
cile sup-
puratur.

12. Bubo œdematodæus *facile* quidem *resolvitur*, quatenus serum te-
nuius, quod vasa tumori circumfusa inundat, facile potest per limpha-
ticos ductus solitas circulationis vias relegere: *Sed resolvitur imperfecte*,
quia limpha crassior glandulæ cellulis impacta defectu caloris, quo li-
quescat, & sufficientis oscillationis arteriarum, qua atteratur & ultra
urgeatur, quæ ambo in ea bubonis specie desunt, resolutioni ægre cre-
dit; unde nucleus durior remanet non facile resolvable.

12. Faci-
le sed
imperfec-
te resol-
vitur bu-
bo œde-
mato-
dæus.

13. Iisdem de causis *difficiliter* quoque *suppuratur*, quia inspissata lim-
pha, tum natura sua ob salinarum & actuosarum partium penuriam, tum
defectu caloris intensioris, quo disfluat, & validioris arteriarum oscil-
lationis, qua subigatur, suppurationi concipiendæ parum idonea est.

13. At
difficul-
ter sup-
puratur.

14. Demum bubo skirrhodæus *nec resolvitur nec suppuratur unquam*,
nisi difficilime, sed plerumque in dies magis induratur, tum quia lim-
pha, quæ in glandularum cellulis hæret, crassior, spissior, viscosior est;
tum quia deest præternaturalis calor & arteriarum oscillantium quassa-
tio, quibus ad resolutionem vel ad suppurationem possit comparari.

14. Bubo
skirrho-
dæus
difficilli-
me resol-
vitur &
suppura-
tur.

§. IV. DIAGNOSIS ET PROGNOSIS.

Diagnosis. Bubones venerei cum simplicibus, pestilentialibus, scor-
buticis & strumosis bubonibus conveniunt ratione situs & figuræ; sed
ab iisdem distinguuntur signis peculiaribus: 1. A simplicibus quidem
& pestilentialibus, quia in his cutis rubet & inflammatur, secusquam
in venereis: 2. A strumosis vero & scorbuticis, quia ex noto prius
ægotantium statu manifesta strumarum vel scorbuti indicia colliguntur:
3. Certius tandem ab omnibus ægrorum relatione, qui fatentur se im-
puro aut suspecto concubitu usos esse; vel gonorrhœa aut cancerosis ul-
cusculis laborare; aut qui univoca proferunt argumenta, quibus virus
in sanguine latere evidens sit.

Diagno-
sis bubo-
nis vene-
rei
tum a
cæteris
buboni-
bus.

Minor est bubonum venereorum cum bubonocèle sive hernia inguina-
li convenientia; novimus tamen cum eadem aliquando confundi; non
cum ea quidem bubonocèle, quæ fit ab Omento, & quæ *Epiplocele* di-
citur, in qua tumor mollior est, sed cum illa, quæ ab intestino pro-
ducitur, & quæ appellatur *Enterocèle*, in qua major adest renitentia,
ratione cuius cum bubone proximius convenit: Neque etiam cum ea
ente-

enteroceles, in qua intestinum per obliquos musculorum epigastricorum annulus delabitur, quoniam locus quo intestinum decidit & ubi tumor excitatur, a glandularum inguinalium atque adeo bubonum venereorum loco nimis distat; sed cum illa enterocoele, in qua intestinum per arcuatam peritonæi fornicem, qua vasa cruralia transeunt, in inguen prolabitur, quæ ratione situs quem occupat a glandularum inguinalium & bubonum in ipsis subnascentium situ parum vel nihil abluat.

Tum ab enterocoele. Potest tamen facile bubo distingui ab enterocoele quacumque signis sequentibus.

1. In enterocoele tumor superficie lævis & figura proxime sphaericus, licet latam habeat superficiem tenuiore basi, quæ foramini, unde intestinum decidit, æqualis sit, quasi pediculo inguini adhærescit: Contra vero bubo superficie inæqualis & figura plerumque oblongus est, & latæ ac expansæ basi innititur.

2. In enterocoele, tumor si prematur facile cedit, sed retracto digito restituitur illico: Contra vero bubo vel prementi digito renititur, ut bubo phlegmonodes & skirrholes; vel si cedat, vestigium retinet, ut bubo œdematodes & suppuratus.

3. In enterocoele patet tactu flatus vel lolos, vel cum liquidior materia confusus tumore toto contineri, ex facili compressione & restitutione celeri: Contra vero in bubone nihil inest flatulenti, imo si quid liquidi latere percipiatur obscura fluctuatione, id omne & paucum est & profundum, & medium tantum tumorem occupat, ut in bubone suppurato.

4. Enterocoele gravia secum infert symptomata, febrem, dolorem colicum, suppressionem dejectionis, sæcum alvinarum per superiora vomitionem, iliacam passionem &c. quæ omnia in bubone semper absunt.

Adde rarum esse, ut impurus vel suspectus concubitus, quo bubo, cum lapsu ab alto, istu in ventrem, aut vehementiore motu, quibus enterocoele possit induci, tam apte simul coincident, ut attendenti dubitare liceat, utra sit tumoris in inguine oborti natura, & utri causæ adscribenda videatur.

Porro ubi semel constat bubonem venereum adesse, facile est differentias, quibus distinguitur, signis in descriptione propoliis dignoscere. Nam si tumor intense caleat, doleat, pulset, & renitatur, *phlegmonodem*; si moderatius caleat, doleat, pulset & retineatur, imo vero mollior prementis digiti vestigium retineat, *œdematodem*; si tandem caloris, doloris, pullus ferme expers durus sit & valide *skirrholem* bubonem esse manifestum est.

Denum causæ bubonum venereorum erui debent, vel ex ægri relatione vel ex antecedentium notitia, unde liqueat an seminum venereum impuro concubitu? An gonorrhœa suppressa, parciusve fluens.

fluente; aut cancris penis ulcusculis? An latente syphilide cum glandulis inguinalibus communicatum sit.

Prognosis. Bubo venereus, modo caute curetur, periculo vacat, sed tamen affectus gravis est, cum operosam therapejam semper exigat & sæpe etiam Chirurgicam sectionem.

Potest nihilominus bubo eo nomine periculosus censeretur quod luem veneream sæpissime inferat, nisi virus susceptum diuturna suppuratione, aut iteratis purgationibus educatur, ac reliquæ, si quæ supersint in sanguine, diligenter specificis remediis corrigantur.

Minus tamen luis periculum imminet a bubone, qui impuro concubitu aut suppressæ parciusve fluenti gonorrhœæ aut penis ulcusculis, quam a bubone qui sine causa præsentis supervenit: Nam prior a seminio recenter admissio, quod cum nondum sanguinem infecerit, potest educi vel corrigi; posterior vero a seminio dependet, quod in sanguine jam dudum latet, & quem ideo funditus contaminavit.

Bubo phlegmonodæus curatu facilior est bubone œdematodæo, ac præsertim skirrhodæo, cum enim prior resolvatur aut in suppuratum facile convertatur, potest alterutra via adhibitis cautionibus convenientibus perfecte cito sanari: Posteriores vero in tumorem vere skirrhosum plerumque abeunt, qui remedium omnium vim diu eludit, ac demum in carcinomatodem naturam non raro degenerat.

§. V. CURATIO.

Bubo venereus potest curandus offerri in triplici casu, 1. Si sine causa manifesta invaserit; Si cum gonorrhœa virulenta vel ulcusculis cancris penis conjunctus sit; 3. Demum si impuro concubitu solus & immediate succedat.

In primo casu, cum bubo luem veneream latere significet, expedit abjecta cunctatione ad hydrargyrosim statim properare, qua tum bubo, tum lues, quæ bubonis causa est, radicitus curentur. At si ægrotanti tam sanum consilium sequi non lubeat liceatque, utendum erit specificis aliis remediis juxta methodos infra tradendas, ægrum tamen præmonendo, ut ingenuum Medicum decet, eo pacto non sinceram & efficacem, sed fucatam tantummodo & mitigatoriam medicinam morbi afferri.

In secundo casu adhibenda similiter eadem remedia juxta easdem methodos, sed cum aliis, quæ gonorrhœæ sicut ulcusculis conveniant, ita maritanda, ut pensatis utilitatibus & consociata medicamentorum efficacia congeneres illæ affectiones perfecte simul curentur.

Demum *in tertio casu*, qui cum simplicissimus sit, cæterorum veluti norma esse potest, in id unice incumbendum, ut contagium recens admissum efficaciter destruatutur aut educatur, & si quæ in sanguine

Curatio
bubonis,
si a lue
venerea.

Curatio
bubonis,
si a gonorrhœa
aut ab
ulcusculis
canceris.

Curatio

bubonis, si a coitu impuro immedie proveniat. Prior methodus curatoria quæ resolutione.

guine supersint reliquæ, quæ morbum renovare aut luem inferre possent, caute corrigantur aut eliminentur.

Usu viget gemina methodus, qua ea omnia perinde præstari possint; altera quidem, qua curantur bubones veneri sine suppuratione aut ul- la maturantium applicatione, solo nempe Mercurialium & purgantium usu, donec resolutus tumor sensim evanescat. Altera vero, quæ bubo- nibus medetur suppuratione, quam topicorum maturantium appositio promoveat, & cum interno Mercurialium usu ita conjuncta, ut semi- nium morbosum utrimque simul efficacissime oppugnetur.

Prior methodus operatione vacat, brevior est, doloris expers, & æque tuta, ac proinde multorum judicio alteri jam præferenda vide- tur, sed id simul habet incommodi, quod æger domi & in cubiculo toto curationis tempore continendus sit, nisi frigidioris aeris tactu grave periculum velit incurrere. Posterior quidem plerumque longior, multum tædiosa, & cum operationem exigit, dolorifica est, sed cum ægrum officia implere ut plurimum permittat, nondum omnium sus- fragiis destituitur; quin imo eo nonnunquam res sponte recidunt sup- puratione jam incœpta, ut Medico eandem vel invito sequi neces- sum sit. Quocirca ne quid omisisse videamur, utramque methodum proferre operæ pretium est, sed utramque paucis.

I. Itaque secundum priorem methodum.

1. Sanguis initio mittendus est, ut nimius glandularum infarctus minuatur, & intensior earundem inflammatio præcaveatur. Libera- lius quidem, si bubo sit phlegmonodes, parcius vero, si sit œdemato- des vel skirrhodes. Hac de re ergo non audiendi Antiquiores, qui ex præjudicio, quod experientia falsi convincit, a secunda vena ab- horrebant in curatione bubonum, quasi scilicet virûs inde ad inter- iora retractum luem veneream inducturum fuisset.

2. Æger deinde purgandus, tum ut via paretur usui cæterorum re- mediorum, tum ut contagii pars quam citissime educatur: *Leniore* qui- dem & *anipblogistico cathartico*, si bubo inflammatorius sit, ex medulla Cassiæ, decocto Tamarindorum, sale quodam purgante, cum mode- rata dosi Mercurii dulcis sive Aquilæ albæ, sub formulis sequentibus.

R. *Mercurii sublimat. dulcis optime præparat. gr. xv.*

Medull. cass. recent. extractæ ʒj.

M. F. bolus sumendus jejunò ventriculo.

Vel

R. *Tamarindor. pinguium ʒjß.*

Sal. vegetal. ʒj.

Bulliam in aq. comm. lib. jß.

Colatura divid. in duas doses sumendas partitis vicibus & interje-cto

He trium bozarum intervallo, devorato prius bolo ex Mercurii sublimati dulcis gr. xv. conserva rosarum sicca exceptis.

Fortiore vero & drastico purgante, si bubo oedematosus vel scirrhus fuerit, scilicet Jalappio, Diagridio, majore dosi Aquilæ albæ; additis etiam, si ita e re esse videatur Trochiscis alahandal, sub formulis sequentibus.

R. Aquil. albæ gr. xx.

Jalappii

Et diagrid. sulfurat. ana gr. xij.

M. cum f. q. conserv. rosarum sicca F. Bolus.

Vel

R. Aquil. albæ gr. xx. aut Dj.

Diagridii sulfurat. gr. x.

Trochiscor. alahandal gr. iv.

Olei anisi gutt. iij.

M. cum f. q. conserv. rosarum sicca F. Bolus.

3. Posthac præscribenda præparata Mercurialia, quæ nulla purgandi facultate polleant, atque adeo cum sanguine diutius confundantur, virusque venereum efficacius oppugnent. Istiusmodi sunt panacea Mercurialis duodecim laboribus sublimata; Mercurius violaceus, sive Flores antimoniales Mercurii optime loti; Æthiops mineralis cum Mercurio & sulfure tritura, vel ignitione paratus, vel qui cæteris præstat Æthiops mineralis alter, cum Mercurio & Balsamo Peruviano aut Canadense tritura confectus. Singulorum dosis est a gr. xv. ad xx. aut ad xxiv. quæ conserva rosarum excepta assumuntur bis in die, mane & vesperi, aut semel tantum qualibet die, aut alternis tantum diebus, prout celerior est aut tardior eorundem efficacia, huic methodo tandiu insistendo usque dum inflentur gingivæ, incalcescat os & proximus immineat pyralismus.

4. Tunc autem imminenti pyralismo caute occurrendum est purgatione, qualem modo præscripsimus, ut per inferiora deturbetur seminii morboſi pars, quæ per salivales glandulas exitura esset. Quod ut feliciter succedat ab omni Mercurialium usu per dies aliquot abstinendum erit, nec quidquam ultra movendum, donec omnia quiete denuo composita sint; quin imo, si res ita exigat, purgatio eadem iterum sæpiusque repetenda, ut salivatio tanto efficacius cohibeatur.

5. Pacato semel salivationis motu ad Mercurialia redeundum simili methodo, atque adeo pyralismus denuo provocandus, qui ut primum apparuerit, rursus ut prima vice coercetur iterata purgatione, ac cessatione ab omni Mercurialium usu; sic per vices repetendo donec tandem bubo resolutus sensim evanuerit.

6. Resolutioni promovendæ conferunt topica emollientia & resolu-

R

ven-

ventia, ut emplastrum de ranis cum Mercurio, vel sine Mercurio; emplastrum de mucilaginis; emplastrum de spermate ceri; aut quod conducibilis, leves inunctiones bubonis & inguinum cum unguento mercuriali ℞. ad ℥℥. quotidie, alternis diebus, aut tertio quoque die, prout usus postulaverit aut permiserit pyralismi periculum. Constat enim eo pacto limpham, quæ in glandulis inguinum hæret præ spissitudine, efficaciter liquefieri, ac inde facilius resolvi.

7. Imo jam receptum est loco Mercurialium interne assumptorum, quæ stomachum gravant vel pervertunt & noxam sanguini plerumque inferunt externas inunctiones, quæ innocuæ sunt, cum unguento mercuriali a ℥℥. ad ℥j. adhibere supra nates & inguina, modo alternis diebus, modo tertio quolibet die, pro vario gradu morbi, & diversa indole effectuum, qui inde consequuntur. Sed ubi prima salivationis indicia apparuerint, non modo a frictionum usu caute abstinendum est, sed etiam ægrotans per inferiora statim purgandus, ut materia per os exituriens alio divertatur, quemadmodum supra monuimus. Inde vero pacato orgasmo frictiones iterum renovandæ, ac imminens pyralismus denuo cohibendus simili artificio, donec bubo perfecte resolvatur.

8. Nullum autem periculum est, ne ea methodo contagium venereum in sanguinem cum limpha resoluta refluens per limphaticos ductus, veneream luem inducturum sit, tum quia virus, quod sanguini remiscetur, Mercurialium energia cicuratum & correctum est, atque adeo jam inefficax; tum quia, etsi virulentum foret, sanguinem non posset mora inficere, cum eadem proportionem purgantibus eliminetur, qua in sanguinem refunditur.

9. Cæterum toto curationis istius stadio æger domi & in cubiculo temperato continendus est; alioquin enim periculum impenderet ne cutaneis & salivalibus glandulis frigidior ære derepente constrictis, adeoque subito suppressis tum diaphoresi tum pyralismo, quæ a remediis concitantur, difficilis decubitus fieret in pectus vel cerebrum.

10. Dieta quoque imperanda est tenuis, diluens, humectans, ex ossis, panatellis, cremoribus orizæ, gelatinis, jusculis, & ad summum oviss forbilibus, interdicto vel parce admodum permisso usu carnis, etiam cupeptarum, ut pullorum aut gallinarum juniorum. Tandem curandum ut æger venere, exercitio, animi contentione, ac præsertim vino abstineat, ac largo ptisanæ potu utatur, ut Mercurii guttulæ & liberius cum sanguine circulante commisceantur, & in lentorem limphæ a morbo seminio inductum efficacius arietent.

11. Hætenus de priorè methodo. Quod si altera ægrotanti magis arrideat, ut qui a negotiis tandiu abesse non possit, aut si dum Medicus advocatur, bubonis materies jam ad suppurationem ita proximè

Methodus posterior, quæ super-

me

me inclinet, ut eo deducenda sit, poterit ea posterior methodus se-
quenti processu administrari.

puratio-
ne obti-
netur.

1. Præmittentur universaliora; venæ sectiō scilicet & purgatio,
cum iisdem cautionibus, quas supra proposuimus.

2. Adhibebuntur inde tota curatione præparata Mercurialia, quæ pur-
gandi facultatis expertia sint, minori quidem dosi & intervallis longio-
ribus quam in præcedente methodo, sed tamen dosi quæ sufficiat ad
virus venereum profligandum. Quod si vero pyralismus inde forsan im-
mineret, cathartico caute averruncandus esset, ut supra dictum est.

3. Topica simul buboni applicabuntur, quibus tumoris materia
emollescat & ad suppurationem perducatur, in quem finem conse-
runt sequentia cataplasmata.

R. *Cape costæ sub cineribus* ℥ij.

Saponis nigri

Et unguenti diachylon. cum gummi ana ℥j℔.

Basiliconis ℥j.

Conterantur omnia in mortario marmoreo ad formam pulvis F. Cataplasma.

Vel

R. *Radic. Albæ*

Bryoniæ

Et Liliorum alborum ana ℥j.

Incidantur omnia & coquantur.

Add. Foliorum malv.

Et bræc. ursinæ ana m. j.

*Coquantur omnia ad putrilaginem, contundantur in mortario & so-
lacio trajiciantur.*

Pulpa trajecte adde fermenti veteris.

Et unguenti Basilicon. ana ℥℔. *aut* j.

Cepam albam sub cineribus costam in mortario contusam n. j.

Olei Liliorum q. s.

F. Cataplasma parti admoventum & identidem renovandum.

4. Cataplasmatum loco poterunt admoventi emplastra maturantia,
quæ parti adhærent & ideo commodius gestantur. Inter hæc primas
tenent Diachylum simplex; Dyachylum cum gummis, cui nempe
Galbanum, Ammoniacum, Sagapenum, Opopanax commista sunt;
Diachylum oleo Galbani & Ammoniaci dilutum; Diachylum cum
anarica parte Saponis nigri; Pix navalis cum pice Burgundica æqua-
tis partibus mista &c.

5. Licet certa se prodant latentis puris indicia, bubo præcipitan-
tius non aperiendus, sed expectandum aliquandiu, donec protrasta
suppuratoria fermentatione potissima bubonis pars sensim computru-
rit,

R. 2

rit,

rit, ut ea ratione absumptis sponte callis bubonis curatio & citius & felicius perficiatur. .

6. Potest bubo suppuratus duplici ratione aperiri, vel scalpello vel cauterio potentiali: Si *priore*, bubo alte incidendus est; minor unica quidem plaga, quæ inguinis plicaturam sequatur; major vero gemina ad angulos rectos & in crucis formam ducta, cujus anguli forfice excindantur. Si *posteriore*, apposita tumori ope emplastri fenestrati lapidum causticorum catena pro bubonis mole longa & lata, eschara alte inurenda est, quæ si ad abcessum non penetraverit, vel nova appositione cauteriorum promovebitur, vel quod superest, incisione peragetur.

7. Constat in aperiendo bubone cauteriorum usum sectioni plurimum præstare, tum quod cauteria latiore plagam inferant, unde interiora bubonis perspicere & curare facilius licet; tum potissimum quod cauteria cathartica facultate callos durioresque glandularum partes absumant, vel putrefaciant, unde ulceris suppuratio; deterfio & glutinatio felicius succedunt.

8. Educto pure aperti bubonis sinus linteo carpto sicco statim repletur, quo postmodum detracto adhibebitur Digestivum vulgare ex Terebinthina cum ovi vitello & oleo hyperici, cui si ulceris sordities ita postulet, admisceri poterit Ægyptiacum, imo Tinctura Myrrhæ & Aloes. Demum procedente suppuratione ulcus curabitur cum Balsamo Arcæi.

9. Porro ubi primum phlogosis suppuratione relaxabitur, ulceris cavum caute explorandum est, & si qui lateant sinus, sectione vel aperiendi si liceat, vel saltem ita dilatandi, ut & detergi & curari commodè possint. Si qui vero calli supersint, ut fere semper solenne est, corrosivis sensim absumendi, lapide scilicet cauteriali pulveris instar plumaceolis insperso, aut præcipitato Mercuriali rubro cum unguento basilicone misto.

10. Tandem durior bubonis basis iterato unguenti mercurialis illitu emollienda & relaxanda; carnis, qua ulcus completur, firmitas concilianda usu Balsami viridis Metensium; ac si nimis luxuriaverit, carpto linteo tenuiore & sicco, vel calcinato alumine reprimenda; demum laxatis ac detumescens glandulis ulcus ad optatam coitionem deducendum.

11. Cæterum toto curationis huiusce stadio æger a consueto vivendi more cogitur minus recedere quam in præcedente methodo, nisi forsitan suppurationis tempore febris invalerit, cujus ratione necesse sit ægro cibis interdici per dies aliquot. Nihilominus tamen expedit ut vino, venere, exercitio, cibis, salis, piperatis, dyspeptis aut succi pravi se absteineat; imo aeri inclementiori sese raro & caute offerat, præsertim quamdiu præparata Mercurialia interne adhibebuntur.

Ex modo dictis haud arduum est sequentia problemata resolvere.

1. An bubones ulli veneret alibi subnascantur quam in inguinibus

Cor-

Resol-
vuntur
aliquot
proble-
mata;

Constat enim experientia & in axillis, & in jugulo, & ad latera maxillæ inferioris venereos bubones aliquando enasci, vel saltem tumores *buboniformes*, bubonibus inguinalibus simillimos, qui eodem modo invadant, morem eundem teneant, iisdemque curentur remediis.

5. An bubones alibi subnascantur quam in inguinibus?

3. Cur alibi subnascantur?

2. Quanam de causa bubones venerei illis in locis aliquando enascantur? Nempe gemina de causa, ut de inguinalibus modo dictum est; 1. Contagio venereo jam antiquo, quod in lue venerea limpham inficit & inspissat, unde facilis ejusdem decubitus in has illasve glandulas, ubi primum frigus externum, vel ictus, attritus, pressusve fortuitus idoneam dederint occasionem. 2. Contagio venereo recens admisso, quod certis partibus exceptum in illas glandulas una cum reduce limpha circulatione traducitur. Sic nutrices, quæ ab alumno inficiuntur, bubones sæpius habent vel in glandulis conglobatis mammarum basi suppositis, quo primum, vel in glandulis axillaribus, quo postea confluit limpha, quæ vehitur a papillis, in quas prima mali seminia insinuantur luctu. Sic alumni, qui a nutrice contaminantur, aut amasia, quæ a proco, procuive qui ab amasia columbando virus concipit, bubonibus obnoxii sunt in maxillaribus vel jugularibus glandulis, quo convehitur limpha quæ redit a buccis, lingua, gingivis, ac ore interno, in quæ prima penetrant contagii miasmata, cum lacte vel cum saliva permixta.

3. Quomodo curentur bubones venerei istiusmodi? Eadem plane therapeja, qua bubones ipsi inguinales, quibuscum in omnibus ita consentiunt, ut gutta guttæ similior non sit: Ideoque adhibitis venæ sectionibus, purgationibus, inunctionibus mercurialibus, ad resolutionem omni ope atque opera adigendi, quæ si ex voto non cessent, ad suppurationem deducendi, incidendi, detergendi, cicatrice obducendi ex artis legibus, quæ supra proposuimus.

4. Num in internis glandulis limphaticis bubones venerei aliquando succrescant? Certe nec ipse ullos observavi bubones venereos interne genitos, nec ullos unquam ab ullo observatos legisse memini; sed pervulgatum est in Syphiliticis oboriri & tubercula dura ac scirrhomæ in pulmonibus, & infarctus duros ac scirrhomæos in glandulis Mesenterii, quæ si a bubonibus exitu forte abludant, at vero cum iisdem causa conveniunt.

5. Unde ea discriminis ratio, cum e contrario seminum morbosum cum cum toto sanguine, atque adeo tota limpha perinde confusum in lue venerea, parem similemque labem singulis glandulis illaturum esse videatur? Ideo forsitan quod in internis glandulis limphaticis, cum in locis lateant calore perpetuo æstuantibus, nativa limphæ liquiditas perinacius foveatur, unde hærentia limphæ rarior, & si forte accadat, minor, tardior, & ad resolutionem faciliior, quam in exteris

4. Num bubones venerei in internis glandulis enascantur?

5. Quanam sit discriminis illius ratio.

ternis glandulis, quæ frigus experiri solent. Adde interiores glandulas ab ictu, attritu, pressu tutas esse, quibus e contra vidimus limphæ decubitus non raro promoveri in exteriores glandulas.

6. Utrum in cinædis bubones generentur, & si generantur, ubinam apparent?

6. Denique utrum in cinædis pathicisque bubones venerei generentur unquam usu venereis impuræ; & si ea ratione generentur, ubinam tunc nasci soleant? Circa prius quidem, nec ipse vidi, nec ab aliis puto unquam visos esse bubones in cinædis, quos certo constiterit contagio usu impurissimæ veneris recens contrafacto obortos fuisse. Neque enim existimo cinædos ullos dari, qui muliebria ita patient, ut virilia numquam omnino agant: Partes autem viri vel semel egisse satis est, ut jure ambigatur de prima bubonis origine, si quis forte posthac supervenerit.

Circa posterius vero, vix credo fore ut bubones in cinædis, si ab impura venere unquam proveniant, in glandulis inguinalibus generentur, quo limpha ab extremo recto anique confiniis vel nulla vel paucissima defertur; sed opinio est generandos esse in glandulis illis lymphaticis, quæ in abdomine juxta aortæ descendens bifurcationem adsident, in quas limpha conveyitur ab illis partibus; & inde forsan efficitur ut bubones istiusmodi nunquam vel rarissime producantur, quod cum illæ glandulæ lateant in abdomine, calor vicinarum partium, quo æstuant, limphæ inspissationi & hærentiæ repugnet, ut modo dictum est. Sed ne sibi ideo gratulentur, qui tam turpi parent nequitie, seu verius, infamie; siquidem præter morbos peculiare non paucos gravissimosque, quos sibi flagitio pariunt & de quibus infra Cap. 10. habent etiam & bubones proprios, abortivos quidem sed inguinalibus nihilo leviores, si non & peiores. Nempe iis accidit, ut limpha, quæ ab extremo recto anique confiniis regreditur, miasmatis a virulento semine exhalantibus inspissata glandulas lymphaticas mole quidem parvas, numero vero multas, podici adscitas & in adipe sepultas, in quas primo passu illabitur, inflet, distendat, tumefaciat; unde gignitur species quædam bubonis annularis, quo podex circulariter cingitur cum calore, rubore, renitentia, ac dolore maximo præsertim quoties alvus deponenda est; qui remediis iisdem eademque methodo curandus est, ac bubones venerei inguinales.

C A P U T VI.

De Morbis, qui Buboni male curato superveniunt.

§. I. DE RUBONE FISTULOSO.

Bubonis fistulosi definitio.

Definitio & differentia. Bubo semel apertus, si negligatur, detritus & coalescentibus labris ac constricto orificio in fistulam degenerat, hoc est in ulcus sinuosum & callosum; hæc enim duo fistula essentialiter complectitur.

Mul-

Multiplex est fistulæ istiusmodi differentia.

1. Ratione aperturæ, quæ modo latior est & ideo perpetuo hiat; modo angustior adeoque vel crusta vel tenui pellicula interdum obducitur.

2. Ratione sinuum qui intus latent, latiorum vel angustiorum, plurium vel pauciorum, cutaneorum vel profundiorum; rectorum vel flexuosorum &c.

3. Ratione humoris qui inde profluit, paucioris vel copiosioris; purulenti, saniosi vel simpliciter ichorosi.

4. Demum ratione callorum qui sinuum latera obsident, & magnitudine, numero, duritie plurimum variant.

Causæ Potest quidem apertus bubo in ulcus sordidum, chironium, *Causæ.* dysepulotum abire vitiosa sanguinis dyscrasia, potissimum vero semini venerei in sanguine latentis præsentia, unde pus acrius suggeritur; in fistulam vero numquam, nisi supina Chirurgi incititia multis modis peccatum sit.

1. Scilicet si bubonem suppuratum angustiore foramine imperitus aperuerit sive scalpello sive cauterio. Inde enim educto pure cum ulceris superfittis fundus nec remediis satis obuius sit, facile non est aut ea quæ intus geruntur perspicere, aut iisdem mederi: Quamobrem ulceris interiora sordida remanent, dum labra quæ remediorum viribus magis patent, melius deterfa ad coalitionem properant, unde fistulam generari necessum est.

2. Si ulcus, utcumque lata plaga aperuerit, ad cicatricem citius tendere incautus permittat, nondum perfecte suppurata glandula quæ exulceratur, vel infima saltem ejusdem portione, quæ ulceris centrum occupat; variisque membranis quibuscum adhærescit, & quæ sunt instar pediculi, suppuratione nondum delapsis. Experientia siquidem notum est nec ulcus perfecte unquam curari, nisi fundus probe detergatur; nec fundum probe unquam detergi, quandiu suppuratæ glandulæ frustulum quodvis, aut adhærescentiam membranarum lacinia intus remanserint, suppuratione nondum decidua.

3. Si male providus non advertat pus ex suppurata altera vicino-re glandula, aut ex interjecta inter viciniore glandulas intercapedine in ulceris fundum latenter instillari, cui jugi puris scaturigini nisi cito occurratur dilatata via scalpello vel cauterio, perfecta ulceris coalitio numquam speranda est, utcumque labra ad cicatricem tendere videantur, sed ulcus in fistulam necessario deliturum est.

Symptomata. Qualicumque ex propositis modo Chirurgus peccaverit, *Symptomata.* sequitur inde 1. Fundum ulcerati bubonis, si remediis non detergatur, si putridis glandulæ aut membranarum lacinis obsideatur, si pure jugiter villabente maceat, nec mundificari, nec proba carne repleti, nec ad *1. Ulcus Chironium.*

coitionem properare posse, sed chironia exulceratione indefinente etolum in cavitatem vacuum, majorem minoremve abiturum esse.

2. Quod 2. Labra vero ulceris, quæ cum remedium energiz obvia & cæteris vitiis immunia sint, perfecte clui, detergi, succrescente carne augeri possunt, ulceris oram mutuo accessu ita sensim coarctatura, ut aditus in cavitatem pateat exiguus, qui magis minusve hiulus vel perpetuo pervius sit, vel identidem crusta aut pellicula obducatur.

3. Sed 3. Interea pus ulceris cavo coercitum adjectas partes latenter impetit, & earumdem stamina comprimendo, fibras distendendo, circumfluam lympham inspissando, duriusculos callos brevi circumquaque generaturum, qui numero, mole, duritie varie variant pro diversa puris energia, fibrillarum erosarum firmitate & densitate, aut circulantis lymphæ spissitudine.

4. Imo vero, si diutius retineatur & natura acrius sit, promota sensim erosione cuniculos novos in varia loca sibi brevi culurum, numero quidem plures paucioresve & amplitudine latiores vel angustiores pro acrimoniz gradu; rectos vero vel flexuosos, profundos vel cutaneos prout objectæ partes puris efficaciam magis vel minus retundunt, aut eidem varie reluctantur.

5. Humoremque 5. Cæterum humorem inde profluxurum natura varium; ichorosum quidem, si limpha sola ex erosione lymphaticis ductibus depluat; saniosum, si cum limpha sanguis e vasis sanguiferis sauciatis in cavum fistulæ instilletur; purulentum, si mora limpha & sanguis puris formam adipiscantur, demum copiosum vel paucum, pro diversa humoris confluentis copia.

Diagnosis. Fistulæ, in quam bubo ulceratus degeneravit, præsentia & status oculis patent; sinus quos recondit, specillo explorantur; calli tactu dignoscuntur; causæ demum ex nota antecedente bubonis therapeja facile eruuntur.

Prognosis. Fistula in inguine ex bubone orta gravis est, neque unquam contemnenda, cum plerumque lucem veneream supponat, a qua indicatur aut foveatur; & ex se curationem Chirurgicam semper exigat, longam, difficilem, laboriosam.

Imo vero periculosa est 1. Si sinus habeat, qui ad vasa cruralia aut majores illorum ramos altius penetrent. 2. Si callorum, quos recondit, nonnulli acute doleant & ad carcinomatis naturam accedant.

Curatio. Si certis, imo si urgentibus tantum indiciis, qualia infra proponemus, *Lib. 4. cap. 4.* locus sit conjiciendi fistulam, in quam bubo ulceratus degeneravit, conjungi cum luc venerea qua foveatur, curationi fistulæ hydrargyrosis præmittenda est methodo inferius tradenda eodem libro *Cap. 7.* Neque enim spes ulla est futurum ut effectus perfecte unquam curetur, nisi sublata prius causa. Deinde sub

ptyalismi finem, cum sanguis jam purgatus fuerit, fistulæ ex arte curandæ providebitur, ut eo pacto luis veneræ & fistulæ curatio pari passu procedat, & adoptatum finem simul perducatur.

Si vero liqueat & contra bubonem in fistulam degenerasse sola Chirurgi imperitia, nec ulla latentis syphilidis suspicio sit, tunc modo tempestatis ratio permittat, ad fistulæ curationem deposita dilatione quacumque properandum est sequenti methodo.

1. Æger quidem ad curationem præparabitur non modo auxiliis universalioribus, venæ sectione scilicet & purgatione, pro ægrotantium temperie & viribus, morbiq; natura rarius sæpiusve iteratus; verum etiam iusculis diluentibus & refrigerantibus ex pullo gallinæo juniore aut carne vitulina cum radicibus & herbis convenientibus; sero lactis chalybeato; lacte asinino aut vaccino; imo si tempestivitas suadeat, balneatione in aqua dulci tepida, aut potatione aquarum mineralium acidularum.

2. Dein exploratis prius numero, longitudine, directione sinuum, qui cum fistulæ ostio communicant, singulorum apertio instituenda erit; ac quidem, si cutanei & parum callosi sint, uti licebit scalpello vel forfice, quorum introductio specillo sulcato dirigetur; labraque hinc & inde pendula forfice caute excindenda, ut sinuum fundus detergatur; & deinde ut solenne est, plaga statim replebitur ad sistendum sanguinem carpto linamento, quo postridie levi manu detracto ulcus digestivo simplici aliquandiu, ac postea Balsamo Arcæi curabitur.

3. At vero si sinus profundiores fuerint aut nimium callosi, satius erit cauterio viam sibi facere, ut jam monuimus *precedenti Capite*. Itaque appposito fistulæ emplastro quolibet ita fenestrato, ut potissima sinuum pars emplastri foramini seu fenestræ subjaceat, lapidum causticorum catena superimponetur, ut eschara alte inuratur: Quæ si ad sinus usque non penetraverit, incisæ ad vivum escharæ lapides alii indidentur, vel quod brevius est, ferro discindetur semi-putris intercapedo, qua sinuum recessus conteguntur.

4. Dein escharæ lapsus quam ocysime promovebitur emollientibus & relaxantibus, ut butyro, vitello ovi solo, vel cum oleo hyperici, aut basilicone, aut terebinthina conquassato & linamentis excepto, lapsaque eschara ulcus cum digestivo vulgari curabitur, donec suppuratione parcius Balsami Arcæi ulum suadeat vel permittat.

5. Relaxatis semel suppuratione tum labris tum confiniis ulceris, omnia diligenter tactu, oculis, specillo exploranda sunt, num alicubi lateat sinus, callusve gravior supersit, quibus mederi necessum sit, priusquam ulcus ad cicatricem coire permittatur, ne error novissimus pejor esset priore, alteraque fistula inde denuo sobolesceret.

6. Igitur si sinus quispiam detergatur, sed in parte quæ sectionem

per.

permittat sine periculo, tota longitudine statim incidendus, si liceat; vel saltem ejusdem ostium intrulo escharotico ita ampliandum, ut fundus jam obviu libere detergi, & intrusis medicaminibus perfecte curari possit.

7. Verum si sinus ad vasa cruralia vel majorem eorumdem ramum tam prope accedat, ut incisio periculo vix careat, cathartecis solum utendum erit, & blandioribus quidem, quæ moderate agant & os sinus rosione ita gradaria dilatent, ut de eorumdem effectu judicium ferre quotidie liceat; imo etiam caute attendendum erit, ut cathartetica ad eam tantum sinus oram admoveantur, quæ a cruralibus vasis longius distiterit, & quæ eorumdem efficaciz possit tutius obijci.

8. Si duriores calli suppurationem eluserint, cathartecis sensim absumendi, lapide scilicet infernali, lapide caustico vulgari, aut præcipitato rubro cum unguento admisto, quorum ut efficacior sit virus, conducit callos summo scalpelli apice levibus puncturis scarificare.

9. Sinubus semel glutinatis, callis absumptis & suppuratis, si succrescens caro firma, densa, granosa, rosea, sit, ulcus ad cicatricem deducendum, cui fini conducunt epulotica, quæ ulceris superficiem exsiccando cicatricem inducunt, ut balsamum viride; pompholyx, plumbum ustum, cerussa; parata ex iisdem emplastra; linamentum carptum siccum, alumen ustum &c. aut colletica, quæ tenui glutine cicatricis rudimenta, donec firmantur, ab aeris erodentis artatu tutantur, inter quæ primas tenent terebinthina pulverata postquam coctione induruit, sarcocolla, thus sive olibanum, myrrha &c.

10. Demum ab ipso curationis principio diæta conveniens ægrotanti imperanda, tenuis quidem ex offis, panatellis, cremoribus orizæ, & ad summum carne pullorum gallinaceorum, cum omnia pro vois maxime succedunt; tenuissima vero & ex jusculis tantum levioribus, si febris invadat, si suppuratio copiosa & fœtida sit; si ulceris ora inflammentur; si caro mollior & fungosa luxuriat &c.

§. II. DE BUBONE SKIRRHODE.

Bubonis
skirrho-
dis de-
scriptio.

Descriptio & differentia. Accidit aliquando ut bubo venereus elusa remedium omnium efficacia nec resolvatur nec suppuretur, sed totus vel fere totus arctius sensim constringatur, densetur, indurescat, ac in skirrhum proprie dictum, durum, renitentem convertatur, quæ de bubone œdematode, & skirrhode potissimum vera sunt.

Differen-
tiz.

Geniti eo modo skirrhiz differunt 1. Ratione figuræ & molis, circa quas plurimum variant.

2. Ratione numeri situsque glandularum, quibus insident; alii enim unam tantum, & *conglobati*; alii vero plures vel racematim vel catenatim di-

dispositas, occupant, & racematim vel catenatim *congesti* dicuntur.

3. Ratione mobilitatis, cum alii quidem subiectæ parti laxius cohercant, hac & illac mobiles; alii vero ita immediate adnascantur, ut nullomodo inde dimoveri possint.

4. Denique ratione sensus, cum alii indolentes sint & vere *skirrhotici*; alii vero dolorem obtusum inferant, & ad *carcinomatodendram* proxime degenerent.

Causæ. Ideo bubo in skirrhum convertitur, quod limpha in vesiculis sive cellulis glandularum inguinalium hærens spissatur prætermo- dum, unde partibus constipatis & ad intimiorem contactum sensim adductis duritiem veluti caseosam adipiscitur. Limpha vero in hunc modum spissatur multiplici de causa.

1. Vitiosa crassitudine, qua natura peccat, unde fit ut inde a suscepto venereo contagio tanto magis cæteris paribus spissescat.

2. Nimia suscepti veneni venerei copia vel energia, unde fit ut cæteris paribus limpham, cui inspiratur, tanto magis coagulet.

3. Utraque memorata causa simul concurrente, unde fit ut limpha natura crassior contagio & nimio & efficaciore in composita utriusque causæ ratione coaguletur.

4. Usu præpostero topicorum repercutientium, qualia incipienti buboni interdum applicantur, ut reprimatur, sed pessimo consilio; cum aucta limphæ spissitudine inde skirrhotici fiat bubo, qui sponte resolubilis fuisset.

5. Abusu topicorum resolventium aut maturantium, quæ si liquefaciendæ limphæ hærenti imparia sint, augent ex accidente ejusdem crassitudinem, quatenus dissipant quodcumque tenuius liquidiusve inerat.

6. Tandem abusu topicorum acriorum, ut sunt cataplasmata maturantia, quibus semen sinapi contusum admiscetur, quæ irritando systalticas glandulosi contextus constrictiones cient, utiles quidem, si materia impæcta ductilis fuerit & ad resolutionem comparata; noxias vero si durior sit & expressioni reluctetur, quandoquidem vi exclusivæ tenuioribus partibus crassamentum, quod supererit, in duriores mæsam coiturum est.

Symptomata. Inde liquet pro diversa limphæ in diversas inguinum glandulas appellentis natura, indole, contagione, vel pro diversa diversarum earundem glandularum laxitate, textura, permeabilitate, modo unam tantum glandulam, mole, figura variam affici, unde bubo ac proinde skirrhus *conglobatus* mole & figura varius; modo plures simul racematim vel catenatim dispositas, unde bubo ac proinde skirrhus racematim vel catenatim *congestus*.

2. Pro diverso glandis infarctæ situ magis vel minus profundo, aut pro diversa tendinearum fibrarum vel membranarum, quibus glandula cum

Sympto-
mata.
1. Bubo
skirrho-
des con-
globatus
vel con-
gestus.

2. Mobi-
lis vel
adhærens

cum confiniis adhærescit, longitudine & mollitie, bubonem atque adeo skirrhum inde natum modo libere mobilem vacillare, modo contra stabilem cum subiecta parte conglutinari.

3. Indolens vel lancinans.

3. Prout limpha in glandulis hærens vel quieta est & sine motu, vel cauta multiplici infra recensenda, §. *sequente*, rarefcit & expanditur, concludentes glandularum membranas modo immotas permanere, unde tumor vere indolens & perfecte *skirrholes*; modo dolorifice distrahi, unde tumor incipit obscure dolere atque adeo in *carcinoma* degenerare esse.

4. Calens & rubens, vel caloris experts.

4. Demum in priore quidem casu, in quo sanguis & limpha vel vasa sua sensim jam dilataverunt, vel vias novas in collateralia vasa sibi jam fecerunt; cum ab immota indolentis skirrhi materia nulla nova inferatur vasis compressio, nihil inde quidquam mutari penes colorem & calorem partis, aut limphæ decubitus; in posteriore vero hæc eadem secus se habere, ut infra videbitur §. *sequente*.

Diagnosis.

Diagnosis. Skirrhi inguinalis tum præsentia, tum differentia in quas distinguitur, oculis & digitis obvia sunt: Causæ vero quibus productus fuerit, ex præcedente ætiologia colligi possunt.

Prognosis.

Prognosis. Semper mala instituenda est, cum bubonem in skirrhum mutatum haud facile sit vel resolutione vel suppuratione dissipare.

Pessima autem, si dolere incipiat, cum inde manifestum sit ad carcinomatodem naturam sensim delciscere.

Curatio.

Curatio. Difficillimum est, modo diximus, bubonem skirrholden resolvere vel suppurare. Suadent quidem nonnulli cucurbitam siccam buboni quotidie applicandam esse per horæ quadrantem, ut confluxu sanguinis impacta in skirrholden materia calefiat, & topicorum resolventium vel suppurantium energiam facilius deinde pareat. Sed docuit experientia eam methodum fere semper frustraneam esse, imo non raro periculosam, cum skirrhus a confluenta sanguine frequentius incallescens tandem in carcinoma sæpe degeneret.

Alii vero volunt skirrholden glandulam cathæreticis pedetentim absumendam esse, si resolventium & maturantium efficaciam eludat, vel incisa cute ferro extirpandam. Sed numquam suaserim longas, difficiles, periculi plenas operationes istiusmodi, quandiu skirrhus indolens nullam noxam insert: Quod de cathæreticis præsertim dictum volo, quorum usu præpostero skirrhus in carcinoma sæpe convertitur.

Itaque satius est ad hydrargyrosim confugere, a qua feliciter expectare. Partes enim Mercurii, quæ eo pacto in sanguinem infunduntur, cum efficacissimæ sint cum ad attenuandam & dissolvendam hærentem limpham, tum ad corrigendas seminii veneri particulas, quæ limpham coagulant, possunt felicius quam ullum aliud remedium, skirrholden bubonem sensim resolvere, ut qui limpha viscidior & contagio venereo nimium spissata producatur.

At

At vero in adhibenda hydrargyrosi duo caute noranda. 1. Ut æger diuturno diluentium & relaxantium usu præparetur, tum universalium, tum particularium; universalium quidem, quæ sanguinem & limpham temperent & liquefaciant, ut a Mercurii partibus facilius possint comminui & extenuari: Particularium vero sive topicorum, quæ bubonis contextum emollient & relaxent, ut limphæ hærenti magis permeabilis fiat.

Priori indicationi conducunt balnea in aqua fluviatili tepida; juscula aut apozemata refrigerantia; serum lactis chalybeatum; lac asininum; aquæ minerales acidulæ sive chalybeatæ; &c. Posteriori vero satisfaciunt cataplasmata de mica panis, aut ex pulpa radicum & herbarum emollientium; vel emplastra de mucilaginis, aut spermate ceti, quibus diu insistendum est.

2. Ut hydrargyrosi lento passu procedat, hoc est ut pauca unguenti mercurialis dosis illinatur qualibet frictione; ut frictiones fiant raris intervallis; ut protractis frictionibus Mercurius cum sanguine confusus diu retineatur &c. eo scilicet fine ut Mercurii partes cum sanguine diutius circulares, limpham quæ in glandulis inguinalibus hæret impacta, possint efficacius dissolvere, & perfectam bubonis skirrhosis resolutionem procurare.

Hac methodo certum est inguinales skirrhosis, qui buboni prægresso succedunt, si perfecte non resolvantur, quod rarissimum est, saltem ita imminui, ut tumor superstes amygdalæ aut avellanæ molem vix æquet. Noluerim tamen certum & indubitandum effectum semper polliceri, quoniam novi skirrhosis bubones ita rebelles interdum esse, ut hydrargyrosi summa etiam cautione adhibita pertinaciter resistant.

Quod si hæc accidunt, modo bubo lapideam duritiem nondum adeptus sit, nec ad cancerum occultum propendeat, proderit Thermas Baregianas adire, ut embrochen super bubonem iterando, inguen morbum stillicidio aquæ fluentis supponendo, demum tumori limum, qui in aquæ fundo colligitur, apponendo quotidie, coagulata limpha sensim liquefiat & tandem resolvatur. Neque enim usquam alibi Thermas ulla novi, quæ vel lenius agant, vel glandularum infarctus efficacius discutiant.

Cauto tamen opus est, ac si bubo inde rarefcere, calefcere, dolere incipiat, Thermarum usu æger statim abstinat, ne skirrhosis in carcinoma degeneret. Tunc igitur missis remediis omnibus res tota naturæ viribus committenda est, convenientem dietam imperando, & tumori emplastrum imponendo ex æqualibus partibus emplastrorum diabolani & de mucilaginis.

§. III. DE BUBONE CARCINOMATODE.

Descriptio & differentia. Bubo skirrhosis, dum in carcinomatoden degenerat.

Bubonis carcinoma-
matodis
descri-
ptio.

1. In-

1. Incalescit, obscure dolet si prematur, intumescit, durius renititur, identidem lancinat, raro tamen; & tunc *carcinoma incipiens* appellatur.

2. Inde magis calet, tumet, renititur; frequentius & acutius lancinat, mutata figura in apicem fastigiatur, quem cutis tensa, laevis, lucens subrubra obtegit; & tunc *carcinoma confirmatum* quidem, sed *occultum* dicitur.

3. Demum fastigiatus apex discissa cute in ulcus dehiscit unde sanguis, ichor, sanies stillatim manant; ulcus incipiens tacito progressu sensim ampliatur; cancrosa materia expanditur & extumet; ulceris orae invertuntur & extrorsum replicantur; caro succrescit fungosa, tabe diffuens; ichor, sanguis sanies ubertim profluunt; dolor atrox, urens, lancinans discruciat; tumoris confinia livent, uno verbo *carcinoma confirmatum & exulceratum* est.

Cæterum ut de skirrho dictum est, sic quoque carcinoma mobilitatis ratione variat; nam modo vacillat & in sede mobile est, modo contra stabile subjectis partibus firmiter adhærescit.

Causæ.

Causæ. Carcinomatis ætiologia hoc unico principio hætenus ignoto, at tamen verissimo tota nititur, nimirum lympham in skirrho impactam rarescibilem esse si calescat, conceptoque semel fervore ad expansionem insito elaterio niti momento tanto majore, quanto magis densata & constipata fuerit. Id sane vel ex eo abunde demonstratur, quod skirrhodes tumor, cum in carcinoma incipit degenerare, intumescat citra tamen suppurationem ullam; quod crescente intumescencia skirrhii pars sive angulus in apicem fastigiatur; denique quod disrupta semel cute cancrosa materia, quæ intus latet, ubi primum liberior expansioni locus datur extumescens & veluti exundans ulcus inceptum sensim diducat, & dum sese magis magisque effert, ulceris margines circumquaque extrorsum invertat.

Inde sequitur præternaturalem calorem, quem materia in skirrho impacta concipit, proximam esse causam, qua skirrhos in carcinoma convertatur. Constat autem calorem huiusmodi a skirrhosa materia concipi.

1. Quotiescunque sanguis juxta fluens fervidior ipse est febre ardente aut diuturna; dieta acriore, salsa, piperata; abusu vini meracioris aut liquorum ardentium; venere, exercitatione, vigilia immoderatis.

2. Quotiescunque sanguis, licet calore non æstuet, nimia tamen copia cogitur hære in skirrhii confiniis, ut accidit ex frequenti cucurbitularum applicatione, aut skirrhii contusione, contrectatione, compressione &c.

3. Demum quotiescunque tumor skirrhodes prætermodum calescit admotis topiis actu vel potentia calidioribus, præpostera aquarum thermalium embrocæ; imprudenti abusu escharoticorum &c.

De-

Debent ergo hæc omnia inter remotas sive procatacticas carcinomatis causas singula reconveneri.

Symptomata. Ideo ex dictis skirrhos incipit in carcinoma mutari, quod contenta materia serveat & rarefcat. Debet ergo skirrhos in carcinoma degenerare paulo magis calere, tumere, reniti.

2. Tumet materia in skirrho degenerare. Debet ergo concludentes cellulæ & externa glandulæ skirrhosæ involucra fortius inde distrahi, atque idcirco dolere.

3. Materia eadem validiore nisu identidem rarefscens ab externa causa qualicunque vasa juxta repentia fortius comprimit. Debet ergo arteriæ recenti sanguine magis turgidæ fortius inde oscillare, partisque appositæ quater vehementius, unde dolor lancinans.

4. Qua proportionem in skirrho degenerare materia gradario augmento magis fervet & impensius rarefscit, proportionem eadem debent calor, dolor, tumor, renitentia, lancinatio magis & magis in dies invalescere.

5. Cum skirrhosa materia non sit perfecte homogenea & uniformis, sed in variis tumoris cellulis ad expansionem magis minusve comparata; pari modo cum nec ipsæ cellulæ, quibus concluditur, expansivo nili æqualiter resistent, sed momento vario & inæquali pro diverso contextus modo, debet una aut altera skirrhosæ degeneris pars alterutra vel utraque causa extumescere præ cæteris, mutata figura in apicem fastigiatum sensim protuberare.

6. Quo magis unus aut alter tumoris degeneris angulus in apicem fastigiatur, eo magis necessum est superextensam cutem distrahi, tendi & explicari. Debet ergo summus apex tensa, lævi, lucente, tenui cute obtegi; imo & subrubra, quoniam sanguis vasa ejusdem nimium distracta difficiliter permeat.

7. Cutis distractione nimia attenuata discinditur cum subiecta materia degenerare. Inde ulcus parvum & superficialium, sed quod causarum earundem efficacia sensim crescit & dilatur. Si in malo granato, vel momordicæ pomo, cum matura sunt, vel levissima scissura solet sponte in ampliorem dehiscere solo involucrorum elaterio.

8. Manat exulcerato carcinomate sanguis, si majora vasa sanguifera discindantur: Limpha sive ichor, si illæsi sanguineis vasa lymphatica tantum disrumpantur: Purulenta materia, si fungosa caro, quæ ulceris superficiem obducit, computrescat: Demum sanies sive limpha sanguine & pure inquinata, si memoratæ conditiones una simul concurrant: Numquam tamen pus verum, sincerum, laudabile, cum skirrhosa materia tum propter naturam lymphaticam, tum propter spissitudinem nimiam perfectæ suppurationi impar sit.

9. Crescente cancrosum materiæ expansionem, cum cutis circumferentia

Symptomata.

1. Renitentia major.

2. Dolor.

3. Lancinatio.

4. Quæ singula ingravescunt in dies.

5. Apex fastigiatus.

6. Rubor in summo apice.

7. Exulceratio.

8. Suppuratio anomala.

9. Labra

tia

ulceris
replican-
tur.

10. Et
venæ cir-
cum circa
varicosæ
tument.
Diagno-
sis.

Prognosis.

Thera-
peja cu-
ratoria.

tia non possit pari ratione extendi, consequens est ut ulceris labra extrorsum revolvantur & contorqueantur sædissimo spectaculo.

10. Tandem compressis circumquaque venis, sanguis non modo hæret in tumoris confiniis, sed deposito ob moram rubore nativo nigriorem colorem contrahit, unde liventes ac varicosæ vasorum propages, quibus carcinoma cingitur.

Diagnosis. Natura, status, differentiz bubonis carcinomatodis facile patent ex descriptione. Causæ vero erui possunt ex antecedente vivendi more.

Prognosis. Bubo carcinomatodes morbus est gravis & periculosus, qui raro curatur, nec unquam nisi ferro & igne: Duro enim nodo durus cuneus apponendus est.

Si bubo subjectis partibus stabiliter adhæreat, tum neque ferro neque cathæreticis radicitus extirpari possit, plane incurabilis est, & mitigationem tantum seu *palliationem* admittit.

Si vero mobilis sit & a subjectis partibus sejunctus, potest perfecte curari extirpatione, modo a cruralibus vasis satis distiterit, ut operatio sine periculo possit institui.

In genere bubo carcinomatodes major minore, acutus dolens dolente obrutius, exulceratus occulto gravior est.

Curatio. Varia est, ut modo diximus, pro diverso tumoris statu; *curatoria* scilicet si mobilis, *palliativa* tantum si stabilis sit.

I. In priore casu hæc præsens urget indicatio, ut tumor canerosus celerrime excindatur, ne viciniore partes in consortium trahat, aut mole auctus subjectæ parti stabiliter agglutinetur.

Itaque 1. Eger, ut jam sæpe dictum est, ad operationem statim præparandus universalioribus remediis, venæ sectione scilicet & purgatione; jusculis aut apozematis alterantibus; lacte asinino, vaccino, aut sero lactis; aquis mineralibus; balneatione &c. quæ pro ægrotantis constitutione, statu, ætate annique tempestate varie variare debent. Imo etiam hydrargyrosis præmittenda est, si qua sit latentis syphilidis suspicio, ut sæpe accidit.

2. Deinde, si nonnulli audiantur, utendum cathæreticis, potissimum vero diversis Arsenici præparationibus, correctionibus, calcinationibus, quibus, asserunt glandulam canerosam totam, ut ajunt, *mortificari*, & sponte decidere, dum avellitur. Ea de re consulendi Fallopius, *Traçtatu de Tumoribus præter naturam*; Sennertus, *Operum Lib. 4. parte 3. sect. 1. cap. 7.* de Pulvere benedicto Anronii Fuchsi; Joannes Vigierius in *Chirurgia magna*; Petrus Joannes Faber in *Myrobacio Spargyrico*, de quinta essentia Arsenici; Joannes Baptista Alliot, *Traçt. de Cancro* &c.

3. Sed eam methodum, quamquam forsitan manu parcissima in parvis &

cu-

Autaneis glandulis tentari possit, periculofam tamen censemus & parum tutam, si grandior aut profundior cancer curandus contigerit. 1. Quia cathæretica magna dosi adhibita irritando, laceffendo, rodendo, gravem inflammationem excitant cum febre, quæ numquam periculo vacant. 2. Quia dolore acutiore, quem inferunt, viciniore partes, quæ sanæ erant, in canceri naturam mutant, unde crescit carcinoma & subiectis partibus adhæret, a quibus ante sejungebatur. 3. Potissimum tandem, quia numquam tutum crediderim usum Arsenici, quocunque modo præparetur, calcinetur, corrigatur. Notum est enim nec unica experientia, solo usu externo Arsenici mortem miseram ægrotantibus illatam esse. Quæ de re vide Fernelium *Method. medendi Lib. 16. cap. 18.* ubi refert Arsenicum & Mercurium sublimatum cancro mammæ imposita mulierem diebus sex de medio sustulisse, perinde ac si eadem ore hausta fuissent.

4. Igitur satius est mobilem cancerum ferro excindere radicitus celeri operatione: Scilicet glandula cancerosa digitis, ligatura, forcipe circulari aut volsella uncinata arrepta suspenditur; inde cutis & tumoris basis novacula ad dimidiam longitudinis partem linteo obvoluto armata circumquaque subtus circumciditur, donec cancer totus radicitus extirpetur, sedulo cavendo ne quid residuum remaneat, quod cancerosæ indolis suspectum esse videatur. Sanguinis fluxu vel ligatura, si vasa unde manat ampliora sint, vel sola vitriolici frustuli applicatione restinguitur. Plaga linamento sicco oppletur & manu aliquandiu comprimitur, donec sanguis subsistat. Dein postera tertiave die postquam linamentum deciderit, superstes ulcus digestivo vulgari, balsamo Arcæi, balsamo viridi successive curabitur, ut artis est, & ut feret usus.

5. Cæterum in id unice Chirurgum intendere necessum est, 1. Ut si qua pusilla glandula cancerosa vel ad canceri naturam proxima lateat in confiniis, diligenter extirpetur; cancer enim hydra est, quæ semper reviviscit, nisi capita omnia relecta sint. 2. Ut carnis optimæ regenerationi caute provideatur, ulcus curando summa diligentia, ne in fistulam degeneret, quod de cancerosis ulceribus nimium frequens est.

6. Sanato demum ulcere vel ad cicatricem properante, vitiosa sanguinis diathesis, quæ a cancro inducta est vel quæ cancerum ipsa fovebat remediis corrigenda est, ne simili vitio novus cancer in parte altera repullulet. Ad hunc autem scopum faciet methodus modo proponenda ad *palliativam* canceri stabilis therapejam: Quæcunque enim cancro mitigando conducunt eadem cancro præcavendo.

II. In calu altero, nempe si cancerosus tumor vicinis partibus jam adhæserit, neque adeo possit radicitus ulla ratione extirpari, ab operatione omni abstinendum est tanquam inutili, imo noxia, & *palliativa*. Therapeja palliativa.

1. Haud defunt tamen, qui curationem perfectam etiam in eo casu polliceantur usu catharteticorum, præsertim vero arsenicalium; sed ægrotantes, si magnificis promissis istiusmodi confidunt, temerarie credulitatis pœnas cito luent morte misera & crudelissima. Neque enim sperare licet utilem fore in stabili cancro therapejam, quam noxiam esse in mobili modo demonstravimus.

2. Tunc ergo una salus ægris est nullam salutem sperare & missa inani & periculosa fiducia uniçe providere, ut canceri augmentum præcaveatur; vitiosa sanguinis diathesis corrigatur, dolores, qui ægrum miserrime torquent, leniantur; demum vita quam diutissime & quam mitissime procrastinetur, in quibus procurandis therapeja palliativa tota versatur.

3. Ea propter æger identidem purgandus est, non quidem cathartics drastics, ut nonnullis temere videtur, sed blandioribus, ut manna, cassia, rhabarbaro, syrupo florum, persicorum &c. quæ congestam in primis viis cacochyliam & biliosam amurcam leniter educant sine graviore orgasmo.

4. Vena quoque in brachio alterutro identidem incidenda est, si dolor & calor ingravescant; eo siquidem modo depletis vasis arterie tumori circumjectæ minus turgébunt, atque adeo debilius oscillando calorem doloremque minorem inferent.

5. Egrótanti interdiciendum vino, venere, exercitatione nimia, animi pathematis vehementioribus, alimentis salsis, piperatis, acrioribus, & condimentis quibuscumque; ac dicta imperanda est tenuis, humectans, temperans ex hordeacis, avenaceis, oriza, ossa, jusculis levioribus aut gelatinis, demum ad summum pullis junioribus, gallinis, carne vitulina &c.

6. Usurpanda identidem jacula vel apozemata refrigerantia & diluentia; aquæ chalybeatæ minerales e classe leviorum; balnea vel semicupia in aqua dulci tepida; lac asininum aut vaccinum; serum lactis &c. Imo quod præstabilius est, lac vaccinum pro omni alimento vel continenter, vel frequentissime saltem, & ne ventriculum gravet, potest dosi matutinæ lactis addi aqua secunda calcis ab ℥j. ad iij. vel decoctum amarum foliorum absintii, centaurii, chamædrys &c. ad ℥iij. iv. vel v. vel ante lactis haustum devorari quolibet mane bolus absorbens ex coralliis rubris, oculis cancerorum, cortice Peruviano, lapide hæmatite, terra sigillata, creta, aliisve hujusce generis, quæ singula ad ℥j. exhiberi possunt, si duo aut tria tantum exhibeantur.

7. Carcinomati, si occultum sit, topica nulla remedia admovenda sunt, nec calida, acria, resolventia, quæ calefaciunt morbum aggravant; nec refrigerantia, anodyna, pingua, demulcentia, quæ cutis poros obstitipando & insensibilem diapnoem inhibendo tumoris calorem, atque adeo morbi progressum intendunt per accidens. Sufficit igitur cavere ne tumor frigore constringatur, aut humorem extrinsecus

cus

eus contrahat ab aëre humidiorē, quod utrumque cavere haud difficile est ratione sedis quam tumor occupat.

8. Contra si carcinoma exulceratum fuerit, tunc necessum est ulcus quotidie curare, linamento sicco molliter extergere, decocto Agrimoniae aut Gerani Robertiani eluere, & humoris defluentis ferociam retundere vel saltem mitigare topicis, quae virtute anodyna aut absorbente polleant, modo oleosa non sint. Multigena in hunc finem laudantur remedia, sed cæteris palmam videntur præcipere sequentia: Nutritum ex succo solani hortensis seu vulgaris, vulgo *Morelle*, recentè expresse, & saccharo vel potius Magisterio Saturnino in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo agitando paratum; oleum ovorum recens in mortario plumbeo conquassatum donec nigrescat; lamina plumbea attenuata vel sola, vel Mercurio illita; catro cochlearum terrestrium aut cancrorum fluviatiliū, elixa & ad putrilaginē in mortario plumbeo contrita; Talleolæ carnis vitulinae calentis, catelli retens nati per medium dissecti, & calentes admoti; oleum cranis viridibus per descensum distillarum, addito exsiccatarum ranarum earumdem, bufonum, aut cancrorum fluviatiliū pulvere; remedia omnia ex ruthia, pompholyge, Saturno &c.

9. Debent narcotica, ut opium a gr. j. ad ij. vel iij. iisdem remediis admisceri, si dolor sit nimius, acer, mordax, lancinans. Imo vero interne etiam usurpari debita & conveniente dosi, ut inde dolor efficacius deliniatur, quod de cancro mobili, si acutè doleat, & de occulto dictum quoque volumus.

10. Demum oportet identidem blando cathartico carniū fungosarum, quæ succrescunt, luxuriem reprimere, ad quem scopum efficacissimum esse novimus balsamum, quod chalybis vulgo dicunt, & cuius conficiendi modum infra proponemus ad calcem *Libri 4.* Unguentum enim sive balsamum istiusmodi rodendo absūmit carnes fungosas, leniter tamen quoniam spicula corrosiva spiritus Nitri fermentatione attrita, chalybeatis partibus castrata, oleo olivarum irretita sunt. Quin imo, si ita videatur, potest balsamum illud insulsius insulsiusque fieri, atque adeo minus minusque corrosdens, si repetita saepius ablutione acida spiritus Nitri spicula diligentius eluantur.

C A P U T VII.

De Ulcusculis cancrois sive carie pudendorum, vulgo Chancreis.

§. I. DESCRIPTIO ET DIFFERENTIAE.

Ulcuscula cancrois ab impura venere, quæ pudendorum carnem constituunt, sunt ulcera exigua, superficialia, passim cava, rotunda.

§ 2

Ulcusculorum
venereo-
rum de-
scriptio.

tunda, callosa, contumacia, quæ ex venereo contagio in pudendis succrescunt ac frequenter repullulant.

Insident in utroque sexu variis genitalium locis; in viris quidem frequenter internæ præputii faciei, & dorso vel lateralibus partibus balani; frequentissime ejusdem coronæ vel fræno; quandoque etiam extremo urethræ ductui qui per medium balanum extrorsum porrigitur: In minis vero sæpe internæ faciei labiorum vulvæ seu magnæ fissuræ; sæpissime clitoridi, clitoridis radici, præputio quo clitoris obtegitur, geminæ nympharum seu pterygiorum faciei, carunculis myrtiformibus, vaginæ; quin etiam quandoque extremæ urethræ juxta lacunas.

Initio levis extuberat papula miliaris vel miliarem parum superans, rubra, acuminata, calens, pruriens, cujus apex sensim albescit & complanatur, ac tandem levi apertura dehiscit, unde ichoris quidpiam ejicitur. Continuata dein laborum erosione ulcus crescit, dilatur, excavatur; callis cingitur magis vel minus duris densatisque; pure crasso, viscido, tenace scatet, & similia ulcuscula in vicinis partibus plerumque excitat.

Differen- Differunt invicem ulcuscula istiusmodi: 1. Sede; alia enim ad bal-
tiz. anum, ut ea quæ ejusdem dorsum sive convexitatem, vel quod frequentius, coronam; alia vero ad præputium, ut ea quæ internam ejusdem faciem, aut extremum marginem; alia demum ad utrumque pertinent, ut ea quæ frænum hinc vel inde occupant, quæ præputium cum inferiore seu sima balani parte connectitur.

2. Numero; nam modo pauca sunt & discreta, modo numerosa & confluentia; modo in unum simul collecta confertaque adjacent areatim disposita; modo vero circulari ambitu vel balani coronam cingunt vel præputii radices obsidens.

3. Qualitate; nam alia sunt benigniora, quæ rotunda, superficialia, parum callosa, in fundo albicant, plus laudabile suggerent & labra habent nec rubra, nec extuberantia; alia contra maligniora, quæ figura irregulari & angulosa; cavitate nigra, livescente, atro-purpurea; labris admodum duris, callosis, prominentibus, rubris inflammatis conspicua sunt, ichorosum quid fundunt potius quam pus, & latius altiusque serpunt.

4. Demum causa; alia siquidem superveniunt impuro concubitu sine prævia ulla labe, & proinde a contagio recens admissio; alia vero sine concubitu ullo suspecto, saltem qui recens fuerit, a lue dudum latente inferuntur, & proinde a contagio jam pridem accepto & inveterato dependent.

Ulcuscula Præter modo descripta contingit & in alijs quibusdam partibus ulcuscula

la ejusdem generis quandoque observari, si forte per illas partes virus venereum admissum fuerit. Sic in catamitis; si cum syphiliticis consuescant, ani confinia tam interne quam externe; sic in nutricibus si lactent alumnus infestus, mammarum papillæ, & circulares areæ quæ papillas ambiunt; sic in alumnis si ab impura nutrice lacteant, aut in procis si cum syphilitica amasia columbent, labia, buccæ gingivæ, lingua ulcusculis defædantur cancris, quæ a contagio venereo ortum perinde ducunt, & quæ venerea genitalium ulcuscula ita referunt, ut ovum ovo similis non sit.

in aliis
locis
quam in
pudendis
aliquan-
do na-
scentur.

§. II. CAUSÆ.

In impuro concubitu non modo balanus præputiumque, quo balanus contegitur, sed etiam penis totus, imo non raro pubes ipsa solent in viris obijci virulento humori, quem mulier infesta emittit dum venere colliquefcit, vel quo fordent illota muliebria. Nec dispari quoque ratione non solum vagina & vulva & variz illarum partium rugæ & caruncula, sed externa quoque pudendi facies, totumque interfœmineum solent in fœminis perfundi corrupto semine, quod vir ejaculatur, vel virulento pure, quod e cancris penis ulcusculis manat. Verum licet omnes genitalium partes communi offerantur periculo, constat tamen singulis parem inde labem nequaquam inferri. Ulcuscula enim venerea, ut modo dicebamus, in viris balano quidem, balani coronæ, fræno & internæ præputii parti insident, numquam vero externæ ejusdem faciei aut reliquæ cuti, qua penis vestitur: In fœminis vero vaginæ quidem aut vulvæ interiora occupant, numquam vero pudendi exteriora. Hinc ergo consequens est, latere quid in illis locis peculiare, unde virus quod a cæteris partibus lædendis abstinet, possit in illas efficacies agere.

Ulcuscu-
la vene-
rea certa
loca pu-
dendo-
rum affe-
ctant.

Obviæ tantum prostant causæ duæ, a quibus discrimen deduci possit, situs nempe illarum partium, & peculiaris earundem structura.

I. Fit quidem situ, ut balani & interna præputii facies in viris; in fœminis vero vaginæ & vulvæ interiora semine virulento in concubitu magis madefiant, eodem, nisi eluatur, diutius perfundantur post concubitum; & idcirco illius energiz & efficaciz inde magis pateant præ cæteris partibus. Sed hanc priorem causam, quamquam ad ulcuscula in memoratis partibus frequentius producenda conferre valeat, solam tamen sufficere minime credimus, ut in illis tantum locis producantur.

Non ra-
tione si-
tus aut
declivi-
tatis lo-
corum
illorum.

1. Quod cutis penis & externa præputii facies in viris; externa vero pudendi labia & totum interfœmineum in mulieribus, licet virulenti fœminis contactui non tam forsitan pateant in concubitu, nec semen vitiosum, quo semel madent, tum diu retineant opere confecto, quam balanus & internum præputium, aut vaginæ & vulvæ interiora; nec ideo possint tam frequenter ulcusculis infestari; ac saltem nisi alia obstitit

ratio, deberent aliquando ulcusculis & ipsa affici, cum certum sit & ipsa feminis virulenti contactui & efficaciz satis diu objici, quod tamen repugnat experientiz.

2. Quod hæc ipsa genitalium loca, ubi ulcuscula pullulant, modo opere confecto statim eluerentur, vix ullum a situ detrimentum pati deberent præ cæteris genitalium partibus, quæ in concubitu virulento femini perinde obviæ fuere. Docet tamen experientia etiam cum ea cautione, quæ videretur discrimen æquatura, ulcuscula in illis locis non raro, in aliis vero nunquam enasci, quod proinde videtur non ex solo situ sed ex alia penitioris causa repetendum esse.

3. Quod utcumque res se habeat, in impuro concubitu, & in ulcusculis quæ concubitu contrahantur, ac saltem omnia paria futura sint si ulcuscula citra concubitum a syphilide latente sponte progerminant. Constat tamen etiam in illo casu ulcuscula in certis tantum genitalium locis enasci intactis aliis, quod tunc evidens est a partium situ minime dependere.

Sed ratione structuræ peculiaris, quæ in illis locis conspicua est.

II. Liquet ergo ex causa altera, scilicet peculiari structura partium quæ solent ulcusculis infestari, deducendum esse, cur certo discrimine partes illæ præ cæteris genitalium partibus huic malo singulariter obnoxie sint.

Docet autem Anatomia in viris internam præputii totamque balani faciem, sed præsertim fræni latera & coronæ peripheriam; in fœminis vero internam faciem vulvæ & caruncularum omnium quæ in vulvam prominent, ipsumque vaginæ principium & myrtiformes carunculas, quæ vaginæ adstant, densissime consterni vasculis numerosis, minutissimis, vix semi-linea profundis, parallelis, cylindricis, cavis infima parte cæcis, altera extrorsum dehiscensibus tenui osculo, quæ a circumfluo sanguine humorem pinguem album, sebaceum, virosolum secernunt secretumque stillatim evomunt, unde partium lævitas, sensus mollities, lubricitas jugiter fovetur, sed unde si loturæ parcatur sordes brevi cumulantur subalbidæ, oleosæ, fœtidi & gravioris odoris. Inde ergo pronum est conjicere descripta vascula venereo seminio peculiariter objici; humore sebaceo quem continent, simul ac inspirato contagio venereo corruptus fuerit, dilatari, inflammari, erodi, exulcerari, uno verbo ulcusculis cancriosis infestari, quorum vera sint & propria sedes. Sed de his fusius infra.

Ut multis probatur.

Huic autem conjecturæ multa suffragantur. 1. Quod venerea ulcuscula in iis tantum genitalium locis observentur, quæ descriptis vasculis sive potius incerniculis confita sunt; nulla vero in cæteris eorundem partibus, quorum dispar structura.

2. Quod ulcuscula eadem, quæ in aliis quibusdam corporis partibus quandoque conspicua sunt, si virus per hæc loca admissum fuerit, partes

cas

cas tantum infestent, in quibus similis est similibus incerniculorum sive vasculorum fabrica & dispositio; v.g. confinia ani, ad quem prostant sebaceæ plurimæ glandulæ, unde profuit humor ille subpinguis, quo podex oblinitur; mammarum papillas aut papillarum areas, in quibus latent glandulæ consimiles, quæ humorum fundunt unguinosum; oris labia, buccas, gingivas, linguam &c. in quibus singulis constat similem adesse similibus vasculorum sive incerniculorum apparatus.

Ex his sequitur sola supra cutim adhæsiōe seminis vel seminalis humoris viscidī corruptique a coeuntibus emissi virus exulcerandis genitalium partibus inspirari seu ut expressius dicam, in cava vasculorum modo descriptorum guttatim illapsum humori, quem continent, latenter instillari.

Inde est 1. Quod ulcuscula iis genitalium partibus potissimum insideant, quæ vitiosi humoris attactui magis obnoxie sunt, & in quibus virulentus humor pertinacius hæret: In viris scilicet inter præputium & balanum; in fœminis vero inter vaginæ rugas, variasque vulvæ plicas sive carunculas.

2. Quod iis viris frequentius accidant, quibus longius & amplius præputium balanum & humorem, quo balanum madet, ætius comprehendit; rarius vero circumcisis & apellis, quibus arte præciso præputio, aut verpis, quibus præputio natura brevior glans detecta est, unde facilius extergitur.

3. Quod idem & in fœminis quoque observari videatur, quarum cæteris paribus ulcusculis illas præsertim infestari compertum est, quibus ampliora pterygia vaginam strictius occludunt, ideoque virulentum semen, quod infusum est, pertinacius retinent.

4. Demum quod ulcuscula rarissime affligant, si post suspectam coitionem genitalia vino, aqua vel lotio quam citissime mudentur & eluantur; contra vero sæpissime, si illota tradantur pudori & spurcitiei.

Modo dicta volumus tantum de illis ulcusculis intelligi, quæ solent coitui impuro immediate succedere; nam cætera quæ citra concubitus, saltem qui suspectus sit, a lue jam pridem latente sponte repullulant, ea sane produci manifestum est, non ab alieno semine, quod extrinsecus adveniat, sed a semine venereo quod jam dudum sanguini insit, & quod a vitio sanguine humori sebaceo descripto circulatione latenter subministratur.

Id unum miri subest a veneno eodem genitalibus simili ratione afflicto affectiones tam diversas in diversis, modo gonorrhœam, modo bubonem, modo ulcuscula cancroſa, modo hæc omnia simul inferri. Sed videtur nodus illa expediri posse gemina differentia quæ in veneni efficacia intercedit, altera penes diversam vim, qua pollet virus, quod agit;

Explicatur, quo modo, contagium idem diversos diversimode afficiat;

altera penes diversam partium, in quas agit, constitutionem.

1. *Differentia* quidem penes diversam veneni vim & indolem; nam si ita spissum crassumque sit, ut cuti hæreat, impactum, nec ulterius penetret, in eo casu poterit ad summum ulcuscula cancrofa producere in vascula sebacea cuti subiecta sensim illabendo. Si vero tenuius sit, ideoque ad humorem sebaceum coagulandum & ulcuscula producenda minus efficax, sed altius subiens cum limpha subter cutem circulante commisceatur, bubonem quidem excitaturum est in glandulis inguinalibus, quo una cum limpha convehitur; nullam tamen gonorrhœam, quoniam præ spissitudine in vaporosos halitus resolvi non potest, quibus urethræ interiora & præsertim feminis conceptacula impetantur. Demum si valde subtile fuerit & penetrans, tunc illibatis sebaceis vasculis glandulisque inguinalibus, quia nec humori sebaceo, nec limphæ coagulandis præ tenuitate compar est, vapore halituoso, in quem fere totum exhalat & attenuatur orgasmo concubitus, conceptacula feminis aggreditur, atque virulentam gonorrhœam inferet. Quod si multigenum fuerit, partelque habeat penes tenuitatem variantes, in illo casu vel tres memoratos affectus, vel binos saltem una simul poterit inducere, ut in praxi frequenter observatur.

2. *Differentia* vero penes diversam partium constitutionem; nam virus idem in hæc aut illa loca efficacius vel inefficacius agit, unde ulcuscula, bubones, gonorrhœam varie illaturum est, prout sebacea genitalium vascula, ubi ulcuscula, magis vel minus patula aut laxa erunt; inguinales glandulæ, ubi bubones, magis vel minus densatæ, compressæ, ad infarctum faciles; demum seminaria conceptacula, ubi gonorrhœæ fiunt, magis vel minus hiulca, aut concipiendæ ulcerosæ inflammationi magis vel minus comparata erunt; quæ cum millenis modis & invicem variare, & cum diversâ seminii morbofi qualitate & indole possint concurrere, inde infinita diversitas debet emergere, qualis ex eodem concubitu in generandis morbis veneris in variis varie observatur.

§. III. SYMPTOMATA.

Ulcusculorum
venereorum
symptomata.
3. Illapsus
conjugii vene-
neri in
glandulas
sebaceas.

1. Dum genitalia madent humore virulento, debent tenuissimæ quædam guttulæ per angusta vasculorum sebaceorum oscula intro subire tacito illapsu in hæc aut illa, in plura vel pauciora, in conjuncta vel discreta, prout diversâ diversorum vasculorum orificia magis vel minus hiulca sunt, aut prout humor copiosior certis locis casu adhæret, vel ad illa declivitate confluit. Idem dictum volumus de veneno venereo quod a circumfluo sanguine sebaceis vasculis latenter subministratur, cum ulcuscula sine prævio impuro concubitu oboriuntur in genitalibus.

2. Illapsæ sensim guttulæ sebaceum humorem, qui natura oleosus est; vitio

vicio contaminant gemino tum acidis aut acido-salis partibus inspissando, tum spiculis corrosivis acrem efficiendo.

3. Hinc ergo sebaceus humor jam viscidior, cum e solitis osculis nequeat pro more extillare, sensim congeritur, & incernicula seu vascula in quæ coacervatur, paulatim distendit, inflat, & in papulam miliarem & acuminatam fastigiat.

4. Compressis inde a dilatato vasculo extremis arteriarum capillarum & primis venarum radicibus, quæ juxta serpunt mutuo invicem coalescentes, sanguis intercepta via & in suis ductibus hæreere & in collateralia vala lymphatica via vi facta irrumpere cogitur, unde rubor, calor, inflammatio papulæ.

5. At simul ex altera parte sebaceus idem humor jam acrior & calore inflammata papulæ in motum vehementiorem actus, vasculi quo concluditur, interiora debet impetere ac sensim erodere, unde prima labe apparet in summo apice, ut qui tenuior sit.

6. Itaque papulæ fastigium semi-putre nec amplius sanguine circumfuso perfundi, ideoque deposito rubore inflammatorio albescere; nec laxatis fibris semi-laceris tendi ut ante poterit, ideoque in se subsidet, unde color albus & complanatio summæ papulæ.

7. Decisa sensim albicante pellicula, quæ fastigium convestit, papula angusto ostiolo dehiscet. Sic ergo papula in verum ulcus degenerabit, unde manebunt guttulæ ichoris viscidæ & purulenti ex sebaceo humore corrupto detritisque vasculi laciniis.

8. Continuata earumdem causarum energia tenuissimum ulcusculum crescet & ampliabitur in omnem loci differentiam, atque adeo latius fiet & profundius.

9. Interim partes contagii acido-fixæ ulceris ambitui insinuatæ lympham circumfluam inspissabunt & callos producent, qui sensim suppuratione colliquefcentes ulcus nova accessione ulterius proferent. Sic ergo in pudendis ulcuscula contumacia, callis obstita, sensim serpentina progerminabunt.

10. Pari similique mechanismo venerea ulcuscula ejusdem generis & in aliis quoque partibus nasci solent, si virus illac admissum fuerit, similisque in illis proster vasculorum sebaceorum apparatus, ut in ani confiniis, mammarum papillis arcisque papillas ambientibus, labiis, buccis, lingua, palato, columella, gargarone &c.

11. Creduntur vulgo purulenta materia quæ ab uno ulcere exeat, vicinæ partes quibus adhæret, labe eadem contaminari. Et factum aptum natum est; haud mirum foret nova inde ulcuscula in eodem subjecto produci, cum certum sit experientia ab eadem materia ul-

2. Inspissatio humoris sebacei a contagio illabente.

3. Hinc papula miliaris.

4. Cum calore, & rubore.

5. Quæ sensim in apice dehiscit.

6. Et tunc subsidet.

7. Et exulceratur.

8. Unde ulcus in genitalibus.

9. Cum callis multis, quibus cingitur.

10. Quæ pari ratione & in aliis locis accidunt.

11. Creditur a pure quod inde exsudet, nova

cu-

ulcuscula excitati. 12. Inde vulgari fertur opinione ab unico ulcusculo, nisi probe munde-
 13. De quo jure tamen dubita-
 tur.

13. Ulcuscula orbicularia & mucosa alba in medio. 1. Ulceris ambitum lentius rodet; hinc minore & magis superficialia erunt ulcuscula, & primævam vasculorum sebaceorum figuram orbicularem constantius retinebunt: 2. Lympham ulceri circumfluentem ignavius inspissabit; hinc calli pauciores, minus duri, minus compacti, ideoque labra molliora, minus protuberantia, quæ lympham ulceribus suggerent uberiorem & spissiore, unde pus laudabile. 3. Demum sebaceum humorem, qui instar mucæ spissioris in fundo hæret, minus alterabit; hinc ergo mucosa materia, quæ ulceris fundum occupat, colorem album, qui nativus est, servabit donec sanatio certa sit.

14. Ulcuscula angulosa & in centro livida. 14. Contra vero, si virus copia nimium vel natura acerrimum fuerit, tunc ratione contraria 1. Ulcerum oram citius & efficacius erodet, unde ulcuscula profundiora & latiora, imo etiam minus rotunda, quoniam celeriore erosione ulcerum labra laciniatim dissepentur; 2. Lympham fortius densabit, unde calli plures, crassiores, duriores, adeoque labra duriora, magis prominentia, e quibus non lymphæ, quæ puris formam adipisci possit, sed serum tantum ichorosum in ulcera exsudabit. 3. Denique nativum colorem mucosi seu sebacei humoris qui in fundo latet, vel pervertere innato vitio, vel infusis cruoris guttulis, quæ a laceris labris extillant, inficiet, unde fundi nigror vel saltem livor.

15. Magis aut minus maligna pro sede quam occupant. 15. Si cætera paria fuerint, at saltem debet ulcusculorum indoles ex diversa sede quam occupant, diverse æstimari; nempe 1. Maligniora sunt in genere ea ulcuscula quæ præputio in viris, quam quæ balano; quæ clitoridi aut carunculis myrtiformibus in scæminis, quam quæ vulvæ labiis aut nymphis: 2. Maligniora in balano quæ ejusdem frano vel coronæ, quam quæ dorso aut lateralibus partibus: 3. Denique maligniora in præputio quæ summo ejusdem margini sive limbo, quam quæ mediz vel infimæ ejusdem parti insident. Nec ratio discriminis obscura esse videtur, siquidem priora loca, cum magis nervea sint, ideoque sensu gaudeant acutiore, debent facilius inflammatione corripri ex dolore & erythismo, si ulcusculis infestentur: Contra vero posteriora, quæ mollioris & magis spongiosæ texture sunt, ac sensu polleant obtusiore, ab inflammationis periculo magis tutata sunt.

16. Demum si ulcuscula venerea plura sint, densa, conferta & maligni moris, solent inde genitalium partes quas depascuntur, balanūs v. g. & præputium in viris, in fœminis vero vaginæ principium, caruncula myrtiformes, nymphæ sive pterygia, clitoris, vulvæ labia inflari, tumere, inflammari, unde phimosis, paraphimosis, crystallina, carcinoma balani, gangræna & sphacelus. Sed de his sigillatim in sequentibus.

§. IV. DIAGNOSIS ET PROGNOSIS.

Diagnosis circa tria versatur; naturam, causam & differentias ulcusculorum venereorum.

1. Facilis est diagnosis naturæ morbi ex descriptione supra allata. Itaque pro venereis habenda sunt ulcuscula quæcumque in descriptis genitalium locis subnascuntur, rotunda, orbicularia, callosa, contumacia, ultra cutem profunda, in fundo plena albicantis vel livescantis mucii.

Solene quidem in iisdem partibus citra venereum contagium excoriationes interdum fieri, si cum muliere res habeatur, cui menstrua acriora actu fluant, vel paulo ante fluxerint, aut quæ fluore muliebri mordacire laboret; imo etiam sine concubitu, si nimia fuerit acrimonia humoris, qui e sebaceis vasculis scaturit in viris, & sub præputio in sordes colligitur, nisi eluatur. Sed excoriationes huiusmodi ab ulcusculis venereis ex eo distinguere facile est, quod cutem superficialiter tantum lambant, quod late & irregulariter serpant, quod nullis callis obsideantur, & quod cito exsiccentur vel sponte vel sola lotionem cum vino solo aut cum herbis vulnerariis insulo.

Contingit etiam, quamquam rarius, in iisdem locis ulcera generari vulnere, abscessu, rosione, perinde ac in cæteris quibusve partibus, sed hæc ulcera ab ulcusculis venereis in eo evidenter discrepant, quod lata, irregularia, profunda sint, sine callis in ambitu, sine mucositate in fundo; uno verbo quod notis cæterarum partium ulceribus adamusculis similia sint, ideoque ulcusculis venereis tanto magis dissimilia.

2. Quod ad causam, abunde liquet ulcuscula venerea contagio venereque produci: Ambigitur tantum utrum contagio recentem admissum impuro concubitu, an vero lue dudum latente producantur; sed ea quæstio ex ægrotantium confessione dirimenda est.

Quod si ægrotantes, ut culpam celent, malint lue jam pridem conceptæ morbum adscribi, quam recentiori stupro, quod crimine non vacaret, ut familiare est mulieribus quæ jam viduæ sunt; imo etiam viris, qui ex nupero vitæ instituto castitatem voverunt: poterit tamen etiam in eo casu rei veritas si non certe, ac saltem ex conjectura colligi. Itaque si ulcuscula in viris frænum, in fœminis carunculas myrtiformes, nymphas aut clitoridem occupent; si multa maligna & conferta sint; si stadia percurrant cum celeritate, hinc probabile est recenti concubitu contracta fuisse,

16. Phimosis, paraphimosis, crystallina, carcinoma balani.

Diagnosis morbi.

Diagnosis causarum morbi.

cum

cum ea quæ a latente lue dependent præputii frænum, aut vulvæ & vaginæ carunculas non affectent præ cæteris pudendorum partibus; pauca, discreta, benigna plerumque sint; ac tarde ut plurimum judicentur.

Diagnosis differentiarum morbi.

3. Demum ulcusculorum differentia obvia sunt, & inspectione sola patet an multa vel pauca; discreta vel conferta; areatim disposita vel circulari ambitu distributa; multum vel parum callosa; rotunda vel angulosa; in fundo albicantia vel liventia; uno verbo benigna vel maligna sint.

Paulo difficilior est ulcuscula dignoscere, quæ internum extremæ urethræ ductum occupant, & quæ oculis obvia non sunt. Et sane ideo contingit non raro cum gonorrhœa confundi, cum in utroque affectu similia symptomata, dysuria, dolor in erectione, puris effluxus &c. perinde urgeant. Errorem tamen licebit effugere, si attendatur 1. In ulcusculis internis extremæ urethræ pus parcius effluere, quam in gonorrhœa; 2. Dolorem tunc non in perinæo ut in gonorrhœa præsentiri in erectione, sed in extremo cole; 3. Doloris & proinde morbi sedem ab ipso ægroto plerumque indicari ad radicem glandis; 4. Imo posse commodè ulcus ipsum explorari vel solo tactu si callosum sit, vel saltem specillo aut candela cerea in urethram immissa.

Prognosis ulcusculorum venereorum.

Prognosis. 1. Ulcuscula venerea benigna, utcumque contumacia sint, ex se tamen periculo vacant, cum ea labes, quam partibus inferunt, & exigua sit, & remediis sponte obvia.

2. At vero gravia & periculosa sunt, quoties plura, conferta, maligna phagædenica sunt, potissimum si præternaturales præputii aut balani in viris; in feminis vero earum pudendi partium, quas obsident, tumefactiones inferant, unde phimosis, paraphimosis, crystallina &c. de quibus *cap. sequenti*, §§. 1. & 2.

3. Tandem pro deploratis habenda, si ex tumefactione nimia, aut acrioris contagii venerei rosione prima appareant incipientis gangrænæ signa in partibus tumentibus aut exulceratis, cum huic morbo mederi nulla arte liceat, nisi periculosa extirpatione, ut videbitur *cap. sequenti* §. 3.

4. Cæterum ulcuscula omnia, utcumque mitissima videantur, id proprium habent, quod luem vel præsentem attestentur, vel futuram prænuntient. Præsentem quidem attestantur, si sine suspecto concubitu appareant, quoniam a latente veneno ea produci necessum est. Futuram vero prænuntiant, si ab impuro concubitu immediate producantur, quoniam intro admissum virus arguunt, quod a sanguine semel exceptum nec parciore pure ab ulcusculis manante satis unquam exhaustum, luem veneream tandem aliquando tardius citiusve illaturum sit.

5. Nihilominus tamen ultro confitendum compertum esse experientia nonnullos, qui veneris ulcusculis olim laboravere, vitam deinde omnem

omnem transigere a quocumque luis symptomate plane immunem, quod suscepta veneni quantitas remediis forsitan olim discussa sit, sive quod optima, qua illi valent, constitutione sensim in sanguine domita fuerit atque superata, ut supra vidimus *Cap. 5. Libri II.*

6. Quapropter et si ulcuscula venerea, si olim prægressa sint, latentis luis venereæ suspicionem jure impartare videantur, haud tamen licet hoc unico argumento ægrum frictionibus præcipitantiis damnare, nisi simul accesserit adminiculi instar pathognomonicum quoddam symptoma, vel æquivocorum symptomatum talis syndrome quæ pathognomonico signo æquipolleat, unde possit latentis luis veritas certius colligi, ut infra videbitur, *Lib. IV. Cap. 4.*

§. V. CURATIO.

Si ulcuscula, quæ cæriem pudendi constituunt, a latente lue dependeant, infectis una salus est, morbum quam ocyssime frictionibus eradicare juxta methodum infra tradendam. Frustratio enim non curatio esset virus levioribus remediis oppugnare, quod mitigationem nullam, quæ diuturna sit, admittit, & quod si aliquando sopiri videatur, solet inde brevi ferocius recrudescente.

Imo vero ad ipsa ulcuscula, quæ a recenti concubitu producuntur, tutissimum foret eamdem methodum statim experiri, cum eo tantum modo virus quodcumque sanguini inest, perfecte educi aut extinguere possit sine ullo recidivæ periculo, quod ab aliis methodis haud ita certo expectare liceat.

Attamen quoniam ægrotantes ab operosiore frictionum methodo plerumque abhorrent, quippe qui leviulculo malo se affectos esse arbitrantur, cogimur. ut plurimum breviori via curationem aggredi juxta therapejam modo tradendam, quæ licet ad ulcuscula, quæ ab inveterata lue dependent, parum utilis sit, plerumque sufficit curandis aliis ulculculis, quæ a recentiore causa producuntur.

Porro autem juxta eam methodum tribus indicationibus satisfaciendum est: Primæ; ut phlogosis pudendorum, qualem uber ulcusculorum progerminatio inducit, caute temperetur & compescatur, ne balanæ aut præputium in viris, vagina aut vulva in fœminis in consortium inflammationis trahantur: Alteri; ut virus, quod in sanguinem forte transfusum est, celeriter alteretur & corrigatur, vel eliminetur, ne mora invalescens sanguinem labe inficiat: Tertiæ demum; ut externa genitalium ulcera probe detergantur & mudentur, atque emolliatis & discussis callis cicatrice feliciter obducantur.

I. Primæ quidem indicationi multa conducunt. 1. Venæ sectio, qua præsentius nullum est remedium ad inflammationem præcavendam, & quæ ideo, spreto inani Antiquorum præjudicio, debet in eo casu

Curatio
ulcusculorum.

I. Therapeja ad
primam

indicatio- casu pluries iterari ex alterutro brachio, pro agrotantis viribus, nem, hoc ætate, temperie &c. & pro morbi vehementia, gradu, periculo &c.

2. Frequens pudendorum, quæ male afficiuntur, ablutio, deterfio, fons cum decocto radicum althææ, nymphææ &c. seminis lini, florum malvæ, aut cum lacte tepido.

3. Admotio topicorum, quæ anodyna sint, de quibus fufe infra ubi de inflammatorio præputii aut balani tumore; quæcumque enim præfenti inflammationi medentur, possunt hæc eadem tanto facilius imminenti occurrere.

II. Therapeja ad indicationem alteram, hoc est ad virus debellandum.

II. Ad alteram indicationem 1. Utilis est Mercurialium usus, qualem supra proposuimus ad curationem gonorrhœæ Cap. 11 sive interne assumantur præparata ex Mercurio, ut Panacea, Ethiops mineralis, Mercurius violaceus &c. sive externe tantum adhibeantur leviores infusiones cum unguento mercuriali identidem repetitæ.

2. Præposito Mercurialium usui, qualicumque fuerit, cætemus insistendum, donec prima appareant imminentiis pyralismi indicia, quæ ut cohibeantur æger statim purgandus est. Iterandus deinde Mercurialium usus & suo quoque tempore iteranda purgatio: Sic pluries alternando pro morbi natura ac Medici prudentia.

3. Verum per id tempus cavendum est, ut supra monuimus, ne liberior aer frigore aut humore motam a Mercurialibus perspirationem coerceat: Hinc enim rheumatismi, catharthi, imo & periculose ad interanea fluxiones inducerentur.

4. Post sufficientem Mercurialium usum, modo adiposa ægri constitutio permittat, aut suadeat pituitosa temperies; pituitosa sudorifica de qua supra, ex radicibus Chinæ & Salsæparillæ, lignisque Guajacæ & Sassafras, & pulverato antimonio decoctione parata, utilis erit ad exsiccanda ulcera & reliquias contagii exstinguendas. Cavendum tamen ne cum Chirurgorum vulgo agrotantes quivis nullo discrimine acriore hac pituita ingurgitentur seu potius torrantur.

III. Therapeja ad tertiam indicationem hoc est ad detergenda & consolidanda ulcera.

III. Tertia indicatio tria intendit, 1. Ut ulcera probe detergantur; 2. Ut calli, si qui post deterfionem supersint, discutiantur & resolvantur; 3. Denique ut cicatrix firma obducatur.

1. In eo consistit optata deterfio ut mucosa seu sebacea materies, quæ ulceris fundo impæcta inhaeret, avellatur & interna ulceris facies ita renovetur vel saltem mundetur, ut roseo colore suffundatur, qui carnis probæ notæ succrescentis & ad cicatricem properantis indicium est.

2. Si mucor paucus sit, lævis, albus, mollis & rarus, poterit extirpati levioribus catharticis, ut solutione simplicis vitrioli Cyprii, collyrio vulgari Lanfranci; aqua quæ collyrii Lanfranci vicaria est & quæ ad pudendorum caviem paratur ex aluminis rupei partibus

iii.

iii. & eruginis parte in .s. q. vini rubri decoctus; vel unguento sequente quod a multis laudatur.

R. Lapidis calaminaris, 3℔.

Sulfuris

Et argenti vivi ana 3j.

Terebinthinae q. s.

M. In formam unguenti, add. tantillum oxungie suille non salita.

3. Plerumque tamen ad cathartica fortiora confugiendum est, ut densus & compactus mucor, qui ulceris fundum pertinacius occupat, radicibus evellatur. Istiusmodi sunt lapis causticus vulgaris, vel lapis infernalis ex solutione argenti paratus, quibus ulcera levi & suspensa manu attinguntur; vel quæ cæteris palmam præcipiunt præparata varia Mercurialia, quibus ulcera insperguntur, ut præcipitatum rubrum vel flavum iterata spiritus vini deflagratione prius mitigatum, & cum æquali cerussæ pulveris parte commistum; imo vero præcipitatum album, non modo paræ artificialio edulcatum, sed etiam quoniam acrius est, cum ovi vitello igne indurato, & paucò melle Narbonensi ad unguenti formam in mortario marmoreo pistum & subactum.

4. Phlogosis, quam admota ea remedia rodendo inserunt, temperanda, si gravior sit, lacte tepido; decocto radicum althææ & asympæ; aut mucagine seminum psyllii & lipi aqua rosarum extracta &c. fovendo; vel cremore lactis recentis; vitello ovi aut solo, aut cum oleo liliorum subacto; albo rhasis, cataplasmate de mica panis &c. apponendo. Hæc autem sæpius iteranda, ut pars calens perpetuo & madeat & relaxetur.

5. Delapsus escharæ, si lentius procedat, promovendus butyro recenti, vitello ovi, digestivo simplici vel unguento basilicone cum oleo ovorum temperato: Eisdem quoque fini conducunt cætera omnia remedia ex anodynorum familia, quæ primo articulo enumerata sunt, ut quæ emolliendo suppurationi saveant, atque adeo escharæ putrescentis sejunctioni a subiecta carne.

6. At quancumque a nonnullis fiant hætenus laudata remedia; usu communi cæteris omnibus præfertur unguentum *europisor* sequens, ex præcipitati rubri probe loti parte j. & unguenti basiliconis partibusvj. vel viij. in mortario marmoreo pistis & una subactis, quod cæteris efficacius & tutius est; nam ferocia Mercurialium & corrosivorum partium balsamicis unguenti basiliconis partibus ita temperatur, ut blanda erosione superficiatiam tantum escharam inurant sine phlogosi ulla, & simul erosa pars a basilicone ita emolliatur, ut inusta eschara levior frustulatim cito decidat sine notabili ulceris incremento.

7. Vitanda semper cane pejus & angue escharotica fortiora; ut arsenicalia

calia præparata omnia; Mercurius sublimatus corrosivus; oleum glaciale vitrioli; aquæ stygiæ sive fortes ex nitro, vitriolo, alumine, sale marino ignis reverberii tortura distillando prolicite; aqua mortua sive secunda aurificum, qua jam solutum fuerit argentum, & dein injecto cupro præcipitatum; aliaque hujusce generis multa, quæ escharam profundiores inurunt, & graviores inflammationem excitant.

8. Si qui leviores calli in ulcere detergo & mundificato supersint, præstabilis est eos levi unguenti mercurialis seu Neapolitani inunctione per dies aliquot iterata sensim resolvere & discutere, quam nimio fortiorum cathetericorum usui pertinacius insistere, ut consumantur; cum inde, & æger inani dolore torqueatur, & parti notabile detrimentum accedat ulceris amplificatione.

9. Ubi primum totus ulceris ambitus remoto mucore & mollitis callis, mollis, lævis, roseus videbitur, a cathæreticis caute abstinendum, quæ rodendo ulcus perennarent, imo dilatarent; sed traumaticis sive vulnerariis tantum insistendum, quæ carnum succrescentium progerminationi faveant, ut balsamo Arcei vel unguento simplici de basilicone.

10. Ulcus succrescente carne semel complanatum in cicatricem facile coibit eorundem remedium usu. Si tamen e re ita videbitur, poterit inspergi pulvere tuthiæ, pompholygis, cerussæ, terebinthiæ aduritiam coctæ & pulveratæ, vel soveri elyxirio proprietatum Paracelsi, cujus efficaciam nonnulli ad hanc rem miris laudibus deprædicant.

11. Quod si morbus ægri negligentia aut incuria, nimia remedium quæ adhibentur ferocia, errore diætiæ, usu rerum venerearum, aut alia quacunque de causa ingravescat, & inflammato præputio vel balano in viris, aut pterygiis, carunculis vel clitoride in feminis, urgentiora accidant symptomata; tunc ab escharoticorum usu desistendum, & intermissa curatoria therapeja solis palliatis aliquandiu utendum est; ut videbitur *sequente Capite*.

12. Debent simili methodo curari ulcera venerea quæ ad urethræ finem solent aliquando interne nasci, scilicet remedia eadem eodem ordine eademque cautione in urethram guttatim instillando, vel syphone breviorè immittendo, vel penicillo introducendo, quæ toties in die iterari debent, quoties vel loci declivitate vel lotii emissionem partem abstergi contigerit. Cavendum enim ne ad continendâ unguenta urethræ ductus turunda obturetur, ut a Chirurgis interdum peccari novimus profecto ægrorum infortunio, cum virulenta materies quæ ab ulceribus extillat, introrsum ea ratione coerceatur, & rodendo quæ sana sunt, morbum sensim augeat.

13. Cæterum toto curationis stadio mentula circumligato cingulo linteo supina suspendenda est, ut viz declivitate motus liberior sit sanguis

ni regressuro, quam ex prona sive pendula, adeoque levius imminuat inflammationis aut tumefactionis periculum. Quod ad dietam vero, sufficit temperantem, humectantem & mediocrem imperare, nisi forse febris inflammatio aut aliud quodcumque gravius symptoma tenuiorem suadeant.

CAPUT VIII.

De Affectibus variis, qui ab Ulcusculis veneris genitalium dependent, vel iisdem superveniunt.

§. I. DE TUMORIBUS PRÆPUTII ET BALANI

UBI DE PHIMOSI, PARAPHIMOSI ET CRYSTALLINA.

Descriptio. Si ulcuscula, quæ internam præputii faciem frænumprio. ve, aut ipsum balani dorsum coronamve obsident, multa, conferta, maligna, dolorifica sint, aut fortiorum escharoticorum abusu nimis irriterentur, contingit inde gliscente labe ut vel præputium, vel balanus, vel uterque simul brevi infletur, crassefcet, tumeat.

I. Præputium autem balanulque, cum inflantur, 1. Modo calent, dolent, rubent, prementi digito ægre cedunt, & cessante pressione prompte restituuntur; atque tumor ille inflammatorius sive pblegmonodes.

2. Modo vero caloris, doloris, ruboris expertia videntur quasi pelucere sero turgida, & prementi digito ita cedunt, ut impressum vestigium diu retineant; atque tumor ille serosus sive edematodes.

3. Denique modo caloris, doloris & ruboris expertia quidem sunt, sed simul ita renitentia ac dura, ut digiti pressionem eludant; atque tumor ille durus seu skirvodes appellatur.

II. Porro præputium, quacumque ratione intumescat, modo in extremo limbo coarctatum glandem ita stricte concludit, ut ad posteriora deduci non possit, & ille status græco nomine *phimosi* dicitur, hoc est *ligatura*: modo vero pone balani coronam retractum ita corrugatur & constringitur, ut ad anteriora adduci nulla arte queat; & status ille præcedenti contrarius, *paraphimosi* appellatur, hoc est *circum-ligatura*.

III. Pari ratione qualiscumque fuerit balani tumor, solent non raro, si infarctus gravior & diuturnior sit, ex ejusdem facie quæ in paraphimosi denudata est, vel ex margine præputii quo contegitur in phimosi hydatides emergere seu *bulle aqueas & crystallina*, quæ plenæ limpha tenui vel crassa, limpida vel subrussa, opaca vel diaphana, sola vel cum aere permista; numero, magnitudine, prominentia variæ, modo summum glandis apicem, modo coronam, modo dorsum, modo latera occupant; quin imo efflorescunt quandoque in phimosi & paraphimosi ex ipso præputio præputiive fræno.

Hæc autem singula non virorum tantum propria sunt, sed mutantur Nam Partes similesque affe-

Etiones
observan-
tur tum
in femi-
nis.

dis mulieribus quoque communia ex eadem causa.

Nam. 1. Vulvæ labia nymphæ sive pterygia, clitoris ac clitoridis præputium, & carunculæ myrtiformes quæ vaginæ ostium obvallant, si ulcusculis defædentur malignioribus, tument & inflantur pari modo ac præputium aut glans in viris; tumorque inde obortus simili prorsus ratione inflammatorius, *œdematodes* vel *skirrholes* est.

2. Quod si carunculæ myrtiformes aut vaginæ ostium ulcusculis gravioribus tentari contigerit, inde gravis superveniet vaginæ coarctatio ligaturam referens, quæ *phimoseos* nomen jure meretur.

3. Imo vero prodeunt interdum ex tumentium partium superficie hydatides seu vesiculæ lymphæ plenæ, quæ *crystallinus* virorum *bullas*

Tum in
cinzdis.

figura, qualitate, natura referunt. 4. Simile quid in catamitis pathicisque observatur, si in ano ex impura venere ulcera carœthea contrahant: Inde enim, quandiu ulcera sæviunt, & gravem extremi recti inflammationem, & morbosam podicis arctitudinem seu *phimosis* experiuntur.

Tum in
mammiis
nutri-
cum, quæ
lactando
inficiun-
tur.

5. Demum nec dispar est nutricum conditio, quæ lactando virus concipiunt; nam experientia compertum est mammarum papillas, si ulcusculis venereis basim depascentibus male habeant, inde multum tumere in apice & morbosa juxta basim constrictione coarctari.

Tument
varia ge-
nitalium
loca.

Causæ. Arteriæ ad præputium & glandem, sicut ad cæteras corporis partes, communi alveo geminum humorem, sanguinem & lympham deferunt, qui invicem secedentes peculiaribus distinctisque vasibus, sanguis venis, lymphæ lymphaticis ductibus inde regrediuntur. Quamdiu humores illi avehantur copia eadem qua adfesti sunt, tandiu præputium & glans nativam formam & mollitiem retinent; sed si quacumque de causa minori copia revehantur quam confecti fuerint, tunc pro hærentis & collecti humoris copia præputium & glandem inflari & intumescere necesse est.

Potest autem adfecta sanguinis & lymphæ copia copiam revectam excedere causa gemina, quam utramque præputium & glans cum cæteris quibuscumque partibus communem habent. 1. Si parcior sanguinis aut lymphæ copia a præputio vel glande deducatur, quam pro more solito, non imminutâ eorumdem humorum copia quæ adducitur. 2. Si solito uberior eorumdem humorum copia adducatur, non adaucta copia quæ deducitur, vel saltem non adaucta ad eundem modum.

I. Quia
sanguis
& lim-
pha reve-
hantur
parcius.

I. Ideo quidem sanguis & lymphæ parciore copia a præputio aut glande recedunt, quam qua accessere, quod vasa quibus inde devehi solent; angustata jam amplitudine solito strictiorem viam regressuris permittant, & idcirco eodem velocitatis gradu minorem eorumdem copiam jam deducant. Duas autem causas agnoscimus angustatæ am-
plitu-

plitudinis vasorum venosorum quibus sanguis, & limphaticorum quibus limpha a præputio vel glande deferantur.

1. Compressionem, quam ab appositis duris ac renitentibus corporibus vasa illa patiuntur. Inde fit ut ulcercula dura, callosa, conferta, si majores venarum ramos aut limphæ ductus ambient vel obfideant, qui a præputio vel glande redeunt, mole, duritie, numero cavitatem eorumdem premendo difficiliorem reddant regressum limphæ aut sanguinis, ac inde præternaturali præputii aut balani tumefactioni locum præbeant.

I. Propter compressionem.

2. Constrictionem, quam sanguifera vasa aut limphatici ductus a circumjectis tendineis aut musculosis præputii vel balani fibris spasmodice contractis experiuntur. Inde est quod ulcera eadem, si intensius doleant; vel natura vel imprudenti escharoticorum abusu, dum convulsiva inde cietur ex sympathia fibrarum contractio; interfectos vasorum ductus nimium coarctent, sanguinis aut limphæ decubium in præputium vel glandem producant.

2. Propter constrictionem.

II. Ideo vero sanguis & limpha solito uberius ad præputium vel ad glandem affluunt, quod præcluso ad viciniore partes aditu in vasa collateralia quæ ad præputium vel ad glandem tendunt, cogantur copiosius divertere. Hæc locum habent quotiescumque alterutra illarum partium jam ante inflammatur: Cum enim communes ab arteria pudenda exteriore ramos habeant balanum præputiumque, si sanguis quem truncus arteriz continenter devehit, non possit surculos qui balano prospiciunt, pervadere, quoniam propter inflammationem sanguine hærente nimium turgent, atque ideo facile permeabiles non sunt, cogetur in collaterales, qui ad præputium pertinent, copiosus irrumperere atque adaucto cruoris affluxu præputii phlogosum vel inflammationem advocare. Sic vicissim si sanguis trunco communis arteriz advectus non possit in præputium jam inflammatum pro rata parte ut ante derivari, totus in balanum congeretur, quem ideo inflammabit. Inde est quod inflammatio balani cum præputio, aut præputii cum balano mutuo tam facile communicetur, ut utraque pars, si non æque cito, at saltem simili labe ex æquo plerumque afficiatur.

II. Quia advehuntur uberius, nempe quod a vicinis partibus admitti non possint.

Contingit autem balanum citius quam præputium, aut præputium citius quam balanum, aut utrumque simul inflammari ex peculiari ulcerum venerorum sede. Si glandis quidem coronam ambient, comprimendo peculiariora vasa quæ sanguinem a balano revehant, glandis solius; si vero radices præputii occupent, vasa alia quæ a præputio redeunt angustando solius præputii; demum si utrique parti insideant, simultaneam balani & præputii inflammationem advocabunt.

Quibus de causis balanum citius quam præputium.

Cæterum varia futura est tumoris species in præputio aut balano pro varia restagnantis humoris natura: 1. *Phlogmonodes* quidem, si venis com-

Quibus de causis et contra præpu-

titum ci-
cius
quam
balanus
tumeat.

pressis vel constrictis nisu validiore sanguis ipse hæreat, & hærens in vasa limphatica vi irrumpat; 2. *Oedematodes* vero, si momentum compressionis aut constrictionis debilius sit, & vasa limphatica, quæ molliora sunt, angustando, limphæ tantum coercendæ compar; 3. Demum *skirrholes*, si limpha quæ in præputio aut balano retineatur, spissa, viscida, glutinosa sit, adeoque mota dimissis sensim tenuioribus partibus in callum facile indurescat.

Sympto-
mata.

Symptomata. 1. Inflatum præputium, ut dictum est, modo in extremo limbo coarctatur, & glandem ita comprehendit, ut ad posteriorem reduci non possit unde *phimosis*, modo contra pene coronam corrugatur & glandem ita constringit, ut ad anteriora non possit deduci, unde *paraphimosis*. Prius quidem accidit iis, quibus præputium natura longius est, præsertim in duobus casibus, 1. Si ulceribus erodatur vel circa frænum vel circa extremum marginem, unde supremus ejusdem limbus angustior fiat. 2. Si præputii tumefactio balani tumorem tempore præcedat, atque adeo possit tanto facilius balanum nondum tumefactum comprehendere. Posterius vero verpis & apellis, potissimum in contrariis totidem casibus, 1. Si ulcera posteriorem præputii partem juxta radicem infestent, unde decurtatum præputium retrorsum corrugatur; 2. Si tumor præputii tumefactionem balani tempore sublequatur, neque adeo possit commode balanum jam tumentem obvolvere.

2. In
phimosis
urina sub
præpu-
tio inter-
dum re-
stitat.

2. In phimosi, cum urina dum mingitur nequeat ex angustato præputii summo foramine eodem tempore effluere, quo ab urethra defluit, necessum est ut non pauca ejusdem copia introrsum regurgitet, & super præputium restitans balani & præputii faciem dolorifice irretet & inflammet mora, acrimonia, salugine, unde ulcuscula latiora, profundiora, maligniora in dies fiet.

3. In pa-
raphimosis
adest
dysuria
& strangu-
ria.

3. In paraphimosi vero, cum urethra præputio nimium constricta ægre pateat urinx exiturienti, necessum est 1. Ut mictio guttatim fiat & quasi ex stillicidio, unde *stranguria*; 2. Ut gravi stipetur dolore, quem ciet urina, dum in inflammatam & angustatam partem fortius incurrit, unde *dysuria*; 3. Ut spasmodico erethismo, quem dolor inducit, inflammatorius balani & præputii tumor intendatur, unde *ulcusculorum incrementum*.

4. In
utraq[ue]
superve-
niunt
bullæ cry-
stallinæ.

4. In utroque casu manifestum est vasa sanguifera & limphatica præputii & balani stagnante humore ultra modum turgere; debet ergo in utroque casu limpha seu serum sanguinis e distractis vasis vi exsudare, & subter divulsam cuticulam in unam pluresve hydatides, sive bullas colligi crystalloides, prominentes quidem vel complanatas, latas vel angustas pro limphæ copia; plenas vero sero limpidio vel subruffo, tenui vel crasso, pellucido vel opaco pro qualitate effusæ limphæ.

5. Imo

5. Imo vero si vesiculæ diutius integræ duraverint, continget tandem flatu semiplenas observari, quia nempe bullulæ aeræ, quæ in limpha intermixtæ latent, sicut & in cæteris quibuscunque liquidis, diutina caloris inflammatorii efficacia sensim extrusæ ferosi humoris, qui pro parte tandem evanescit, locum occupant in bullarum summo.

6. Descriptæ bullæ multis variisque genitalium locis insident: Scilicet in paraphimosi denudatæ glandis superficie aut coronæ, vel rugis frænove corrugati præputii; in phimosi vero externæ præputii faciei, supremo ejuldem limbo aut summo balani apici, prout pars unaquæque exstirpanti fero debilius renititur.

7. Docuit experientia phimosi & paraphimosi, bullisque crystallinis frequenter laborare mentulatos & potissimum si cum impura muliere, quæ junior vel æstior sit, rem habeant: Frequentissime vero qui venere abutuntur sodomitica. Et sane quo præputium & balanus fortius perfricantur & fricatione magis atteruntur & quasi contunduntur, eo cæteris partibus inflammationi virulentæ gravius patient, & exsudanti lymphæ cedunt facilius.

8. Quotiescunque præputii vel balani inflammatio gravior erit, febrem inde accendi toties necesse futurum est, tum anomalia circulationis sanguinis, quam inflammatio inferit; tum dolore urente, quo inflammata genitalia torquentur; tum demum virulentis miasmatis in sanguinem ab ulcerata parte tacite exhalantibus, quæ singula suo quæque modo inducendæ febri symbolam conferunt.

9. Cæterum quæ de viris dicimus, debent quoque mutatis mutandis de fœminis intelligi, si ea phimoseos specie laborent, cui possunt ipsæ obnoxie esse. Scilicet 1. Mictio difficilis & dolorifica futura est; *difficilis* quidem, quia urethra ab inflammatis partibus coarctabitur; *dolorifica* vero, quia urina dum effluet, inflammatas aut ulceratas partes distrahet aut irritabit. 2. Inde manifestum accedet augmentum inflammationi & exulcerationi affectarum partium, quas lotium irritando durius habebit. 3. Tandem, si ea nimia sint, serum a stagnante sanguine sensim expressum subter cuticulam colligetur in crystallinas hydatides, bullis, quæ in virorum genitalibus inflammationis emergunt, forma, qualitate, causa simillimas. Solent autem istiusmodi hydatides in fœminis efflorescere potissimum in vulvæ labiis, nymphis sive pterygomatis, clitoride, clitoridisque præputio & carunculis myrtiformibus, quoniam partes illæ cum laxæ sint & pendulæ, hærente sanguine facilius turgent.

10. Nec dispar est conditio catamitorum pathicorumque, in quibus ani confiniâ ulculculis venereis & phimosi tentantur: inde enim sæcum egestio parca, difficilis, dolorifica est; quin imo crescente in dies morbi

5. Quæ successu temporis flatulentæ sunt.

6. Et quæ variis insident præputii pudendorum locis.

7. Ac in pædiconibus frequentissime sunt.

8. Inflammato præputio vel balano febris supervenit.

9. Quæ singula mutatis mutandis communia sunt cum fœminis.

10. Cum catamitis.

malicia si negligatur, crystallinz bullæ ad ani marginem non raro prodeunt, bullis modo descriptis plane compares.

III. Cum
nutrici-
bus.

11. Tandem nutrices ipsæ, quæ lactatione labem concepere, & quibus contingit ut mammarum papillæ inflammatae & ulcerosæ phimosis stringantur, 1. Experiantur simili successu lactationem difficilem & dolorificam, quia lac per constrictos inflammatae papillæ ductus manare non potest, nisi parcellissime & ægerrime: 2. Hæbent plerumque papillas variis hydatidibus oblitæ, nisi urgenti morbo prompta adhibeatur môdella.

Diagno-
sis tumo-
ris balani
vel præpu-
tii.

Diagnosis. I. Morbi quidem natura evidens est, cum tumor præputii vel balani in viris; variarum vulvæ partium aut ostii vaginæ in mulieribus; marginis ani in catamitis; demum papillarum in lactantibus, vel ipsis sensibus obviis sit.

Ac di-
verse tu-
moris
spectei.

II. Nec difficilior est morbi speciem dignoscere, cum sensuum testimonio perinde manifestum sit an tumor ille rubeat, caleat, doleat, & inflammatorius; an mollis, laxus, indolens, & œdematodes; tum an durus, renitens, indolens, & skirrholes sit?

Phimo-
seos &
paraphi-
moseos.

III. Licet pari modo & tactu & visu diversum præputii situm observare, atque adeo phimosis, in qua præputium in extremo limbo coarctatum glandem totam contegit, a paraphimosis distinguere, in qua denu-
datus balanus a præputio ad glandis radicem retracto constringitur.

Bulla-
rumque
crystalli-
narum.

IV. Similiter sensuum eorundem adminiculo facile est certo pronuntiare de præsentia, numero, qualitate & sita bullarum lymphaticarum seu hydatidum crystallinarum, quæ in putendis efflorescunt in utroque sexu.

Singula-
rumque
causa-
rum, qui-
bus indu-
untur.

V. Demum nec obscurum esse potest iudicium de morbi causa, cum oculis quidem pateant ulcuscula, quæ genitalia obsident, & a quibus morbus producitur; aliunde vero manifestum sit ea ulcuscula ab impura venere ortum ducere tum ægotantis confessione de impuro vel suspecto concubitu querentis, tum descriptione ulcusculorum venereorum superius tradita *precedente Capite*.

VI. Proinde haud difficile est cavere ne venereus præputii & balani aut muliebrium tumor, vel venerea earumdem partium phimosis vel paraphimosis, quæ remediis ægre cedant & periculo numquam vacent, temere confundantur cum tumefactione vel constrictione quavis, quæ iisdem partibus accidunt quandoque ex leviori phlogosi & sine ulcusculorum præsentia, scilicet vel paulula contrectatione sæpius iterata, vel laboriosa & difficili venere, quantumvis pura, qua cum teneriore virgine vir mentulatus sæpius usus sit; & quæ proinde periculi immunes sunt, & sponte brevi discutiuntur, modo ægotantes a causa qua inducuntur sunt, se abstinere velint.

Prognosis
in genere.

Prognosis. Tumor qualiscunque præputii & balani, qui ab impura vene-
nere

nere originem ducit, I. Semper gravis est, tum ratione symptomatum, cum dolorem, inflammationem, stranguriam &c. comites habet; tum ratione causæ, quæ contumax & maligna vel alias radices jam egit, vel brevi actura est, nisi cito occurratur.

II. Semper periculosus est, cum in gangrænam & sphacelum plerumque desinat, quibus mederi fere non licet, nisi circumciso præputio, imò amputato veretro, si labes altius penetraverit.

III. Demum semper curatu difficilis est, cum vitioso quasi circulo penis quidem ulcuseula a præputii & balani tumefactione, tumefactio vero præputii & balani ab ulcusculis penis vicissim vires mutuatur, & cum ambo simul ab interna causa, nempe semine venereo ita foventur, ut artem diu eludant & aliquando superent.

IV. Itaque quamvis prognosis nunquam fausta esse possit, varic tamen varianda est, atque adeo magis vel minus funesta institui debet.

Quæ in particulari varia institui debet.

1. Pro tumoris specie.

1. Pro natura quidem & specie tumoris; hinc affectus gravior & periculosior censendus est, si tumor inflammatorius sit, ut qui graviora inferat symptomata, & in gangrænam sæpius celeriusque delinat: Contra minus gravis & minus periculosus, si œdematodes fuerit, quia minoribus stipatur symptomatis, neque tam tristem exitum minatur: Demum curatu difficilis & maxime contumax, si skirrhodes, quoniam limpha in callos indurata ægrius discutitur, quam hærens vel devius sanguis, aut limpha stagnans quidem, sed fluida.

2. Pro ratione & gradu tumoris; scilicet eo magis minusve gravis, periculosus, contumax fuerit tumor qualiscunque præputii & balani inflammatorius, œdematodes, skirrhodes, quo inflammatio, œdema, skirrhos, magis minusve intensa & gradu majora vel minora futura sunt.

2. Pro tumoris gradu.

3. Demum pro effectibus, quos tumor advocat; sic morbus periculosæ plenus est alet. 1. Si dolor acer, stranguria urgens, febris ardens &c. adfuerit, unde manifestum fiat, omnia brevi in pejus ruitum ire. 2. Si in graviore phimosis inflatum præputium glandem ita contegat, ut ulcuseula, quæ sunt prima mali causa, nec detergi nec curari possint, aut si in paraphimosis intensione glans corrugata ad posteriora præputio tam arcte constringatur, ut præcluso sanguinis regressu inflammatio invaleseat cum gangrænae periculo. 3. Tandem si in præputio aut balano ex inflammationis intensione & diuturnitate, bullæ seu hydatides crystallinæ efflorescant, quæ sunt veluti prima gangrænae incipientis indicia.

3. Pro tumoris effectibus.

Curatio. Tribus indicationibus in genere satisfaciendum est, quæ subsidario veluti ordiæ sibi succedunt: Primæ, ut pacatis vel temperatis sanguinis motu, fervore, orgasmo, partisque affectæ dolore intensione & erectilismo, frustra promoveatur inflammationis & intumescenzæ resolutio: Alteri, si ea secus eveniant, ut saltem imminens

In curatione tres sunt indicationes.

præcaveatur gangræna, remota diligenter causa, a qua metuenda videretur: Tertiæ denique si morbus autem eluserit, ut incipiens sphacelus celeriter reprimatur, si ita liceat, vel cæteroquin crudeli sed necessaria operatione cito extirpetur.

Prima ut
inflam-
mationis
resolutio
procure-
tur.

I. Itaque ex legibus primæ indicationis, 1. Sanguis in principio largiter mittendus est ex venis cubiti alterutrius, non modo ter quaterve, sed etiam si morbi vehementia ita postulaverit, quarta quaque hora per unum aut alterum diem, ut depletis ea ratione vasis, fractoque cordis & arteriarum pulsu nimio; cruoris quidem affluxus ad partem dolentem parcius sit & debilior, refluxus vero uberior faciliorque.

2. Ab omni escharoticorum & cathæreticorum usu illico caute abstinendum, ne gravi dolore quem cient, fibrosa partium stamina convulsive ita crispentur, ut solitus sanguinis comœatus difficilior inde fiat.

3. Imo vero contra adhibenda sedulo emollientia, relaxantia, parergorica, quæ dolorem compescendo & erethismum mitigando cruoris circulationi faveant. Conducibile est in hunc finem partem affectam fovere, lacte subtepidi solo, vel cui flores & cortex medianus sambuci incocti fuerint; decocto radicum althææ & nymphææ; infusu mucaginoso seminum psylli & lini in aqua rosarum &c. vel summo pœni tepide admoveere cremorem recentem seu florem lactis; cataplasma de mica panis cum croco & ovi vitello, vel quod efficacius est, admista saponis albi rasura temperatum &c.

4. Utile est in eundem finem tum somnum, si dolore nimio impediatur, narcoticis conciliare, ut Decocto unius alteriusve capitis papaveris albi. Syrupo de diacodio ab ℥ss. ad ℥vj. Opio vellaudano a gr. j. ad ij. Tinctura anodyna a gutt. xx. ad xxx. Pilulis de cynoglossa a gr. v. ad x. &c. tum alvum quotidie laxare enematis emollientibus, diluentibus, eccoproticis, ex aqua fluviatili tepida, pura; vel oleo amygdalarum dulcium, butyro recenti, melle violaceo aut mercuriali, medulla cassiæ &c. temperata.

5. Si febris comes adsit, ut fere perpetuum est quotiescumque tumor inflammatorius gravior est, eger a solidioribus cibis interdicens & iusculis tantum vel dilutis cremoribus nutriendus est; largus simul potus imperandus est tenuioris iusculi ex pullo gallinaceo, vel ptisanæ ex decoctis radicibus althææ, nymphææ, acetosæ, cichorii &c. addita pro libra qualibet semi-drachma crystalli mineralis vel salis prunellæ. Demum bis in die propinandæ emulsiones dilutiores ex seminibus frigidis, semine lini, papaveris albi & cannabis, ut nimius sanguinis fervor efficaciter contemperetur.

6. Cæterum expedit egrum, si morbus urgentior fuerit, in lecto decumbere situ corporis supino, tum ut quietus otiose jaceat, tum ut remedia

dia commodius possint & admoventi & contineri, tum potissimum (a) ut coles ad ventrem deligari possit, quod in omni curatione ejus necessarium est, ut supra docuimus cap. 7. §. 3.

7. Dum hæc universalia in usum advocantur, topicis simul insistendum est, quæ partis labem corrigant. Quamobrem si phimosis adit glansque arctius contegatur, (b) *clystere auriculario inter eam cutemque inferenda est* vel aqua pura tepida; vel ptisana ex decocto hordei, cui dissolutum sit mel rosaceum, aut ex decocto radices althææ, cui semina ptylli infusum fuerit; vel aqua calcis dilutissima cum admixtis aliquot sacchari Saturnini granis; ut quicquid fordidum sub præputio lætet, eluatur, ulcera detergantur, phlogosis temperetur, demum ut rigidiores fibræ relaxentur & emolliantur.

8. Si vero glans in paraphimosis denudata sit, levi suspensaque manu decocto iidem identidem eluenda & fovenda, ulcera singula accurate ab omni pure abstergenda, tuthia vel cerussa pulveratis inspergenda complicati præputii rugæ singulatim everrendæ, ut detracta spurcitie possit inflammatio tanto facilius promptiusque resolvi vel saltem remitti.

9. At si vel in summo præputii limbo in phimosis, vel ad balani dorsum aut coronam, præputiive frænum aut rugas in paraphimosis bulla seu hydatidis limphatica emergat, quam vulgo crystallinam dicunt locus fovendus est decocto hordei cum melle rosaceo, lacte cui flores sambuci & chamæmeli incocti sint, aqua calcis cum saccharo Saturnino, vino tepido in quo ferrum ignitum extinctum fuerit, aut aqua vitæ camphorata &c. leniora scilicet vel fortiora seligendo, prout necroseos periculum magis vel minus urgere videbitur.

10. Si urina parce, laboriose, dolorifice emittatur, aut si cum emittitur, pars subter præputium regurgitet, expedit in utroque casu cannam plumbeam argenteamve tenuiorem in urethram intrudere, quam lorium facilius exeat, & aptatis funiculis ita continere, ut elabi nullo modo possit. Identidem tamen canna de industria removenda est, ut urethræ status exploretur, & ut sordes quæ adhærescunt eluantur.

11. Ubi primum partis inflammatio remiserit, ad usum blandorum resolutivum properandum est, quæ motum sanguinis & limphæ urgendo, & systalticam partium contractionem sollicitando, affectu partis contextum pristinæ laxitati, mollietati, ductilitati restituant. Laudantur ex hoc censu lac decoctum cum floribus meliloti, chamæmeli, sambuci &c. quatuor farinis resolutivibus in leni lixivio sarmentorum cocta, addito pulvere florum chamæmeli & meliloti oleoque chamæmelino; puls ex farina fabarum in decocto foliorum hyoscyami albi; cataplasma ex terra cimolia,

quæ

(a) Celsus, de Medic. Lib. 6, cap. 18.

(b) Celsus, ibid.

quæ in famiatorum sive cultrariorum situlis ex ferri & cotis ramentis colligitur; cataplasma ex pulpa radicis bryoniæ in aqua coctæ & soliorum hyoscyami sub cineribus maceratorum &c.

12. Si res pro votis successerit, laxatum semel præputium versus glandis radicem leniter reducendum est in phimosi, ut ulcera quæ subtus latent, detergi & mundari possint. Id autem felicius numquam obtinetur, quam si balanus summis digitis ita comprimatur lateraliter, ut antrorsum protensus ultra summum arctati præputii marginem sensim deducatur vi eadem qua præputium ipsum eodem tempore, sed motu contrario retrorsum reducitur. Detectæ ea ratione tum balani, tum præputii facies eluendæ, detergendæ, everrendæ sunt decoctis emollientibus, resolventibus, detergentibus, quæ varie variare oportet pro diversa ulcerum conditione. Quod si alicubi præputium glandi forsan coaluerit, levi manu invicem divellenda sunt, vel dissicanda summo calpello.

13. Pari consilio in paraphimosi corrugatum præputium explicandum & ad interiora deducendum est, simul ac resolutione relaxabitur. Id autem nequaquam tentandum est, ut a Chirurgis artis minus gnaris non semel tentatum novimus, summum glandis apicem imposito digito retrorsum pellendo, cum ea ratione glans magis expandatur, adeoque latior supra annularem præputii ambitum magis exuberet, sed contra balani latera summis digitis molliter ita comprimenda, ut glans longior inde fiat & exilior; simul vero præputium digitis iisdem ad anteriora blande deducendum. Quo semel confecto oportet explicatas præputii rugas rugarumque sulcos rite foveres eluere, detergere & relaxare decoctis variis, supra propositis.

14. Tunc remittente inflammatione, therapeja qualem ad venerea ulcera proposuimus *precedente Capite*, vel redintegrandæ est, si jam ante adhibita fuerit, vel jam de novo adhibenda, ut ea methodo ulcera quæ latebant suppurata, deterfa, mundata cicatrice tandem coalescant. Verum eligenda suppurantia, detergentia, mundificantia lenissima; imo etiam anodynis & paregoricis plerumque caute temperanda, ne inflammationem renovare ullo modo possint.

15. In fine morbi alvus blando cathartico idemdem subducenda, tum ne eliminetur cacochylia, quæ in primis viis congesta est ex errore dietæ vel coctionis, tum vero ut subtrahatur venæni pars quod morbum etiamnum fovet. Utrumque scopum feliciter implex medulla castiæ ab ℥j. ad ℥jss. cum Mercurii dulcis granis xx. alternis diebus iteranda.

16. Cæterum cum evidens sit venereas inflammationes præputii & balani vel contagio dudum latente produci, quod sanguinem jam pridem infecerit, vel si a recens admissio forsan illatæ sint, locum saltem dedisse ut haud pauca concepti contagii para in sanguinem deducatur.

daceretur, quandē inflammationis vehementia debita obstitit pariter resolutioni, opere pretium est in utroque casu, ut curatio feliciter succedat & perfecta sit, morbo jam remittente mercuriales inunctiones adhibere, legitimas quidem & ex artis præceptis, quales infra proponemus Lib. 4. cap. 7. si certa sint luis indicia; leviores vero, quales jam sæpe proposuimus, si haud ita firma fuerit luis suspicio.

17. Universa quæ de viris hætenus attulimus, perinde conducunt fere singula mulieribus, siue mammarum papillas, siue muliebria venereo contagio tumencia, inflammata, contaminata habeant. Hæc eadem paucis mutatis de catamitis vera sunt, quibus anus tumore inflammatorio obidetur ex ulcusculis venereis. In his enim ad summum duo sunt, quæ paulo scrupulosius attendenda videantur; prius quidem, ut tenuissima dieta ex foliis jusculis statim imperetur, ne feces, finissime aut duriores essent, inflammationem auferant dum egerentur; alterum vero, ut alvus enematis quotidie liquetur, quæ sint ex genere anodynorum & paregoricorum, scilicet ex lacte, ex sero lactis, ex decocto radicum althææ, foliorum verbasci, cynoglossi, quatuor seminum frigidiorum, seminis lini, papaveris albi &c. ex jusculo pingui; quibus singulis admiscebitur ovi vitellus, vel saccharum album, vel oleum ex amygdalis dulcibus expressum; imo etiam præstabit quandoque oleum amygdalinum sineorum clysteris forma immiscere.

18. Si vero arte elusa vel superata inflammatorius præputii aut balani tumor in dies ingravescat cum doloris, caloris, tensionis augmento, imo si ita persistat, ut usu propositorum remedium intra sex septemve dies ad resolutionem proxime non tendat, merito timendum est in utroque casu ne stagnans sanguinis copia & virulenti humoris mora in gangrænam delicturus sit. Quocirca advocato Chirurgiæ auxilio discindenda statim repagula, quibus sanguinis circulatio inhibetur vel retardatur, & via vi aperienda est stagnanti cruori, ut possit inde inflammatio vel resolutio veleri, vel tuta suppuratione feliciter terminari, ac proinde juxta scopum secundæ indicationis imminens præcaveatur gangræne periculum.

Altera, ut imminens gangræna præcaveatur

Itaque eo fine, 1. In phimosi præputium incidendum est, non quidem supra balani dorsum, quæ grandiora vasa perreptant, sed ad alterutrum vel utrumque glandis latus: Igitur intruso sensim inter præputium & glandem alterutro forficum scapo, qui simus sit & præpilatus, comprehensa cutis alte diffecanda est, & si unica sectio detegendæ glandi non sufficiat, compar in parte opposita instituenda est simili cautione. Quod si commodè non possit præ angustia loci scapus forficum satis alte intrudi, specillum sulcatum seu striatum prius insinuandum est, cujus ope facilius certiorque via apici scapi aperiatur. Sunt quibus videatur præstabilis lo-

quo forficum cultello tenuiore uti ad formam scalpelli scriptiorei, et-
 jus apex vel solus sed globulo cereo armatus, vel per crenam specilli
 prius immissi subter præputium pedentim plano situ introducitur ad
 optatam altitudinem, & quo pertusum semel præputium retrahendo
 discinditur: Sed in re istiusmodi, quæ levioris momenti est, cuilibet
 ut suo sapiat ingenio facile permittendum censemus.

2. Simili consilio in paraphimosis annulares rugæ complicati præputii,
 quibus glandis corona arctius stringitur, vulgari scalpello, quod *Bistouri*
 dicunt, transversim dissecandæ incisuris aliquot perpendicularibus, quæ
 penis rectitudini respondeant, adductoque dein præputio super glandem
 rugæ ante consipatæ sedulo explicandæ sunt. Oportet autem incisu-
 ras præputii in præsentī casu, sicut incisiones ejusdem in præcedente
 opplere statim linamento sicco ad hæmorrhagiam restinguendam, ac
 postea digestivo simplici & deinde balsamo Arcæi curare, ut artis est.

3. In priore quidem operatione revolutō post incisionem præputio
 exulcerationes malignæ fœtidæque, quæ subtus latebant; in posteriore
 vero explicato præputio, fissuræ rhagadesque omnes, quæ intra sulcos de-
 litescabant, diluentibus, relaxantibus, resolventibus, vulnerariis, phage-
 denicis, qualia supra proposuimus, eluendæ, suppurandæ, detergendæ,
 mundificandæ sunt, donec ex artis legibus cicatrice tandem obducantur.

4. Si qua bulla crystallina nec resolutione evanescat, nec sponte dis-
 rupta diffuat, summo apice lara-plaga incidenda erit, viaque paranda
 contentæ limphæ, ut flamina in confinio nimum distracta relaxentur,
 atque ea ratione præcaveatur imminens gangræna, quam humor mora
 acrior illaturus esset. Deinde si qua appareant incipientis livoris si-
 gna, basis, bullæ superficiarie prius scarificata contegenda est penicillo
 seu plumaceolo aqua vitæ camphorata, tinctura myrrhæ, vel collyrio
 Lanfranci imbuto, quæ identidem renovabuntur, donec advocata sup-
 puratione & delapsa syderata superficie, necroseos periculum decesserit.

5. Singula, quæ attulimus de inflammatione genitalium in viris,
 perinde conducunt tum mulieribus, si vulva vel mammarum papillæ;
 tum catamitis muliebria passis, si ani confinia venerea inflammatione
 tum tumeant, quæ remedium efficaciam eludat & in gangrænam
 brevi abitura videatur, Scilicet partes, quæ dolorifice distent, cruo-
 re turgidæ, siderationi proximæ sunt, scarificandæ confertis quidem in-
 cisuris, sed magis minusve altis pro contextus natura & sensus con-
 ditione. Deinde postquam sanguis stagnans, ichorve putrescens gut-
 tatim exstillaverint, resolutentia, suppurantia, traumatica sive vulne-
 raria, phagedenica adhibenda sunt ex artis legibus, dum partes detur-
 gentes & nativam laxitatem adeptæ cicatrice coeant.

Tertia, III. Tandem si morbus remediis major sit, & præcisa spe omni aver-

ten-

tendæ gangrænæ, certa jam appareant necroseos indicia, tunc una talis superest, ut in tertia indicatione proposuimus, incipientem scilicet gangrænâ celeriter reprimere, vel si jam reprimi non possit, amputatione partis affectæ radicitus extirpare, sed de his infra, tertio hujusce, capitis artic. ubi *de genitalium spæcelo*.

aut gangræna incipiens reprimatur vel extirpetur.

§. II. DE PHYMATIS ET TUBERCULIS CALLOSIS CHORDISVE SKIRRHOIDIBUS BALANI ET PRÆPUTII.

Descriptio. Discussis venereis præputii aut balani tumoribus, vel sanatis ulcusculis supersunt interdum duriores & renitentes calli, numero & mole varii, modo in ipso partis contextu sepulti & solo tactu dignoscendi, modo prominentes & visui quoque obviæ, qui si nodorum instar conglobati sint, *phymata seu tubercula* appellantur, *chordæ* vero si instar funiculi in longum porrigantur.

Descriptio phymatum & chordarum.

Solent autem conglobata phymata in quacumque præputii aut balani parte adesse: Ea tamen potissimum loca affectant, quibus ulcuscula venerea profundiora insederunt, Hinc frequentissima in extremo præputii margine, in corona balani, in fræno quo balanæ cum præputio committitur.

Sic etiam skirrholdes chordæ, etsi quamvis præputii aut balani partem occupare possint, frequentius tamen observantur in extremo præputii circulo, qui angustatur in phimosi; in rugis, in quæ præputium complicatur in paraphimosi; in fræno præputii & in corona balani, quæ ulcusculis gravioribus & catenatim dispositis obsepta fuere.

Dum skirrholdæ sunt.

Quandiu phymata seu chordæ hujusmodi naturam calli seu skirrhi retinent, dolore, utcumque premantur, ac omnimodo sensu carent; sed ad summum si mole nimia tumeant, obstant ne libera sit præputii super balanum deductio vel adductio, atque adeo phimosis vel paraphimosis habitualement inferunt.

At vero accidit interdum, ut progressu temporis sensim intumescant, incalescant, lancinent & obscure doleant si comprimantur, si tentato & rigente veretro veneri militandum sit, aut si jam iterato militatum fuerit, & tunc ad carcinomatoden naturam proxime degenerant.

Dum carcinomata degenerant.

Quod si periculum inde imminens celeriter non præcaveatur, tractis in consortium vicinioribus partibus, auctaque in dies mole manifeste dolent, lancinant, calent, mutataque figura in apicem fastigiatum extuberant, quem cutis tensa, lævis, lucens, rubra obteggit; & tunc carcinoma confirmatum est, quod pro diversis situ aut mole phymatum vel chordarum, a quibus initium duxit, modo balanum præputiumve totum, modo partem tantum balani præputiive occupat.

Dum sunt carcinomatodea

Quandiu cutis carcinomati superjecta integra est, necdum discissa, carcinoma

cino

cinoma latens sive occultum dicitur; verum ubi primum tumoris incremento cutis dilacerata in ulcus abiit, carcinoma mutato nomine jam apertum & exulceratum appellatur.

Carcinomatii præputii balanive, sive occulto, sive exulcerato, omnia eadem accidunt symptomata, quæ bubonis carcinomatodis propria esse supra diximus *Cap. 6. §. 3.* & tanto quidem intensiora, quanto sensus præputii & præsertim balani acutior est & magis exquisitus præ sensu glandularum inguinalium.

Descri-
ptio ea-
rumdem
affectio-
num in
fœminis.

Hæc eadem in mulieribus etiam observantur simili de causa, in quibus vulvæ labra, pterygomata sive nymphæ, clitoris clitoridisque præputium, & myrtiformes caruncule phymatis callosis istiusmodi interdum confita sunt, quæ a prægressis ulcusculis vel inflammationibus venereis superfunt: Imo vero in quibus non rarum est vaginæ ostium chorda skirrhode annuli instar arctatum habituali quasi phimosis constringi, unde fit ut scortilla diabolaria, quæ obviis quibuscunque corpus jam pridem vulgare, post contracta venerea ulcuscula ementitam virginitatem aliquando præ se ferant.

Sicut autem in viris, sic & in fœminis callosa eæ phymata & skirrholes chordæ solent interdum in tumores carcinomatodes & vera demum carcinomata sensim abire progressu eodem & æque funesto successu.

Et in ca-
tamitis.

Utrumque catamitis etiam familiare est, in quibus post ulcerosam an inflammationem venere contractam, tubercula phymataque varia an marginem interdum obsident, dura, callosa & in cancerosam naturam sæpe degenerantia; & in quibus a causa eadem tanta est aliquando anæritudo, seu phimosis quasi habitualis, ab annullari chorda skirrhode inducta, ut sæces nisi prius solutæ & enemate quasi liquefactæ sint, nequeant egeri, imo etiam nec eo pacto egerantur unquam sine dolore.

Phymata
& chordæ
skirrholes
sunt
a lymphæ.

Causæ. Calli omnes tumoresque callosi fiunt in parte molli ab humore viscido præternaturam indurato. Debent igitur tubercula, phymata, chordæ skirrholes tum balani, tum præputii, quæ singula ad callos tumoresque callosos pertinent, ab humore istiusmodi in præputii balanive contextu spissescere dependere.

Sunt autem in summa duo tantum humores, qui præputium balanumve alluant, sanguis nempe & limpha. Sanguis vero, cum ad suppurationem concipiendam natura comparatus sit, dum in parte quavis retinetur, vix unquam potest in callum indurari, neque adeo inde arcessenda videtur causa phymatum, tuberculorum chordarumque, quæ in præputio vel balano observantur. Superest ergo, ut tumores illi repetantur ab indurata lymphæ; ejus sane conclusionis veritatem abunde testantur & color phymatum, quæ cum lymphæ inspissata ejusdem coloris sunt, nempe albicantis; & phymatum sirus, quæ his partibus insident, ubi potissima est limphaticorum copia.

At

Quæ ibi-
dem hæ-
ret vel
conge-
stione,
vel ex-
travas-
tione.

At vero non potest limpha in callos unquam indurari, nisi hæreat; tandiu enim inspissationis impatiens est, quandiu iugis fluxu indefinenter renovatur circulando. Hæret autem duabus de causis, 1. Quia stagnat copiosius collecta intra ductus distentos quidem, sed tamen integros: 2. Quia extravasatur e laceris ductibus effusa inter vasorum vicinorum interstitia. Utrique causæ locum esse in venereis præputii & balani tumoribus & ulcusculis manifestum est, in quibus 1. Vasa limphatica comprimuntur & angustantur, unde limpha in tenuioribus horumce vasorum capillamentis cogitur cumulari & stagnare; 2. Exiles limphaticorum ramuli nimia copia limphæ congestæ dissepuntur, unde cogitur collecta limpha guttatim effundi & extravasari.

Verum non sufficit ad callorum genesim lympham hærare, sed præterea opus est ut hæread inspissetur, dimissis statim tenuioribus partibus, quæ aquosæ sunt, deinde ad intimiorem contactum adductis cæteris, quæ crassiôres sunt & viscidæ. Dimittuntur quidem partes tenuiores & aquosiores, tum quia copia & pressione lymphæ pone urgentis exsulant, tum quia calore & æstu partis exhalant. Ad intimiorem vero contactum adducuntur partes cæteræ, tum quia jam exulant partes aquosiores, quarum interventu sejungebantur, tum quia ab admisso contagio venereo acido aut salso-acido densius constipantur.

Hæc omnia una simul concurrunt in tumoribus, ulceribusve venereis, ad producenda in præputio aut balano phymata: Siquidem 1. Vasa collecta lymphæ turgent; ergo pressu debent exsudare partes limphæ tenuiores: 2. Calet & æstuat pars inflammata, ergo debent partes eadem exhalare fervore: 3. Partes crassiôres limphæ dimissis semel tenuioribus in se propius accedunt; ergo debent strictius densari; 4. Demum inspiratum limphæ inest contagium venereum, cuius natura acida est aut salso-acida; debet ergo limphæ crassamentum magis inde constipari. Proinde nequaquam mirum est, si ea causarum syndrome phymata callosa, post diuturnos tumores venereos aut graviora ulcera, in præputio & balano tam sæpe observentur.

Modo quidem discretæ, conglobata, orbicularia, chalaziorum instar grandinosa futura sunt, si succedant vel discretis ulcusculis venereis, vel discretis congestionibus, quæ singulares areas ideo affectaverint, quod ibi forsân major fuerit texti inertia, seu uberior collectæ limphæ copia.

Modo vero in skirrhodes chordas porrigentur, si ulcera quibus supersunt, una serie sibi invicem continua fuerint, vel quod frequentius est si peculiari partis conformatione congestio in longum extensa fuerit. Inde est *exempli causa*, quod in phimosis extremus præputii margo, qui angustatur; in paraphimosis ejusdem rugæ, quæ in sulcos complicantur; in utraque frænum & corona balanæ chordis skirrhodibus sæpissime obrigescant.

Quæ

Et ibi-
dem spif-
fescit
tum ex-
halatio-
ne partium
aquosa-
rum, tum
efficacia
veneni
venerei.

Cause
discrimi-
num, quæ
in phy-
matis &
chordis
observantur.

Quæ singula de mulieribus, & de catamitis debent intelligi.

Quæcunque de phymatis veneris genitalium in viris dicta sunt, hæc eadem conveniunt phymatis quæ ex impura venere muliebris in feminis, aut ani confinia in cinædis occupant. Nam & perinde sunt congestione indurata limphæ; & peculiare quoque eorumdem differentia in discreta seu orbicularia, & catenata seu in chprdas porrecta a similibus causis perinde deducendæ sunt. Nosandum tantum phymata in mulieribus & cinædis plerumque rariora esse quam in viris, quia ex vasorum situ partiumque conformatione fluxus sanguinis & limphæ minus inhibetur in veneris muliebrium aut ani, quam præputii vel balani inflammationibus & ulceribus.

Symptomata.

1. Absentia doloris & caloris.

Symptomata. 1. Quandiu limpha in phymatis chordisve skirrhodibus indurata nullo cietur motu expansivo, tandiu nec locus est violentæ distractioni fibrillarum nervearum juxta positarum, nec compressioni vasorum sanguiferorum juxta repentium sanguinisve hærentiæ. Ergo per id tempus phymata chordæque tum dolore, tum calore vacare debent.

2. Phimosis aut paraphimosis habitualis.

2. Verum si mole ita nimia fiant, ut præputii ambitus angustetur, vel augeatur balani crassitudo, alterutro vitio perinde obstitura sunt deductioni vel adductioni præputii super balanum. Inde ergo inducitur habitualis phimosis vel paraphimosis.

3. Aliquando phimosis.

3. Itaque si angustatio sit in extremo præputii margine, vel si tumor in balano sit coronæ finitimus, in utroque casu præputium semel adductum ægre deducetur, potissimum si longius fuerit. Tunc ergo balanus denudari non poterit vel ægre denudabitur, atque adeo phimosis habitualis futura est.

4. Aliquando paraphimosis.

4. Contra vero si angustatio præputii sit in parte posteriore, aut si balani tumor ejusdem apicem occupet, deductum semel præputium ægre adducetur, præsertim si brevius sit. Tunc ergo balanus non poterit contingi vel ægre contegetur, atque adeo paraphimosis habitualis futura est.

5. Phimosis vaginæ in feminis.

5. Pari modo in feminis ostium vaginæ, si crassioribus phymotis vel chorda skirrhode obsideatur, angustiore rima patebit. Inde ergo fiet habitualis phimosis virginitatem mentiens in corruptis, quæ jam virum sæpius expertæ sunt.

6. Eranis in cinædis.

6. Similiter in cinædis, si ani confinia aut infima recti pars vel phymatis angustentur, vel chorda skirrhode constriuantur, tanta ani arcuitudo seu phimosis futura est, ut fæces alvinæ ægre egerantur, imo etiam vix egeri possint nisi liquidiores & enematæ jam solutæ.

7. Lancinatio frequens cum calore.

7. Quod si tandem acrimonia vel fervore sanguinis, errore dicitur, contrectatione vel fricatione nimia &c. phymata irritata vel agitata fortius subinde rarefiant, nisi expansivo tum distrahent identidem continentes tunicas fibrasque nerveas intertexas, tum vasa circumflua comprimendo sanguinem retinebunt. Inde igitur frequens lancinatio cum caloris sensu, unde status in carcinoma proxime degener.

8. Si

8. Ulcera, abscessus, fistulae.

9. Carcinoma confirmatum.

10. Imo carcinoma exulceratum.

Qua ratione diagnosis praesentia phymatum & chordatum, cum skirrhotodea sunt. Et cum in carcinoma-toden naturam degenerant. Tum in viris.

Tum in feminis.

8. Si limpha quæ in phymata induruit? satis mollis sit ductilisque, ut in putre liquamen possit resolvi, dum iidem causis fortius & frequentius atteritur, inde suppurationem tacite conceptura est, vel in summo phymatum apice, unde renovatio ulcerum venereorum; vel in phymatum centro, unde abscessus; imo vero quandoque fistulae, praesertim in mulieribus & cinædis, in quibus abscessus huiusmodi, cum altius lateant, difficilius deterguntur.

9. Contra vero si limpha eadem strictius constipata & quasi cornea suppurationi impar sit, vi earumdem causarum sæpius impetentium magis in dies rarefcat citra suppurationem. Inde lancinatio, calor renitentia, tumor intensus in dies urgebunt, vicinioreque partes in consortium sensim trahentur, unde carcinoma confirmatum sed tamen adhuc occultum.

10. Demum si disrupta cure summum phymatis fastigium levi fissura dehiscat, hinc necessaria successione fiet exulceratio maligna, ichorosa, fungosa, phagædenica, in dies crescens, cum duris, granosis & replicatis labris, ut supra explicavimus *Cap. 5. §. 3.* atque adeo carcinoma jam non-modo confirmatum, sed etiam exulceratum seu apertum erit.

Diagnosis. 1. Præsentia, numerus, situs &c. phymatum callosorum & chordarum skirrhotodum oculis patent.

2. Liqueat similiter sensuum testimonio, an phimosis vel paraphimosis præputium stringatur, & ad qualem gradum in utroque casu.

3. Colligitur ex dolore lancinante, si recurrat identidem sed rarius, phymata ad carcinoma-toden naturam latenter desciscere; si frequentius vero & fere continuo, jam descivisse.

4. Visu tactuque dignoscitur an carcinoma occultum sit exulceratumve an magnum, balanum aut præputium totum in viris, totam vulvam aut totum vaginæ ostium in mulieribus, totumve ani ambitum in cinædis; an parvum, exiguum tantum singulorum partem occupet; demum an laxum & mobile sit & a vicinis partibus sejunctum, possitque proinde radicitus extirpari sine labe nimia; immotumve & stabile vicinioribus partibus ita dudum accreverit, ut nullo modo possit excindi sine earumdem amputatione.

5. In viris & mulieribus nuptis viduivse genuina horumce morborum causa vel situ & indole callorum conjicitur, vel ægotantium confessione manifesta est.

6. At vero sæminæ quæ innuptæ sunt, & quarum ideo refert flagitia sua celare, raro satis ingenuæ sunt, ut se contagio contaminatas esse fateantur; imo potius audent malo dolo morbolam vaginæ arctitudinem impura venere contractam pro virginitate ostentare. Sed tantam impudentiam falsi arguere facile est, in iis saltem quæ veneri sæpius litavere, in quibus labia vulvæ & pterygia laxa, mollia, pendula sunt; fossa navi-

cularis lævis, complanata, diducta; demum interior. vagina ultra primum limen quod morbose coarctatur, patula, ampla, attrita est, cum e contra in integris & virum nondum expertis angusta & rugosa sit.

Tum in
cinædis.

7. Pari consilio cinædi quoque simulant non raro præternaturalem podicis arctitudinem, quam impuræ veneri & muliebri patientiæ acceptam debent, a prægressis vel præsentibus hæmorrhoidibus dependere. Sed mendacium vel inde manifestum est, quod coarctatio istiusmodi ab hæmorrhoidibus vix unquam induci possit; potissimum vero quod ea coarctatio in cinædis qui morbo corrupti sunt, perpetuo jungatur cum fisis, mariscis, cristis aliisque ani tumoribus, qui veram coarctationis causam abunde denotant.

Prognosis.

Prognosis. 1. Phymata callosa chordæque skirrhodes genitalium, quandiu exigua, mobilia, pauca sunt, nullius fere momenti putantur. Contra vero incommoda sunt, si numero, mole duritiæ præputium aut vaginæ ostium nimis coarctent & veneris usui officiant.

2. Malum, si phymata chordæve incipiant latenter in carcinomatodæ naturam desciscere; pessimum, si jam desciverint, cum carcinoma confirmatum ferro tantum & igne reprimi possit.

3. Quandiu phymata carcinomatodæ mobilia sunt & ferro radicitus excindi possunt, superest salutis spes, magis minuscule certa pro modo & gradu operationis qua utendum est ut extirpentur: Sed si ob situm vel adhesionem cum vicinioribus partibus nequeant extirpari, tunc misera & ineluctabili morte sensim pereundum est.

4. In fœminis & cinædis phymata carcinomatodæ rariora quidem sunt quam in viris, ut supra vidimus, sed graviore periculo in iisdem stantur, quoniam altius recondita operationem difficiliter admittunt, neque remediis æque obvia sunt.

Curatio.

Curatio ad tria debet dirigi pro triplici morbi statu. 1. Ut phymata perfecte discutiantur & resolvantur, si mere callosa sint & indolentia. 2. Ut caveatur ne in carcinomata degenerent, si eo inclinare videantur. 3. Ut extirpentur quam celerrime, si in carcinomata jam desciverint.

Quomodo
phymata
resolvenda
si indolentia
sint?

1. Ad procurandam phymatum resolutionem, 1. Materiei in callosis impactæ mollietis, & densiori callorum contextui laxitas concilianda est, ut liquidiorẽ lympham laxiora stamina minus coercant. Huic fini conducunt diluentia omnia interna, quæcumque supra attulimus *hujusce Libri cap. 6. §. 2. ubi de Tumore scilicet venereo*, sementaque emollientia varia quæ ibidem proposita sunt.

2. Deinde si qua sit latentis & male curatæ luis suspicio, ut accidit non raro, adhibenda hydrargyrosis conveniente tempore & debita methodo, ex artis legibus infra proponendis, ut eo pacto virus admissum edometur, lymphæ nativæ fluiditas restitatur, atque adeo superstitēs calli efficaciter resolvantur.

3. Quin

3. Quin imo etiamsi liqueat nullam latere luem, si non hydrargyrosi plenæ, qua tunc opus non est, ac saltem levioribus inunctionibus unguentis mercurialis insistendum est, raro quidem, nempe semel qualibet hebdomade, sed diu, per tres quatuorve menses iterandis. Docuit nempe experientia vix alterum remedium ad promovendam resolutionem callosorum illi Mercurio efficacius esse, præsertim vero quoties hærentis lymphæ spissitudo ab inspirato seminio venero primum orta est.

4. Possunt etiam eodem consilio inunctionum loco in usum advocari emplastra varia ex Mercurio cum resolventibus vel relaxantibus varie temperato præparata, ut emplastrum de Ranis cum Mercurio, emplastrum Vigonis quadruplicato Mercurio &c. modo scorsum & sola: modo ad æquales partes cum emplastris de mucilaginibus, de spermote ceti aut diabotano mixta & subacta. Notari tamen velim emplastra istiusmodi tum virtute resolventium acriorum, quibus ex parte constant, tum glutinosa & emplastica facultate, qua poros curis constipant & perspirationem inhihent, calorem morbosum parti plerumque conciliare, & idcirco inunctionibus mercurialibus minus tuta esse.

II. At vero si ea remedia frustra sint, phymataque lancinante dolore identidem corripri contingat, tunc mutato consilio 1. A topicorum usu cavendum est, tum resolventium, quæ impactum materiarum attenuando & rarefaciendo ad carcinomatis naturam præcipitæ, tum relaxantium, præsertim si sint e genere pinguium & oleosorum; quæ cutis poros oblinendo perspirationem intus retinent, motumque quo materia jam cietur, ex accidente magis augent & accelerant.

2. Expedit itaque in eo rerum statu vel topicis penitus abstinere, & affectam partem tantum fovere, ut a sorditæ munda moderate caleat, & ab externo frigore tuta sit; vel ad summum topicis iis uti quæ mere aquea sint, ut sunt decocta radicum althææ, nymphææ &c. vel quæ ad aqueam naturam proxime accedant, ut lac, vel serum lactis tepens.

3. Si lancinatio & gravius & frequentius urgeat; sanguis mixtendus est ex alterutro brachio semel atque iterum, ut depletæ arteriæ quæ dolentem partem alluunt, segnius inde oscillent, atque adeo minore momento in objectos callos arietando hærentem materiam tardiore & inefficaciori motu conquassent. Narcotica quoque identidem adhibenda, ut syrupus de diacodio vel de succino ad ꝑ. Laudanum ad gr. j. Tinctura anodyna ad gutt. xx. Pilulæ de cynoglossio ad gr. vj. vel viij. ut compages phymatum per somnum debilius succutiatur & obusius doleat.

4. Interea vero adhibenda remedia omnia, quæ diluere, temperare, humectare valeant, atque adeo sanguinis fervorem infringere, acrimoniam ejusdem mitigare, & expansivum rarefcentium callosorum visum sufflammare, ut lac, serum lactis chalybeatum, juscula diluen-

Quomodo cavendum sit, ne in carcinoma degenerent, si eo inclinare videantur?

tia ex pullo gallinaceo & plantis refrigerantibus, aquæ acidulæ leviores &c. interne sumpta; semicupia, balnea in aqua dulci tepida &c. externe adhibita, quæ singula jam sæpius recensuimus.

5. Inprimis operæ pretium est, ut ægrotantes a venere se abstineant, ne dolentia phymata, quæ in pudendis latent, tensione, calore, frictione, distractione agitata carcinomatoden naturam celerius inde contrahant. Curandum etiam in cinædis, ne alvum unquam depellant, nisi emolliente enemate prius liquefacta fuerit.

Denique quomodo extirpanda si in carcinoma desciverint?

III. Denique si res male cedat, phymataque duriora, magis dolentia, & in apicem fastigiata in carcinomata confirmata, sive exulcerata sive occulta desciverint, vel proxime descitura videantur, tunc abjecta omni cunctatione ad certiora prælidia properare necessum est.

1. Igitur si quod phyma carcinomatodes in præputio in viris, aut in mulieribus in nymphis sive pterygiis lateat, quod mobile, laxum, ab omni nexu liberum sit, & a subjectis partibus sejunctum, summis sinistræ digitis arreptum cultello excindendum est, neque præputio in viris aut affectæ nymphæ in mulieribus parcendum, ut phyma radicitus extirpetur. Deinde vulnus superstes ex artis legibus primum digestivo unguento, deinde balsamo Arcæi curandum est.

2. Si vero phyma cancriforme in balano in viris, in alterutro vulvæ seu pudendi labio in mulieribus, aut in ani margine in cinædis profundius quidem sepultum sit, sed suis tamen finibus ita circumscriptum, ut nulla adhæsiōe committatur cum partibus ullis aliis, quæ sectionem respuant pari modo eradicandum est. Igitur pars affecta a ministro disenta & a Chirurgo sinistra manu compressa ad phymatis ambitum semi-circulari sectione alte inciditur. Postea phyma summis sinistræ digitis, vel etiam si ita opus fuerit, uncino aut forcipe arreptum stirpitur excinditur cum fibris omnibus, vulnusque, quod inde superest, curabitur ut artis est.

3. Si phyma cancriforme, quod in præputio balanove latebat, mole ita creverit, ut communicata per adhæsiōnem labe contigua corpora cavernosa, quæ penem constituunt, in consortium ducta sint, una jam superest salutis ratio, nempe ut penis caput, quantum morbo affectum est, totum celeriter amputetur, amputatique vulnus curetur ea methodo quam trademus sequente paragrafo.

4. Verum si cancriforme phymata in fœminis internam vulvam aut vaginæ ostium occupent, si in cinædis recto altius insideant, si in viris ad penis radicem extendantur, de salute concludatum est, quandoquidem carcinoma nulla potest opera tunc radicitus extirpari; neque enim magnificis Ariolorum promissis ullomodo confidimus, qui catharteticorum usu se carcinomata adhærentia perfecte sanatuos esse pollicentur, quæ de re vide quæ dicta sunt supra hujus Libri Cap. 3. §. 3.

5. Tunc

5. Tunc ergo spes omnis in eo sita est, ut Therapeja, quam *palliativam* dicunt, dolor leniatur, morbus sustineatur, humoris ferocia retundatur, ulceris progressus retardetur, & miserabilis ægrotantium vita quam diutissime procrastinetur, mitigatis ut maxime fieri poterit ærumnis, vigiliis, doloribusque, quibus dirum in modum premuntur, qua de re consuli possunt, quæ supra proposita sunt, *Cap. 6. Artic. 3. de Bubono carcinomatode.*

§. III. DE GANGRÆNA ET SPHACELO GENITALIUM.

Descriptio. Nisi genitalia, genitaliumve partes in utroque sexu, anive margo in cinædis, quæ hærentibus sanguine & limpha impentius turgent, perfecta celerique resolutione detumescant, solent intra paucos dies gangræna corripi, quæ tacito, sed gradario progressu brevi invalefcit ordine sequenti.

Descri-
prio gan-
græne
immi-
nentis.

1. Tumor vel tumoris apex, qui ante tensus, renitens, lævis, lucidus erat & acute dolebat, flaccescit, ignavius renititur, crispatur, infusatur; obtusius dolet, atque inde urgentia *imminentis* gangræne indicia.

2. Cutis inerior magis magisque relaxatur, sublidit, prementi digito facilius cedit, vestigium impressum magis retinet, livescit cum manifesto doloris, sensus & caloris decremento; & hæc gangrænam *incipientem* significant.

Incipi-
entis.

3. His singulis ingravescentibus accedunt pustulæ seu vesiculæ ex cute emergentes, ichore subflavo vel subrubro plenæ, quarum basis plerumque nigrescit, numero, situ, magnitudine variæ; & tunc gangræna *confirmata* dicitur.

Confir-
mata.

4. Demum cutis, parsque cuti subiecta corruptæ, emortuæ, lividæ, nigre, fœtidæ; caloris, sensus pulsusque expertes, in tabum dissuunt graveolens, vel si digitisprehendantur, in lacinias a subiecta carne separantur; atque hic ultimus est necroseos gradus, qui Græcis *sphacelus*, Latinis *sideratio* dicitur.

Deplora-
ta.

Gangræna eque genitalium aut ani partes tentantur, quæ a stagnante sanguine vel limpha male habent: Frequenter quidem illæ; quæ natura molles sunt & spongiosæ, ut balanus in viris, labia vulvæ in mulieribus, ani margo in cinædis; frequentius vero quæ sunt cutaneæ & magis flaccidæ, ut in viris præputium, in feminis nymphæ sive pretygia, in cinædis cristæ ani; inde brevi altius longiusque serpit, & ab affectis partibus in corpora cavernosa, totumque penem in viris; in vulvæ claustra & vaginæ ostium in feminis; & in extremum rectum in cinædis celeri passu propagatur.

Causæ. Perit in gangræna & sphacelo sensus, calor, circulatio sanguinis & limphæ; nexus, cohesio, firmitas partium. Conciduntur er-

Gangræ-
na indu-

citur con-
ciso par-
tis con-
textu.

go in gangræna & per minima dividuntur 1. Nervi, quibus sensus vi-
get; 2. Arteriæ, venæ, vasa lymphatica, quibus sanguis & limpha cir-
culando calorem nativum fovent; 3. Demum stamina omnia tendi-
nea, quibus partis contextus firmitalque constat.

Potest ea consequentia ulterius confirmari ex nota efficacia causa-
rum præcipuarum, quibus gangræna solet efficacissime inferri. Sic ignis
comburendo; elcharotica, caustica, & cathartica remedia erodendo;
contusio nimia conterendo; congelatio, cui partis congelatæ solutio
citius succedit, lacerando; singula scilicet suo quæque modo partis
contextum vasque parti intertexta concidendo gangrænam & sphace-
lum advocant.

Cum di-
scinditur
in phleg-
mone,
aut ero-
ditur in
œdema-
te.

Id unum ergo superest, ut missis cæterarum gangrænarum causis,
quarum jam non satagimus, in peculiare causas inquiramus, quibus
videtur partis contextus destrui posse in præsentī casu. Duas autem
ad summum agnoscimus, alteram quidem in *phlegmone*, nimiam scili-
cet sanguinis & lymphæ in parte congestionem & turgescētiā, unde
non modo vasa nimium distenta, sed etiam appolita stamina per-
rumpi & laceratim discindi necesse est: Alteram vero in *œdema-
te*, nempe salioris & acrioris lymphæ decubitus & stagnationem, unde
sero laxata & emollita partis exiliora stamina, vasque tenuiora sali-
nis particulis tandem minutatim dissolvi & erodi debent.

Prior causa citius agit, sed plerumque magis superficialiter; posterior tar-
dius, sed altius; ambæ, si jungantur, citissime, efficacissime, altissime.

Sympto-
mata.

1. Immi-
nutio ca-
loris, do-
loris &
lævoris.
2. Partis
subsiden-
tia cum
livore.

3. Vesicu-
læ sero
plene.

4. Tabum
in quod
pars affe-
cta dis-
solvitur.

Symptomata. 1. In gangræna imminente pauca & exilia stamina di-
scissa vel erosa sunt: Hinc ergo in affecta parte, parum relaxatur to-
nus, tensio, firmitas; atque adeo caloris, doloris, lævoris, imminutio
debet tunc esse in moderatissimo gradu.

2. In incipiente vero & plura & crassiora stamina dilacerari vel
erodi necessum est ab invalescente causarum earundem efficacia. Hinc
ergo tunc major partis flacciditas, subsidētia, livor, cum manifesta
sensu & caloris decremento.

3. In confirmata tenuior latex sanguinis & lymphæ discissis vel erosis
vasis exundantium debet sensim per semilaceram cutem permeare, atque
cuticulam seu epidermidem, ubicunque subjacet cuti laxius adhæret, divel-
lere & in hydadides inflare, seu vesiculas sero plenas, subflavo, si pu-
rum sit; subrubro, si admistis aliquod sanguinis guttulis inficiatur.

4. Demum in sphacelo crassamentum sanguinis & lymphæ, quod in
ruinosa partis strue superest, & minuta frustula, in quæ fibræ, mem-
branz, vasa conciduntur, una simul permista, confusa, subacta tabum
constituunt putre, atrum, graveolens, quod quidem liquidius est, si
gangræna sit in parte molli, ubi vasa copiosiora; si ab œdema te fiat;

&

& si nullo, ut in œdemate, vel paucò calore stiperetur, ut in phlegmone œdematode; quod contra spissius est & crassioribus partibus strictius densatis corneam duritiem interdum æmulatur, si gangræna ab inflammatione vel erysipelate oriunda partem duriorem & exsanguem occupet, & si cum intenso calore invadat.

5. Partes quæ gangræne vel sphacelo subiectæ aut consiguæ sunt, participant ipsæ labem eandem qua sphacelata vel gangrænosa pars ante laborabat. Debent ergo a virulento tabo, quod a gangrænosa parte undique defluit & alte imbibitur, in vitii ejusdem consortium tanto facilius trahi; atque adeo minime mirum est si gangræna sphacelusque alte lateque celeriter serpent, & partes depascentur quæ confines sunt.

6. Vasa limphatica a gangrænosa parte prodeuntia in sanguinem jugiter traducunt guttas rabi quas inde hauriunt, tanto quidem plures, quanto gangræna latior & profundior est, & fœtido tabo magis scatet. Sed guttæ rabi istiusmodi in venas semel insulæ debent infra proprietate sanguinem inspissare, & inspissati circuitum retardare. Debent ergo pari quoque proportionem nativum sanguinis calorem imminuere, & cordis motum infringere quod ad vehementiam & magnitudinem, unde pulsus in sphacelo debilis & parvus futurus est cum horrore frequente.

Diagnosis. 1. Ex signis in descriptione propositis facile est tum imminuentem gangrænam prævidere, tum incipientem, confirmatam, in sphacelum degenerare discernere.

2. Limites quibus gangræna circumscribitur, visu tactuque patent ut plurimum: hinc ergo facile judicium quales quantasve partes occupet, scilicet an præputium, balanum frænumve in viris; an labia vulvæ, pterygia, clitoridem præputiumve clitoridis in mulieribus; an cristarum aut fitorum fastigium ipsumve ani ambitum in cinædis?

3. Cavendum tamen ne ex præputii conditione de statu balani qui in phimosi subtus latet, temere judicium fiat; constat enim experientia gangrænoso præputio illibatum balanum interdum recondi. Quocirca præputium incisum dissectum ad postica revolvendum est, ut de recte glande apertius certiusque statuere liceat.

4. Ut æstimetur gangræne altitudo, conjecturis minime fidendum, sed pars affecta incisuris eoque scarificanda est, dum incisionum fundus doleat, & floridum sanguinem emittat. Hinc enim certo constat & de vitali subiectarum partium statu, & de superjectæ gangræne altitudine.

5. Cautio eadem adhibenda, quoties de gangræna partis cujusdam ambigitur. Si levioribus enim incisuris punctum scarificata doleat & cruorem fluidum & rutilum emittat, omnia salva sunt; contra vero, si seæus.

6. Demum manifestum est ex prægressis a qua causa gangræna ortum habuerit; an ab œdemate, an a phlegmone, an complicato vitio ab œdemate phlegmonode.

5. Celeb gangræne propagatio.

6. Pulsus debilis & parvus cum horrore.

Diagnosis gangræne.

Limitum

Altitudinis.

Et causam gangræne.

Prognosis gangrænae tum in genere, tum in partibus lateri.

Prognosis. 1. Gangræna malum est quo non alterum periculosius cum necrosim inferat celerique passu a parte in partem proropat.

2. Potest imminens gangræna præcaveri, & incipiens reprimi; sed confirmata & in sphacelum degener nulla arte sanabilis est, nisi extirpetur; unde facile est singulorum pericula æstimare.

3. Bonum gangrænam rubro circulo circumscribi; id enim inter affectam sanamque partem certum discrimen intercedere significat.

4. Malum contra gangrænosam partem cum sana ita confundi gradaria colorum diminutione, ut certus gangrænae terminus assignari nullus possit; id enim denotat gangrænosum virus & latenter & late ad confinia serpere.

5. Sphacelus levi nec difficili excisione extirpatur, si præputium in viris, nymphas in foeminis, cristas ani in cinædis solum afficiat.

6. Graviorem & periculi plenam operationem exigit, si caput penis, alterutrum labiorum vulvæ, aut portio marginis ani morbo teneantur.

7. Nullam operationem admittit, si ad penis radicem, ad vaginæ ostium aut intra rectum processerit; sed res tota naturæ viribus committenda, cui debentur interdum curationes mirificæ.

8. De ægrotantis salute plane conclamatum est, si sphacelo ad interiora propere horror, rigor, syncope, debilitas pravitasque pulsus identidem recurrant; hinc enim lethalem noxam in venas insulam esse evidens est.

Curatio.

Pro triplici gangrænae statu triplex therapeja adhibenda est; 1. Nempe gangræna, si sit imminens, præcavenda; 2. Si incipiens, reprimenda; 3. Si confirmata & in sphacelum degener, extirpanda est.

Gangræna imminens præcavenda.

1. Ad præcavendam imminens gangrænam, 1. Removeantur obices omnes, quibus sanguinis & lymphæ circulatio retardatur, ideoque, nisi jam ante provisum fuerit, incidantur quam celerrime præputium in phimosi, & complicatæ præputii rugæ in paraphimosi, basisque pterygiorum in mulieribus crebris incisuris scarificetur, si nimis adstricta sit.

2. Provideatur celeri opera nimis vasorum turgescitæ, qua partis flaminibus discissis; & nimis lymphæ acrioris stagnationi, qua flaminibus eisdem erosio periculum est ne gangræna inferatur; ideoque pars crebris punctiunculis seu incisuris pertundatur magis minusve altis, prout imminet magis superficialia vel profundior gangræna.

3. Simul ac sanguis ex incisuris abunde manaverit, atque pars affecta opere levata fuerit, vasa, quæ prægressa dilatatione atona, vel nimia emollitione flaccida sunt, reddantur tono, firmitati, elaterio naturalibus, ut recuperato motu oscillatorio consuetam sanguinis & lymphæ circulationem renouent, a qua jam feriabantur; ideoque pars post scarificationem foveatur tepide spiritu vini sive solo, sive camphorato, sive etiam sum addito sale ammoniaco; spiritu vini theriacali; spiritu vini cum æqua-

æqua-

æquali parte aquæ calcis &c. linteisque contexta detineatur, quæ iisdem liquoribus jugiter madeant, & per modum embroches identidem irrorentur. Constat enim calore, partium tenuitate, punctione doloris sensu efficaciter inde sollicitari oscillatorium vasorum motum, humorumque singulorum circulationem, in quibus consistit partis vita.

4. Si qua sit in partis superficie nota seu macula paulo nigrior, ideoque gangrænæ magis suspecta, ut plerumque accidit in bali bullarum crystallinarum, pulvillus seu plumaceolus imponatur imbutus tinctura myrrhæ vel sola, vel ad æqualem dosim cum aqua phagedenica permista, quam gangrænâ incipientem efficaciter reprimi certum est.

5. Eadem tandiu admoveantur, donec pars detumescat, & ex incisuris seu scarificationibus pus erumpat maturum & laudabile, quæ sunt certissima signa non remotæ modo causæ, a qua gangrænæ periculum, sed etiam plane restitutæ in partu *vitalitatis*, quæ ambo explevisse in votis erat.

6. Interim ne negligantur auxilia cætera, quæ antecedentes gangrænæ causas possunt retundere vel debellare, sed dum topica admoventur, simul etiam vena semel atque iterum incidatur, si ita ferat morbi ratio, atque ægrotantis conditio permittat; largus imperetur potus ex decoctis herbis temperantibus & diluentibus, ut ex cichorio, borragine, buglosso, scolopendrio, pimpinella, agrimonia &c. si febrilis æstus vehemens sit; ex diaphoreticis vero & cardiacis, ut ex carduo benedicto, scabiosa, scorfonera, angelica, floribus camomillæ &c. si pacatior sit sanguinis motus; imo vero si pulsus depressior sit, cochleatim propinetur quolibet bihorio mistura, haustus, seu potio ex aquis cardui benedicti, melissæ, scabiosæ, angelicæ, scorfoneræ, scordii aut cinnamomi, quibus dissolvantur pulveres, electuaria, salia volatilia ex attenuantium, diaphoreticorum, cardiacorum familia juxta sequentem formulam.

R. Aquar. cardui benedicti.

Et meliss. ana ʒijß.

Quibus dissolv. diaphoretic. mineral. vel bezoardic. jovial. ʒß.

Sal. volatil. oleos. ʒß.

Tberiac. veteris ʒjß.

Add. Aqu. bordeat. cinnamom. ʒj.

M. F. Potio cujus sumantur cochlear j. vel ij. quolibet bihorio.

II. At vero si morbus medicamenta vicerit & in apertam gangrænâ abeat, missis remediis illis, quæ urgentiori malo imparia forent, ad efficaciora properandum.

1. Antiquiores quidem ne noxiorum humorum affluxu gangrænâ ulterius serperet, partem sanam munire satagebant *defensivis*, quæ constarent remediis e familia astringentium, v. g. Emplastro rubro:

II. Gangrænâ incipiens reprimenda.

cc.

cerato a Vigone descripto, *Prætic. Lib. 2. cap. 17.* aut cataplasmate olim usu receptissimo ex bolo armena, terra sigillata; pulveribus gal-larum, nucum cupressi, corticum granatorum, & myrtillorum; & farina hordei una coctis in oxymelite.

2. Gangrænosum deinde locum scarificabant, ut sanguis jam corruptus efflueret, & putridi vapores exhalarent.

3. Scarificationes calide abluébant & fovebant aqua muriatica, urina, lixivio forti cuti lupini incocti fuissent, oxycrato solo vel in quo unguentum Ægyptiacum dissolutum esset.

4. Inde admovebant firmum cabalinum calentem & oxycrato dilu-tum, vel cataplasma ex farinis oroborum, lupinorum, lolii, fabarum &c. coctis in oxymelite, quibus addebant succum ablinthii & marru-bii, sal muriaticum, imo etiam myrrham & aloen pulveratas, si inten-siori putredini medendum esset.

5. Si quid jam sideratum esse videretur, absumebant unguento Æ-gyptiaco, pulvere ulli calcanthi, vel trochiscis catharteticis variis, ut Andronis, vel Polyidæ, vel Musæ, vel ex alphodelis, qui in antiquio-ribus dispensariis olim obviæ recentioribus jam pridem exciderunt.

6. Hæc olim fuit Antiquorum therapeja ad gangrænam amoliendam, quam noluerim equidem acerbius rejecisse, quasi inefficacem vel noxiam ne iniquius dammare videar methodum, quæ multis emolumento quon-dam fuit, ac certe quam multo minus ausim vel approbare vel sua-dere, hac præsertim ætate, qua artem certiorém experientia fecit ex-emplo monstrante viam; siquidem jam licet exitiali & gravi morbo, quo non periculosior alter, qualis est gangræna, potentiorém, effica-ciorém, tutiorém medicinam adhibere sequenti methodo.

7. Itaque missis *defensivis*, quæ perspirationem inhibendo nociva merito censetur, pars gangrænosa ad vivum spisse scarificetur; imo si quid sideratum sit caute resecetur & detondeatur, tum ut tanto ma-gis imminuatur morbi fomes, tum etiam ut apponenda remedia tanto altius faciliusque penetrare possint.

8. Sanguine prius largiter educto scarificata pars, si gangræna læ-vis sit & superficialis, foveatur decocto aristolochiæ rotundæ, tinctu-ra myrrhæ vel aloes; unguento Ægyptiaco, quod spiritu vini campho-rato dissolutum sit, aqua phagædenica; vel quod cæteris præstat, tin-ctura myrrhæ & aqua phagædenica ad æqualem dosim permixtis & in quibus dissolutum sit unguentum Ægyptiacum. Pulvilli seu plumaceo-li iisdem liquoribus imbuti admoveantur, locusque apte contegatur & deligetur linteis spiritu vini camphorato vel solo, vel cum addi-to sale ammoniaco madentibus.

9. Si vero gangræna gravior sit & profundior, pars perfundatur spiritu
acti-

acido sulfuris per campanam educto; vel contegatur linteis madentibus solutione Mercurii in aqua forti seu stygia aut lapidis caustici vulgaris in aqua communi; vel illinatur oleo glaciali vitrioli, aut butyro antimonii; quæ singula pro diverso gangrænæ gradu vel more parcius largiusve affricare decet, & pura adhibere vel oleorum, unguentorum, pomatarum miscela varie temperate.

10. Quin imo si ad mali ferociam & firmiore & celeriore præsidio opus sit, pars inuratur cauterio actuali, acrius quidem leniusve, ferroque magis minusve candente, prout & morbi ratio postulaverit, & permiserit sideratæ partis conditio.

11. Caveatur tamen ab omni usu arsenici seu auripigmenti, & arsenicalium præparatorum, ut sunt magnes, rubinus, regulus arsenicales; sublimatum, oleum, butyrum arsenicalia &c. Siquidem ut supra monuimus *Cap. 6. §. 3.* experientia compertum est hinc remediis seu potius venenis, qualicumque arte adhibeantur, gravia symptomata plerumque inferri, ut deliria, spasmos syncopen &c. & deleteria, quæ pollent, virtute sanguinem lethali noxa infici.

12. Nota autem & usu confirmata propositorum causticorum & catharteticorum efficacia in amovenda gangræna tota repetenda est ex discrimine, quod intercedit inter partes, quæ tacita labe computrescunt, partesque cæteras, quæ putredinem nondum sensere. Ille quidem tenuissimis causticorum particulis, quas præ molliæ alte imbibunt, in liquamen funditis & æstutum dissolvuntur: Hæ vero firmitate, tono, motu oscillatorio quibus etiamnum valent, earumdem particularum non modo attactum diutius refugunt, & energiam pertinacius eludunt; quin imo acrius inde stimulatæ in fortiores crebrioresque oscillationes agi solent, unde faciliiori & promptiori sanguinis & lymphæ circulationi consulitur. Haud igitur mirum est causticorum facultate semiputres partes, quæ ad interitum præcipitantur, tam aperte discerni ab integris, quæ videntur inde maiorem *vitalitatem* adipisci.

13. At vero hoc opus, hic labor est tam cauto prudentique consilio causticorum vim, ac gangrænæ ferociam & densitatem conferre & pensare, ut neque imbecilliora caustica admoveantur, quæ putredinis partem intactam & in jugem mali fomitem cessuram relinquant; neque acriora, quæ sanas partes frustra absumant. Sed in tam præcipiti malo gravior peccaretur defectu quam excessu; adeoque ut incolumitati consulatur, satius est sanas partes aliquatenus erodere dura pietate, quam gangrænæ radicibus non extirpare culpanda commiseratione.

14. Cæterum ubi primum inusta escharæ ambitus rubro circulo circumscriptus observabitur, indicium est gangrænosam partem cohibita labe a subjectis partibus, quæ integræ sunt, sejungi potissimum si quæ

ma-

maturi puris guttæ intermediæ manent. Tunc itaque crustæ delapsus quam citissime procuretur, 1. Escharam scarificando, ut emollientia altius penetrent, & puri subitus latenti via fiat. 2. Oleosa & pinguis adhibendo, quibus crusta emolliatur & relaxetur, ut butyrum, cremorem lactis, ovi vitellum, adipem suillam, digestivum vulgare simplex vel ovi vitello temperatum &c. 3. Si nimia sit partis mollities, pinguis admiscendo ea remedia, quæ ad putredinem valent, ut tincturam vel pulverem myrrhæ aut aloes.

25. Escharam semel delapsa ulcus superstes, si sæptum sit, eluatur & foveatur primis diebus decocto radicum aristolochiæ rotundæ, vel foliorum absinthii, ruthæ, scordii &c. aqua calcis, tinctura myrrhæ vel aloes, pro diverso putredinis gradu. Detergatur deinde unguento Egyptiaco vel apostolorum, aut digestivo vulgari, cui tinctura vel pulvis myrrhæ vel aloes admista sint. Demum ulu balsami Arcei, & si opus sit, balsami viridis Metensium ad perfectam cicatricem deducatur ut artis est.

16. Cæterum ne negligantur interna remedia, saltém gangrænæ initio, dum omnia periculi plena sunt. Itaque si nimius sit sanguinis æstus, vena tundatur in brachio, largus potus imperetur ex decoctis herbis refrigerantibus & temperantibus supra propositis, enemata infundantur emollientia & demulcentia; imo etiam alvus subducatur identidem blandiore cathartico, ut medulla cassiæ vel manna Calabrina in sero lactis vel decocto cichorii.

17. Contra vero si contractæ arteriarum pulsu horror intercurrat cum periculo syncopes, potus præscribatur ex herbis cardiacis & diaphoreticis, quales supra recensuimus, ubi de gangræna imminente, viresque rescillantur usu potionis, misturæ vel haustus, qualem ibidem proposuimus, sed cui tunc addi necesse est, cum omnia in pejus ruant, cardiaca efficaciora, ut guttas Anglicanas ad gutt. xv. vel xx. lilium antimoniale Paracelsi ad gutt. xxx. vel xl. sal volatile viperarum aut salis ammoniaci ad gran. xxx. aut pulverem cocheniliæ tenuissimum ad gran. xv. aut xx. &c.

III. Gangræna confirmata exsurgenda.

III. Tandem si sphacelus confirmatus sit, neque jam spes affulgeat posse partem integram ulla opera conservari, necessum est, ne pars sincera trahatur, exitiali malo quod moras non patitur citam opem ferre extirpatione.

Igitur 1. Si præputii pars quædam siderata sit, pars illa statim abscindenda; si præputium totum corruptum sit, totum quoque circumcidendum: Locus vero incisionis deinde curandus est vel juxta methodum quam ad imminens gangrænâ, vel juxta illam quam ad incipientem modo proposuimus, prout exiget morbi ratio.

2. Similiter si pterygomatum alterutrum in foeminis, vel quædam in ano crista in cinædis necrosi tentetur, forfice ad basim excindenda, basisque incisa curanda est, ut modo de incisi præputii vulnere dictum fuit.

3. Quod

3. Quod si sphacelo ad cavernosa usque corpora jam progressio spea nulla sit posse mentulam integram superesse, ne morbus cunctando ulterius prorepat, siderata pars quam ocysime amputanda. Itaque mentula manu sinistra suspensa novacula vel scalpello refecetur ad gangrenæ ambitum, sed tamen in parte sana, ne quid residui supersit, quod sphacelo contaminatum sit. Deinde leniter expresso mentulæ trunco sanguis, qui manat ab arteriis pudendis interioribus & exterioribus, sistatur vel appositione frustulorum vitrioli cuprei gossypio abvolutorum, imo vero, si opus fuerit, levi ferri semi-candentis tactu, quo eichara inuratur superficialia; reliquo vulnere imponatur defensivum stypticum & astringens cataplasmatibus forma ex bolo armena, sanguine draconis, terra sigillata, gypso, gallis, aloes, mastiche &c. tenuissime tritis, & ovorum albumine exceptis ad mellis consistentiam. Omnia ex arte deligentur & cooperiantur linteis spiritu vini camphorato madentibus, eodem spiritu identidem irrorentur in modum embroches. Altero tertiove die detracto primo apparatu pulvilli digestivo, cui tinctura myrrhæ admixta sit, imbuti apponantur, continuata eadem embroche cum spiritu vini camphorato, donec manifesta appareant suppurationis indicia. Inde ulceris suppuratio digestivo eodem vel solo, vel cum additis tinctura aut pulvere myrrhæ; deterfio vero balsamo Arcegi, pariter vel solo, vel cum tinctura aut pulvere iisdem; demum cicatrix epuloticis ex artis legibus procuretur.

4. Simili modo, si alterutrum vulvæ labium, vel portio quædam marginis ani sphacelo afficiatur, ad vivum refecanda, extirpando si fieri possit, quidquid sideratum est. Inde cohibito sanguine astringentibus, ligatura, vel cauterio actuali, pars fovetur & irroretur spiritu vini camphorato cum sale ammoniaco; ac ubi primum suppuratio apparuerit, suppurantibus, detergentibus, vulnerariis epuloticis ad cicatricem ex arte deducatur.

5. Ceterum si unquam, maxime in casibus modo propofitis, interno cardiacorum usui insistendum est; quæ cordis motum, sanguinis circuitum, spirituum influxum tueantur, adeoque horrore, syncope, asphyxiæ efficaciter medeantur, de quibus videantur quæ superius dicta sunt.

CAPUT IX.

De Porris, Verrucis & Condylomatis genitalium.

§. I. DESCRIPTIO.

A Ccedit præcedentibus jam descriptis quarta morbi venerei species, verrucosæ scilicet excrescentiæ in genitalibus, quæ quandoque
Descri-
prio por-
rorum,
coi-

verruca-
rum, &
condylo-
matum.

coitu impuro, sed plerumque prægressis & male curatis cæteris affectionibus syphiliticis solent succedere.

In viris in toto pene germinant, sed potissimum in præputio & in balano, ad coronam aut juxta frænum: In fœminis vero in tota vulva, sed præsertim in pudendi labiis, in clitoride, clitoridis præputio & nymphis seu pterygiis: Ad ani ambitum efflorescunt in iis qui muliebria patiundo contaminantur: Demum in nutricibus, quæ lactatione morbum concepere, mammarum papillas, vel papillarum basim obsident.

Figura variant, sicut & situ: Si oblongæ, exiles & teretes sint, porri dicuntur; verrucæ si teretes quidem sed breviores planioresque; condylomata, si complanatiores sint & in oblongam aream extensæ. Demum cristæ si mole grandiores, in fimbrias seu lacinias latas & foliaceas excrescant.

Modo sponte decidunt exarescendo, sed superstite basi ex qua repullulant; modo permanent sed flaccidæ, molles & sensu fere orbæ; modo duræ, siccæ, rigentes & quasi corneæ sensu carent & vere callosæ sunt; modo vero dolent, ichoris quidpiam ex summo apice eructant & naturam carcinomatoden æmulantur.

§. II. CAUSÆ.

Causæ Compertum est papillas contextu nerveas, figura pyramidales seu potius cylindricas, modo sparsim, modo parallelo ordine insidere extimæ cuti, quæ genitalia in utroque sexu vestit, sicut, & cuti reliquæ qua cæteræ corporis partes obteguntur; & numerosas, confertas, prominentes maxime observari in balano, fræno, utraque præputii facie & extremo ejusdem limbo in viris; in fœminis vero in toto vulvæ ambitu, variisque prominentiis, quæ in vulva conspicuæ sunt, ut in nymphis, carunculis myrtiformibus, clitoride clitoridisque præputio. Prostant pares similesque papillæ & in ani confiniis, & in mammarum papillis, areisque papillas cingentibus.

Sicut ergo constat verrucas, quibus manus aut cæteræ quævis corporis partes quandoque deturpantur, fieri augmento papillarum istiusmodi cutanearum quæ præter naturam indurantur, sic etiam consequens est porros, verrucas, condylomata, cristas, quæ genitalia in utroque sexu infestant a causa venerea, simili ratione deducenda esse ab incremento papillarum ejusdem generis, quæ elongatæ extræ contiguam cutem supercrescunt, quotiescumque coniungit easdem uberius nutrir.

Patet autem descriptas genitalium papillas uberius nutriri non posse nisi gemina de causa; vel quia limpha nutritia copiosius convehitur; vel quia retinetur pertinacius. Sed priorem causam excludendam censemus,

ut

ut cui locus esse non possit, quoties agitur de incremento partis peculiaris. Restat igitur ut præternaturale papillarum incrementum in porros & verrucas ab herentia sola limphæ nutritiæ repetatur.

Jam vero, ut cæteras causas omittamus, quæ papillarum incremento favere solent sine contagii ullius interventu, & quarum in præsentī non satagimus, ideo tantum limpha in papillis pertinacius herere potest ex caula venerea, quod papillarum basis, quæ intra corpus mucosum sepulta jacet, occalescit energia contagii venerei, quo mucosus humor circumfluus inficitur. Inde enim recessus limphæ, ut qui per vasa limphatica mollia & ex se inertia fieri debeat, difficilior, ideoque parcius futurus est ejusdem accessu, ut cui arteriæ ipsæ destinantur, quæ tum elaterio tum oscillatione compressioni fortius renitentur; ac proinde quantuluscunque sit limphæ congestiæ excessus præ reventa, consequens est fore ut papillæ tacita limphæ congestione in porros aut verrucas sensim excrevant.

Docet autem experientia posse mucosum humorem, qui sub genitalium cuticula later, seminio venereo contaminari gemina ratione: 1. Quia tenuior portio virulenti tabi, quo genitalia madent quotiescunque res est cum infectis, per mediam cuticulam in subiectum corpus mucosum latenter imbibitur; & tunc porri venerei citra præcedentem corporis noxam concubitu impuro immediate succedunt. 2. Quia portio seminii venerei, quod in sanguinem dudum penetravit, mucoso humori inde secedenti infunditur; & tunc porri sine ullo recente concubitu, qui suspectus sit, a lue venerea pridem latente dependent.

Cæterum virus venereum in mucosum humorem quomodocunque infusum modo unicam cutis papillam, vel exiliorem papillarum manipulum singulatim afficit sed valide, & porros; modo vero papillas plures, juxta adhasas intra circularem aream sed debiliter, & verrucas; modo papillas plurimas, contiguas & in aream oblongam & fasciolas similem dispositas inficit sed debiliter, & condylomata. Modo demum papillas plurimas, sed valide, & cristas producit.

Discriminis hujus ratio ex diversa causa repetenda est, prout diversa supponitur prima contagii venerei scaturigo: Nempe, 1. Si virus illud portio sit tabi illius virulenti genitalibus affusi in actu venereo: Ex loci declivitate qua tabum huc vel illuc copiosius confluit, heretque ibidem pertinacius: Ex vitio cuticulæ superjectæ, quæ si sit alicubi faucia, abrasa, hiulca, superaffusum tabum facilius intromittit: Ex qualitate tabi venerei, quod est magis minusve aere & energicum &c. 2. Si vero virus idem scaturiat ab ipso sanguine pridem inquinato: Ex diversa laxitate cellularum corporis mucosi, quæ virus facilius copiosiusve admittunt: Ex diversa papillarum mollitie, quæ virus in finitimis cellulis latitans altius citiusque imbibunt: Ex diversa contagii natura, unde major minorve effitacia &c.

§. III.

Quæ papillæ ideo excrevant, quod earum basis occalescat energia contagii venerei.

Vel recens concubitu admitti, vel a sanguine dudum induratum in fæcto subministrati.

Unde pro numero papillarum, quæ afficiuntur aut pro gradu quo occalescunt, diversa emergit excrementaria facies.

§. III. SYMPTOMATA.

1. Excre- 1. Si a graviore obice limpha uberius retineatur in una vel pluri-
scentia bus papillis, verrucosa excrementia in longum producta cuti multum
longior supereminet; contra vero si a leviori obice parcius hæreat, excre-
vel bre- scentia depressior supra cutim minus extrahit.
vior.
2. Mollis 2. Si limpha, quæ in papillis retinetur, tenuis, aquosa, diluta sit,
vel skir- excrementia mollis, si vero viscida, spissa, tenax fuerit, excrementia
rhodes. dura, callosa, skirrhodes futura est.
3. Inter- 3. Si porrus longus, mollis, exilis, partis cui inhaeret calore vel in-
dum de- dumentorum affricu sensim exarescat, sponte quandoque decidet, sed
cidua, sed ex superfluitate basi cito denuo progerminabit.
viv-
radix.
4. Non 4. Si excrementia mollis & laxa, vel a fricatione nimia, vel ab acriore
raro in- medicamento doleat, advocato inde constrictorio partis erethismo solitus
flamma- sanguinis commeatus intercipietur; unde inflammatio, imo & abscessus.
tur, imo
& absc-
dit.
5. Quin 5. Si excrementia skirrhodes fricatione nimia, vel præpostero ca-
imo ac- thareticorum usu identidem irriteretur, calore quem dolor advocat in-
cedit ad durata limpha sensim rarefcet, unde dolor, calor, lancinatio, uno
carci- verbo carcinoma incipiens.
oma.
6. Ac in 6. Tandem si excrementia eadem durius aliquandiu tractata in dies
carcino- pejus habeat, & summo apice dehiscens ichorosum quid profundat,
ma de- fiet inde carcinoma, leve quidem & superficiale, sed jam confir-
generat. matum & apertum, & proinde nequaquam negligendum.

§. IV. DIAGNOSIS.

- Diagno- 1. Præsentia, situs, differentia, conditio porrorum, verrucarum,
sis excre- condylomatum, cristarum tactu & visu patent.
scentia-
rum.
Et cau- 2. An a venereo contagio ortum habeant conicere est ex numero.
satum a Rarum est enim genitalia unquam obsideri verrucosis excrementis,
quibus quæ multæ sint, sine labe venerea.
depend-
ent. 3. Porrorum tamen indoles apertius indicatur, si semel extirpati
sponte & sine causa repullulent.
4. Certo demum colligitur ex ægrotantis confessione, ut cui facile sit
verruca, quas in pudendis habuit a teneris unguiculis, distinguere a por-
ris ceterisve excrementis, quæ post suspectum veneris usum apparuere.
5. Similiter ab ægrotante discendum est an porri aut verrucæ suc-
cesserint impuro concubitu, qui recens esset, atque adeo a contagio
genitalibus nuper affuso progerminaverint? An contra citra concubi-
tum ullum, qui suspectus esse possit, sponte prodierint, atque adeo
a semine in sanguinem jam pridem infuso dependant?

§. V.

§. V. PROGNOSIS.

1. Venereæ genitalium excrescentiæ ex se quidem leves sunt, possuntque facili negotio radicitus extirpari.

2. At, vero ratione causæ graviores esse possunt, nempe si a seminio in sanguinem jam pridem infuso producantur, quoniam tunc luem veneream confirmatam arguunt, cujus hydrargyrosis unica medicina est.

3. Quin imo licet constiterit easdem inferri a tabo genitalibus recenter superaffuso in impuro concubitu, periculum tamen est ne virus, quod subter cuticulam jam penetravit, nec inde potest ulla ratione effluere, ulterius progressum sanguinem pedetentim inquinet, & luem confirmatam tandem inferat, si omittatur antivenericorum usus.

4. Hinc liquet luem confirmatam plerumque argui a porris & verrucis genitalium venereis, vel tanquam causam, vel tanquam effectum. Cave tamen ne cum Chirurgorum vulgo luem veneream in iis omnibus latere temere concludas, quorum genitalia vel presentibus obsidentur porris aut verrucis, vel olim oblecta sunt; cum certa experientia compertum sit porros & verrucas, qui a contagio dependent recentiter admissio, radicitus curari sine ulla noxa, quæ in sanguine superstes sit.

5. Porri, verrucæ, condylomata, cristæ genitalium, si inflammata in abscessum abeant aut si lancinantia carcinomatoden naturam contrahant, quam celerrime extirpanda sunt, ne cunctando finitimæ partes in ejusdem labis consortium trahantur.

Prognosis varia institui debet pro gravitate causæ, a qua dependent.

Et numero aut gradu symptomatum, quæ superveniunt.

§. VI. CURATIO.

Porris, verrucis, condylomatis, cristis duplex medicina facienda est; altera interna, quæ seminio virulento in sanguinem jam ingresso vel proxime ingressuro medeatur; externa altera, quæ partis vitium delect & emendet.

1. Circa internam quidem medicinam, si colligere liceat ex indicis urgentibus luem veneream latere, 1. Plena hydrargyrosi utendum est juxta methodum infra proponendam, cum ea tantum ratione virus, quod in sanguinem jam insulum est, certo debelletur.

2. Quod si ægrotans huic methodo ceu operosiori repugnet, at saltem adhibendæ sunt identidem leviores unguenti mercurialis inunctiones super genitalia, inguina, nates &c. vel præscribenda præparata Mercurialia, quæ diaphoretica sint & tacite antivenerica, interjectis identidem catharticis, quæ humores ad salivales glandulas confluentes deorsum deturbent, juxta methodum, quam supra proposuimus Capite 1. ubi de gonorrhœa.

Interna excrescentiarum therapia.

X

3. Si

3. Si vero nulla fuerit luis suspicio, & excreſcentiæ, quæ impurum concubitum ſequuntur, virus recens necdum ultra morbi ſedem progreſſum ſignificent, plenæ quidem hydrargyroſi licebit tuto parcere; at ſaltem, ut in præcedenti paragrapho levioribus inunctionibus vel iterato Mercurialium præparatorum uſui ſatis diu inſiſtendum erit, donec virus ſubter cuticulam illapſum perfecte proſtigatur videatur.

Externa
excre-
ſcentia-
rum the-
rapeja.

II. Jam vero quod ad externam porrorum, verrucarum, condylomatum curationem, variant jam pridem ſententiæ,

1. Antiquiores Medici excreſcentias omnes filo vel ſeta equina comprehenſas arte ligabant, donec exſiccatae ſponte deciderent. Sed ea methodus jam damnatur, nec immerito, cum dolore acrem ſemper, gravem inflammationem plerumque inferat arctiore ligatura; cum excreſcentiis calloſis, poſſimum vero ſi complanatae ſint & parum extenſæ, impar ſit, ut quas colligare non liceat; cum deſiſſo tantum extantium faſtigio baſi numquam medeatur, a qua ſuperſtite novæ excreſcentiæ brevi repullulant.

2. Satiſ eſt proinde excreſcentias ſummis ſiniſtræ digitis prehenſas forſice ad cutim proxime reſecare, & deinde modo nullus ad baſim callus ſubſit, levius quod ſuperſt ulcuſculum cicatrice quam celerrime obducere, quod plerumque faciliſſimum eſt.

Si quid vero calloſi lateat, operæ pretium eſt, ut priuſquam coeat cicatrix, callus vel ſuppuratione reſolvatur vel uſu cathæreticorum abſumatur, ne inde nova ſuccreſcat porrorum luxuries, vel quod pejus eſt, ne dereliſti calli in phymata radificentur.

3. Ea ſane methodus utiliſſima, quoties porris longioribus, qui duri & calloſi ſint, vel criſtis grandioribus & in plures lacinias diviſis medendum eſt, quoniam eo pacto levi ſcilique incifione horæ momento obtinere eſt, quod alioquin repetito acriorum cathæreticorum uſu vix forſan intra plures dies conficeretur cum ſumma ægrotantis moleſtia nec ſine gravi inflammationis periculo: Porro detruncatis ſemel excreſcentiis baſi caute proſpiciendum eſt, neque permittendum unquam ut præmature coeat, nondum reſolutis, ſuppuratis, emollitis vel abſumptis callis omnibus.

4. Sed methodus eadẽ ſatis commoda nequaquam videtur, quotieſcunque excreſcentiæ humiles brevioresque nec digitis ſuſpendi, nec radicibus excindi poſſunt; quamobrem præſtat ad cathæreticorum uſum conſugere, quæ porris, verrucis, condylomatibus illata vel admodum, non modo excreſcentiarum faſtigia, quæ prominent, detruncant, ſed earundem radices funditus extirpant, & quibus adeo nec certius nec efficacius quidquam novimus.

5. Inter cætera minoris notæ uſu probatiſſima ſunt & receptiſſima pul-

pulvis ex duabus fabinae pulveratae partibus & una ochrae; pulvis vitrioli cyprii; pulvis ex aequalibus Mercurii rubri praecipitati, aluminis ulsi & fabinae pulveratae partibus; pulvis Mercurii praecipitati rubri solus, vel cum aequali parte praecipitati Mercurii albi &c. quae singula porris & verrucis saliva prius madefactis insperguntur, vel butyro aut unguento basilicone excepta cum linamento iisdem admoventur, donec exsiccatae excrescentiae sponte decidunt.

6. Si porri & verrucae nimium callosae horumce remediorum vim eludant, possunt in usum vocari sequentia, quae potentiora sunt, nempe aqua aluminosa magistralis Fallopii; aqua phagædenica, quae cum aqua calcis & sublimato corrosivo paratur; aut oleum viridis æris per deliquium, quod ex ærugine cum nitro calcinata & in cella deliquescente conficitur. Hæc autem singula porris, verrucis, condylomatis vel guttatim instillantur, vel linamento imbibita iisdem apponuntur, cavendo ne vicinæ partes lædantur.

7. Imo vero si efficacissimis opus fuerit, quod tamen perrarum est, licet uti lapide vulgari cauteriali, lapide infernali seu luna cornea, oleo glaciali vitrioli, butyro antimoniali &c. iisque excrescentias leviter attingere, vel etiam derafa paucula lapidum ramenta, aut unam vel alteram olei butyri guttulam gossypio vel linamento exceptam iisdem caute applicare, sed confinis partibus emplastro defensivo probe prius minutis.

8. Cavendum tamen ne arsenicalia unquam adhibeantur aut corrosiva ulla ex arsenicalium familia, quoniam quantacumque arte præparentur, cicurationis nescia naturam semper retinent, adeoque acrius deurendo dolores intolerandos, inflammationes, spasmos, lipothymias &c. plerumque advocant; quin etiam lethalem quandoque noxam sanguini inurunt, ut jam non semel monuimus.

9. Basis ulcerata, quae superest porris, verrucis, condylomatis deciduis, curanda est vulgari methodo cum ballamo Arcæi, cui grana aliquot Mercurii praecipitati rubri admista sint, donec callis perfecte resolutis feliciter coeat, novos porros numquam productura.

CAPUT X.

De Christis, Moris, Ficis, Mariscis & Rhagadiis Ani.

§. I. DESCRIPTIO.

MOrborum localium, qui a semine venereo recenter admissio producantur, agmen claudunt affectus varii, qui solent in ano vel

juxta anum oboriri, ut cristæ, mora, fraga, fici mariscæ, rhagadia &c. quæ singula paucis jam exponenda sunt.

Descri-
ptio.
I. Crista-
rum ani.

I. Cristæ sunt elongatæ cutis appendices; situ & magnitudine variz; modo pendulæ, molles, flaccidæ, reliquæ cuti concolores, palis quæ a gallinarum mento dependent simillimæ; modo contra duræ, rigentes, callosæ & skirrhodes, cristis similes, quæ summo gallinarum capiti innascuntur. Si fricatione, contrestatione, distractione, usu acriorum remedium nimis irritentur, inflammantur, & nisi inflammatio cito resolvatur, in suppuratum abeunt si molles fuerint, si vero skirrhodes, in carcinomatoden naturam degenerant.

II. Thy-
morum,
frago-
rum mo-
rurum, fi-
corum, &
marisca-
rum.

II. Adnascuntur ano excrecentiæ aliæ densiores, sphæricæ, globosæ, capitatæ, granosæ, tenui pediculo cuti adhærescentes, quæ si mole minores sint, *thymi*; *fraga* vel *mora*; si majores, *fici* vel *mariscæ* dici solent ex similitudine. Modo molles, pulposæ, læves sunt; modo vero duræ, asperæ, skirrhodes. Ex se inflammationis quidem expertes sunt, indolentes, cuti concolores; sed si vizio sanguinis, distractione, contusione, usu acrioris topici inflammantur, vel in abscessum abeunt si molles sint, unde non raro ani fistulæ; vel si duræ fuerint, citra suppurationem calent, dolent, lancinant, uno verbo carcinomatodes fiunt.

III. Rha-
gadam
sive rha-
gadio-
rum.

III. In fundo sulcorum, qui radiatim anum ambiunt, fissuræ fiunt, Græcis *Rbagades* vel *Rbagadia* dictæ, quæ si superficialiæ ac labris molli- bus atque complanatis septæ sint, parum doleant, pure spisso, albo, maturo manent, boni moris; si vero profundæ, phagædenicæ, labris callosis, duris, extrorsum replicatis obvallatæ sint, identidem lanci- nent, & loco puris ichore diffuant, mali moris esse consueverunt.

§. II. CAUSÆ.

I. Cristæ
ani a pli-
cis ex-
crescen-
tibus.

I. Prima cristarum rudimenta in ano apparent, quoties ultra tonum vi sæpius anus distrahitur vel averfa venere, vel violenta duriorum sæcum egestionis; dum enim diducta cutis sibi denuo permittitur, laxata in sese concidit & in plicas pendulas corrugatur. Leviores illæ plicæ sese in dies paulatim promittunt in cristas, quoniam stagnante limpha uberius nutriuntur. Stagnat autem in iisdem limpha causa gema, 1. *Visciditate* quam habet seu ab admisto contagio venereo, seu ab alia quacunque causa, unde fit ut ægrius progrediatur, 2. *Nimia* partis ipsius *mollitie*, unde fit ut debilius propellatur.

Hinc ergo liquet cristas legitimas luem veneream & muliebrem patientiam frequenter quidem, sed non semper arguere.

II. Thy-
mi, mo-
ra, fraga,

II. Prostant ad ani ambitum vesiculæ, vel si mavis lacunæ multæ, quæ natura vacant secernendo humori pingui, viscido, sebaceo, ad podi-
cem

tem lubricandum a natura comparato. Ab hisce vesiculis, si mole tumeant, oriri solent in ea cutis parte quam occupant, excrecentiæ varix, globosæ, capitatæ, granulosæ, quæ ano adnascuntur; minores quidem & *fragis seu moris* pares, si vesiculæ & pauciores & minus extumeant; majores vero & *ficus seu mariscis* similes, si vesiculæ plures aut magis excrecant.

Illæ vero vesiculæ ideo tument & excrescunt, quia humor quem reconducunt, contagii venerei illapsu ita inspissatur, ut infra sua conceptacula hæreere, eadem sensim dilatare, & lymphæ circumfluxu regressum retardare vel suppressum necessum habeat, unde vesicularum tumefactio, accretio, ac demum supra cutim finitimam extuberatio.

Potest autem humor ille contagio venereo infici, vasa sanguinea ipso prius infecto, cujus vitia participat humor sebaceus, qui inde secedit; vel a *virulento semine*, quo ab ano stillatim manante podicis confinia non raro madent in iis qui aliorum libidini flagitiosissime serviunt.

Hinc liquet mōra, fraga, ficos, mariscas lue quidem veneream semper, at non semper flagitiosam venetrem attestari.

III. Rhagades fiunt vel distractione qua discinduntur, vel erosione qua ulcerantur rugarum interstitia in ano: *Distractione* quidem vel a violenta duriorum fecum egestionem, vel a flagitiosa cinædorum patientia: *Rosione* vero vel a virulentia humoris seminalis qui ab ano defluit in cinædis, vel ab acrimonia succorum qui a fluentibus vel suppuratis hæmorrhoidibus, aut ab intestinorum cavo, in dysenteria, diarrhœa, hypercatharsi &c. depluunt, & qui hærent impacti inter ani plicas.

Hinc liquet rhagades ani a lue quidem venerea aut ab impurissima venere quandoque fieri, at frequentissime a neutra causa sed a vitio leviori produci.

Pudet sane tustipia tam sæpe refricare, sed exigebat instituti operis finis causam minime taceri, quam maximo humani generis opprobrio experientia docet morborum venereorum causam esse & nimis veram & nimis frequentem. Imo vero poscere visa est ipsa honestatis ratio eandem causam sæpius inculcari, ut in quibus circa jecur ulcerosum tam male sana libido sævit, moniti aliquando sapiant, & si neque naturæ sensu revocari, neque terreri valeant Dei judicio, at saltem certa malorum hinc impendentium notitia a tam turpi flagitio tam abvertant.

§. III.

IATA.

1. Si criste lymphæ venereo infecta excreta futurae sunt, si tum inquinata

nullo vel paucio seminio venereo intra paucos dies rigentes & callosos exstiterint, seminio venereo mul-

1. Criste molles, vel callosæ.

2. Si.

2. Mariscæ pulposæ, vel skirrholdes. 2. Similiter mariscæ molles & pulposæ futuræ sunt, si limpha fluxili, pauca, pura nutriantur; contra vero si limpha viscida, uberi, virulenta, renitentes & skirrholdes.
3. Rhagades duræ, vel laxæ. 3. Pari quoque modo ex diversa limpha copia & qualitate repetenda est diversa laborum conditio in rhagadibus, quæ quidem dura & callosa, si limpha viscida, copiosa, contagio venereo gravior fuerit; contra vero mollia & laxa futura sunt, si limpha tenuior, parcius, purior sit.
4. Aliquando crissæ & mariscæ inflammantur. 4. Crissæ, mariscæ, rhagades, si distractione, contusione, pressione, contestatione; usu catharticorum; fecum alvinarum duriorum asperitie, vel earumdem liquidiorum acrimonia nimium irriterentur, coercito præ dolore sanguinis circuitu inflammabuntur magis vel minus intense prout sanguis ipse natura fervidior erit vel temperatior.
5. Aliquando abscedunt, vel abeunt in carcinomata. 5. Nisi vero inflammatio celeri resolutione evanescat inde crissæ & mariscæ, si molles sint, in suppuratum abituræ sunt, unde abscessus, apostema, fistula; vel in necrosim, unde sphacelus: Si vero duræ & skirrholdes sint, expansivam rarefactionem sensim concepturæ, unde dolor acer, lancinans, uno verbo carcinomatodes.
6. Et rhagades in abscessus vel in gangrenam. 6. Nec dispari ratione rhagades ipsæ semel inflammatæ; si molles fuerint, suppuratione cuniculos fistulosos subter cutem agent in podicem; vel necrosi in sphacelum descendent: Si vero callosæ, expansivo calore in carcinoma degenerabunt.
7. Sessioni, equitationi, egestionibus varie officiunt. 7. Quandiu crissæ, mariscæ, rhagades inflammatione vacant, vel mere skirrholdes sunt, ambulationi, sessioni, equitationi, fecum egestionibus officiant quidem, sed officiant parum: Contra vero si inflammatæ, suppuratæ, exulceratæ, carcinomatodes fiant, obstant ne eadem munia nisi cum dolore exerceantur.

§. IV. DIAGNOSIS.

- Diagnos. rhagadum. 1. Rhagades quidem visu solo facile dignoscuntur ex descriptione superioris tradita, cum suam sibi que propriam naturam habeant, quæ cum nullo alio ani affectu communis sit. At vero crissæ & mariscæ solent non raro cum hæmorrhoidibus confundi.
- Crissarum. 2. Crissæ tamen, si legitime sint, possunt ab hæmorrhoidibus ideo distinguui, quod ipsæ tenues sint & mere cutaneæ, nihilque intermedium comprehendant: Contra vero hæmorrhoides, utcumque subtiles sint & crissiformes, crassiores esse soleant, & quid molle ac pulposum in medio semper complectantur, cincinnos scilicet ad minus, capreolose arteriarum aneurismalium venarumve varicosarum, quarum dilatatione producuntur.
- Et mariscarum. 3. Mora vero, fraga, fici & mariscæ ab hæmorrhoidibus in eo differunt, quod excrecentiæ hujuscemodi globosæ, capitatæ, granosæ tenui

teretique pediculo podicis margini adhærescant; contra vero hæmorrhoides cuspidatæ, angulosæ, superficie læviores sint, & plerumque latiore basi ab ano vel ani margine dependeant.

4. Facile est conditionem statumve cristarum, mororum, mariscarum rhagadumve dignoscere visu tactuque, vel ad summum specillo: *Visu* nempe, *tactuque* an molles, callosæ, inflamatæ suppuratæ, ulcerosæ, carcinomatodes, sphacelatæ sint? *specillo* vero an cavæ; & si cavæ fuerint, an per basim foraminulentam fistulosos cuniculos alte egerint necne, & in quam egerint loci differentiam?

5. Difficilius est certo eruere an cristæ, mora, mariscæ rhagadesque ab averia probrosaue venere ortum habeant necne; sed nec juvat in tanta flagitia curiosius inquirere, decetque Medicum æqui conscium conjecturis parcere, tanto quidem magis, quod inde nulla accedat utilitas neque ad morbi prognosim, neque ad curationem instituendam.

6. Pluris interest statuere an affectiones hujuscemodi luem veneream præsentem indicent necne, vel tanquam causam a qua ipsæ sobolescant, vel tanquam coeffectum causæ ejusdem a qua & ipsæ dependeant, contagii scilicet illius, quod recens admissum & labem parti inusserit cui primum affricatum fuit, & simul etiam sanguinem latenter vitiaverit. Id vero licet tantum colligere ex conditione & syndrome signorum quæ luem significant, & de quibus infra *Libro IV. cap. 4.* quorum quidem unum aut alterum ex urgentioribus requiritur, si cristæ aut rhagades solæ adsint, quoniam priores illæ affectiones, ut supra §. II. dictum est, luem ex se perpetuo non indicant; unum contra aut alterum ex levioribus sufficit, si mariscis vel fisis anus obfideatur, quoniam posteriores istæ affectiones, ut ibidem expositum est, luem veneream satis ipsæ arguunt. Quod si cristæ, mora, mariscæ, rhagades suppuratæ, ulcerosæ, fistulosæ, carcinomatodes sint, tunc vel levissima suspicio prudenti Medico satis erit ut ad hydrargyrosim ceu ad sacram anchoram ocyus properet, cum in evidenti periculo latius sit remedium inutile, sed quod omni nocumeto caret, adhibere, quam omittere necessarium.

§. V. PROGNOSIS.

1. Cristæ, mora, mariscæ, rhagades, affectiones sunt ex se graves, cum curari non possint nisi extirpentur, nec extirpari nisi urendo & secando, hoc est duris, difficilibus, laboriosis operationibus.

2. Hinc ergo consequens est eo graviores & curatu difficiliores esse; quo numero plures, mole grandiores, duriore, crassiore, magis callosa basi dependent, ad ani ambitum propius adsint, vel in interiore recto magis radican-
 X 4

Diagnosis differentiarum, quibus affectiones illæ singulæ distinguuntur.

Diagnosis causarum a quibus dependent.

Prognosis cristarum, mariscarum, rhagadum, eo periculiosior. Quo affectiones

illæ plures, aut mali-
gniores. ri, & resectis graviora, calliosiora, latiora, magis dyslepulotica ulcera superfunt, quorum curatio difficilior.

Quosym- 3. Cæteris paribus eo quoque graviore censendæ sunt, quo graviora ptomata symptomata advocant. Crescit ergo singularum periculum, si callosæ, inflammatae, suppuratae, ulcerosæ, carcinomatodes, sphacelatae sint, cum ea sint totidem morborum monstra, quæ debellare difficillimum sit.

Quo a 4. Accedit tertia periculi causa, si cum lue venerea conjungantur, graviore sive recente, sive inveterata, utpote quæ in neutro casu radicitus curari possint, nisi prius expugnato seminio venereo, a quo excrescentias istiusmodi produci vel saltem foveri certum est; quod tamen nunquam obtineri tuto potest, nisi plena & legitima hydrargyrosi, atque adeo dura condicione.

§. VI. CURATIO.

Præmissa idonea præparatione. 1. Ægrotans efficaci therapeja præparabitur tum remediis universalioribus, venæ sectione scilicet & purgatione, quæ plethoræ & cacochyliæ medeantur; tum alterantibus, diluentibus, demulcentibus; attenuantibus, quæ sanguinis fervorem, acrimoniam, visciditatem corrigant vel temperent, nempe jusculis cum pullo gallinaceo vel frustulo carnis vitulinæ, & cichorio, scolopendrio, agrimonia, pimpinella &c. sero lactis; lacte asinino, caprillo, vaccino; aquis mineralibus acidulis; semicupio; balneo tepido aquæ dulcis &c. varia seligendo pro tempestatis modo, aut præviæ diatheseos ratione.

2. Deinde si qua legitima sit latentis luis venereæ suspicio, plena perfectaue hydrargyrosis adhibebitur, ut profligato seminio, quantumcunque sanguini inest, remota causa antecedente, possit inde morbus & tutius & felicius ad optatam curationem deduci.

3. Præmissa eo modo præparatione & hydrargyrosi, si ea forsitan uti visum sit, finita vel finiente, ad distractionem cristas, mororum, flicorumve deveniendum, ubi primum tempestas faverit. Neque enim sperare licet excrescentias, quæ in hyperfarcicos accrevere, posse unquam ratione ulla in arctiorem molem denuo cogi & pristinæ reddi angustia.

Cristæ & mariscæ extripandæ non ope ligaturæ. 4. Olim usu receptum fuit, cristas, mora, ficosve filo cerato vincire & in dies strictius & strictius colligare, donec sponte contabescerent deciderentque. Sed ea methodus nunc exploditur, neque immo-rito, 1. Quia plena est acris & diuturni doloris; 2. Quia cohibito sanguinis regressu graves inflammationes in ligatis excrescentiis plerumque excitat, quæ in suppuratum, in gangrænam, in carcinoma degenerant; 3. Quia ad cristas ficosve, quæ crassiore & calloso pediculo suspenduntur, vix unquam utilis est; 4. Denique, utut cætera omnia opti-

optime procederent, quia basim excreſcentiarum intactam ſemper relinquit, unde novi fungi cito progerminant.

5. Nec utilior eſt methodus altera, qua ſolent ani excreſcentiæ cathæreticis paulatim exedi. Nam 1. Ea methodus diuturnitate tædioſa eſt, ſi cathæreticorum. hyperſarcoticoſes grandiores ſint; imo etiam quandoque inefficax, ſi calloræ fuerint; 2. Dolore intolerando ægrotantes diſcruciat; 3. Gravem inflammationem non raro advocat, quæ ad anum ulque extenditur; 4. Demum abſceſſus & apoſtemata quandoque inſert inflammatione, ſi excreſcentiæ molles ſint; cæteras vero, quæ duræ & calloræ ſunt, ad carcinomatiſ indolem præcipitat dolore & irritatione. Attamen ſi excreſcentiæ minutæ, molles, pulpoſæ fuerint, ægro qui ferri aciem nimium expaverit, poterit cathæreticorum uſus haud ægre condonari.

6. Igitur una tantum therapeja tuta eſt, certa, efficax, ſcilicet excreſcentiaſ ſcalpello reſecare, vel detondere forſice. Sic enim horæ momento & dolore iſtanteo res conficitur, cæteroquin ultra mentem duratura cum ſummo ægrotantiſ dolore. In hunc finem æger apto ſitu primo componendus eſt. Itaque genubus inſiſtens & reclinato deorſum capite clunes extrorſum porrigat; vel quod plerumque commodius eſt, in latus jaceat & capite genubulque ad lecti interiora reductiſ nates extrorſum quam maxime proſerat, natiumque ſuperior a miniſtro quodam ſuſum reirahatur, ut inferior, ubi mali ſedes, Chirurgo magiſ obvia ſit.

7. Inde excreſcentiæ, cujuſcunque generiſ fuerint, ſive criſtæ, ſive mora, ſive marifcæ, quæcunque magiſ prominent & apprehendi poſſunt, ſiniſtra ſuſpendantur; & ſi latæ, duræ, calloræ baſi inſideant, novacula, vel ſcalpello, vulgo *Biſtoni*, ad vivum reſecentur; forſice vero exciſciantur proxime ad cutim, ſi exili, molliſque pediculo dependeant; quæ vero breviores humilioreſque ſunt extremiſ forſicis ſcapiſ comprehenſæ ad cutem deradantur. Quod ſi ſuſpicio ſit ne qua carcinomatodeſ vel gangrænodeŶ labes in excreſcentiarum baſi fortaſſe lateat, incifioni minime parcendum eſt, ſed ſatiſ alte excavandum, ut quæviſ carcinomatiſ radiculæ extirpentur, & deleantur omnia gangrænæ rudimenta.

8. Poſtea exterſo cruore baſi conditio exploranda eſt, atque 1. Si molliſ fuerit & labiſ immunis, ab omni incifione & ſcarificatione temperandum, nec pariſ ſaniſ ſana fruſtra dilanianda eſt. 2. Si vero grandinoſiſ & diſcretiſ calliſ conſiſta ſit, ſummo ſcalpelli acumine ſpiſſe ſcarificanda, ut uberior promoveatur ſuppuratio, qua ſpeſ eſſe poſſit calloſ omneſ reſolutum iri. 3. Demum ſi in callum uniformem & quaſi corneum indurata, aut ſaviſ inſtar ſoraminulenta ſit, aut ſi carcinomatiſ vel gangrænæ ſubſtrata tacitam labem inde contraxerit, ignito ferro ſive cauterio actuali alte deurenda, quo tollatur efficaciter morbi ſomes.

9. Deinde in duobuſ primis caſibuſ ſanguis fluens ſigamento ſiccò cohiben-

Nec uſu
cathære-
ticorum.

Sed ferro
exciſcien-
dendæ.

Deinde
ulcuſ, &
quod ſa-
perit, ex
arte cu-
randum.

bendus; imo si opus fuerit, quod tamen rarum est, pulveribus astrigentibus malicorii, balauustiorum, gallarum, aluminis, gyphi &c. ovi albumine exceptis. Apparatu illo postera die detrahto superstes plaga curabitur digestivo vulgari ex terebinthina & ovi vitello, quocum admiscebitur oleum hyperici, si foetidior videatur vulneris facies; tintura vel pulvis myrrhæ aut aloes, si quod immineat siderationis periculum; præcipitans Mercurius ruber, si calli duriores & resolutionis necis suppurationem eludant; sed singula diversa dosi, majori mino-
rive, nempe quæ variet pro diverso periculi modo.

10. Ubi primum remittetur suppuratio, digestivi loco utendum erit balsamo Arcæi ut plaga detergatur & regeneratio sensim promoveatur, quocum poterit identidem præcipitatus ruber admisceri, si ita e re esse videatur, ac tandem resolutis, suppuratis, vel exesis callis omnibus vulneris coitio in cicatricem permittenda.

11. In ultimo vero casu inusta est-hara butyro recenti, vel ovi vitello bis de die illinenda est, dum decidat. Deinde utendum digestivo vulgari, cum oleo quidem hyperici vel tintura myrrhæ aut aloes, si nimius sit ulceris foetor; cum præcipitato vero rubro, si qui calli superstitis ulceris fundum vel labra occupent. Demum ut deterfio & carnis regeneratio felicius procedant, balsamum Arcæi vel solum, vel cum balsamo viridi, si carnes fungosæ luxuriaverint, adhibendum est, donec vulnus perfecte consanescat.

Neque
dispar
curatio
rhagadi-
bus adhi-
benda.

12. Triplex distinguendus est ad therapejam rhagadum status, cutanea-
rum, profundiorum sed quæ tamen benignæ sint, & malignarum.

Cutaneæ quidem, si inflammatae doleant, foveantur lacte, sero lactis, decocto verbasci aut althææ, vel solo vel cum addito saccharo Saturnino; succo depurato plantaginis, sempervivi seu sedi &c. mucilagine ex seminibus psylli, lini, cydoniorum &c. cum aqua plantaginis extracta; oleo e vitellis ovorum, vel e semine lini diu in mortario plumbeo subactis, dum nigrescant. Si vero inflammatione vacent, abluantur sæpius in die aqua thermali quavis, Balerucana, Borboniensis, Bagneriensis &c. infuso vel decocto plantarum vulnerariarum, ut Alchimilla sive pedis leonis, faniculæ, bugulæ, pyrolæ, veronicæ, virgæ aureæ, angelicæ, betonicæ, prunellæ, vincæ pervincæ, pilosellæ &c. aqua calcis; vino rubro, cui ferrum ignitum intinctum fuerit; aqua vulneraria sive traumatica vulgari, quæ ex vino albo cum plantis vulnerariis modo dictis infuso distillatione elicitur. Lotis & deterfis illinatur butyrum; ceratum refrigerans Galeni paulo liquidius; album Rhasis; unguentum de cerussa; unguentum album camphoratum; unguentum diapompholygos &c. qua methodo brevi consanescunt rhagades, quæ cutaneæ sunt, levioresque ad anum fistulæ, & a nullo soventur sanguinis vitio.

13. Rhagades vero *profundiores*, sed quæ tamen benignæ sunt, id est quarum labra mollia sunt & callorum expertia, si acrius doleant, remediis iisdem, quæ in præcedenti articulo modo proposuimus, demulcendæ sunt; si vero inflammationis & intensioris doloris immunes fuerint, elui debent aqua phagedænica mitiore, vel lapide infernali leviter attingi, vel unguento Ægyptiaco curari, ut lurida & semi-purris ulcerum facies renovetur. Demum deterfis & mundatis ulceribus admovenda unguenta demulcentia, quæ supra proposita sunt, ut mitigata succorum affluentium acrimonia, cicatrice feliciter obducantur.

14. Si rhagades *malignæ* sint, id est labris duris, callosis, extrorsum replicatis, obscure lancinantibus &c. obvallatæ, ulcerosa facies spissis incisuris scarificanda, imo labra, si duriora sint, summis forficibus alte excindenda, quantum fieri poterit. Inde cohibito semel sanguine ope linamenti sicci, postera die rhagadum sulcis admovendum unguentum Ægyptiacum, vel basilicum cum præcipitato rubro; quin etiam si ea forsitan imparia sint, ulcera lapide caustico vulgari contingenda sunt, donec eschara inuratur, quæ ad vivum penetret; qua delapsa vel basilico vel balsamo Arcæi, solis, aut cum cathæreticis commixtis ex arte curabuntur.

15. Quod si rhagades maligniores ad *gangrenam* vel ad *carcinoma* jam desciverint, vel descituræ proxime videantur, tunc abjecta omni cunctatione urgentissimis malis occurrendum est. In hunc finem excisis deraisisque fornice partibus, quæ male affectæ sunt, ulceri cauterium actuale inurendum est, quo morbi reliquæ potentissime reprimantur. Postea delapsa eschara superstes ulcus, ut jam sæpe dictum est, ex arte curandum.

16. Demum si cristæ, mora, mariscæ suppuratæ, si rhagades ulcerosæ tacidos cuniculos ad podicem cæterasve vicinas partes clam egerrint, unde multiplex fistularum genus, cæcarum vel apertarum, profunde latentium vel cutanearum; rectarum, obliquarum, simplicium, compositarum &c. ubi primum specillo res innotuerit, conveniens operatio adhibenda. Sed hæc non sunt nostri instituti, quocirca adeantur, si ita lubeat, Auctores varii, qui ea de re ex professo scripserunt, vel consulatur (a) Dissertatio, quam de eodem argumento ipsi olim edidimus.

DE

(a) Dissertatio de Fistula ani. *Montpelii*, anno 1718. in 12.



DE MORBIS VENEREIS.



LIBER QUARTUS.

De Ætiologia, Diagnosi, Prognosi & Thera-
peja Morbi Venerei universalis,

S I V E

De Lue Venerea confirmata.

C A P U T P R I M U M.

Descriptio Luis venereæ confirmatæ.

Descri-
ptio luis
venereæ
confir-
matæ.



Lætenuſ de morbis venereis topicis ſive localibus, qui contagio recens admiſſo geniti, partes peculiareſ, unde hauſtum eſt, inſident, atque inde tacito progreſſu ſunt veluti prima incipientiſ luiſ rudimenta. Jam de lue eadem confirmata qua non una aut altera corporiſ pars, naturalifve œconomiæ functio una aut altera lædi, ſed qua ſingula fere corporiſ loca inſici ſingulaque munia perverti ſolent. Tam late patet mali natura, & tantam ſymptomatum diſcrepantiũ ſyndromen complectitur, ut non tam morbuſ unicuſ, quam morborum illiũ eſſe videatur. Ideo fruſtra laboraretur in definiendo morbo, qui arctiori- buſ definitioniſ cancelliſ comprehendere vix poteſt, multoque latiuſ eſt ac-

cu-

curata descriptione, & recensione potissimum symptomatum ejusdem naturam, formam, indolem & effectuum, quos producit, seriem & nexum sub uno aspectu ponere. Verum ut singula ordine quæque suo exponerentur, necesse fuit symptomata quibus partes, a symptomatis quibus functiones vitiantur, distingui; utraque vero revocari ad diversa propriae capita; pro diversitate partium vel functionum ad quas pertinent.

Itaque I. Morbi venerei genitalium recrudescunt, renovantur, de novo invadunt. 1. *Recrudescunt* quidem & maligniores fiunt, si qui forsitan praesentes sint. Hinc in lue venerea confirmata gonorrhœa virulenta, si qua ægrotantem affligat, acrior & pertinacior diutius fluit, & sæpius ingravescit: Hinc generatio plurium callorum in prostaticis, vesiculis seminariis, urethra: Hinc earundem partium apostemata, ulcera, fistulae frequentiores.

I. Morbi
genita-
lium.

2. *Renovantur* vero, si qui jam ante præcesserint sed dudum curati. Hinc in lue venerea confirmata accidunt sine causa manifesta in genitalibus ulcera cancrofa, porri, verrucæ, condylomata juxta anum fraga, fici, maritica; in inguinibus pani sive bubones; in testiculis tumores multiformes, spermatocele, varicocele, sarcocoele, pneumatocele, hydrocele.

3. Denique *de novo invadunt*, si nulli præextiterint. Hinc quotidianum est in lue venerea confirmata genitalia affici morbis localibus, quos nondum senserant, si unam excipias gonorrhœam virulentam, quam a sola lue & sine impuro concubitu produci nec unquam ipse observavi, nec a quoquam observatum fuisse memini.

II. Cutis multifariam afficitur, 1. Variatur, potissimum in pectore & interscapulio maculis ephelidum instar planis, non extuberantibus; roseis, purpureis, flavis, aut livescens; modo discretis, parvis, circularibus, lentiginosis; modo latius diffusis & expansis.

II. Affe-
ctiones
cutis.

2. Tentatur scabie, impetigine, lichene, herpete multiplici, sicco, fluente, furfuraceo, pustuloso, miliari, exedente &c.

3. Finditur in volis manuum plantisque pedum, Ycissuris seu rhagadibus duris, callosis, prurientibus, ichore tenui manantibus, & hinc suffossa cuticula soluto nexu mutuo a subiecta cute laciniatim secedit instar exuviae, unde *la Pelarelle*.

4. Infestatur tuberculis seu pustulis duris, callosis, circularibus, non fastigiatis, summa parte ulcerosis, plerumque siccis, & sine pure, sed aliquando humidis & manantibus, squamosis, furfuraceis, flavis, quæ frequentes sunt in commissuris labiorum aliisque nasi, præsertim circa frontem & tempora, poneque aures, ubi seriatim dispositæ veluti corallam referunt, vulgo *le Chapelet*. Inde totum capillitium, cæteraque corporis partes sensim occupant, maxime si pilosæ sint.

5. Glabrescit desluyio tum capillorum, unde areæ circa crotaphytas &c.

& in occipite, Ὠφθαλμῶν, Ἀλωπεκία calvities; tum etiam pilorum fere omnium, ita ut supercilia, genæ, mentum, inguina, pilis nudentur, unde *la Pelade*.

6. Demum ungues, qui extremæ cutis appendices sunt, inæquales, crassi, rugosi, scabri fiunt, & obortis ad radices reduciis, panaritio, inflammatione, ulcere sponte decidunt, unde *l'Onglade*.

III. Mor-
bioris,
narium
& fau-
cium.

III. Male habent oris, faucium & narium interiora; 1. Uvula five columella, tonsillæ five Παρίσχυια, totumque lacunar faucium dolent, calent, inflammantur, ulcere depascuntur, cariesque inde cum aditis ossiculis palatinis communicatur, qua brevi exeduntur.

2. Tubercula & pustulæ palato innascuntur, quæ in ulcera rotunda, cacoethea, phagedenica degenerant, quibus palati fornix osseus carie nonnunquam ad nares usque perforatur.

3. Membrana pituitaria simili labe infecta vel in polypos fungosos, ulcerosos, callosos, carcinomatodes extuberat; vel phlyctænis pluribus in ozænas seu malignas exulcerationes desinentibus tentatur, unde spongiosa narium ossa, ossa bina triangularia nasi, vomerque quo fulciuntur, carie erosa corruunt cum manifesta nasi depressione.

4. Hinc tam multiplici læsione organorum quæ loquelæ servant, vocis immutatio, raucitas, aphonia.

5. Gingivæ aphthis, parulidibus, ulceribus eroduntur, unde dentes dolent, vacillant, carioli fiunt, e sede decidunt.

6. Inde animæ sætor corruptis, ulceratis, putrescentibus locis, qua spiritus ducitur, scilicet naribus, faucibus & ore.

IV. Do-
lores in
variis lo-
cis.

IV. Dolores frequentes, acuti, atroces, noctu & in lecto præsertim sæviunt, dum corpus stragulis incaluit; natura, gradu, loco diversi, tensivi, pungitivi, pulsatorii vel lancinantes; 1. si quidem modo partes musculosas membranaceasque, & *Rheumaticorum*, modo vero ligamenta tendinesque qui articulos ambiunt, & *Arthriticorum*; modo demum musculos articulosque simul occupant, & *Rheumatico-artbriticorum* dolorum naturam referunt.

2. Inter cætera dolorum venercorum genera peculiari appellatione designantur dolores *Ischiadici*, quibus partes ossi Ischio aditæ, totaque coxendix externa; *Lumbago*, qua lumbi lumborumque muscoli; dolores Ὠστέοποι quibus ossa ipsamet discruciantur, quasi frangerentur aut terebra perfoderentur.

3. Cæterum partes doloribus venericis affectæ quandoque dolent & calent citra tumorem & inflammationem; contra vero quandoque tument & inflammantur in suppuratum abituræ nisi occurratur. Pari quoque inconstantia dolores modo fixi sunt & permanentes, modo contra vagi & erratici.

V. Ossa

V. Morbi
offium.

V. Ossa multiplici quoque noxæ patent: 1. In media & densissima parte in *Ἐξέσσεις* extument majores minoresve, modo submolles & quasi semi-pulposas, modo renitentes & vere ossæ, quæ nunc atrociter, nunc levius & tolerabilius dolent, imo verò quandoque indolentes sunt.

2. Ossa ad extremos fines, ubi spongiosa sunt & minus densata, tacita accretione seu *Ἐπίρροσεις* sensim dilatantur & intumescunt, tota quidem mole sed inæquali tamen modo pro inæquali compagis densitate, unde articularum, ad quos illa offium capita pertinent, tumor, dolor, ad motum impotentia, *Ἀγκύλωσις* &c.

3. Carie tentantur externa, quæ superficiem; interna, quæ medullam; universali, quæ totam ossis compagem labefactat, unde fragilia & semi-exesa levissimo ac fere nullo conatu diffiliunt & confringuntur.

4. Imo etiam observatione compertum est in demortuis medullam ipsammet, quæ offium cava replet, nonnumquam inflammata, suppuratam, exulceratam atrocissimos & vere osteocopos dolores excitavisse, atque abscessus, exostoses carielve in interna offium cavitate produxisse.

5. Constat quoque observatione ossa seminio venereo, quo alte imbuuntur, aliquando ita mollescere in *Οστεοάρθρωσι*, ut ceræ instar inflecti, comprimi & in angustius spatium redigi possint; quin imo semel emollita singulis partium mollium affectionibus, phlogosi, inflammationi, dolori, suppurationi, exulcerationi, fistulæ, gangræne patere.

VI. Limpha infecta vitium brevi communicat cum promptuariis vasisque quibus continetur, & cum partibus quas uberius alit. 1. Hinc glandulæ limphaticæ sive conglobatæ mole auctæ & in callos induratæ tumores varios, duros, mobiles, circumscriptos, strumosis tumoribus similimos in collo, axillis, inguinibus, mesenterio &c. efformant.

V. Vitia
limphæ
& glandularum
limphaticarum.

2. Dilatata, expansa, crassifecta limphatica vasa & hærente spissiore limpha turgentia gummata seu tumores molles & membranæ cystide conclusos variis in locis constituunt, quæ pro contentæ materiei qualitate, colore, spissitudine *Ἀσθράματα*, *Μελικηρῆδες Σπαστώματα* appellantur.

3. Hærens & indurata limpha intra villos membræarum tendinearumve partium quas nutrit, nodos in tendinibus, in nervis ganglia tophosque in articularum ligamentis producit.

VII. Oculi variis morbis tentari solent in syphiliticis. 1. Palpebræ densæ, asperæ, rubræ, pruriginosæ, lippæ seu lemosæ, callosæ, ulcerosæ, ficosæ, canerosæ sunt, & verrucis, hordeolis sive *Χαλάζιοις*, rum. grandinibus oblitæ.

VII. Mor.
bi oculo-

2. Adnata sive conjunctiva tenetur ophthalmia, contumaci, diuturna, œdematode, phlogode, inflammatoria, ulcerosa, phlyctænode, quæ comitem habet epiphoram continuam, acrem, salam.

3. Cor-

3. Cornea nubeculis seu albuginibus offuscatur, vel pustulis, phlyctenis, ulcusculis eroditur, quæ in Σποφύλωμα desinunt.

4. Humores inspissantur; vitreus, unde Γλαύκωμα; crystallinus, unde suffusio, barbaris *Cataracta*; aqueus, unde multiplex pilorum villorumve per aerem volitantium species.

5. Caruncula lachrymalis, quæ in majori oculi cantho Jatet, nimium excrescens unguem sive Πτερύγιον; ulceratus lachrymarum faccus fistulam lachrymalem sive Αἰγίλωπα; Iris, pupilla, uvea suppurata Τρόπον inferunt.

VIII.
Aurium.

VIII. Neque aures a labe vacant. 1. Frequenter adest sine causa ulla manifesta sibilus, tinnitus, murmur, Βαρυηχία seu auditus gravitas, surditas.

2. Aurium interiora, alvearium, cavitas tympani, sinus mastoideus, ductus hemi-cycliçi, cochlea, labyrinthus, doleat, inflammantur, abscedunt, exulcerantur cum dolore atrocissimo, intolerando.

3. Carie exeduntur ossicula quæ auditioni servantur, malleus, incus, stapes, os orbiculare, osseusque aurium fornix.

4. Limpha, ichor, pus, sanies defluunt ex alveario & aure interiore; quasi ex fistuloso sinu, cum fœtore summo & vere cadaveroso.

IX. Læsi
functio-
num, 1.
Anima-
lium.

IX. Functiones ipsæ ferociam mali brevi sentiunt; quæ lædi solent multiplici vitio, immutatione, abolitione, depravatione. 1. Functiones animales Καρδιαία seu capitis gravitate; cephalæ interna externave; clavo, ovo, hemicrantia; vertigine simplici vel tenibricosa seu Σκοπάμα; epilepsia tum idiopathica, tum sympathica; spasmo motibusque spasmoticis, tremore artuum, hemiplegia, paraplegia, paralyti particulari; hydrocephalo, agrypnia contumaci &c.

2. Vita-
lium.

2. Functiones vitales dyspnœa, asthma, orthopnœa, hæmoptoe seu sanguinis sputo, tussi sicca humidave, vomica, phthisi a tuberculis vel ab ulceribus pulmonum; cordis tremore & palpitatione, syncope, lipothymia, asphyxia; pulsuum inæqualitate & intermissione &c.

3. Natu-
ralium.

3. Functiones naturales Ανορεξία seu inappetentia, Απείψια seu indigestione, affectione hypochondriaca, singultu, frequenti vomitione; diarrhœa contumaci, biliola, serosa, stercoracea, lenterica, cœliaca; obstructionibus aut skirrhis hepatis, lienis, pancreatis; ictero flavo, nigro; hydrope abdominis seu ascite, hæmorrhoidibus cæcis, fluentibus, callosis, inflammatis, suppuratis, ulceratis, carcinomatodibus.

4. Uni-
versali-
um.

4. Functiones universales totius corporis marcore, atrophia, marasmo, virium languore, prostratione, imbecillitate; vultus decoloratione, pallore, livore; febre intermittente, periodica, anomala, erratica; febre continua lenta, hæctica, colliquativa, marasmode.

5. Demum fœming suas & sibi proprias grummas experiuntur; can-
crum

crum mammarum, suppressionem vel fluxum menstruum immodicum, muliebrem fluorem, passionem hysterica; inflammationem, abscessum, skirrhum, gangrænam, ulcus, carcinoma uteri; sterilitatem vel frequentem abortum, partum foetum erysipelate universaliter rubentium, squallidum, semi-putrium, ulcerofozum.

s. Functionum, quæ femininarum propriæ sunt.

Cave tamen putes symptomata ea omnia unquam concurrere, aut in subjecto quoquam simul observari. Singulos singula singulatim afficiunt, omnia vero neminem: Neque enim venenum quod conceptum est, utcumque in corpore multiplicetur, tot ac tam variis noxis inducendis sufficiens est, neque etiam si sufficeret, posset unquam hæc omnia symptomata simul advocare, cum pleraque inter se contraria, imo pugnancia sint. Sed ex quamplurimis syphilide laborantibus, qui singuli suo quique modo ægrotarent, plurima symptomata seligere & in unum congerere visum fuit, ut venerea lues pluribus descripta lineamentis accuratius depingeretur.

Cave etiam ne existimes recensita symptomata omnia luis venereæ propria esse, & ad luem veneream pertinere omnia. Contra notissimum est ut nulla *omni*, sic pauca *soli* luis venereæ convenire. Pleraque cum cæteris quibuscvis morbis communia sunt, paucissima vero, imo forsan nulla luis venereæ ita propria, ut pathognomonica dici optimo jure mereantur. Sed de his fusius infra ubi de *Diagnosi*.

Demum cave quoque ne credas symptomata luis venereæ descriptione supra allata exhausta esse, neque plura dari, quam quæ recensita sunt. Potissima quidem & frequentissima seligimus, sed non omnia; cæteroquin opus fuisset non modo morbos omnes, sed omnes etiam morborum differentias enumerare; siquidem experientia compertum est veneream luem Protei instar mutabilem & omnes morborum formas induere & omnes eorumdem species referre posse.

CAPUT II.

Causæ luis Venereæ confirmatæ.

Symptomata, quæ modo recensuimus & quæ luem veneream produnt & manifestant, neminem unquam adoriuntur, nisi cum infecto vel infecta concubitu, contactu vel affricu intimiore sese polluerit. Hinc ergo consequens est venerea illa symptomata a morbo semine sive contagio dependere, quod ab infecto in sanum latenter serpat; cum ea tantum ratione concubitus contractu vel sano vel sanæ nocere valeant.

Sed admissum semel contagium sive seminum tot & tam longe dissitas partes afficere: tot & tam varia munia pervertere non potest, nisi in uni-

Seminum morbosum contagione admitti in corpus sanum.

Et admissum univ-

Y

ver.

fum cor-
pus per-
vadere.

verfas corporis partes diffundatur; nec in univerfas corporis partes diffundi, nifi commisceatur tum humore quodam qui univerfas partes alluat, qui per univerfas circulet, qui ad univerfas virus secum deferat. Sequitur ergo virus semel admissum & cum humore quodam admisceri, qui totum corpus perluat & pervadat, & una cum humore illo ad omnia corporis loca & organa latenter traduci.

Commis-
ceri pro-
inde cum
sanguine
vel cum
limpha,
vel cum
utroque.

Sunt autem duo tantum humores, qui perenni & iterato fluxu refluxuque cunctas corporis partes jugiter irrorent, & cunctis infundantur, nempe sanguis & limpha; debet ergo venereum seminum cum alterutro commisceri, vel quod eodem recidit, cum utroque; nam ambo, licet in extremis arteriarum capillamentis secedant inde peculiaribus vasis versus cor revehendi, sanguis quidem venis, limpha vero vasis seu ductibus lymphaticis, una tamen denuo confunduntur in majoribus venarum truncis, præsertim in subclavia sinistri lateris, & inde cordis & arteriarum systole subacti, attriti, intime permixti, vitia si qua habeant, reciprocè inter se communicant.

Jamalibi
abunde
dictum
fuisse de
intro-
missione,
multipli-
catione
& effica-
cia con-
tagii ve-
neri.

Non quaerimus nec quâ via contagium venereum parti cuidam affusum & inhærens ad sanguinem aut limpham traducatur; nec quâ ratione guttatim traductum ocyus seriusve in sanguine augeatur & multiplicetur: nec tandem quâ vi, indole, efficacia semel multiplicatum fluida perdat & solida labefactet. Hæc omnia fuscè explicata sunt superius capitibus 2. 3. & 4. Lib. II. ubi demonstratum fuit 1. Contagium in sanguinem traduci via gemina, vel circulatione sanguinis, qui virulentas guttulas ab infectâ parte lambendo secum abripiat, vel circulatione limphæ, quæ ab inquinata parte regrediens in sanguinem, quocum denuo commiscetur, una secum devehat plurimas tabi virulenti guttas. 2. Contagium admissum ocyus seriusve multiplicari in sanguine ex depravata hæmatoseos œconomia, unde naturale sanguinis opificium pervertitur. Sic simili de causa contagia cætera, hydrophobicum, scorbuticum, pestiferum, scabiosum, in sanguine multiplicari; sic compari ratione fermenta quævis, panificum, cerevisiarium &c. in operando augeri certum est. 3. Denique contagium venereum esse acidæ vel acido-lasæ naturæ, corrosivæ & fixæ, quod ideo & sulfurea fluida, quibuscum miscetur, inspissare & coagulare; solida, quibus instillatur, rodere & exulcerare; & utroque nomine numerosam symptomatum, quæ recensita sunt, catervam inducere valeat.

Contagi-
um cum
sanguine
confusum
humores
quosdam
potius

Verum tamen, quamvis experientia compertum sit humores quosvis qui ab infecto sanguine secedunt, seminio istiusmodi affici posse & infestari, neque ullum penitus esse, qui integritatem suam queat perpetuo illibatam tueri, fatendum est contagium venereum humores quosdam potius quam alios ex se affeclare, cum his facilius promtiusque quam cum aliis affinitate conjungi; adeoque partes peculiare, quibus illi destinan-

tur

tur, muniæque quibus exercendis vacant, specialius & frequentius labefactare. Unde fit, ut licet symptoma morbosum nullum sit, quod a lue venerea dependere, quod cum lue venerea conjungi non possit, sint tamen aliqua, quæ ad illam luem frequentius, & ut ita dicam: essentialius pertinere videantur.

quam a
lios affe-
ctare.

In genere quidem constat virus venereum, cum natura pingue sit & viscosum, cum pinguibus, viscosis & insulis fluidis facillime commisceri, adeoque humores istius generis, ut sibi maxime analogos, citissime & ut plurimum omnium primos contaminare. Sed cum ea in re ex peculiari humorum natura & indole, quæ plerumque latet, non pauca diversitas intercedat, ac proposita modo regula exceptionibus pluribus inde pateat, operæ pretium visum est scalam sive tabellam harumce affinitatum ex observationibus quam maxime certis conficere, cujus ope uno quasi intuitu perspicere liceat quæ frequentissima esse soleant luis venereæ symptomata, atque inde tutius prælagire quæ proxime impendeant, & quæ præsentibus successura sint.

Itaque 1. Semen prolificum, quod in testibus virilibus elaboratur, humoresque seminales cæteri, qui in viris quidem in prostaticis, glandulis Cowperianis & lacunis urethræ; in sceminis vero in prostaticis, glandulis Cowperianis, & botryformibus glandulis vaginæ conficiuntur, primum potissimumque affinitatis gradum sibi vindicant; nec immerito: Virus enim venereum, quod e corrupto semine primitus gentium est, originariæ indolis retinens debet cum seminalibus fluidis proxime homogeneis facili connubio jungi. Hinc perpetuum est in syphiliticis semen & seminales humores contaminari, quacunque via non genitalium modo, concumbendo; sed etiam mammarum, lactando; oris, sugendo vel basiendo; cutis, cubando &c. contagium conceptum fuerit, unde tam frequentes sunt in confirmata lue venerea locales genitalium morbi.

1. Semen
humo-
resque
semina-
les.

2. Alterum affinitatis gradum obtinent humores ambo viscosi & oleosi, qui ad cutem pertinent, *mucosus*, scilicet, qui cellulis reticularis corporis inter cutem & cuticulam intermediis reconditur, & *sebaceus*, qui peculiaribus cutis glandulis seu potius lacunis secernitur. Hinc morbi multiplices cutis, cuticulæ, pilorum, capillorum, & unguium in syphiliticis adeo frequentes.

2. Humo-
res am-
bos, cutis
mucos-
um scilicet
& sebace-
um.

3. Tertius locus cedit tribus humoribus mucosis & pituitosis, qui faucium nariumque proprii sunt, nempe 1. Muco, qui e paristhmiis sive tonsillis, & columella sive uvula; 2. Muco, qui e glandulis palatinis, gingivis &c. 3. Muco, qui e glandulis membranz pituitariæ eructatur. Hinc tam variz in syphiliticis affectiones faucium, palati, gingivarum & narium.

3. Mucos-
um oris,
tum nari-
um.

4. Quartum locum assignandum censemus unguinosos & mucilaginosos

4. Humo-
hu-

res mucilaginosos, qui tum ossium capita, tum musculorum membranas oblinunt.

5. Medullares ossium succos.

6. Lympham.

7. Humores lymphaticos oculorum.

8. Cerumen aurium, & ipsam billem.

humoribus, qui ad motus artuum musculorumque molliendos comparati sunt, tum qui a glandulis juncturarum ad ossium capita oblinenda, barbaris *synovia* dictus; tum qui a glandulis membranarum muscululos & tendines vestientium; tum qui a glandulis periostii distillant ad periostii mollietatem & lævitatem tuendam. Hinc multiplex dolorum venereorum genus, arthriticorum, rheumaticorum, rheumatico-arthriticorum, ischiadicorum, osteocoporum, lumbaginosorum.

5. Proximas tenet pinguis & oleosus succus ossium medullaris, tum qui majoribus ossium cavitatibus, tum qui discretis extremorum ossium cellulis, tum qui multiplicibus lamellarum, ossium interstitiis inest. Hinc exostoses, ankyloses, caries ossium; atque medullæ in ossibus latentis inflammationes, suppuraciones, abscessus.

6. Inde in vicem succedit limpha pinguis & subviscida, quæ toti corpori communis est, qua universæ partes irrorantur & nutriuntur. Hæc contagio infecta, inspissata, acrior facta glandulas conglobatas, quas pervadit; vasa lymphatica, quibus revehitur; partes tendineas & membraneas, quas nutrit, in strumas vel tumores strumarum æmulos, gummata varia, nodos, ganglia, tophosque inflat & tumefacit.

7. Septimus locus debetur humoribus, qui oculorum, partiumve ad oculos pertinentium proprii sunt, nempe 1. Humori viscido & lemoso, qui manat a palpebrarum margine; 2. Humori sebaceo, qui a caruncula lacrymalis majoris canthi exprimitur; 3. Humori lymphatico & pituitoso, qui innumeris tenuissimisq; osculis e tota conjunctivæ & corneæ facie eructatur; 4. Humori lachrymali, qui e lachrymali glandula super oculi bulbum depluit; 5. Denique humoribus lymphaticis, qui vitreum, crystallinum, aqueum oculorum humorem constituunt. Hinc pro diversa eorum humorum infectione, spissitate, acrimonia, chalazie sive hordeola, inflammatio, lippitudo, *Τριχάσμα*, *Σύχαις* palpebrarum; carunculæ lacrymalis *Πιπύρις*, sive unguis; epiphora, ophthalmia in adnata; *Αδωάματα* sive nubes, pustulæ phlyctænæ, ulculcula, in cornea; fistula lacrymalis seu *ægyplos*, suffulo, abscessus; hypopyon, gutta serena, unde visus immutatio & cæcitas.

Demum agmen claudunt cerumen aurium & bilis, quæ & ipsa contagii venerei energiam sentiunt, quamquam serius, propterea quod alcalina, qua pollent, acrimonia, semini venerei vim salso-acidam diutius hebetent. Hinc fit ut infectum cerumen solito quidem spissius hærendo phlogosim, inflammationem, dolorem in meatu auditorio; solito vero acrius rodendo herpes, rhagades, exulceraciones ibidem producat. Hinc quoque fit ut bilis viriata solito quidem viscidior & in emissariis restitans obstructions, infarctus, skirrhos hepatis, & inde icterum, hydro-

pem

dem, hæmorrhoides; solito vero mordacior, intestina quo fuit stimu-
lando diarrhœas, dysenterias, fluxus hepaticos inferat.

Vix superest quid ultra eloquamur de cæteris humoribus, saliva,
stomachali & intestinali limpha, succo pancreatico; tracheali seu bron-
chiali humore, lachrymis, sudore, urina, &c. quoniam constat hos
omnes, ceu tenuiores & seriosiores recensitis tardius parciusque inqui-
nari, & inter se nullo vel fere nullo discrimine distingui.

Cæterum allatæ affinitatum scalæ seu tabellæ noli inconsiderantius con-
fidere, quasi omni exceptione major esset, neque possent symptomata, quæ
venereo contagio fiunt, a proposita norma vel tantulum unquam decli-
nare. In phyllicis rebus, medicisque potissimum constantiam tantam ple-
rumque frustra requiras, quoniam varia & mutabilia esse necessum est,
quæcumque tam multo variarum conditionum concursu nituntur. Et
sane in exemplum adduci potest quæstio, ipsamet de qua agitur: Quan-
tumvis enim natura si sibi permittatur & omnia paria sint, propositam
normam affectare aperte videatur, docuit tamen experientia multa
sæpius intervenire, quæ ordinem varie pervertant & inturbent.

Nempe 1. Si nativa vel adventitia sit in parte quadam debilitas, Varias
tamen
causas
esse, quæ
proposi-
tum or-
dinem
interver-
tere pos-
sint.
vitiumve ullum conformationis, pars illa cæteris paribus citius & ante
ordinem morbo tentabitur, tum quod humores infectos magis re-
tineat ob præclusam circulationis facilitatem, tum quod hærentes de-
bilibus repellat ob debilitatam facultatem systolicam. Sic antecedentia
vitia oculorum, pulmonum uteri &c. contagio venereo anam præ-
bent, ut partes easdem & celerius & efficacius adoriatur, quam ex
prædicta affinitatum scala sive tabella expectandum esse videretur.

2. Si humor quidam acrior, uberior, nimium sollicitatus, motu
præcipiti ad destinata loca jam ante confluat, virus venereum una ab-
ripi, ad eadem loca copiosius deduci & partes illas peculiare præma-
ture labefactare cogetur. Si diarrhœa diuturna, gravior coryza seu
catarrhus narium, fluor muliebris in sæminis &c. ad intestina, nares,
fauces, uterum &c. symptomata advocant in syphiliticis inexpectata.

3. Si humor quilibet alieno contagio inquinetur, virus venereum
superadditum efficaciam majorem inde contrahet, atque adeo bina ve-
nena confociata partibus, ad quas humor ille pertinet, & graviorem
& præproperam noxam inferent. Sic virus strumulosum, quo limpha;
aut scorbuticum, quo saliva inficitur, feminio venereo quod in iis-
dem humoribus quietum latet, ita calcar addunt, ut ad strumulos
glandularum conglobatorum tumores producendos, aut ad gingivæ
exulcerandas ocyus inde festinet.

4. Si adhibitis remediis topicis partis cujusdam, & humorum qui par-
tis ejusdem proprii sunt, integritati cauto consultum sit, pars illa quæ

alioquin citissime inficienda esset, vel nullomodo inficietur, vel inficitur tardissime & infra ordinem, qui ex scala competeret. Sic leviores genitalium frictiones cum unguento mercuriali tuto præcavent vel ad minus diu retardant venereos earundem partium morbos, qui cæteroquin ex notis affinitatis legibus fere omnium primi solent apparere.

5. Denique si casu quovis fortuito humorum decubitus in partem quamdam accersatur, inde tanto facilius virus venereum in parte eadem cum humore hærente stagnaturum est, & eidem labem tanto citius allaturum. Sic in syphiliticis sæpe accidit ut ossi ictu contuso exostosis, articulo lapsu distorto ankylosis vel dolor arthriticus, parti quæ frigoris acerbiteriam passa fuerit paralyssis, cuti leviter attritæ herpes &c. ex improvise suboriantur.

Haud inficias iverimus quin forsitan plures aliz reperiri possint exceptiones seu anomaliz istiusmodi, sed quas ipsi novimus candide proposuimus. Cæteras alii impertiant, si quid noverint rectius istis, vel allatis utantur, æquo animo nobiscum expectando, dum experientia quæ in rebus medicis rerum magistra est, certiora doceatur. Fatendum interim allatis anomaliis regulam, nedum ullis infirmari, sed omnibus potius confirmari egregie, cum vel ex anomaliis ipsismet liqueat Naturam sui constantem normam semper affectare, nec ab illa unquam vel tantillum discedere in anomalias, nisi vi cogatur. Hinc ergo colligere est propositam affinitatum scalam sive tabellam, quamvis satis certa non sit, ut plenam & perpetuam fidem impetret, ac saltem satis veram videri, ut a Medico artis gnaro ignorari non debeat, cum possint aliquando futura incipientis syphilidis symptomata inde prælagiri, imo etiam feliciter præverti.

Placuit ideo & in recensendis luis venereæ symptomatis, & in iisdem nunc explicandis huic normæ potius insistere ceu observatione certa probatæ, quam ordinem sequi arbitrarium alium quemlibet, & nullo nixum fundamento.

C A P U T III.

Symptomata Luis Venereæ confirmata.

§. I. MORBI GENITALIUM.

IN genitalibus quatuor humores peculiariter distinguendi sunt, qui veneno venereo infici, & infecti locales genitalium morbos inferre possunt. 1. Semen prolificum testium virilium; 2. Semen infecundum utriusque sexus, scilicet prostaticarum, glandularum Cowperianarum, & lacunarum urethræ in viris; in foeminis vero prostaticarum, glandularum

Cowpe-

Cowperianarum, & glandularum vaginæ; 3. Humor sebaceus glandularum cutanearum, quæ balanum & internum præputium in viris, in fœminis vero vulvam, in utroque sexu ani confinia obfident; 4. Humor mucosus, qui inter tenuissimam cuticulam glandis, præputii aut vulvæ, cutemque subjectam interjacet, sicut in reliqua corporis cute.

Itaque I. Si gonorrhœa recens antiquæ syphilidi superaddatur impuro concubitu, semen, tum quod a testibus in vesiculas seminarias confluit, tum quod in prostaticis & glandulis Cowperianis secernitur, adventitio vitio jam corruptum simul etiam virus jugiter hausturum est, sanguine jam pridem infecto. Hinc ergo gliscente in dies morbi virulentia propter fomitem continuum gonorrhœa malignior pertinaciorque & diutius fluxura est & sæpius renovanda.

II. Simili de causa diuturniore feminis vitio, quod a sanguine fovetur, limpha perluens feminis conceptacula in callos inspissata est, qui in dies majores & duriores futuri sunt, & tandem in apostemata, ulcera, fistulas non raro abituri, ut vidimus supra *Cap. 4. §. 2. Lib. III.*

III. Pari ratione si ulcuscula cancrofa, bubo, porri aut verrucæ in genitalibus, fici aut mariscæ in ano syphilidi jam ante contractæ de novo superveniant impura sed recenta venere, major singulorum malignitas futura est propter fomitem quem sanguis perpetim suggeret, quam quæ a solo contagio recens admisso expectanda foret. Hinc ergo ulcuscula acriore pure scatentia, magis phagædenica futura sunt; bubo, porri &c. spissiore limpha indurati vel enutriti, contumaciores; imo vero singula in callos & duriores & majores plerumque desitura sunt.

IV. Quod si supponantur syphilitici novi contagii immunes esse, nihilominus tamen semen habent illi utrumque, tum fœcundum, tum infœcundum fermento venereo pridem inquinatum, quod a sanguine transfunditur. Hinc ergo limpha, quæ feminis utriusque promptuaria, testes, vesiculas seminarias, prostaticas, glandulasque Cowperianas perluit, & inde tenuiorem feminis partem circulando haurit, idem contagium participatura est, quo nimium inspissata in glandulis inguinalibus, ad quas confluit, resitatura est, panolque seu bubones ibidem productura, de quibus supra *Cap. 5. Lib. III.*

V. Imo vero si semen prolificum nimiam ab admisso contagio visciditatem & spissitudinem contrahat, nec in testibus anfractuosis & replicatos vasorum spermaticorum gyros peragrarè, nec a testibus pendulis ad vesiculas seminarias sursum ascendere poterit. Hinc ergo futurum ut hærentis & resitantis copia vasa spermatica distendantur, unde spermatocele; cohibito sanguinis fluxu venosi surculi in varices inflentur, unde variocèle; retenta limpha pinguiore quædam testium loca in sarcofes excrescant, unde sarcocèle; demum a stagnante san-

I. Gonorrhœa si qua adsit, malignior & curatuficiliior.

II. Imo, quod pejus, callosa & ulcerofa.

III. Ulcuscula, bubo, porri, callosiores & curatuficiliores.

IV. Pani seu bubones in inguinebus.

V. Spermatocele, variocèle, hydrocele, vel pneumatocele testium.

guine vel limpha serum aut flatus vi extendantur intra vaginalem tunicam, unde hydrocele vel pneumatocete.

VI. Porri,
verruca,
condylo-
mata.

VI. Si a semine istiusmodi virulento, quod vel pollutione nocturna, vel concubitu etiam cum sano aut sana, vel per stillicidium post missionem emittatur ab ipso infecto balanus præputiumve in viris, aut vulva in fœminis ita madefiant, ut tenuioribus partibus, quæ per mediam cuticulam penetrant, subiectus humor mucosus veneno inquinetur, a mucosæ semel inquinato pulposæ bases papillarum cutanearum quas circumfluit brevi indurandæ sunt. Hinc ergo futurum ut papillæ cutis retenta limpha spissiore, qua nutriuntur, in porros, verrucas, condylomata sensim excrescant & exporrigantur, de quibus supra egimus *Cap. 9. Lib. III.*

VII. Ul-
cuscula
cancrofa.

VII. Si vero acrior feminis pars in hiulcas aliquot glandulas sebaceas irruerit, quæ in præputio, balano aut vulva frequentes sunt, humor, qui intus latet, vitiosam inde tum spissitudinem tum virulentiam concepturus est. Hinc ergo ab hærentia spissioris humoris, glandularum illarum in papulas tumefactio producenda est; a virulentia vero acrioris, earumdem erosio in ulcuscula cancrofa, de quibus supra *Cap. 7. Lib. III.*

VIII. Nulla iam
men go-
norrhœa
sine novo
concubi-
tu.

VIII. Numquam tamen hætenus observatum fuit semen tantam ab infecto sanguine sine ullo contagio recens admissio virulentiam posse contrahere ut conceptaculis perfecte sanis inflammandis aut exulcerandis compar fiat possitque adeo ulla unquam ratione gonorrhœam virulentam ex se de novo inferre sine contagii accessione, quod in concubitu impete factio introrumpat. Potest tamen antiquior gonorrhœa, quæ male curata substitit, renovari solo vitio quo sanguis & semen jam pridem infecta sunt, sed hæc ut patet, minoris sunt molis.

IX. In
ano ena-
scuntur
fraga,
mora, fi-
ci, mari-
scæ &c.

IX. Si ea quæ ex corpore egeruntur, virulento intestinorum mucos oblita sint, sebaceum humorem inspissatura sunt, qui in lacunis ano adfatis reconditur, & natura crassior est spissiorque. Hinc ergo ab humore illo intra suo conceptacula congesto, & ea sensim dilatante prodituri sunt ad anum tumores varii, fraga, mora, ficos figura referentes, de quibus supra *Cap. 10. Lib. III.*

X. Vel
leviores
in rugis
fissuræ
seu rha-
gades.

X. Si mucus ille, aut humor qui ab ano destillat vel egeritur, acrior fuerit, rugas ani quibus instillatur in fissuras erosurus est. Hinc ergo rhagades ani, de quibus supra *Cap. 10. Lib. III.*

XI. Cæterum possunt etiam porri, verrucae, & ulcuscula cancrofa genitalium, sicut & fraga, mariscæ, rhagadesque ani commode deduci ab affinitate sola, quæ inter virus venereum & sebaceum mucolumque humorem genitalium & ani intercedit, qua fiat ut humores illi primario & per se vitioso contagio a sanguine immediate contaminentur, adeoque memorata symptomata accersant, sine ullo feminis intervenitu.

§. II. VITIA CUTIS.

Duo sunt humores in cute, qui veneni venerei consortium facile admittunt, *mucosus* nempe, qui in spongiosis cellulis corporis reticulati cuticulæ immediate suppositi intercluditur, & *sebaceus*, qui e glandulis seu potius vasculis lacunive cutaneis sensim eructatur. Cæteros duos, qui e cute etiam scaturiunt, sudorem nempe & insensibilem perspirationem non moror, quoniam tenuiores sunt, subtiliores & nimis aquei, ut virus venereum, quod crassum est viscidumque, aut retinere possint.

Itaque I. Si mucosus humor connubio veneni venerei inquinetur, I. Scabies; imo etiam Herpes. majorem inde acrimoniam contrahet, qua summam cutem vellicaturus est: hinc pruritus frequens & impetigo: Erosio deinde fibrillis quibus cuticula cum cute alligatur, laxatam epidermidem in vesiculas miliaris sero pleno inflaturus est, quæ in ulculcula leviora dehiscunt; hinc scabies. Demum crescente malo graviores exulcerationes cuti ilaturus est, quibus exosa & exsiccata cuticula furfuris instar sponte decidet; hinc herpes siccus, furfuraceus, pustulosus, miliaris, exedens.

II. Cum cuticula nullibi crassior sit densiorque quam in volis manuum & plantis pedum, mucosus humor qui subtus latet difficiliter inde efflabitur per cuticulæ spiracula. Diutius ergo & ideo copiosius collectus calorem & pruriginem majorem ibidem excitaturus est. Hinc arefacta cuticula satiscet in rimas sive rhagades duras, callosas, prurientes, ichore manantes: imo etiam latenter suffossa & a subjecta cute sponte lecedens interdum deponetur exuviz instar. II. Rimæ, scissuræ seu rhagades in volis manuum

III. Si humor idem, sed benignioris veneni consortio minus acer summam tantum cutis superficiem levissime erodat in certis corporis locis seu areis intacta & illæsa cuticula, vasa cutis semi-lacera guttis seu stillis pauculi sanguinis roratura sunt, nativa humoris mucosi pelluciditas inquinabitur: Hinc ergo cutis maculæ planæ, non extuberantes, ephelidibus similes, discretæ, si in discretis cutis locis humor mucosus vitietur; latius expansæ, si in pluribus locis continuis; livescentes, purpureæ, rosæ, flavæ &c. pro rorantis sanguinis copia majore vel minore, aut diverso ejusdem colore, nigro, rubro, roseo, flavo &c. III. Cutis maculæ ephelidibus similes.

IV. Constat pilos capillosque singulos in rotundo vel ovali capitulo cartilagineo intra cutem latente, velut in testa florali radicari; pluribus exilibus, mollibus, mucilaginis fibrillis sive radiculis cum capituli fundo continuis enasci; gradaria sed latente harum radicularum accretione, quam limphæ pingui & mucosæ acceptam debent, succrescere & promitti. IV. Ophiatis & alopecia. Inde consequens est posse pilos capillosque triplici causa morbose defluere.

I. Si

1. Si limpha qua nutriuntur, contracta ab admisto contagio acrimonia, tenuissimas capillarum fibrillas trans versim succidat demetaturque, illæis tamen radicibus primis. 2. Si acrior & magis virulenta primas ipsas pilorum & capillorum radículas erodat & extirpet. 3. Si ulcuscula cutis ipsasmet glandulas seu capitula ovalia, unde pili capillive prodeunt, depalcantur & funditus pessudent. Hinc areæ, ophiasis, alopecia, capitis calvitium, imo etiam glabrities superciliorum, genarum, menti cæterarumque omnium pilosarum corporis partium; quæ vitia sunt modo quidem natura vel arte reparabilia, ut cum a prima causa dependent; modo vero ex toto immedicabilia, ut cum a duabus postremis inducuntur.

V. Unguium vitia & casus.

V. Similiter compertum est ungues, qui extremos digitos ornant armanque, e papillis nerveis tentineisve cutis strictè invicem unitis coalescere, mollihus in origine, pulposis, & reticulari cutis corpore circumdatis, donec firmitatem adeptæ sint: Cæteroquin ungues ubi induruerint, accretionis plane nescios sola harumce radicum molliorum nutritione, quæ limphæ viscidiori debetur, sensim extendi & extorsim promitti. Igitur si viscidior illa limpha, cujus appositione unguium radices crescunt & explicantur, spissitate vel acrimonia nimia peccet, quas a seminio venereo contraxerit, molles & pulposas radicum fibras distrahatur, tumefactura, corrosura, exulceratura est. Hinc unguium scabrities, crassities, hinc ad unguium radices reduviæ sive paronychiæ, inflammationes, panaricia, ulcera; hinc demum erosio radicum unguium casus.

VI. Pustulæ cutaneæ.

VI. Si humor sebaceus, qui vasculis seu lacunis intra cutem reconditur, ut stillatim affusus epidermida molliat & oblinat, veneno-venereo inficiatur, 1. Inspissabitur, unde conceptacula hærendo dilataturus est, & hinc tubercula cutanea, parva, discreta, dura, rotunda, parum fastigiata. 2. Acrior fiet, unde summum apicem conceptaculorum in tubercula dilatatorum latenter erofurus est, & hinc pustulæ venereæ seu ulcuscula cutanea, dura, callosa, circularia, plerumque sicca & sine pure, aliquando tamen humida & manantia, squamosa, furfuracea, flava &c. quæ in commissuris labiorum, alis nasi, toto capillitio partibusque omnibus pilosis frequentia sunt, ubi magis abundant glandulæ seu lacunæ sebaceæ.

§. III. MORBI ORIS ET NARIUM.

Humores duos in ore agnoscimus quibuscum virus venereum jungi amat; 1. Mucum scilicet viscosum, qui in tonsillarum cellulis glandulisque columellæ & totius lacunarum faucium secernitur; 2. Sebaceum & unguinosum humorem, qui e glandulis seu lacunis gingivarum & palati exudat, & quo lingua & dentes obduci solent, nisi detergantur. In eodem quoque censu numerandus in naribus mucus, qui e glan-

glandulis membranæ pituitariæ depluit, & internas nares emollit, si abundaverit emungendus.

Proinde I. Mucus faucium, si semini consortium admittat, tum in-spissabitur, atque adeo hærendo cellulas glandulasque quibus continetur, dilataturus est, venasque circumrepentes compressurus, unde tonsillarum, columellæ & lacunaris faucium tumor, dolor, phlogosis, inflammatio cum difficultate deglutienti; tum acrior fiet, atque adeo rodendo partes easdem exulceraturus est, unde tonsillarum, columellæ, lacunaris faucium ulcera dyssepulotica, maligna, cæcæthea, phagedænica, quibus palatina ossa apposita, quæ tenuia sunt, carie brevi tentari & absumi necesse est, unde hiatus ad nares.

II. Idem dicendum de sebaceo humore in palati glandulis secreto, qui semel infectus & spissior inde fiet, ut hærendo & conceptacula dilatando tubercula dura, discreta, rotunda, parum fastigiata in palati fornice producturus est, inflammatoria modo vero inflammationis expertia; & fiet simul acrior, unde summa tuberculorum fastigia erosurus est in ulcera rotunda, dyssepulotica, maligna, quibus ossis palati fornix superinductus carie ad nares usque interdum perforabitur.

III. Eadem quoque humori sebaceo gingivarum conveniunt, qui contagio venereo inspiissatus sua conceptacula in tumores grandinolos induraturus est, unde gingivarum tubercula; qui simul ex contagio eodem virulentus conceptacula indurata costosurus est, unde aphthæ sive ulcuscula gingivarum, suppurationes ulcetosa in extremis gingivis, parulides sive abicessus inter gingivas & radices dentium, ac demum pure ad tenuem membranam, quæ instar periostrii dentem intra alveolum con-vestit, sensim proropente, dolor, vacillatio, caries, casus dentium.

IV. Nec dispar est conditio muci narium, qui si contagio admissio nimium inspiisset, glandulas quibus secernitur, dilataturus hærendo & sensim tumefacturas est in sarcomata polyposa, callosa, fungosa, ulcerosa, carcinomatodea pro diversa lymphæ nutritiæ qualitate: Si vero nimiam acrimoniam causa eadem adipiscatur, easdemmet partes rodendo producturus est ulcera, phlyctænas & ozenas seu exulcerationes malignas, & hinc caries spongiosorum ossium narium, triangularium duorum ossium nasi, vomerisque ipsius cui innituntur, unde corruente nasi concameratione & depresso acrorrhinio, simi derepente fient, quibus ante nasus aquilinus fuerat.

V. Corrofa columella; ossiculis palatinis, spongiosis narium ossibus & vomere carie exelisis; depresso nasi fornice, necessum est vias quibus defertur aer qui efflatur, penes amplitudinem varie inmutari. Hinc ergo consequens est variandum quoque vocis tonum, ut ex Mucicæ pneumaticæ theoria liquet, unde sonus nasalis, vocis raucitas, aphonia &c. qui-

I. Ulcera faucium cum carie ossium palatinorum.

II. Ulcera palati, cum carie fornices ossis.

III. Ulcera gingivarum & casus dentium

IV. Ulcera narium & nasi depresso.

V. Sonus nasalis & aphonia.

quibus singulis symbolam quoque non raro conferunt inflatio, durities; alperitas, erosio & exulceratio tum tracheæ arteriæ, tum glottidis.

VI. Oris
fætor.

VI. Necesse est a spiritu, qui e pulmonibus expirando educitur, purulentra miasmata non pauca transeundo abripi ex faucibus, gingivis nari-
bulve, si exulceratæ sint, atque inde olidissimum odorem contrahi. Hinc
est quod syphilitici, qui ore vel naribus exulceratis laborant, id oleant

(a) *Quod sicca redolet palus lacuna,*

Quod pressa piger hircus in capella,

Quod his murice vellus inquinatum,

Quod jejunia Sabbatariorum,

§. IV. DOLORES VENEREI.

Ad contagium venereum quod irrepit, admittendum se facilia præ-
bent tria humorum genera, quæ ut artuum motioni conducant a na-
tura comparata sunt, nempe 1. Mucago muscularis, quæ extrema mu-
sculorum superficies mader, ut lubrica fiat. 2. *Synovia* seu articularis
mucago, quæ in juncturas instillatur, ne ossium attritus durior sit.
3. Mucago periostii, quæ exterior periostii facies oblinitur, ut super-
jecti musculi liberius moveri possint. Hinc ergo deducendi dolores
omnes veneri, quibus syphilitici dirum in modum discruciantur.

I. Dolo-
res rheu-
matici.

Nempe I. Si mucago muscularis venereo seminio graviora in con-
ceptaculis hæreat, grandinolos tumores excitatura est, unde cohibitio
vel retardato sanguinis fluxu dolor rheumaticus, tensivus, pulsativus,
cum tumore manifesto & inflammatorio; si vero fluat, sed acrior &
virulenta, mordicando & stimulando dolorem illatura est rheumati-
cum, acrem, pungitivum, cum calore quidem, sed sine inflammatio-
ne. Dolores autem istiusmodi hæc aut illa, plura vel pauciora loca
occupant, & vagi vel fixi sunt, prout muscularis limpha in his aut
illis, pluribusque vel paucioribus locis afficitur, vitiumve quo peccat,
permanens est vel mutabile; quæ singula varie variant pro partium
conformatione & qualitate, accidentium externorum concursu, & ve-
neni veneri natura & indole. Cæterum ad rheumaticos dolores ischia-
dici, sicut lumbago, referendi sunt, ut species ad genus, cum ad
musculos ambo pertineant.

II. Dolo-
res ar-
thritici.

II. Simili modo si mucagine articulari seu synovia, quæ virulenta
præ spissitudine hæreat, mucilaginosæ glandulæ unde scaturit, inflen-
tur, & coercito sanguinis circuitu inflammentur, dolor arthriticus
advocandus est, tensivus aut pulsativus, cum articuli calore, rubore,
in-

(a) Martial. Epigramm. 4. Lib. 4.

inflammatione : Sin vero mucagine eadem , quæ in juncturas libere quidem fluat, sed quæ justo acrior sit, ligamenta alte fodicentur, dolor arthriticus inferendus est acer & pungitivus, cum calore quidem, at vero plerumque sine tumore & inflammatione.

III. Si vero mucago utraque muscularis & articularis pari vitio laboraverint, hinc simultaneous futurus est, rheumaticorum & arthriticorum dolorum concursus, unde dolores rheumatico-arthritici, tensivi, pulsativi, acres, pungitivi, inflammatorii, vel non inflammatorii ex causis prædictis.

III. Dolores rheumatico-arthritici.

IV. Dolores osteocopi, quibus ossa frangi videntur, triplici de causa fiunt. 1. Si periostium ab hærente limpha, quæ ipsi propria est, infletur & præcipiti sanguinis confluxu inflammetur, unde dolor atrox, tensivus, aut pulsativus cum calore summo. 2. Si ab effluente limpha eadem sed acriore periostium fodicetur & erodatur, unde dolor acer & pungitivus sed cum calore minus urente. 3. Si ab ossis subitus in exostosem celeriter succrescente periostium vi distendatur & distrahat, ut infra videbimus, unde dolor terebrans.

IV. Dolores osteocopi.

§. V. MORBI OSSIIUM.

Succus medullaris, qui ossibus peculiaris est, tenuissimis, exiguis & arachnoidæis vesiculis fecernitur & secretus continetur, quæ sicut sedem, sic formam quoque triplicem obtinent; nempe in majoribus ossium cavitatibus racematim congestæ & communi membrana vestitæ in candelas veluti sebaceas compinguntur; in extremis vero eorumdem capitibus in tenues floccos distributæ singulas cellulas replent, quibus foraminosa ossium cavitas pervia est; demum in densissima ossium substantia in frustilla minutissima disgregatæ spatiola exiguiissima inter lamellas spissæ interjecta occupant. Cæteroquin natura succi medullaris eadem est ubique, nempe oleosa & unguinosa; usus idem, ossa scilicet emolliendi ne ariditate dissiliant; eadem quoque cum fermento venereo affinitas, quo solet facile infici, citius tamen seriulve prout conceptacula externæ frigoris injuriæ magis minusve patent : Itaque frequentissime succus, qui in frustillis medullaris substantiæ lamellis ossis interspersæ, unde exostoses cariesque ossium duriorum; rarius, qui in floccis capita ossium replentibus, unde ankyloses, cariesque ossium molliorum; omnium rarissime, qui in medullari substantia continetur ossium majorum cavitates occupante, unde abscessus cariesque in internis ossium cavitatibus.

Sic ergo I. *Exostosis*, ut Græca vox sonat, tumor est ossium, qui circumscripto tubere supra confinium partium libellam extrorsum prominet.

I. Exostosis.

Exostosium aliz spuriz sunt, quæ submolles prementi digito cedunt ali.

aliquantulum, acriterque dolent, imo etiam interdum lancinant; legitimæ aliz, quæ duræ & renitentes non cedunt & nullo vel levi dolore stipantur:

1. Compertum quidem est iterata observatione spurias induci sine ullâ ossis labe, solo tumore periostii ex causa supra proposita, *paragraphe præcedente*, n. 4. duri, skirrhodes & quod ossi subiecto ita adhæreat ut continuum esse videatur. Hinc ergo patet ratio tum quare exostoses illæ submolles sint, ut quæ in parte molli fiant; tum quare acriter doleant, imo vero lancinent & carcinomatodes fiant, ut quæ in parte fiant sensus acutissimi.

2. Legitimæ vero subdividuntur in duo genera, alterum quidem in quos os tumens in fornicem cavum arcuatur subter quem numerosæ latent cavernulæ lamellis ossibus distinctæ, & substantia carnea, firma, dura, cartilaginea plenz: Alterum vero, in quo os tumens intus plane solidum est, cæteroque osse candidius instar eboris, neque ullis cellulis, quæ conspicuæ sunt suffossam, sed contra solito durius compactiusque.

Liquet autem ex nota ossium fabrica prius legitimarum exostosum genus produci a frustillis medullaris substantiæ, quæ inter lamellas osseas interjiciuntur, si nempe succo medullari spisso, viscido, virulento ita pedetentim surgant, ut angusta spatiola, in quibus recondita sunt, in ampliores cavernulas dilatent, extimamque ossis superficiem in fornicem attollant.

Hinc ergo planum est 1. Cellulas, quibus in hoc exostosum genere ossa tumida multiforma sunt, nihil aliud esse præter spatiola, quæ interjecta inter lamellas osseas frustilla medullaris substantiæ recondunt, sed jam plus æquò ampliata, distenta, dilatata.

2. Substantia carnis æmula, imo plerumque carne duriore, quæ cellulæ replentur frustilla ipsamet repræsentari medullaris substantiæ, sed præternaturali accrescione mole aucta & indurata.

3. Exostoses hujusce generis dolere quidem, ut in quibus lædatur pars sensu prædita, sed plerumque dolere lenius quam quæ spuriz sunt, quoniam pars quæ læsa est, obtusior sensu pollet, quam periostium.

4. Contra vero atrociter quandoque dolere, imo etiam interdum lancinare, si substantia skirrhodes cartilaginis vel carnis æmula, quæ cellulæ opplentur, in carcinoma occultam abeat, ut potest variis de causis accidere, quæ repetantur ex *Cap. 6. §. 3. Lib. III.*

Alterum exostosum legitimarum genus fit uberiore nutrimento certæ ossis parti ideo appposito, quod ibi lamellæ osseæ sero medullave aquosiorē emollitæ vel acriorē semi-erosæ, lymphæ nutritiæ appulsui facilius cedant. Siquidem notum est lymphæ nutritiæ ad partem quamvis accessum cæteris paribus in eadem ratione augeri, quæ manuitur partis ipsius resistentia ad ul-

ulterioremsilationem, seu quod idem est, qua crescit partis mollietis. Itaque si succus medullaris, qui distillat a frustillis medullaris substantiæ ossibus interspersæ, acrior sit & corrosivus in certo loco, aut si a periostio, in quo limpha stagnat, serum acrius subjecto ossi infundatur, emolitione aut tacita & latente lamellarum ossæarum erosionem, locus fiet nimis earundem nutritioni a limpha uberius accedente, adeoque præternaturali accretioni in exostosem, vere ossæam & plane solidam.

Hinc facile est colligere exostoses illius generis dolore vacare, cum pars ipsa affecta sensu careat, periostium vero quod ossi superextensum eadem proportionem expandi necessum est, qua os ipsum mole excrevit, ita gradaria lentissimaque expansione distrahatur, ut inde nullus dolor excitari possit.

Cæterum licet æqualis similisque succi medullaris infectio in ossibus singulis supponatur, tamen quædam futura sunt ossa, & in iisdem ossibus loca quædam, quæ cæteris citius tentabuntur exostosi, 1. Nempe quæcunque frigori externo magis objecta sunt, & in quibus proinde inspissationi, quam medulla a veneno jam habet, accedit & altera quæ frigori debetur. Inde est quod exostoses frequentissimæ sint in dorso utriusque tibis, & in osse frontali sive coronali, in ulna & extremo cubito &c. quandoquidem ea ossium loca sola cute contegentur. 2. Quæcunque ictu vel casu contunduntur, quoniam violento lamellarum ossæarum attritu decubitus medullæ virulentæ in affecta parte procuratur, unde cita labe inferenda est ossis integritati.

II. *Hyperostosis*, ut vox Græce significat, tumor est ossium spongiosorum, quæ ita inflantur, ut pars altera alteram non superemineat, ut in exostosi, sed omnes tumorem æque participant. II. *Hyperostosis*.

Ea autem tumoris species ossibus accidit in lue venerea causa triplici; 1. Quia cellulæ ossæ singulæ, quibus ossa spongiosa constant, a contentis floccis medullaris substantiæ, stagnante succo medullari spissiore & virulento nimium surgentibus, extroffum impensius dilatantur: 2. Quia cellulæ ipsæmet ab instillato acriore succo medullari semi-exsectæ nutrimento, quod accedit, facilius inde cedunt, adeoque in crassiores molem sensim accrescunt: 3. Demum quia simultaneo utriusque prioris causæ concursu cellulæ ossæ a turgescenribus floccis medullaris substantiæ vi dilatantur, & ab acriore succo medullari emolliæ uberius simul nutriuntur. In primo casu mole augentur medullaris substantiæ flocci, & ideo quidem cellulæ ampliantur, parietes vero cellularum exiliores fiunt. In altero neque cellulæ neque flocci majores fiunt, sed cellularum parietes in crassitudinem majorem excreverunt. Demum in tercio, qui frequentissimus occurrit, pari passu flocci male crescunt, ampliantur cellulæ & cellularum parietes crassescunt.

Hinc

Hinc ergo sequitur 1. Capita ossium, quibus articuli constant, hyperostosi sæpenumero in lue venerea tumefacienda esse, quoniam ossium capita omnia sunt e genere ossium spongiosorum.

2. Inter cætera ossa spongiosa ossiumve capita, tum ea hyperostosi maxime obnoxia esse, quæ carne paucissima contexta citissime frigescunt, ut claviculæ, costæ, coxendices, & ossa quæ pedum, genuum, ulnarum &c. articulos constituunt, tum ea quorum textura ictu, casu, contusione debilitata fuit.

3. Ossâ spongiosa ossiumve capita hyperostosi tumesceri non posse, quin periostium, muscoli & ligamenta, quibus circumdata sunt, dolorifice distrahantur, magis minusve prout accretio ossium celerior tardiorve futura est, unde dolores rheumatismum vel arthritidem mentientes.

4. Hyperostoses in tota capitum osseorum mole raro & vix unquam æquabiles esse & uniformes, sed plerumque varie gibbas & anormale inæquales, prout inæqualis est eorumdem ossium densitas firmitalque in diversis locis. Hinc variz corporis deformationes, artuumve ankyloses, unde gibbosi, scambi, vari, valgi, scauri &c.

III. Vita varia medullæ ossium.

III. Medullarum substantiam, quæ in ossium majorum medutillio latet, iisdem morbis affici posse a veneno venereo, quibus cæteræ partes molles afficiuntur, liquet ex ejusdem structura, quæ ceterarum partium mollium structuræ compar ex vesiculis membraneis, nervis, arteriis, venisque perinde componitur. Morbis vero iisdem reipsa affici liquet experientia (a) qua compertum est medullarum ossium majorum substantiam ipsam quoque veneno venereo corrumpi, tardius quidem quam cæteras medullæ portiones, quia intimius recondita ab externis injuriis magis tuta est, quibus contagii venerei ferocia solet intendi; cæteroquin totuplici vitio modove: Nunc enim vesiculis, quibus componitur, medullari succo turgentibus quem acidius virus in sebum inspissat, duram inde & skirrhoten firmitatem acquirit, in carcinoma tandem aliquando degeneraturum nisi virulentia occurratur: Nunc vero vesiculis iisdem spissiore succo plenis & acriore stimulis, unde naturalis sanguinis circuitus derepente interceptitur, inflammatoriam phlogosim vel phlegmonem contrahit, nisi resolvatur in abscessum cito abituram: Nunc demum erosio sensim vesiculis iisdem a succo medullari, qui semini acrioris consortio corrosivam facultatem nactus est, ulcere maligno & esthiomeno corroditur.

Hinc consequens est 1. Dolores in ossium medutillio excitandos esse quoties medulla corrumpitur, cum certis constet experimentis (b) medullarem substantiam sensu pollere; & illos proinde vere osteoc-

pos

(a) Joan. Ch. Heyne. *Tentam. Medico-Chirurg. De præcipuis ossium morbis.* §. 19.

(b) *Memoires de l'Academie Royale des Sciences, année 1700.*

pos fore, tanto quidem graviore vel minus graves, quanto nervæ fibrillæ medullari substantiæ intextæ magis minusve tensæ erunt, aut contento succo validius vel ignavius stimulantur.

2. Ab apposita medulla male affecta sensim ita vitiandam esse concavam ossium superficiem, quæ contigua est, virulentia succi quem inde imbibit, ut quemadmodum jam explicatum est *n. 1. hujusce paragraphi* exostosis hinc inferenda sit, in interiore quidem ossis facie subsistens, si vitium leve sit, ad exteriorem vero extensa, si vitium gravius extrorsum prorepat; modo universalis & toti ossis longitudini æqualis, si tota medulla corrumpatur; particularis modo, & quæ ambitu annullari ossis peripheriam cingat, si definita tantum medullæ pars vitietur.

3. Ichore, pure aut sanie, quæ a corrupta medulla depluant, si semel abscesserit aut ulcerosa sit, inferius ossis caput, quod spongiosum est, in similis labis consortium brevi deducendum esse, unde capitis illius hyperostosis, ankylosis, apostemâ, caries &c.

IV. In syphiliticis ossa carie frequenter infestantur, ideo quod acrior & virulenta limpha medullave, quæ in ossium substantiam alte imbibitur in exostosi, hyperostosi, & periostii medullæ interioris vitiis, lamellarum ossæarum nexum ita relaxet, superficiem ita rodât, soliditatem ita pessundet, ut ossa cribri instar foraminulenta, multifariam erosa, & soluto partium nexu ruinola carie tandem corruant & dilabantur. IV. Caries ossium.

Hinc sequitur 1. Ossium cariem seminio venereo, inductam dolorem quidem illaturam esse acrem & urentem, si gemina causa concurrat, nempe si sedem habeat in parte ossis molli & spongiosa, ubi abundet medullaris substantia cui sensus inest; & si tanta sit humoris rodentis virulentia, ut una cum lamellis ossis celeri efficacia erodantur frustilla medullaria, vasa quæ ad ossa penetrant, periostii appendices &c. quæ inter lamellas interjecta sunt, & quæ sensu pollent. Contra secus nullo dolore manifestam fore si fiat in parte ossis durioris & densioris, ubi partes sensu præditæ paucissimæ sunt; aut si ab humore ignavius, debilius, tardius erodente producat.

2. Ossa cariola quandoque manatura esse ichore fœtidissimo ex concursu causæ geminæ; scilicet si quæ carie tentantur molliora sunt & spongiosa, adeoque pluribus vasis sanguiferis vel lymphaticis abundant; & si sanguis liquidior serosiorque lympham uberiorem suggerat. Contra vero quandoque sicca fore causæ alterutrius defectu, scilicet si ossa quæ cariem sentiunt duriora sint, in quibus vasa sint pauciora; aut si sanguis spissior sicciorque lympham parciorem suppeditet.

3. Cæterum cariem qualemcumque modo universalem fore & in toto osse, si antecedens vitium generale; modo vero particularem & in peculiari ossi loco, si vitium particulare fuerit: Modo externam & superficiariam,

riam, si externa tantum pars ossis ab exostofi exteriore, vel periostii inflammatione; modo internam, si interior ossis cavitas ab indurata vel putrescente medulla labefiat; modo demum internam simul & externam & totam ossis soliditatem pessundaturam, si exterior caries cum interiore in eodem loco concurrat, vel quod frequentius est, si interior ad exteriorem usque ossis faciem, aut exterior ad interiorem usque ossis cavitatem extendatur: Denique modo aream circularem occupaturam esse, si exostofi vel ulceri circulari succedat; modo vero annulari ambitu ossis peripheriam labefacturam, si a vicio medullaris substantiæ dependeat, quoad contiguam ossis continentis circumferentiam traducatur.

4. Tandem in omni ossium carie lamellarum ossium nexum & firmitatem pessundandam esse, tanto quidem magis quanto altior futura est latiorve caries; omnium vero maxime si totam ossis peripheriam annulari ambitu occupet. Hinc est quod in syphiliticis ossa cariosa tam fragilia esse soleant, ut sæpenumero in fragmenta dissiliant & diffingantur istu minimo aut saltem nisu lævisimo, potissimum si caries annularis totam ossis peripheriam ambiat.

V. Osteo- V. Osteofarcosis est lenta & tacita ossium emollitio, qua cartilagineam, imo etiam carneam naturam adipisci videntur.

Potest ea labe ab aliis etiam causis ossibus induci, quarum hic non satagimus, sed producitur frequentissime venerea virulentia ut testantur exempla quæ prostant apud Scriptores Observationum Medicarum, qua de re consule Joannem Fernelium, *De additis rerum causis, Lib. 2. cap. 9.* Jacobum Hollerium, *Observ. rarar. Observ. 7.* Petrum a Castro, in *Ephemerid. Acad. Natur. Curiosor. German. ann. 1. Observat. 37.* Daniele Protentium, *Actorum Hasniens. volum. 3. Observat. 24.* Georgium Hieronym. VVelschium, in *Observat. Medic. Observat. 82.* Dominicum Gagliardi, Romæ Professore Anatomicum, *Anatom. ossium Part. 2. Observat. 3.* Ludovicum Petit, Chirurgum Parisiensem, *Maladies des os, Tom. 2. Chap. 17.*

Contingit autem ossa eo pacto emollescere, quotiescunque humor virulentus, quo imbuuntur, solito quidem acrior, mitior tamen quam in carie, tacite dissolvit quicquid duri, solidi, ac vere ossei inest ossibus, cæteras vero partes illælas dimittit tendineas, membranofas, vesiculosas & vasculosas quæ interpositæ sunt; pari modo ac solent ferrum & æs ab aqua stygia penitus dissolvi, qua tamen mollior cera ne quidem attingitur. Sic enim partes illæ ab injuria tutæ & sui juris jam factæ jugi sanguinis illapsu per vasa integra nutrirî; perenni spirituum per nervos illibatos influxu vivificare; mollem dissolutorum ossium pastam deplere, stringere, conformare; uno verbo cartilaginis, imo carnis formam induere & speciem satis apte repræsentare debent.

Hinc

Hinc sequitur 1. Osteosarcosim modo doloris expertem fore, si mollioribus partibus quæ in osse latent, & quæ solæ sensu gaudent, nulla fiat injuria ab humore virulento benigniore; modo vero dolorem comitem habituram esse, si humor idem malignior & magis corrosivus molliores illas partes acrius stimulet, vellicet, erodat.

2. Ossa semel emollita tonicæ musculorum ambientium contractioni, superincumbentis reliqui corporis gravitationi, & causarum externarum energię facile cessura esse, unde multiplices deformationes partium, artuumve decurtationes, qui tunc statumine carent. Sic refert Prottenius ægrotum, de quo loquitur loco *supra* laudato annos 26. natum, in quo ossa cerea erant & flexilia, ad staturam infantis triennis decrevisse. Sic ipse olim Tolosæ vidi in noloscomio puellam, cujus ossa emollita & quasi cerea ita sensim decurtata fuerunt ante obitum, ut corpus longitudine tres pedes vix æquaret.

3. Ossa, quæ in carneam naturam desierunt, morbis omnibus, qui partium mollium proprii sunt, obnoxia fore, ac proinde inflammationi, dolori, suppurationi, apostemati, carcinomati, gangrænæ &c. qua de re adeas si lubeat, Antonium Benivenium, *De additis nonnullis ac mirandis morborum & curationum Causis*, 79. Alexandrum Benedictum *Anatomices Lib. 1. cap. 6.* Joannem Langium, *Medicinalium Epistolarum Lib. 1. Epistola 42.* Hieronimum Montium, *Tom. 3. Anasceves*, cap. 54. Thomam Bartholinum, *Ephemeri. Academia Naturæ Curiosior. Germaniæ, Decur. 1. ann. 1. Observat. 38.* Alhardum Hermannum *Gummiu Ibid. Decuria 1. ann. 3. Observat. 112.*

§. VI. TUMORES GLANDULOSI ET LIMPATICI.

Limpha humor est toti corpori communis & alter a sanguine. A corde in partes defertur ipsismet arteriis, sed ab extremis illarum finibus secedit ut partibus infundatur & instilletur. Hinc redit venis peculiaribus, numerosissimis, tenuissimis, pellucidis, arachnoide tunica vestitis, multiplici valvularum apparatu distinctis in brevina internodia, non uno continuoque ductu progredientibus cæterorum valorum ritu, sed per intervalla sæpius repetita in glandulas conglobatas sive lymphaticas desinentibus. quò velut in successiva diverticula lympham convehunt ad destinatos usus, donec tandem superatis remoris omnibus in subclaviam sinistri lateris confluat cæterosque majores venarum ramos prope cor, cum sanguine iterum commiscenda. Cæterum cum limpha natura subpinguis & viscida sit, ideo cum seminio venereo quod secum devehit in syphiliticis, satis apte consentit, ut debeat consortii damna frequenter experiri.

Proinde I. Si limpha seminio morbofo contaminetur, stagnatura est in variis glandulis conglobatis, tum quia spissior moras æstet in glandula-

rum
glandu-
larum
strumosi,
skirrholi,
gumma-
tosi, car-
cinoma-
todes &c.

rum anfractibus, tum quia acrior glandulas validius stimulando ad systolicam contractionem adigeret, qua via præcludetur. Hinc ergo futurum est ut glandulæ lymphaticæ in collo, axillis, inguinibus, melenterio &c. stagnante & inspissata limpha turgida indurescant in tumores circumscriptos, rotundos, glandulosos, strumosos vel strumosis simillimos, majores minoresve, racematim vel catenatim congestos, duros & adhaerentes, vel submolles & mobiles, qui modo in skirrhos & carcinomata, modo vero in abscessus & ulcera abituri sunt, si negligantur.

II. Melicerides,
atheromata,
steatomata.

II. Si limpha a seminio venereo viscidior in quibusdam lymphaticorum vasorum ramis seu ramorum internodiis iisdem de causis congeratur, futurum ut rami quidem seu internodia collecta limpha turgencia in tumores novos & insuætos dilatentur; tunica vero arachnoides qua vestiuntur, simul fiat crassior & in densam cystidem paulatim abeat ob largius appositam limpham nutritiam, quæ pressione retinebitur. Hinc ergo gummata sive tumores cystide conclusi, qui prout collecta materies colore & spissitudine ad mellis, pulvis, aut sebi consistentiam & similitudinem accesserit, melicerides, atheromata, aut steatomata dici solent.

III. Nodulæ, trophi,
ganglia.

III. Quod si pari de causa limpha virulenta hæreat intra contextum tendinearum partium quas nutrit, tum mora tum calore densius coacta & conspata constitutura est tubercula varia, globosa, dura, renitentia, supra partis libellam extuberantia. Hinc in periosio nodi, intigamentis artuum trophi, in nervis tendinibusque ganglia.

§. VII. OCULORUM MORBI.

In oculis partibusve, quæ ad oculos pertinent, prostant humores numero multi & usu varii, quibuscum virus venereum consortium multifariam inire solet: Nempe 1. Humor ille viscidus & sebaceus, qui a palpebrarum margine exsudat, quæ palpebrarum oræ obliniuntur, qui dum copia aut acritate peccat *lippitudo* dicitur: 2. Humor pinguis & sebaceus qui paucus prodit e glandula in majore oculi cantho obvia & falso lacrymali dicta; 3. Humor lymphatico-pituitosus, qui ex externa tota conjunctivæ & corneæ faciei guttatim & inconspicue exprimitur, ut oculi bulbos jugiter lubrefiat. 4. Lacrymalis humor, qui a glandula lacrymali in superiore orbitæ pare sita plerumque raris, aliquando crebris guttis depluit: 5. Deüm humores illi lymphatici natura proxime congenere, quibus vitreus, crystallinus & aqueus humores debentur.

I. Palpebrarum
inflammatio,
lippi-

Itaque I. Si lemosus palpebrarum humor veneno venereo acidiore inspissetur, in suis lacunis stagnaturus est, quas in dura, renitentia, rotunda vel ovata tubercula, palpebrarum margini adfusa dilaturus est, & hinc chalazia, grandines, hordeola palpebrarum. Si vero acriore veneno cor-

rosi.

rosivam facultatem adipiscatur, emissaria rodendo ulcuscula seu pustulas ulcerosas oræ palpebrarum illaturus est, & hinc palpebrarum inflammatio, lippitudo, densitas, asperitas, callositas, trachoma, sycofis &c.

rudo, trachoma, sycofis.

II. Pari modo si sebaceus humor glandulæ, quæ in majori oculi cantu obvia est, seminio venereo inficiatur, hinc quidem præ spissitudine stagnando sua conceptacula dilataturus est, unde glandulæ inflatio & phlogosis: Hinc vero præ acrimonia rodendo varia ulcuscula ibidem excitaturus est, unde glandulæ ejusdem exulceratio. Utroque nomine ea glandula, si malum protrahatur, inspissata limpha nutrita nimium excrecens ad pupillam sensum exporrigenda & præter sædam deformitatem visui non parum offectura, unde encanthis, unguis sive pterygium.

II. Encanthis, unguis sive pterygium.

III. Similiter si humor subviscidus & pituitosus, qui e vasculosis conjunctivæ lacunis erumpit, veneno inquinetur, spissitudine quidem emissaria dilaturus est in tubercula miliaria, dura, renitentia, conferta, quæ sanguinis vias angustando inflammationi locum datura sunt, unde Epiphora & Ophthalmia: Acritate vero summum tuberculorum apicem erosurus in ulcuscula minutissima, phlyctænoidea, phagedænica, unde ophthalmia ulcerosa omnium contumacissima.

III. Epiphora, ophthalmia.

IV. Nec dispari modo humor viscidus congener, qui e lacunis corneæ emanat, veneno simili infectus, si spissior lente hæreat, emissaria ita oppleturus est, ut opacitatem vel tota cornea vel varia corneæ puncta contractura sint, unde leucomata, albugines, sive nubeculæ: Si vero copiosius celeriusque stagnet, emissaria eadem ita inflaturus, ut singula fastigianda sint in tubercula minutissima seu miliares papulas cum levi phlogi & uredinis sensu, unde phlyctæne corneæ: Demum si acrior papulas easdem sensim ulterius erodat; pustulas totidem circulares, cavas, phagedænicas producturus est, quæ in ulcera maligna & cacoethea, imo in staphylomata non raro desitura sunt, nisi medicina cito pareatur.

IV. Albugines, phlyctæne, staphylomata.

V. Fatendum sane lacrymalem quoque humorem recensitis palpebrarum, adnatæ & corneæ vitiis symbolam nec efficacem collaturum esse, quotiescunque seminio venereo gravidus futurus est, ut qui partes illas madefaciat perpetuo atque adeo noxam eisdem inferre tanto magis valeat. At verò experientia constat lacrymalem humorem cæteris humoribus, de quibus hætenus, & tardius & minus infici venereo seminio, quoniam cum tenuior sit serosiorque, contagii viscidioris miscelam peritaciùs respuit & refugit.

VI. Si puris acrioris particulæ ab erosio, suppuratis, ulcerosis palpebris adnatæ corneæ decerptæ una cum lacrymali fluido in saccum nasalem deferantur, internam sacci faciem brevi eroluræ sunt, unde fistula lacrymalis sive ægilops. Potest tamen morbus idem aliis quoque causis & sine prævio oculorum ulcere inferri, nempe papula venerea intra sacci

VI. Fistula lacrymalis sive ægilops.

nasalis cavitatem enata, quæ suppuretur; exostose ossium nasi, quæ faccum comprimendo lacrymarum stagnationi & putrescentiæ ansam præbeat; caries ossis unguis a fomite venereo, quæ superjectum faccum nasalem exulceret &c.

VII. Hæ-
malops,
inflam-
matio in-
terna, hy-
popyon.

VII. Si virus ad humorem vitreum, crystallinum aqueumve penetraverit, & acidius sit, præternaturalem illorum humorum inspissationem induciturum est, unde glaucoma, suffusio seu barbaris *catarrha*, aut inanis villorum in aere volitantium species: Si vero acrius, eorundem humorum vasa tunicalque multifariam exulceraturum, unde fuggillatio sive hæmalops, inflammatio seu ophthalmia interna, abscessus, hypopyon, totius oculi suppuratio &c.

VIII.
Gutta se-
rens, cæ-
citasque.

VIII. Demum in syphilide haud raro accidit visus immutatio, cæcitasque a nervorum opticorum paralyti, quæ barbaris *Gutta* seu *Fluxio ferens* ideo dicitur, quod in oculis omnia sint perspicua & pellucida. Porro autem contingit in syphilide nervos opticos ideo resolvi, vel quod obstruantur spiritibus veneno inspissatis, quod rarius est, vel quod comprimantur arterioli interpersis, quæ sanguine spissiore turgent; nodis gangliisve obortis in tunica qua vestiuntur; aut exostosis quæ foramini osseo, qua transeunt, innascuntur; quæ frequentiora sunt.

§. VIII. MORBI AURIUM.

Cerumen aurium in alveario seu meatu auditorio secretum unicus humor est, qui auribus peculiaris sit. Etsi sulfureum sit & mellis instar viscidum, quo nomine cum veneno venereo congener esse videtur, ideo tamen cæteris corporis fluidis & rarius & tardius infici solet, quippe quod acidi venerei consortium vel refugiat vel hebetet innato amarore. Inficitur tamen quandoque & hinc *prior* classis morborum venereorum, qui auribus proprii sunt.

Præterea ossa interioris auris claustra, variaque officula ibi latentia exostoses, hyperostoses & caries a syphilide experiuntur, perinde ac cætera ossa, imo etiam frequentius, saltem si ulcuscula venerea fauces vel tonsillas infestent, propterea quod expirati aeris pars tubi seu Eustachianis seu aquæ-ductibus in cavitates tympani deducta illuc una secum deferat non pauca virulenta miasmata, quæ ab ulcerosis locis abripit transeundo, & hinc classis *altera* morborum venereorum, qui ad aures pertinent.

I. Fissu-
ræ, her-
petes, ul-
cuscula
in meatu
auditorio

Itaque I. Cerumen aurium, si quando contagium conceperit, inde quidem solito spissius, stagnaturus est in secretoriis lacunis, tanta copia ut dilatis conceptaculis compressisque idcirco venis juxta repentinis phlogosis, inflammatio, dolor in meatu auditorio excitanda sint,

in

in abcessum non raro abitura : Inde vero solito acrius internam meatum ejusdem cavitatem ita erosurum, ut fissuris, rhagadibus, ulculculis multifariam defœderetur in herpes malignos, imo etiam in ulcera cœcoethea sæpe degeneraturis. Hinc ergo alterutro nomine ab auribus fluxura sunt pus, ichor, sanies &c.

II. Olsa internæ auris præter generales causas exostoseos & hyperostoseos, quas cum cæteris corporis ossibus communes habent, patent etiam causis aliis peculiaribus, videlicet tetris halitibus qui a faucibus ulcerosis per tubas Eustachianas seu aquæ-ductus in aurem internam penetrant inter expirandum, & qui olsa obvia miasmatis virulentis, quibus gravidi sunt male afficiunt. Hinc ergo syphiliticis sæpe adfuturæ sunt exostoses in fornice osseo tympani, sinus mastoidis, labyrinthi &c. vel hyperostoses quatuor ossiculorum auditioni inservientium, incudis, mallei, stapedis & ossis orbicularis.

III. Ea olsa exostosi vel hyperostosi tumefacta a virulenta limpha, qua imbuuntur, sensim erodenda sunt & tacita carie exedenda ex causis supra allatis §. V. n. IV. Hinc ergo futurum est tum ut pus seu potius ichor fetidum & graveolens a cariosis ossibus defluat in tympanum, & erosa membrana tympani e meatu auditorio stillatim scaturiat; tum etiam ut una cum pure non raro prodeant ossicula integra, quæ auditioni conducunt vel saltem eorumdem fragmine, aut varia ossea ramenta a fornice internæ auris erosionem decidua.

IV. Sanguis in syphilide sæpe stagnat in encephalo lentore nimio, ut infra videbimus §. IX. n. I. ubi de capitis gravitate. Hinc ergo necessum est sanguinem recto itinere retardatum in laterales arterias divertere, quæ a carotidibus ortæ auri internæ prospiciunt; singulos earum ramos per auris interiora perreptantes & nervis acousticis appositos impensus dilatare; motusque, quo saliant, vehementiam adeo intendere, ut in nervos acousticos valide arietando inasueti succussione eandem in aure impressionem producant, quæ a motu aeris tremulo solet excitari, cum sonus percipitur. Hinc falsa & importuna soni auditio, qui pro varia nervorum tensione & vibratilitate, aut frequentiore vel rariore arteriarum pulsu, modo continuus & acutus futurus est, & *sibilus*, modo continuus sed gravis, & *murmur*, modo demum interruptus & intermittens, & *tinnius* appellatur.

V. Denique barycoia sive gravitas auditus, imo etiam surditas quandoque contingit ex lue venerea, seu quod ossicula, carie exesa jam perierint, vel saltem hyperostosi tumefacta solitis muniis imparia sunt; seu quod acoustici nervi crassioribus spiritibus obstruantur, vel comprimentur arteriis nimium turgentibus, nodis aut gangliis juxta enatis, exostosis ossium per quæ transeunt &c. qua de re vide quæ supra dicta sunt de cæcitate *paragraphe præcedente n. VIII.*

Z 4

§. IX. LÆ.

II. Exostoses vel hyperostoses ossiculorum auditioni inservientium.

III. Ulcera in aure interna.

IV. Sibilus, murmur, tinnitus.

V. Barycoia & surditas.

§. IX. LESIONES FUNCTIONUM.

Cetera quæ supersunt brevius perstringemus, & ne totam pathologiam compilasse videamur, læsæ cujuscumque functionis causam tantum indicabimus. Curabimus tamen ne fiamus obscuro, dum breves esse laborabimus, a quo proposito ideo confidentius speramus non aberraturos esse, quod mox dicta dicendis haud parum lucis afferant, utpote quæ utraque perinde dependeat a simili efficacia veneni ejusdem, quod humores quovis limphaticos & vitiosa spissitate, & acrimonia corrosiva simul impertiatur & pervertatur.

1. Læsi-
o functionum
animalium,
unde?

Itaque 1. Functiones animales seu functiones illæ, quæ exercentur ope organorum in capite latentium, lædi possunt in lue venerea multiplici de causa 1. Tumoribus præternaturam genitis, exostosi vel carie alterutrius tabulati ossium quæ superiorem vel inferiorem cranii partem componunt; nodis gangliisve pericranii aut meningum; hydatidibus vel tuberculis ple-xuum choroidæorum; skirrhoglandulæ pituitariæ, quæ insidet ephippio; apostemate vel tumore gummatoso in encephalo &c. 2. Hæmostasia, seu sanguinis stagnatione & hærentia, sive fiat sola sanguinis spissitudine, vel recentis obicibus sanguinis fluxum retardantibus. 3. Vitiosa spirituum animalium crassitie, unde & parcius secernuntur & fluunt lentius in partes.

1. Capitis
gravitas.

Hinc 1. Capitis gravitas sive *καρψαπία*, si sanguis stagnet & hæreat in toto encephalo.

2. Clavus
& ovum.

2. Clavus & ovum, si exostosis cariesve partem ossis cujusdam occu-per; si nodus in pericranio, si tubercula vel pustulæ ad sint in quadam meningis parte; si quod alicubi lateat apostema; si sanguis sola spissi-tudine hæreat in loco quodam; aut acriorem limpham dimittat.

3. Hemi-
crania.

Hemicrania ab iisdem causis, sed quæ latiore capitis partem obli-deant, ac plerumque dimidiatur.

4. Cepha-
læa.

4. Cephalæa seu cephalalgia, *gravativa* quidem aut *pulsativa*, si ar-terix meningum sanguine hærente turgidæ cerebrum subiectum dilata-tione premant, vel pullu validiore membranas quatiant; *pungitiva* ve-ro & *mordicans*, si acriore sero eodem effuso meninges dolose stimulentur.

5. Verti-
go.

5. Vertigo, *simplex* quidem si sanguis a cerebro propter hæmostasiam præclusus in oculis copiosius fluat per arterias collaterales, & arteriola-rum retinæ infestarum pulsatorium motum ita intendat, ut inde fibril-læ nervæ juxta sitæ motu tremulo succutiantur; *tenibricosa* vero, si fi-brillæ eadem præ compressione nimia spiritibus admittendis impares fiant.

6. Spal-
mus.

6. Spasmus, si quæ arteriæ cerebri sanguine nimium turgidæ vali-dius pullent, spiritusque in nervos obvios majore continuo impetu prop-ellant: *Motus* vero *spasmodici*, si ex variabili variarum arteriarum

turgescencia variabilis quoque sit eârumdem arteriarum pulsus, unde spiritus ad has illasve partes varie amendantur.

7. Epilepsia, si ea accidit hæmostasia in encephalo, qua fibræ quidem internisensorii compressione cerebri relaxentur, unde *ἀραιωσις*; sed qua tamen spirituum secretio permittatur naturali ferme compar, qui arteriarum turgentium pulsu in nervos præter naturam agantur, unde spasmus vel motus spasmodicus.

8. Paralysis, si mollia nervorum principia vel infarciuntur lymphâ, cui devehendæ vacant, & quæ spiritus animales constituit; vel exostosis, nodis, gangliis, vasivæ sanguiferis nimium turgentibus ita comprimantur, ut spiritus influxuros nequeant admittere. Tertiam enim causam, cui paralysis solet interdum adscribi, coincidentiam scilicet nervorum, qui collapsu parietum molliorum impervii fiant, locum in syphiliticis nullum habere ideo censemus, quod ea sit semini veneri indoles, non quæ partes emollire & relaxare possit, sed e contra quæ easdem denset, astringat, induret.

9. Artuum suspensorum tremor, quem specie geminum distinguendum esse arbitramur, alterum, in quo pars quæ tremori obnoxia est, viribus suis destituitur; alterum, in quo pars affecta pollet robore nativo. Fictile quoties spiritus per nervos allatis de causis semi-occlusis æquo parcius influunt, quam ut adversus suspensorum artuum pondus contrantiti valeant; ac proinde causa cæteroquin congener, gradu tantum differt a paralyti quæcum plerumque conjungitur, quoties illa invadit vel definit: Hic vero toties producit, quoties fibrillæ nervæ aridiores ita tono tenduntur, arteriæque quæ interrepunt, tam fortiter simul oscillant, ut necesse sit pulsi validiore nerveas fibrillas, quæ solito vibratiliore sunt, subinde quassari, spirituumque influentium momentum alternatim intendi, ex quo efficitur ut artus illi motu tremulo succutiantur, qui nisu tonico atque adeo vi æquilibri suspensi possunt levissimo momento huc vel illuc impelli.

10. Hydrocephalus, si glandula pituitaria, quæ sellæ Turcicæ sive ephiripio insidet, skirrholdes fiat, & ideo lymphæ, quæ a ventriculis cerebri defluit, viam denegat; aut si tumefacta quævis in encephalo loca naturali sanguinis motui officiant, unde præternaturali feri decubitus.

11. Agrypnia, si æger doloribus acutissimis, rheumaticis, arthriticis, osteocopis &c. distrahitur.

II. Functiones vitales, quæ fiunt ope organorum contentorum in pectore, depravari solent in syphilide variis de causis. 1. A tuberculis vel gummatibus in pulmonum substantia latentibus, sive cruda sint, sive suppurata; 2. Ab acrimonia, quam trachealis humor morbo contrahit; 3. Ab hæmostasia sanguinis in pulmonibus, sive soli cruoris ipsius similitudini, sive oppositis in pulmone obicibus debeatur; 4. A sarcomatibus sive

7. Epilepsia.

8. Paralysis.

9. Artuum tremor.

10. Hydrocephalus.

11. Agrypnia.

II. Lesio functionum vitalium unde?

sive polypis veris, qui e carneis cordis columellis in ventriculorum cavo succrescunt; 5. A limphaticis concretionibus, seu polypis spuris ibidem genitis; 6. Ab hydropo, abscessu vel exulceratione pericardii.

- Hinc ergo 1. Dyspnoea, asthma, orthopnoea, quæ gradu tantum differunt; nempe si sanguis in pulmonibus hæreat, vel præ spissitate tardius fluens, vel objectis obicibus sive tuberculis retardatus.
1. Tussis. 2. Tussis, si trachealis humor acrior ab admisto morbofo seminio internam bronchiorum tunicam validius stimulet.
3. Hæmoptoe. 3. Hæmoptoe seu Hæmoptysis, si stagnantis sanguinis copia vel æstuantis rarefcentia vasa pulmonum discindantur, vel acrimonia trachealis humoris διασπαρῶν eroantur.
4. Vomica. 4. Vomica, si qua gummata aut grandiora tubercula in abscessum latentem tacita suppuratione abeant, unde pus discissa vel erosa cyfide tandem erumpat.
5. Phthisis. 5. Phthisis si vomica aperta tuberculave suppurata, vel erosio bronchii a tracheali humore sensum illata in ulcus malignum, cacoethes dyspneuloticum degenerent, ut in pulmonibus fere perpetuum est.
6. Cordis tremor & palpitatio. 6. Cordis tremor & palpitatio, si qua externa repagula compri-mendo cordis dilatationi obstant, ut hydrops, abscessus, exulceratio, sarcosis pericardii; si qua obturamenta interna obstruendo sanguinis egressum e corde retardent, & cordis contractionem ideo reprimant, ut polypi veri, concretiones polyposæ, sarcomata majorum arteriarum, infarctus pulmonum &c. Denique si qua convulsio carnearum cordis fibrarum motum earumdem refrænet pervertatve, ut in spasmo aut motu spasmodico, sive idiopathico, sive sympathico fuerit.
7. Syncope. 7. Syncope, lipothymia, asphyxia ab iisdem causis, sed quæ potentius agant, & cordis systolen vel diastolen quoad sensum aliquandiu sufflamment.
8. Intermissio pulsus. 8. Inæqualitas & intermissio pulsus ab iisdem quoque causis, quibus cordis tremor & palpitatio, syncope, lipothymia & asphyxia inferuntur.

III. Lætio functionum naturalium, unde? III. Functiones naturales, quarum exercitium debetur organis in abdomine contentis, perverti possunt in lue venerea causis sequentibus: 1. Vitio stomachalis & intestinalis limphæ morbofo fomite inquinatæ; 2. Vitio simili bilis & succi pancreatici ab eodem contagio; 3. Skirrho glandularum conglobatarum, quæ diversas abdominis partes, potissimum vero mesenterium obsident; 4. Hæmostasia, sive spissitate sola sanguinis, sive multiplici viscerum infarctu inducatur.

Hinc 1. Anorexia seu inappetentia, & apepsia seu indigestio, si stomachalis limpha solito spissior vel naturali crassi seu indole degeneret.

per nec fami excitandæ, nec fermentandis & coquendis cibariis compar sit.

2. Vomitus aut singultus, si limpha eadem corrosiva simili vitio contaminet chylum quem conficit, unde vellicata quidem nervea totius ventriculi tunica vomitus; unde vero stimulado orificio tantum superiore ventriculi singultus. 1. Vomitus aut singultus

3. Affectio hypochondriaca, si ad ea symptomata quæ vitiosus & acrior chylus potest producere, ventriculum & intestina pungendo ac irritando, & sanguinem in quem transfunditur inspissando, cæteraque anxietates quæ a seminio venereo producuntur in universo corpore, accedat ea mentis dispositio ad melancholicum delirium vergens, quæ ad affectus hypochondriaci essentiam pertinet. 2. Affectio hypochondriaca.

4. Diarrhœa sive alvi fluxus, si chylo, qui a ventriculo acrior defluit, aut intestinali limpha, bile succove pancreatio, quæ veneno venereo inquinantur, ad motum peristalticum citatiorem intestina sollicitentur; *stercoracea* quidem, si solæ fæces deturbentur; *serosa*, si a glandulis intestinalibus serum uberius irritatione exprimatur; *biliosa*, si causa eadem fluxilior & copiosior bilis ab hepate exorqueatur; *linterica*, si alimenta nondum confecta vel male confecta e ventriculo exeant; *caliaca*, si chylus a venis lactis exclusus propter skirrhus glandularum mesenterii in fæcibus retineatur, & una cum illis egeratur. 4. Diarrhœa.

5. Obstructiones & infarctus jecinoris, lienis, pancreatis &c., si bilis, limpha lienaris vel succus pancreaticus spissitate peccent, & in suis hæreant conceptaculis. 5. Obstructiones jecinoris, lienis, pancreatis.

6. Icterus, si bilis a secretionem præclusa in sanguinem exundet; *flavus* quidem, si bilis flava; *niger* vero, si nigra sit. 6. Icterus.

7. Hydrops ascites sive abdominis, si sanguis venosus obstructione hepatis, splenis & pancreatis retardatus serum quo turget, guttatim dimittit in cavum abdominis. 7. Hydrops.

8. Hæmorrhoides, si compressio venæ portarum ab hepate obstructio vel skirrhode tanta sit, ut cum via vix pateat sanguini ab hæmorrhoidalibus venis regredienti extrema capillamenta hærente sanguine nimium distenta ad ani ambitum in varices dilatanda sint. Illæ autem hæmorrhoides cæcæ, fluentes, callosæ, inflammatae, suppuratae, ulcerosæ aut carcinomatodes futuræ sunt variis de causis, quarum disquisitio non est hujus loci, sed ex peculiari hujusce morbi theoria repetenda est. 8. Hæmorrhoides.

IV. Functionum universalium læsio potest in syphiliticis causas sequentes agnoscere. 1. Vitiosam acrimoniam limphæ nutritiæ morbo infectæ; 2. Parciorum & lentiorum spirituum influxum per nervos; 3. Mi- IV. Læsio functionum universalium, unde?

3. Minorem sanguinis attritionem & fermentationem; 4. Copiam recrementitiorum aut excrementitiorum humorum, qui in sanguinem propter viscerum infarctus restagnant.

1. Marcor & atrophia. Hinc igitur 1. Marcor, atrophia, marasmus, si limpha nutritia acrior & corrosiva partes nedum nutriat, sed potius deradendo extenuet & emaciet.

v. Virium languor. 2. Virium languor, prostratio & imbecillitas, si spiritus ad partes musculosque præsertim & parcius & lentius fluant; *parcius* quidem, quia in cerebro parcius secernuntur; *lentius* vero, quia crassiores sunt.

3. Vultus pallor & decoloratio. 3. Decoloratio, pallor, livor vultus, unde in sæminis chlorosis; si sanguis crassior & minus attritus ignavius, fermentetur, adeoque colore minus florido vultum pingat; aut si bilis ita redundet, ut mucosus humor cuticulæ subiectus, quocum confunditur, vitioso colore inficiatur.

4. Febres intermittentes. 4. Febres intermittentes, si cacochylia a ventriculo primisque viis in sanguinem traducta, aut amurca recrementorum quæ in sanguine retinentur, solitam circulationis œconomiam pervertant.

5. Febres lentæ. 5. Febres lentæ ab iisdem causis sed contumacioribus, vel quod frequentius est, a doloribus atrocibus, ab exulcerationibus variarum partium, a gummatibus, nodis aut exostosis putrescentibus, ab abscessibus internis &c. quæ singula in lue venerea inveterata plerumque perpetua sunt.

V. Lætio functionum, quæ mulieribus propriæ sunt, dependere potest in lue venerea a multis causis. 1. A vitio limphæ lacteæ seu lactis mammarum, quod viscidius & acrius est ab admisso veneno; 2. A simili vitio limphæ lacteæ seu lactis uteri, cui periodicus catameniorum fluxus debetur; 3. A vitio limphæ, quæ turgent oviformes vesiculæ sive ovula, quæ in sæminis testibus sive ovaris latent, & prima sunt concepti embryonis incunabula.

1. Cancer mammarum. Hinc igitur 1. Cancer mammarum, si limpha lactea viscidior in vesiculis mammarum hæreat, & hærendo in skirrhum dolentem induretur sive cancerum; *occultum* quidem, quandiu congesta materies in quiete duratura est; *apertum* vero & *exulceratum*, si limpha eadem virulenta concepto rarefcentiæ nisi tumore exulceret.

2. Suppressio menstruum. 2. Suppressio menstruum, si defectu limphæ lacteæ uteri, quæ præ spissitudine a secretionem penitus arceatur, nec impleri vesiculosa uteri conceptacula, nec comprimi venæ uterinæ appositæ, nec laterales earum appendices dilatari, inflari, extremo fine dehiscere possint, ut sanguis menstruus more solito effundatur.

3. Fluxus. 3. Fluxus nimius menstruum, si vitio limphæ ejusdem quæ fecer-

cernatur, quidem, sed quæ præ spissitudine non excernatur vesicula eadem conceptacula ita distendantur, venæ appositæ ita comprimantur, appendices cæcæ continuo ita dilatentur & hient, ut sanguis jugi fluxu manaturus sit. Potest quoque affectus uterque, suppressus scilicet & nimius catameniorum fluxus a gravioribus morbis induci, *suppressus* quidem a skirrho vel carcinomate; *nimius* vero ab erosione vel ulcere uteri.

immotus
cus co-
rundem.

4. Fluor albus live muliebris; si limpha eadem acrior & ideo largius secreta, e conceptaculis perenni & uberi fluxu scaturiat; vel si nimia & diuturna compressione quam vasa sanguifera patiuntur a vicinis tumoribus uteri; vel ab uterinis collis spissiore lacte turgentibus, tenue cruoris serum in uteri cavum jugiter & ubertim exillet.

4. Fluor
albus.

5. Inflammatio, si ex subitanea colorum uterinorum ab hærente lactea limpha dilatatione, ita derepente sufflaminetur sanguis per venas recta fluens, ut a via præclusus impete facto in limphatica vasa ab extremis arteriis prodeuntia cogatur irrumperere. Ea autem uteri inflammatio in abscessum, aut quod pejus est, in gangrenam abitura est, nisi depletis vasis & resolutis obicibus devio sanguini via cito restitatur.

5. Inflammatio
uteri.

6. Ulcus uteri, quod potest gemina causa induci; 1. Suppuratione & apostemate, si inflammatio, de qua modo, in abscessum versa, aut si atheroma, steatoma, melicerisve, quæ in ipsis uteri tunicis latent aut juxta adnascuntur, suppurata in uteri cavitatem aperiantur: 2. Erosione, si semen ab infecto viro admissum, si menstrua quæ periodice prodeunt, si fluor albus, quo uterus non raro madet, seminio morbosico contaminata internam uteri faciem exulcerent.

6. Ulcus
uteri.

7. SKirrhos uteri, si limpha lactea lente congesta intra sua cola firmiter indurescat. SKirrhos autem in carcinoma sæpe degeneraturus est, si limpha acrior ad nifum rarecentiæ concipiendum comparata sit, unde dolor, lancinatio, exulceratio gradatim succedant.

7. Skirrhos
uteri.

8. Tophi, skirrho, tumores ovariorum, si limpha, qua opplentur vesiculæ pellucidæ, sphaeroides, cellulis singulatim coercitæ, quæ inferiorem ovariorum partem distinguunt, & ovula feminina dictæ, vel qua perluitur ac turget superior eorundem ovariorum pars mollis pulposa, succo plena, unde dependent ovula descripta, præter naturam ita crassescat ab inspirato veneno venereo ut in tophos, skirrhosve induretur, numero, mole, figura, situ varios, & in carcinomata quandoque degeneres variis de causis supra recensitis, *Lib. III. Cap. 6. §. 2.*

8. Tophi,
skirrho,
tumores
ovariorum.

9. Ovariorum hydatides, hydrops, abscessus, si tubercula in ovariiis genita ex causa venerea sanguini aut limphæ regressui ita obstant, ut serum latenter dimittatur in varias ovariorum cellulas, aut in ovula variis cellulis conclusa, unde *hydatides*, vel in iptum ovariorum con-

9. Hydatides,
hydrops,
abscessus
ovariorum.

tex-

rum.

textum exundet, unde *hydrops*, quorum utrumque malum in abscessus anomalos haud raro degeneraturum est.

10. Sterilitas.

10. Sterilitas, si menstrua suppressa, nimiae, fluor albus nimius; uterus exulceratus, sKirrholes aut carcinomatodes, conceptioni obstat; vel si citra ullam uteri labem ovaria morbose tumescant, aut oviformes vesiculæ indurescant & sæcundationi ineptæ fiant.

11. Frequens abortus.

11. Frequens abortus, si conceptus embryo virulenta acrimonia laetis uterini, quo enutritur, cito contabescat.

12. Partus foetum semiputrum.

12. Partus foetum squallidorum, erysipelate rubentium, semiputrum, ulcerosorum &c. ab eadem causa, cum virulenta materni sanguinis indoles tenellum embryonis corpusculum celeri labe perdat, pessundet, destruat.

C A P U T IV.

Diagnosis Luis venereæ confirmata.

IN diagnosi duo inquirenda sunt, an æger lue venerea vere laboret? Deinde quali laboret, & an laboret sola? Nempe I. An verelaboret, tum ne magno patientis infortunio, nec parvo medicantis dedecore umbra pro corpore, larva pro morbo oppugnetur; tum ut nascens hydra, si forsan lateat, in incunabilis ocyus opprimatur, antequam adolescat: II. Qualis adsit lues & an adsit sola; ut morbo compar paretur medicina, simplici simplex, multiplex multiplici; vel si remedia repugnantia fuerint, saltem ut prius profligato morborum altero, qui curatu facilior esse videbitur, liceat inde alteri, qui perstinacior est, tanto facilius mederi.

† I. AN ÆGER LUE VENEREA VERE LABORET?

De præsentia luis venereæ iudicium anceps & difficile.

Judicium de præsentia luis venereæ solet esse plerumque & anceps & difficile, 1. Quod symptomata luis venereæ, quæ supra recensita sunt, pleraque cum aliis quoque morbis ita communia sint, ut ad luem veneream nullo potiori jure quam ad morbos alios pertinere videantur, neque adeo possint luem veneream potius quam morbos alios indicare.

2. Quod symptomata cætera, numero pauca, quæ lui ita propria sunt, ut soli conveniant, inveteratæ tantum, sed raro incipienti accidunt, atque adeo inveteratam quidem demonstrent, nullius vero usus esse possint ad recentem & incipientem designandam, quod tamen votorum summa esset.

3. Quod ea sit luis venereæ indoles, ut semel concepta nativæ ægro-

tan-

tantum temperiei plerumque ita sese accommodet, ut morbos eisdem mentiatu quibus ægri ante afficiebantur. Si quis v. g. pulmone, capite, oculis, hepate &c. ante laboraverit, admissio semel contagio iisdem in locis perinde laboraturus, sed paulo urgentius; unde fit ut de novo morbo nulla sit suspicio, credaturque æger vetere tantum morbo languere, qui inveterascendo invaluerit.

4. Quod ægotantes sæpe celent morbi partem, saltem morbi originem & progressum disimulent, ne causam retegant. Sic verum vix extorqueas ab adolescentibus, qui a parente vel Magistro sibi timent; ab innuptis fœminis, quas pudet culpam confiteri; imo vero ab adultis senibusve qui sui juris sunt, quos piget nonnumquam antea tam vitæ candide relegere, & juveniliū errorum remitti.

In ea rerum ambage una superest ratio veritatem fugitivam expiscandi, nempe si Medicus sedulus & sagax veri indagator ad sequentia signa parallela, quæ in duplicem ordinem digessimus, diligenter utrimque attendat; singula sincere discutiat, distinguat, æstimet; & quid de luis venereæ præsentia opinandum sit conetur collatione utrorumque mutua colligere, quod a singulis, si seorsim spectarentur, vix posse elici.

Prior ordo signorum eorum est, quæ ab effectibus semini venerei deducuntur & quæ præsentem ægri statum demonstrant, unde *ἰνδιδεικτικά*, seu *demonstrativa*; posterior vero eorum quæ desumuntur a causis semini ejusdem & quæ præteritum ægri statum commemorant, unde *ἀναμνηστικά* seu *commemorativa* dicuntur.

PRIMO. Signa demonstrativa duplicis generis sunt; altera quidem luis venereæ ita propria, ut soli convenient vel ferme soli, & ideo *παθολογικά* & *univoca*; altera vero luis cum cæteris morbis ita communia, ut in diversis morbis perinde observentur, & ideo *ἀquivόκα* appellantur. Priora ab effectibus desumuntur, qui fiunt vitio humorum cum venereæ contagio maxime analogorum, & quos supra recensuimus Cap. II. prioribus articulis scilicet affinitatum. Posteriora vero ab effectibus cæteris, qui fiunt vitio cæterorum humorum minus affinium, & quos exposuimus ibidem posterioribus articulis descriptionis ejusdem.

De utrisque caute advertendum est in hoc ordine demonstrativorum signorum, quæ singula ab effectibus repetuntur, præsentia signorum syphilidem quidem argui, quia posito effectu causam poni necessarium est; at vero absentia eorundem syphilidem minime excludi, quia posita causa consequens non est effectum semper poni, cum possit causæ efficacia multiplici modo inhiberi, retundi, aut alio diverti. Quocirca demonstrativa signa, si adsint, luis venereæ existentiam singula pro suo quæque modulo affirmant; negant vero minime licet desint, si ab aliis indicetur.

In iudicando caute attendendum esse ad signa.

Quorum alia demonstrativa, alia commemorativa.

Primo. Demonstrativa sunt, vel univoca, vel æquivoca.

Signa

Signa
univoca
numero
decem.

Signa univoca seu pathognomonica, quæ in indicanda lue venerea præcipua sunt & primaria, ex ordine sigillatim proponemus, brevissime tamen, sed ita ut nulla omittatur cautionum, quarum usus esse debeat in distinguendo & æstimando signo quolibet istius generis. Deinde vero signa æquivoca nude tantum referemus brevitate studio, cum ex tradita ætiologia abunde perspicuum sit, quanti singula æstimanda esse videantur.

Primum.
Infectio
cum al-
tero ex
traduce
commu-
nicata.

SIGNA*UNIVOCA seu **PATHOGNOMONICA**. *Primum*. Infectio cum altero quasi ex traduce communicata quocunque modo, concubitu, lactatione, suctione, basiatione, cubatione &c.

Hoc quidem signum est indubium & primæ notæ latentis syphilidis, cum ut vulgari fertur adagio, nemo det quod non habet, modo tamen constiterit de sanitate antecedente alterius quocum res fuit & qui se infectum fuisse queritur. Sed in eo negotio tot præstigij, tot officinæ sunt, ut nasutum non unum noverim, cui fucus factus fuerit, quasi ab ipso acceptus morbus esset, qui tamen vel usu, qui cum illo intercesserat, antiquior erat, vel ab alio nuper contractus.

Secundum.
Genera-
tio itera-
ta fœtu-
um abor-
tivorum
& semi-
putrium.

Secundum. Generatio fœtuum abortivorum, vel qui si legitimum tempus attigerint, squallidi, emaciati, pustulosi, ulcerosi, semi-putres, nullo modo vitales pariantur.

Simplex quidem indicium est, seu signum secundæ notæ, sed urgens, & quod si pluries repetatur sine causa ulla manifesta, quæ fœtum maturius exturbare, aut in utero materno pessundare valeat, in signum vere pathognomicum & univocum abiturum est. Cum enim contingit partus plures male affici quasi hæreditaria successione, liquet inde parentum alterutrum ad minus infectum esse debere, quod quidem argumentum & in matrem, quæ fœtui alimoniam suggerit toto gestationis tempore; & in patrem, qui in generationis opere primas confert; & in utrumque simul validum est, ut qui consuetudine venereos morbos invicem communicare soleant, licet tamen non semper.

Tertium.
Morbosa
libero-
rum vi-
talium
constitu-
tio.

Tertium. Morbosa liberorum vitalium constitutio, qui est strumosi, rachitici, gibbi, hæctici, macilenti, marasmodi vel miseri ante diem obeunt, vel si superent, statura humiles, delumbes, capitones, sili, vari, vatii, valgi, compernes, deartuati, varie distorti sunt & articulos tuberosos habent.

Istud indicium cum præcedente ferme convenit, & est ejusdem notæ. Validum quidem, si in pluribus vel in cunctis liberis repetatur, & si neuter parentum strumis aut rachitidi olim obnoxius fuerit; nec inter avos ulli numerentur, qui iisdem morbis affecti fuerint. Contra vero, si secus, plane infirmum, nisi adjuncta pondus addant.

Quartum.

Quartum. Morbi venerei locales supra memorati *Capite* 1. §. 1, ut ulcuscula venerea, phimosi aut paraphimosi, porri, verrucæ, condylomata, fraga, fici, mariscæ, bubones &c. si in genitalibus, ano, aut inguinibus vel primum sponte appareant, vel ante curati renoventur sine ullo concubitu, aut saltem sine ullo qui suspectus sit.

Signum hoc luis venereæ certissimum est & primariæ notæ, si morbi illi venerei appareant vel renoventur sine ullo concubitu. At vero minus certum, si post concubitum quemlibet superveniant, cum nullus reivenereæ ufus ita tutus sit, in quem suspicio non cadat; ut enim amor furti, si libido fraudis amans est. Cæterum signa diagnostica, quibus possunt ulcuscula genitalium venerea a levioribus cutis fisluris; porri & verrucæ venereæ a non venereis; bubones venerei a simplicibus vel strumosis distingui, repetenda sunt ex illis capitibus præcedentis Libri, ubi de eorundem morborum diagnosi fuisse actum fuit.

Quintum. Morbi venerei locales impuro concubitu recens contracti, si remedia efficacissima diutius eludant, & nullam, saltem non plenam & perfectam sanationem admittant, quamvis medicina ex artis legibus adhibeatur. Hoc quidem luis latentis signum esse potest, sed secundæ tantum notæ, & in quo æstimando magnopere etiam cavendum est, ne sanationem ideo tardam esse ducas, quod ægrotanti videatur tardissima, aut latentis virulentia temere tribuas, quod curantis incitæ, & incuria, vel ægri erroribus in diætâ acceptum referendum sit.

Sextum. Vitia omnia supra recensita *Cap. i. artic. 2.* quibus cutis deturpatur, si sine causa ulla manifesta accidant, & remediorum vim & efficaciam diutius eludant. Inter hæc primum quidem tenent maculæ venereæ, tubercula & pustulæ; ordinis vero sunt inferioris rhagades manuum, defluvium capillorum, unguium morbi, scabies, lichen, herpes &c.

Ut allata symptomata signorum rationem habere possint ad indicandam luem veneream, opus est ut ipsamet caute prius discernantur ab aliis morbis, qui licet affines videantur, nihilominus tamen a venereo contagio nequaquam dependent.

Sic 1. Maculæ venereæ cutis distinguendæ sunt, 1. A lentiginibus, in eo quod maculæ venereæ & recentes sint, & in pectore ac interscapulis tantum observari soleant; lentigines vero faciem, collum & manus, partes scilicet corporis nudas deturpent, & congenitæ sint vel ad minus antiquæ.

2. Ab ephelidibus Solis ardore contractis, quod maculæ venereæ in partibus quæ a Solis radiis tutæ sunt, appareant, & difficillime discutiantur, contra quam accidit ephelidibus hujuscemodi.

3. Ab ephelidibus gravidarum, quod maculæ venereæ in partibus quas infestant, pertinacius perseverent; phelides vero gravidarum soluto utero sponte evanescant, addæ ephelides in gravidis ad faciem & collum pertinere, quæ loca maculæ venereæ non insident.

Quartum
Morbi
venerei
locales
supra re-
cenſiti
articulo
1. Descri-
ptionis.

Quintum
Morbi ve-
nerei re-
cens con-
tracti, si
adversus
adhibita
remedia
diu relu-
ſcatur.
Sextum.
Vitia
omnia
cutanea
supra me-
morata
artic.
2. Descri-
ptionis.

4. Denique a maculis purpureis, flavis vel liventibus scorbuticorum quod maculæ venereæ adjuncta quidem habeant alia symptomata luis venereæ, sed nulla scorbuti; maculæ vero scorbuticæ numquam efflorescant, nisi prius gingivis exulceratis & in fungos succrescentibus, tibiisque livore nigrescentibus, quæ certissima sunt scorbuti conformati indicia.

II. Tubercula & pustulæ.

II. Tubercula vero & pustulæ quæ a venere fiunt, dignoscuntur facili opera a varis seu jonthis faciei, quod non faciem solam ut vari, sed cæteras corporis partes occupent, & in apicem purulentum non abeant, ut varis proprium est, sed duræ, callosæ, siccæ, crustosæ sint a cæteris vero cutis vitiis abunde differunt numero, sede in pilosis partibus, figura, callo, colore, nodo tuberoso, quo tubercula renituntur, fossulis in quas pustulæ excavantur, inefficacia remediorum quæ adhibita sunt &c.

III. Rhagades manuum, defluvium capillorum, unguium vitia.

III. Demum rhagades manuum, defluvium capillorum, unguium vitia, scabics, lichen, herpes, impetigo &c. satis superque liquent ex descriptione supra proposita, *Cap. 1. artic. 2.*

Septimum, Ulcera tonsillarum, faucium, columellæ, palati, gingivarum, cum ossium aditorum carie; ulcera similia internarum narium, cum carie & prolapsu ossium nasi; sarcomata, polypi in naribus, &c. qualia supra descripta sunt, *Cap. 1. artic. 3.*

Septimum
Ulceria
faucium,
palati,
gingivarum.

Hæc omnia in lue venerea inveterata sæpe observantur, in recente rarissime, si unquam. Singula suppeditant signa totidem primaria, si sarcomata & polypos narium excipias, qui sunt ordinis tantum secundarii. Verum cauto opus est ne venerea ulcera istiusmodi confundantur cum ulceribus scorbuticis os infestantibus, affinis quidem sede, feritate, curationis difficultate, sed quæ tamen differant multis nominibus.

1. Quod ulcera venerea primum tonsillas, fauces, columellas, inde gingivas, sed tardius rariulque; contra vero scorbutica primum gingivas, inde vero fauces, tonsillas, columellam afficiant, sed rarissime & tardissime.

2. Quod ulcera venerea nares sæpe, scorbutica vero nares nunquam occupent.

3. Quod venerea in ambitu & basi callosa sint; minime vero scorbutica.

4. Quod venerea circumscripta & plerumque circularia certis tantum locis insideant; contra vero scorbutica serpentina & irregularia latius explicentur, & totam oris cavitatem non raro male afficiant.

5. Quod venerea erosionem excaventur; scorbutica vero in fungos & fungosas hypertharcolos excrecant.

6. Quod venerea in ambitu rubra, in fundo ex albo cinerea sint; scorbutica vero tota liveant perpetuo.

7. Quod venerea subjectis ossibus cariem celerem inferant; scorbutica nunquam vel raro.

8. Demum quod ulcera venerea adjuncta habeant signa luis venereæ; scorbutica vero scorbuti signa quæ aliena sunt.

Off.

Osseum. Dolores venerei rheumatici, arthritici, reumatico-arthritici, ischiadici, osteocopi &c. supra propositi, *Cap. 1. articulo 4.* si remediis diutius resistant, & noctu atrociter ingravescant.

Osseum
Dolores
venerei.

Elici possunt ex prioribus dolorum generibus indicia tantum luis venereæ seu signa secundæ notæ: Ex doloribus vero osteocopis signa vere univoca.

Ut I.

Verum I. Cavendum est ne dolores venerei rheumatici, arthritici, reumatico-arthritici, ischiadici &c. confundantur, 1. Cum doloribus levioribus sed anxiferis, qui tota tibia sub vesperam oberrando ad irrequietam pedum jactationem vel invitos sollicitant, Gallice vulgo *des Inquietudes*. Ab his enim in eo differunt, quod illi calore læsti augeantur & invalescant; contra vero hi in læsto derепente celsent & sopiantur.

Rheumatici, arthritici, reumatico-arthritici.

2. Cum rheumatismo, arthritide & ischiade a causa simplici; sed ab his in eo discrepant, quod illi noctu præsertim læviant, alioquin de die fati mites, quod remediis nullis efficaciter levantur, quod persistent diutissime insanabiles, quod Mercurialium usu mitigentur, secus quam his solemne est.

3. Cum doloribus scorbuticis per artus vagantibus; sed a quibus in eo dissentiant, quod illa signa alia congeneris naturæ hoc est luis venereæ propria adjuncta habeant; hi vero signis a lue venerea plane alienis & scorbuto peculiaribus indicentur.

II. Dolores vero osteocopi, a quacumque causa fiant, ad luem veneream ita peculiariter pertinent, ut quotiescunque diutius, pertinacius, atrocius disrunciant, toties luem veneream certam, plenam, confirmatam apertissime demonstrent.

II. Osteocopi.

Nonum. Morbi ossium, quos *Cap. 1. artic. 5.* exposuimus, ut exostosis, hyperostosis, caries, abscessus interioris medullæ, fractura alveissimum nifu & osteosarcosis.

Nonum.
Morbi ossium, de quibus articulo 5. Descriptionis.

Singula totidem sunt signa primaria luis venereæ, modo caute distinguantur a cæteris morbis, qui similis quidam speciei esse possunt, sed qui ad causas a lue venerea alienas referendi sunt.

I. Exostosis proprie dicta, hoc est extuberatio areæ osseæ in tumorem hemisphæricum, si doleat, si caleat, aut si cute rubra & phlogode oblecta sit, venerea perpetuo censenda est, neque tunc ulteriore inquisitione opus est. Sin secus, poterit forsan confundi ad summum cum callo qui ossi post fracturam coalito superest; cum exostosi quæ ossi accidit ictu vel casu contuso; & cum vitiosa ossis difformitate quæ congenita sit; a quibus tamen levi attentione facile distinguitur.

Ut I. Exostosis.

1. A callo quidem, tum quod nota ossis fractura notusque fracturæ locus callum & calli situm abunde indicent, tum quod callus ossis peripheriam circulariter ambiat, contra vero exostosis hemisphærica sit, & circularem tantum aream in osse occupet.

2. Ab exostosi benigna quæ sit in osse ictu validiore contuso, quod hæc

A a 2

mi-

minima sit, numquam doluerit, jam dudum ægro nata sit, externæ & manifestæ causæ successerit, contra quam hæc eadem singula in exostosi maligna sive venerea observantur.

3. Denique ab ossis difformitate congenita, quod tuber connatum numquam doluerit, jam pridem ab ægrotante observatum fuerit, & plerumque compar habeat tuberculum ex opposito, vel in osse eodem, si os unicum sit, vel in osse congenere, si duplex; quæ sane exostosi venereæ neutiquam conveniunt.

II. Hyperostosis.

II. Quatuor alia hyperostosisum genera præter venereas agnoscimus, nempe rachiticarum, strumosarum, scorbuticarum & arthriticarum. Totidem ergo diagnoses instituendæ, ut de venerea hyperostoseos natura liqueat.

1. Hyperostoses quidem rachiticæ puerulis propriæ, nec adolescententes nec adultos adoriuntur; non unum tantum alterumve articulum, sed plures simul invadunt; dolore omni vacant, nisi dum fiunt; semel factæ artus varie distorquent; quibus singulis a venereis abunde discrepant.

2. Hyperostoses strumosæ non dolent, vel obtuse tantum dolent; & iis tantum accidunt qui strumis olim a tenera ætate laboraverere, & quibus etiam in diversis corporis locis glandulæ conglobatæ tument, skirrhotides sunt; unde a venereis aperte dissident, quæ nihil simile adjunctum habent.

3. Hyperostoses scorbuticæ raro observantur, nec unquam nisi in osse ulceri scorbutico subjecto, in osse v. g. maxillari cum superjecta gingiva ulcere eroditur, mole parvæ sunt; in cariem citissime abeunt; cum maculis scorbuticis, violacei aut nigricantis coloris, cum tibiærum pedumque livore, cum ulceroso gingivarum & palati nigrore, cæterisque scorbuti signis conjungi solent, quæ in venereis neutiquam observantur.

4. Tandem hyperostoses arthriticæ succedunt arthritidi gravi, diuturnæ, frequentibus in eodem articulo repetitis; tophos tophaceasve concretiones comites habent; raro majores occupant articulos, saltem numquam nisi prius minores digitorum juncturas pessunderint, quæ singula contra se habent in hyperostosis venereis.

III. Caries

III. Caries citra causam omnem veneream esse potest, quoties 1. Hyperostosi rachiticæ, strumosæ, scorbuticæ aut arthriticæ; 2. Ulceri maligno aut cacoethi ad os adsito; 3. Abscessui seu apostemati sub periostio, vel juxta periostium a causa quavis manifesta inducto; 4. Ossis fracturæ vel contusioni nimis succedit.

Sed 1. Liqueat cariem hyperostosi rachiticæ, strumosæ, scorbuticæ aut arthriticæ supervenire ex signis modo propositis, quibus manifestum est hyperostoses, quæ in cariem tandem abeunt, rachiticas, strumosas, scorbuticas, arthriticas esse.

2. Liqueat similiter cariem ulceri maligno & cacoethi quod ossi adsidet, abscessui ab externa causa subter vel juxta periostium suppurato, fracturæ ossis

sis vel confusione vi illatz succedere ex signis antecedentibus, quæ ulceris, abscessus, fracturæ, confusionis naturam, causam, diuturnitatem significant.

3. Si casus hocce exceperis, ossium caries venerea semper censenda est, præsertim si exostosis aut hyperostosis veneream abscessum medullaris substantiæ sequatur, imo etiam abscessum periostii, qui sponte & sine causa evidente acciderit.

IV. Abscessus medullaris substantiæ si fiat ab ossis fractura in acutiores schidias, quibus medulla laceretur vel pungatur; aut ab externa carie, qua altius progressa medulla putrefiat, nullam quidem luis venereæ suspicionem movere debet ut cujus causæ pateant ab omni morbo soleminio plane alienæ. Contra vero virus latens toties apertissime proditurus est, quoties sine ulla labe, quæ obvia sit, in ossium cavo clam producitur.

Rarum est abscessum hujusmodi putrescente medulla gigni in ossium cavo, nisi cum lues venerea gravissima est & valde inveterata. Rarissimum vero posse unquam certo explorari, nisi cum & medulla computruit tota, & ossis substantia intime cariösa est, id est cum de ægri salute ferme conclamatum est. Attamen ad singula attendendo sedulo, quid in occulto fiat poterit haud inepte conjici; 1. Si dolor osteocopus altior, atrox, nullis cedens remediis eandem ossis partem continenter obsideat; 2. Si levis horror sub vesperam quotidie redeat, & in febrilem incandescentiam terminetur; 3. Si nullus tumor, rubor, calor in parte dolente obvius sit; 4. Denique si dolor non intendatur, dum locus ad quem refertur, confricatur vel premittitur.

V. Fractura ossis ab exiguo conamine signum est luis venereæ evidentissimum, sed satis rarum, & quod numquam nisi in valde inveterata & deplorata syphilide accidat.

VI. Denique osteosarcolis geminam tantum causam agnoscit, strumofam aut veneream, & hanc quidem frequentius quam illam. Itaque quoties desunt signa quæ strumas aperte indicent, toties colligere est ex osteosarcolis virus latere. Rara tamen ea inductio, quia signum rarum est, quod scilicet de tot syphiliticorum millibus vix in uno aut altero reperiatur, & quod adeo in usu quotidiano frustra requiras vel expectes.

Decimum. Tumores glandulosi & limphatici glandularum conglobatarum, tophi, nodi, ganglia, gummata seu tumores cystide conclusi, ut atheromata, steatomata, melicerides, quæ sigillatim exposita sunt supra Cap. 1. articulo 6.

Hæc singula, licet esse possint effectus luis venereæ, ab aliis etiam causis sæpe dependent: Hinc ad judicandum cauto opus est, ut causæ probe distinguantur. Quapropter si univoca luis venereæ signa censenda sint, at saltem non censenda esse videntur nisi inferioris ordinis.

Sic I. Tumores venerei glandularum conglobatarum cum strumosis ita consentiunt, ut ovum ovo similis non sit. Idcirco virus venereum nequeunt

IV. Abscessus medullaris substantiæ.

V. Fractura ossis ab exiguo conamine.

VI. Osteosarcolis.

Decimum, Tumores, qui expositi sunt Cap. 1. articulo 6.

Ut I. Tumores

glandula-
rum con-
globata-
rum.

II. Tophi, nodi,
ganglia.

III. Gumma-
ta, athero-
mata, steato-
mata, &
melicerides.

Signa æ-
quivoca.

Alia sunt
primæ.

Alia vero
secundæ
notæ.

certo unquam arguere, nisi constet ægros nec ullis strumis a tenera ætate laboravisse, nec ullis aliis strumarum symptomatis tunc obnoxios esse.

II. Tophi, nodi, ganglia non a solo veneno venereo fiunt, sed debentur etiam contusioni aut distractioni violentæ nervorum, tendinum, ligamentorum, & diuturnis doloribus arthriticis. Ideo si qua valida partis contusio, si qua juncturæ distorsio, si quis insultus arthriticus diuturnior præcesserit, reprimendum est judicium, nec temere de lue venerea pronuntiandum ex illis tumoribus, nisi adjuncta alia signa pondus addant.

III. Gummata seu tumores cystide tanquam folliculo conclusos, qui in atheromata, steatomata, & melicerides distinguuntur, a vitio lymphæ ordinario sæpius oriri certum est, præsertim in capite, ubi *testudines & talpa*, & in gutture, ubi *botia* sive *bronchocèles*, vulgo *gouettes* appellantur. Si tamen contigerit cæteras corporis partes tumoribus istiusmodi pluribus quasi ex improvviso obsideri illæis capite & gutture, haud infirmum inde argumentum futurum est fomite venereo latente lympham perverti & inspissari.

SIGNA ÆQUIVOCA in duas classes distinguere debent sicut univoca, alteram quidem signorum *primæ notæ*, quæ licet cum aliis quoque morbis communia sint, frequentius tamen & magis proprie ad luem veneream pertinent, adeoque ad univoca proprius accedunt: Alteram vero signorum *notæ secundæ*, quæ nullo potiori jure lui venereæ peculiaris sunt, sed quæ in aliis quoque morbis nullo fere discrimine observantur, atque adeo ab univocis recedunt longius.

Prioris notæ vulgo censeantur, 1. Oculorum morbi, ut rubor, prurigo, lippitudo, ulcera, verrucæ, hordeola palpebrarum; ophthalmia phlogodes, ulcerosa, phlyctænodes; corneæ nebulæ sive albugines, pustulæ, ulcuscula, staphyloma, glaucoma, suffusio, pterygium, fistula lacrymalis sive ægilops, hypopyon.

2. Morbi aurium, ut tinnitus, sibilus, murmur; gravitas auditus, surditas; interioris auris inflammatio, abscessus, exulceratio; caries ossiculorum, & ossis aurium fornicis, cum effluxu puris fœtidi.

3. Capitis gravitas, cephalæa; ovum, clavus, hemicrania; vertigo, epilepsia; phthisis, marcor, atrophia, marasmus, virium languor; pallor & livor faciei; febris intermittens difficilis, aut lenta; & in scæminis fluor muliebris; inflammatio, abscessus, skirrhus, cancer uteri; sterilitas, abortus frequens, partus scætuum squallidorum, semi-putrium &c. si ea forsitan contingant sine ulla causa evidente, quæ effectus producendo compar esse videatur.

Inter signa vero inferioris notæ numerantur cætera symptomata, quæ supra recensita sunt *Cap. 1.* in descriptione, ut spasmus, motusque spasmodici, tremor artuum, paralytis, hydrocephalus, agrypnia, asthma, dispnœa, orthopnœa; hæmoptoe, tussis; cordis tremor & palpitatio, syncope, pulsus inæqualitas & intermissio: anorexia, apestia, affectio hypochondriaca

ca singultus, vomitio, diarrhœa; obstructiones hepatis, lienis, pancreatis; icterus, hydrops, hæmorrhoides; & in feminis cancer mammarum, suppressio vel fluxus nimius menstruorum, passio hysterica &c.

SECUNDO. Signa commemorativa præteriti status delumi debent a morbis veneris topicis sive localibus, qui luis veneræ semper præcludunt, & quibus ea corporis loca, unde mali labes contagione concipitur, primum inficiuntur. Siquidem compertum est experientia, ut supra vidimus *Cap. 3. Lib. II.* Virus præ nativa fixitate intra corpus numquam admitti, nisi ea pars, per quam admittitur, prius affecta fuerit, atque adeo luem veneræam numquam contrahi per saltum ut ita dicam, *omisso medio*, hoc est illæsa parte, qua contrahitur.

Morbi illi locales sive topici modo causæ rationem habent respectu luis veneræ, quem tunc proinde indicant tanquam causæ effectum: Sic gonorrhœa virulenta suppressa, sic bubo temere repressus luem veneræam inferunt, & illatam denotant tanquam effectum. Modo vero respectu luis veneræ rationem habent coeffectus ab eadem communique causâ, & luem proinde tunc significant tanquam effectus coeffectum ejusdem naturæ: Sic porri & verrucæ, sic ulcera cancrofa genitalium syphilidem designant non tanquam causâ effectum, cum ipsa syphilidem rarissime producant, si forte unquam; sed tanquam effectus coeffectum unius & ejusdem causæ quandoquidem tum vitia illa in genitalibus, tum ipsa syphilis ab eadem causâ fiunt, nempe a contagio venereo, quod parti adhærens porros, verrucas, ulcera; quod sanguini infusum syphilidem inferat.

At vero qualitercunque signa istiusmodi se habeant respectu luis veneræ, sive ut causæ, sive ut coeffectus, caute perinde advertendum est in hoc signorum ordine contrario modo concludendum esse, quam in præcedente nempe 1. Si defuerint, hinc luem penitus excludi, quoniam si causæ rationem habeant, notum est causâ non data nec effectum quoque dari; si vero coeffectus tantum sint ejusdem causæ, constat pariter a causâ quavis effectum graviolem & difficiliorem frustra expectari, quæ alteri effectui ejusdem naturæ sed faciliiori & magis obvio producendo jam impar fuerit. 2. Si vero præluserint, inde tantum probari luem adesse posse, sed non probari revera adesse, cum posita causâ effectus quidem poni possit, sed non perpetuo ponatur. Posito pariter effectui leviori & magis obvio, possit quidem similiter poni coeffectus alter ejusdem naturæ, quanquam difficilior; at vero nequaquam certum sit ideo semper poni.

Cæterum, quemadmodum supra demonstrativa, sic etiam commemorativa signa ordine singula jam recensibimus, additis notis, quæ paucis indicent quanta sit singulorum gravitas, quanti proinde faciendum sit testimonium quod ex singulis scotim elici potest, atque adeo quantum luis veneræ periculum ab unoquoque denunciatur in singulis casibus.

Secundo. Signa commemorativa repetuntur ex morbis veneris localibus, qui præcellere. Quorum alii causæ, alii vero coeffectus rationem habent.

*Primum
signum
commemo-
rati-
vum.*
Porri,
verrucae,
cristae,
condy-
lomata
puden-
dorum.

*Secun-
dum.*
Ulcuscu-
la earum-
dem par-
tium.

Tertium.
Phimosis,
paraphi-
mosis &
bullae cry-
stallinae.

Quartum.
Bubo sive
panus in-
guinum.

Quintum.
Gonor-
rhoea vi-
rulenta.

Itaque I. *Signum commemorativum.* Porri, verrucae, cristae condylomata, sarcoles, quae in genitalibus succrescunt post impurum concubitum.

Monuimus supra Lib. III. Cap. 9. & 10. morbum localem inter venereos nullum alium esse, cui syphilis certius succedat cum virus admissum nec effluxu, nec suppuratione ulla tunc evacuetur. Verum ceteris paribus gravius periculum imminet; si excrescentiae istiusmodi plures & maiores fuerint, si acutius doluerint, si fræno infederint, si increverint celerius, si omiſſis remediis diutius neglectae sint &c. contra vero levius, si secus.

II. Ulcuscula cancroſa & phlyctænodes, quibus genitales partes infestantur ab impuro concubitu.

Ulcuscula venerea grave periculum semper denuntiant futuræ syphilidis, cum virus uberius acceptum parca suppuratione educi totum vix possit; gravissimum vero si plura, cava, lata, phagedænica, rebellia fuerint, si præputio & præsertim fræno adstiterint, si ægrotantis constatione vel socordia remedia omiſſa sint, si febre superveniente suppuratione exaruerit, si callus difficilis curatis ulcusculis superſit.

III. Tumor phlegmonodes vel phlegmono-œdematodes balani & præputii in viris; in sœminis vero vulvæ & ostii vaginæ, unde phimosis, paraphimosis, bullæ crystallinae &c.

Ut tumor ille cum ulcusculis causa, sic cum iisdem gravitate quoque sentit; vel si discrepat, in eo tantum discrepat, quod gravior sit, quatenus supprimit ulcusculorum suppurationem, qua posset multa pars contagii educi, & illorum deterſioni obſtat, qua virulentia contagii miteſceret. Cæterum periculum debet variè æſtimari pro tumoris intentione, extensione, diuturnitate, virulentia, phlogosi & gradu febris symptomaticæ, quæ advenit.

IV. Bubo sive panus inguinum impuro concubitu superveniens.

Hoc signum præcedentibus gravitate cedit, si bubo suppuratus diu fluxerit, aut si in represso Mercurialia ex arte caute adhibita fuerint ad virus proſtigandum. At si neutra ratione veneni propagationi occursum fuerit, præcedentibus haud impar est, præsertim si bubo & glandulas multas & diu male affecerit; si suppuratione febre vel phlogosi ante tempus exaruerit; si calli duriores suppurationum efficaciam eluserint &c.

V. Gonorrhœa virulenta, qualis impurum concubitum frequentissime sequi solet.

Vix licet unquam luem veneream inferre ex prægressa gonorrhœa, quæ diu, ubertim, sine intermissione fluxerit, cuius iuge effluviū remediis non coercitum fuerit, sed virulentia sensim miteſcente sponte evanuerit &c. quoniam tunc larga suppuratione virus omne quod introſuſceptum erat, exhaustum fuisse spes est, nec ut plurimum vana. An vero si secus, constat luem frequentissime a gonorrhœa produci, quoties contingit virulentum humorem in sanguinem retroceſſiſſe, ut accidit.

1. Si fluxus inhibitus fuerit constipatis vesicularum seminarium & prostaticarum emissariis abusu injectionum astringentium in urethram, vel remedium internorum ejusdem efficaciz.

2. Si fluxus suppressus fuerit inflammatione partium affectarum, qualis advocatur usu præpostero rerum venerearum, equitatione, potatione, febre sponte oborta, erroribus dietæ &c.

3. Si fluxus coercitus sit tumore spermatico, inflammatorio, aut œdematode utriusque vel alterutrius testis.

4. Demum si fluxus, licet perennis, venendo exhausti impar fuerit, sive quod venenum nimium sit & solito acrius, sive quod ægroantis socordia nec mitigatum temperantibus nec opportune Mercurialibus profligatum sit.

VI. Porri, verrucæ, condylomata, fraga, fici, mariscæ, ulcuscula cancroſa &c. quæ ad anum adstant, quando virus impurissima corporis ulsura contrahitur.

Periculum, quod a singulis timendum est, æstimari debet ad exemplum periculi, quod a similibus morbis imminet in genitalibus, de quibus modo diximus *signo commemorativo* 1. & 2.

VII. Ulcuscula, phlogosis, inflammatio, condylomata, excreſcentiæ, quæ in papillis areisque mammarum, aut bubones, qui in glandulis axillaribus accidunt, cum morbus ab infantibus in nutrices lactatione traducitur.

De singulis judicium idem instituendum est ac de affinis affectibus, qui congressui impuro succedunt in genitalibus.

VIII. Ulcuscula phlogodea labiorum, gingivarum, palati, linguæ, columellæ aut faucium; tumoresque buboniformes glandularum lymphaticarum, quæ parotidibus aut maxillaribus adstunt sunt, si infantes contagium a nutrice fugendo, vel adulti columbatim oscula jungendo concipiant.

Ut singulorum horum morborum ætiologia eadem est ac ætiologia similibus effectuum, qui ab impuro concubitu hinc, sic eadem est quoque singulorum prognosis, idemque periculum futuræ luis a singulis impendit.

IX. Scabies, impetigo, herpes, tubercula, pustulæ, ulcuscula cutis si quis unquam cubando cum infecto, cui cutis ulcerosa sit aut qui noctu ludet, contagio infectus fuerit.

Cum hæc vitia, sicut naturam eandem, sic eandem quoque prognosim habeant, quacumque causa producta esse supponantur, quantum syphilidis futuræ periculum a singulis impendeat, colligere est ex his, quæ de iisdem supra diximus.

TERTIO. Signa demonstrativa & commemorativa, quæ hæcenus recensuimus, si seorsim spectentur, luis venereæ veritatem subindicant magis quam demonstrant. Opus est ad plenam rei notitiam ut singula cum singulis conferantur. Sic enim crescet collatione singulorum valor, ut au-

Sextum,
porri,
verruca,
fraga, fi-
ci, iuxta
anum.

Septi-
mum.

Ulcuscu-
la, phlo-
gosis,
condylo-
mata in
papillis
areisque
mam-
marum.

Octavum.

Ulcuscu-
la labio-
rum, oris
faucium.

Nonum.

Scabies,
herpes,
pustulæ,
ulcuscu-
la cutis.

Tertio.

Canones
diagno-
stici col-
latione

signorum
utriusque
speciei
deducen-
di.

getur in arithmetica valor cifrarum appositione. Hinc ergo, si quatuor signorum demonstrativorum species scilicet univocorum & equivocorum, tum primæ tum secundæ notæ; cum duabus speciebus anamnesticorum nempe gravium & levium, combinentur, octo Canones sequentes elici possunt, qui totam lues venereæ diagnosis sub uno velut intuitu satis apte repræsentant.

Canon
primus.

CANON I. *Si unum aut alterum e signis demonstrativis univocis prima notæ cum uno aut altero signo commemorativo, quod grave sit, concurrat, certissimum de lue venerea judicium esto.*

Sic ergo liquet certissime ægrotum lue venereâ laborare, quoties post prægressos porros, ulcuscula, bubonem suppressum & neglectum, aut gonorrhœam arte vel casu cohibitam, morbosos liberos omnes generat; pustulis, exostosis, dolori osteocopo &c. obnoxius est &c.

Canon
secundus.

CANON II. *Si unum aut alterum e signis demonstrativis univocis prima notæ coeat cum uno aut altero signo commemorativo leviori, certum de lue venerea judicium esto.*

Sic certe liquet ægrum de quo quæstio est, lue infici, quoties post gonorrhœam rite curatam & quæ sponte evanuerit, superveniunt signa eadem quæ modo recensuimus, infectio alterius; generatio morbosorum liberorum; pustulæ, exostosis, dolores osteocopi, fracturæ ossium levi de causa &c.

Canon
tertius.

CANON III. *Si unum aut alterum e signis demonstrativis univocis inferioris ordinis, conveniat cum uno aut altero signo commemorativo, quod grave sit, similiter certum de lue venerea judicium esto.*

Sic etiam certe liquet luem latere, quoties ægrotans, qui jam experitur defluvium capillorum aut casum unguium, rhagades manuum; ulcera tonsillarum, faucium, columellæ, narium; dolores rheumaticos aut arthriticos; ossium caries aut hyperostoses; tophos, nodos, ganglia, gummata &c. confitetur se olim laboravisse porris, ulcuculis, bubone neglecto vel male curato, gonorrhœa virulenta injectionibus cohibita &c.

Canon
quartus.

CANON IV. *Si unum aut alterum e signis demonstrativis univocis inferioris notæ conjungatur cum uno aut altero signo commemorativo, quod levius sit, urgens tantum de lue venerea præsumptio esto.*

Sic præsumitur lues venerea, quoties post suppuratum bubonem, aut gonorrhœam, quæ diu fluxerit, & sponte celsaverit, obveniunt ossium caries & hyperostoses, sine causa manifesta, rhagades, manuum, ulcera faucium, oris, palati, narium &c.

Canon
quintus.

CANON V. *Si unum aut alterum e signis demonstrativis equivocis prima notæ coincidas cum uno aut altero signo non commemorativo ex ordine gravium, urgens etiam de lue venerea præsumptio esto.*

Sic præsumitur lues venerea, si cui post porros, ulcuscula, bubonem male repressum aut gonorrhœam cohibitam superveniant ophthalmia con-

tu.

tumax sine causa fistula lacrymalis, hypopyon, tinnitus, abscessus aurium, surditas; vertigo, cephalæa diuturna, phthisis, marasmus, faciei pallor, febris intermittens difficilis &c. Et in foeminis fluor muliebris, sterilitas, abortus frequens, partus foetuum squallidorum semi-putrium &c.

CANON VI. Si unum aut alterum e signis demonstrativis æquivocis prima nota concurrat cum uno aut altero signo commemorativo ex ordine levium, ut in re de qua non liquet ampliatio esto.

Canon sextus.

Sic ampliandum est & ulterius inquirendum quoties signa quæ modo recensuimus, & quæ natura æquivoca sunt, non apparent nisi post gonorrhæam benignam, leviolem, quæ diu fluxerit, & curata sponte tandem exaruerit.

CANON VII. Si unum aut alterum e signis demonstrativis æquivocis secunda nota conjungatur cum uno aut altero signo commemorativo ex ordine gravium, ut in re de qua non liquet ampliatio esto.

Canon septimus.

Sic etiam ampliandum est si quis porros, ulcuscula, bubonem male repressum, aut gonorrhæam virulentam cohibitam motibus spasmodicis, tremore artuum, paralyti, asthma, hæmoptoe, tussi, cordis palpitatione, anorexia, apestia, vomitione, affectione hypochondriaca, diarrhæa, ictero, hydrope &c. laboraverit.

CANON VIII. Si unum aut alterum e signis demonstrativis æquivocis secunda tantum nota conveniat cum uno aut altero signo commemorativo ex ordine tantum levium plena de lue venerea absolutio esto.

Canon octavus.

Sic eger absolvendus est, si uni tantum aut alteri symptomatum minorum & æquivocorum, quæ proposuimus Canone præced. pateat, nec ullum morbum venereum localem ante expertus fuerit præter gonorrhæam unam aut alteram, levem, benignam, quæ remediis mitigata & perfecte curata fuerit.

Ex dictis manifestum est 1. Hydrargyrolim imperandam esse quotiescunque certo liquet de lue venerea: Expedit enim morbum quam ocyssime debellare, qui vires acquirit eundo.

Hinc liquet quo casu hydrargyrolis imperanda sit.

2. Hydrargyrolim suadendam esse, quotiescunque gravi de causa conjinitur lue latere: Neque enim in re quæ mora ingravescit opus est demonstratione, quæ sæpe numquam advenit, saltem quæ semper tarde. Plane actum foret de Medicina, quæ ars conjecturalis est, si graves & urgentes conjecturæ consilio capiendi non sufficerent.

Quo casu suadenda tantum. Denique quo casu omittenda.

3. Hydrargyrolim omittendam esse, quotiescunque ambigitur de lue venerea, quandoquidem probum Medicum numquam decet remedium temere adhibere, quod ut cætera taceam incommoda, vires frangit, temperiem non raro pervertit, atque si forsan periculo, certe numquam damno vacat.

Geminus tamen calus est in quo licet, imo vero expedit ab allata regula discedere hydrargyrolim adhibendo quamvis res in ambiguo sit. Alter quidem si æger uxorem ducturus sit: Præstat enim illum remedio potius damnum difficili, tædioso, forsan inutili, sed quod est pe-

Casus duo, quibus expedit ab allata re-

gula discedere.

riculi immune, quam uxorem lue, liberosque rachitide aut strumis contaminari, aliisve affectibus, qui a lue degeneres, lue ipsa nihilo mitiores sunt, nam ut communi fertur adagio, *malis corvi ovum semper malum*.

Alter vero si æger difficili morbo detineatur, qui adhibitorum remedium vim & efficaciam jam diu eludat; tunc enim suspicio est, neque temeraria ut plurimum, virus latere; quo morbus pertinaciter foveatur. Expedit tamen in eo casu ad plenam & legitimam hydrargyrosim prius non properare, quam levioribus inunctionibus vel interno Mercurialium usu caute periculum factum sit futuri levaminis, unde innotescat velut ex ungue leo, quid salutis ab inunctionibus legitime administratis expectandum sit.

§. II. QUALI LUE ÆGER LABORET, ET AN LABORET SOLA LUE?

Minus inest difficultatis in resolvenda questione altera, quæ secundam diagnoseos partem facit, nempe qualis adsit lues venerea & an adsit sola? Siquidem *Primo*. Palam est ex nativa corporis fabrica, ex naturali functionum æconomia, ex aperta ægotantium confessione.

1. An lues venerea humores tantum infecerit, qui sunt arte reparabiles? An vero ulterius progressa solidas quoque corporis partes læserit, quorum vitium stabilius est, ac minus mutabile?

Quibus signis patet qualis sit lues venerea.

2. Quos & quales humores contaminaverit contagio, an seminales, pneumonicos, gastricos, uterinos, muciferos qui narium, sebaceosne qui cutis proprii sunt? Quali contaminaverit vitio, an inspissatione, an acrimonia, an utraque? Et quanto, an mediocri, an summo?

3. Quas & quales solidarum corporis partium vitiaverit, an molles, nempe carneas tendineasve; an vero duras, scilicet osseas?

4. Quales e mollibus corporis partibus corruerit, tam principes nobilesque quæ vitæ præsumt, ut cerebrum, pulmonem, hepar, ventriculum, uterum &c. ignobilesne quæ ad vitam parum vel minus saltem necessariae sunt, ut artus extremos, cutim, carneasque partes cuti proxime subjectas? Quali vitio eadem corruerit an tumore skirrho, an ulcere, an utroque? Et quanto, an ad gradum mediocrem maximumve?

5. Similiter quibusnam & quibus ossibus labem intulerit, aut in capite aut in trunco corporis, unde ossa excindi non possunt; an in artibus summis, ubi ossium excitio facilius minusque periculosa? Qualem illis labem intulerit, an exostosim aut hyperostosim, an cariem, an utramque? Et quantam, an superficialium, ideoque leviorum, an altiorum & graviorum, quæ ad ossis medullarium penetret?

6. Quanta ac quotuplex inde soboleat ex utroque capite functionum læsio, animalium, vitalium, naturalium, cæterarumque quæ ad viros, sæminales specialiter pertinent.

7. An morbus recens sit, aut diuturnus & inveteratus? An remedia nondum

dum expertus fuerit? An contra adhibita varia remedia jam eluserint?

8. Demum an ægrotantes ætate, viribus, habitudine valeant? An contra ætate pueri sint aut senes, corporis habitu infirmi, viribus exhausti?

Secundo. Neque difficilius futurum est iudicium utrum lues sola adsit necne; quandoquidem morbi quicumque solent cum lue venerea concurrere, sua habent propriaque symptomata, quibus abunde declaratur singulorum natura, inveteratio, novitas.

1. *Natura* quidem, si præsentia sint symptomata, quæ peculiaribus morbis peculiariter sint. Sic ut rem per se facilem ad pauciora exempla contrahamus, constat 1. Epilepsiam cum lue venerea convenire, si syphiliticus sui impos præceps in terram identidem ruit, membra quatit, ore spumat, varie convellitur, sensu orbis est.

2. *Paralyfim*, si pars corporis quædam nec sensu polleat, nec pareat imperio voluntatis motum jubentis.

3. *Asthma*, si æger anhelus & suspiriosus sed a febre liber spiritum identidem ducat & crebrum & difficilem.

4. *Phthisim*, si a febrienti, tussiculoso, marasmode pus exspuatur vel sputa pure graviora.

5. *Strumas*, si glandulæ lymphaticæ in collo, ad maxillam utramque, in axillis, in inguinibus, in variis artuum internodiis &c. doleant, caleant, tumeant, indurentur, skirrhomæ fiant.

6. *Scorbutum* si maculæ, striz, vibices, aræ in pedibus tibiisque appareant coloris violacei, atro-purpurei, livescantis &c. & si gingivæ tumidæ, fungosæ, ulcerosæ, nigrae, dentes qui in sedibus mobiles vacillant, superemineant.

7. *Affectiõnem hypochondriacam*, si æger meticulosus, melancholicus, iniquus, de valetudine anxie provideat, symptomata quæcumque patitur etiam levissima verbis exaggeret, & a morte quasi semper immineret, sibi semper timeat.

II. *Inveteratio* vero si symptomata illa singulis singulatim peculiariter multo ante apparuerint. Sic liquet epilepsiam, paralyfim, asthma, phthisim, strumas, scorbutum, affectiõnem hypochondriacam, cæterosque quosvis affectus qui cum lue possunt concurrere, luis ingressum præcessisse, quoties symptomata, quibus designantur, antiquiora sunt impuro concubitu, quo lues admissa creditur: & tunc profecto evidens est morbos illos essentielles esse & a lue plane alienos, quacum nihil commune habeant, vel si quod forsitan, id unum ad summum quod ab illa tanquam a fomite intenduntur.

III. Demum *novitas*, si symptomata illa peculiariter recens observentur. Sic ergo si symptomata epilepsiz, paralyseos, asthmatis, phthiseos, strumarum, scorbuti, affectiõnis hypochondriacæ &c. propria non apparuerint, nisi post luis ingressum inde manifestum futurum est morbos a quibus fiunt, post acceptam tantum luem veneream advenisse. Id unum ambiguum superesse posset an a

Quibus signis di. gnosci possint morbi, qui cum lue venerea conjungi solent.

Quibus signis manifestum sit, an morbi illi lue venerea antiquiores sint.

Quibus signis liceat colligere an lue venereæ superveniant.

an a lue venerea, an a causa alia quavis simpliciore advenerint? Sed vix dignus est vindice nodus ille, cum in utroque casu hydrargyrosis perinde adhibenda sit, ut lues radicitus deleatur, & ea semel curata in aperto futurum sit, si symptomata simul cessaverint, morbos, ad quos pertinebant, symptomáticos fuisse & a lue oriundos; si vero perseverent, morbos eisdem esenciales esse, adeoque post curatam lem specificis remediis ex arte oppugnandos esse:

Quapropter
dentia
deceat æ-
grotañtes
percontari
de mor-
bis vene-
reis, qui
forsan
præcesse-
re. Viros,
tum qui
adolescen-
tes, tum
ætate pro-
vectiores
Fami-
nas, tum
quæ nu-
ptæ, tum
quæ in-
nuptæ
sunt.

Pro coronide juniores Medicos monitos velim, ut se modeste gerant, ceu ingenuos decet, tum in sciscitando an æquales morbi veneri præcesserint, tum in patefaciendo quid de præsentia luis veneris ipsi sentiant.

I. Levis quidem conjectura sufficit ad adolescentes juvenesve interrogandos, ut qui gestiant morbos venereos, quos jam passi sunt, ultro narrare, quali egregia totidem facinora, quorum juvat meminisse. At vero urgentiore præsumptione opus est, si cum viris materiore ætatem jam alsecutis agatur, potissimum si severiorem vitæ rationem ingressi sunt, ut quos, si non pudet, pigeat saltem antiquos errores relegere. Nihilominus tamen ne cunctatio nimia culpæ affinis videatur, propositis demum argumentis ex præsentis morbi statu manifestis, quæ auctoritatem quæstioni addant, libere querendum est an juventutem labis veneris ita viciose immunem egerint, ut se ab omni suspitione vacuos esse jure arbitrari possint.

II. Quod ad fœminas spectat res quidem satis facilis est & expedita, si de nuptis viduisve quæstio sit. Urgens enim præsumptio, imo vero levior conjectura sufficit, ut jure percunctari liceat, non quid ipsæ forsitan egerint, quod semper nefas, sed quid agant egerintve mariti: Usus enim invaluit viros, ut jure matrimonii liberorum omnium, quos uxor parturit, parentes sunt, sic etiam morborum omnium venereorum, quos uxor patitur, auctores esse jure vel injuriam. Sic ergo data semel occasione, ut fœminæ natura suspiciosa sunt & loquaculæ, quæcumque de viris suis noverint, quæcumque ipsæ unquam expertæ fuerint illorum contubernio sponte effluent, unde judicatu facile futurum est quid de luis præsentia opinandum sit. At vero lubrica & perardua res est, si in quæstione versetur status innuptarum, præsertim quæ famam sine labe teneant, & sanctiore superbiant vitæ instituto; tunc sane nisi inconsiderantissimæ & dementissime temeritatis notam parum cures effugere, neque suspicio prius aperienda est, quam certo liqueat de lue venerea neque tum vero unquam aperienda, nisi odii mitigandi causa morbi originem in parentes vel nutrices refundendo. Vidi equidem eo pacto innuptarum plerasque quas interrogandas habui, rem satis libere confessas esse; saltem si quæ veracundiores fuerint, veri sibi conscias nec inficias ivisse, nec propositis remediis difficiles sese præbuisse, quod Medico satis esse debet, ut qui de morbi origine parum sollicitus, solius curationis debeat satagere.

CAPUT V.

Prognosis Luis venereæ.

IN prognosi duo tantum debent inquiri, 1. Quænam lues venereæ cæteris graviore sit, & quæ omnium gravissimæ, atque inter lethiferas referendæ? 2. Quæ curationem faciliorem vel difficiliorem admittant, & cum majore minoreve periculo.

Quomodo de gravitate luis venereæ judicandum sit?

§. I. QUÆ LUES GRAVIOR, QUÆ GRAVISSIMA SIT?

1. Lues omnis venerea in genere gravis & difficilis censenda est; 1. Ratione causæ; pendet enim a seminio corrosivo, quod in partibus omnibus solidis corporis alte imbibitur, cum liquidis omnibus intime confunditur, a corpore difficulter evellitur, & cui evulso superest plerumque non una labe partibus inusta.

I. Luem veneream omnem gravem & difficilem esse 1. Ratione causæ.

2. Ratione symptomatum; nam veneno venereo, quod in æstum exeritur, non modo dolores atroces excitantur, sed pleraque corporis munia mirum in modum depravantur & pervertuntur.

3. Ratione læsionis partibus solidis illatæ: observatur enim veneni venerei acrimonia, non liquida tantum corporis infici, sed partes quæ solidas vitiari & erodi, non modo molliores, ut pulmonem, hepatis, uterum &c. sed duriores etiam, ut ossa.

2. Ratione symptomatum. 3. Ratione læsionis partibus solidis illatæ.

4. Ratione remedii quod competit, licet enim id raræ felicitatis esse videatur ad hunc morbum certius & efficacius remedium dari quam forsitan ad alterum quemquam, minime tamen dissimulandum hoc ipsum remedium genus, quantacumque cautione adhibeatur, haud raro non tardiosum tantum sed durum, imo quandoque periculi non expers esse, præsertim si ad morbum nimis inveteratum plenior hydrargyrosi opus sit.

4. Ratione remedii.

5. Demum ratione recidivæ, qua morbus, qui profligatus credebatur, iterum reviviscit; contingit enim non semel medentis culpa qui curationi finem imponere præponere festinat, aut qui imparem Mercurii dosim adhibuit; virus nec radicitus evelli nec funditus deleri; unde morbus mitigatus quidem sed non curatus post fallaces inducias cum pristina ferocia sponte redintegratur.

5. Ratione recidivæ, quæ aliquando metuenda est.

II. Cave tamen censeas eandem paremve de omni lue venerea prognosim instituendam esse. Constat enim morbi gravitatem varie varia esse, atque adeo varie in variis casibus æstimandam, multiplici causa.

II. Morbi gravitatem variam esse.

1. Morbi novitate vel inveteratione. Sic ergo cæteris paribus lues venerea, quo recentior, eo minus gravis futura est, cum a veneno re-

1. Pro morbi novitate

con-

vel inveteratione.

1. Proximate ægrotantium.

3. Pro ægrotantium sexu.

4. Pro nativo temperamento.

5. Pro naturalium constitutionum.

6. Pro symptomatum numero & vehementia.

7. Pro morbo habituali, quo ægri ante laborabant.

8. Pro natura partium affectarum.

center admissio certum sit liquida corporis minus corrumpi, solida minus labefactari, muniaque minus perverti. E contra vero gravior, quanto magis inveterata, cum contraria sint contrariorum consequentia.

2. *Ægrotantium ætate.* Sic cæteris paribus lues venerea magis periculosa est in infantibus & senibus, quam in adolescentibus, in quibus magna veneni pars exercitio expellitur vel edomatur; quod vero residuum superest, citatiore circulatione abreptum, intensiore fermentatione attritum & subactum, validiore partium nisu retusum mitiorem tragediam agit.

3. *Sexu ægrotantis.* Licet enim mulieres viris plerumque imbecilliores sint & eo nomine efficaciarum contagii veneri semel admissi magis obnoxie videantur, docuit tamen frequens experientia morbum a feminis cæteris paribus facilius tolerari quam a viris, quandiu libere fluunt catamenia, ut quibus contagii pars non pauca singulis mensibus exhauriatur; at vero constat e contra omnia in pejus ruere statim, atque fluxus menstruorum cessat ex accidente & ante tempus, vel ex legitimo naturæ ordine circa annum ætatis 45. aut 50.

4. *Nativo temperamento.* Quandoquidem virus & plures & graviores effectus producturum est cæteris paribus, si sanguis, quocum permiscetur, natura falsus, crassius, acer, ad rodendum aptus, insuli semini virulentiam foveat, imo intendant; quam si tenuis insulsus, rite temperatus eandem reprimat corrigitque.

5. *Naturali partium constitutione.* Majus enim a lue venerea periculum imminet, si cerebrum aut præcordia male affecta, si viscera male conformatæ, cæterave organa laxa & mollia sint, atque adeo adventitio veneno sese perfundenda tanto facilius permittant, quam si partes eadem firmæ, validæ, integræ, veneni energiarum pertinacius & efficacius reluctentur.

6. *Symptomatum,* quæ lues invehit, numero & vehementia. Sic ergo lues tanto gravior censenda est; quanto plures functiones, quanto ad vitam utiles, ut vitales & animales, quanto vehementius easdem lædit & depravat. Hoc enim majorem vel malignitatem in seminio, vel infirmitatem in organis læsis supponit, quod utrumque ad morbi prognosim perinde est.

7. *Morbo habituali,* quo æger ante laborabat. Lues enim cæteris paribus magis timenda in epileptico, phthisico, hydropico, arthritico, cachectico &c. quam in perfecte sano, quandoquidem ut antiquus morbus accessione recentioris ingravescit, sic novum antiquioris præexistentia intendi necesse est.

8. *Natura partium affectarum.* Nam patet cæteris paribus gravius esse a lue periculum, 1. Si solidæ corporis partes corrumpantur, quarum reparatio difficilior, quam si liquidæ tantum inficiantur, quæ possunt facilius renovari; Si inter solidas partes eæ corrumpantur, quæ interne latent, sunt e genere nobilium, muniisque ad vitam necessariis destinatæ, ut pulmo, ventriculus, hepar, uterus &c. quam si fuerint oculis obviæ, & ex

igno-

ignobilium numero, ut cutis tunica adiposa, musculosa caro &c. quarum labes & levior est & curatu facilior.

9. Tandem gradu tælionis solidis partibus illatæ. Morbus enim eo gravior est cæteris paribus, quo læsio major aut plaga profundior: Hoc enim & causæ morbificæ atrocitatem & perfectæ curationis difficultatem indicat.

III. In genere inter omnes syphilidis species pro gravissimis ac plerumque lethiferis illæ habendæ sunt. 1. In quibus pars ad vitam necessaria, quæ inter nobiles locum obtineat, gravi & difficili vitio afficitur: 2. In quibus pars alia quævis ignobilior, quæ remediis parum obvia sit nec ferro excindi possit, immedicabili labe corrumpitur; 3. In quibus contagium aliud pestiferum, scrofulosum nempe scorbuticumve cum veneno venereo admixtum latet. Itaque ad eas classes pertinent lues venereæ, quæcunque male afficiunt.

1. Cerebrum, cæterasque encephali partes cerebro aditas; ut si interius ossium tabulatum exostosi tumeat, aut latente carie erodatur, si gummata tuberculave duriora piam duramve meningem obsideant; si quis cerebri tractus in skirrhum induretur, aut latente & anomalo abscessus corrumpatur; si venosi sinus, tum superiores, ut longitudinalis, laterales, torcular Galeni, tum inferiores, qui basi cranii incumbunt, polyposis inspissati sanguinis concretionibus oppleri sint; si plexus choroidæ, qui in utroque anteriore ventriculo prostant, congeneresque similium plexuum laciniæ, quæ anticæ & posticæ cerebelli parti adlitæ sunt, multiplici hydatide turgant; si glandula pituitaria, quæ ephippio insidet, indurata limphatico latici, qui per infundibulum a ventriculis cerebri confluit, transitum denegat in jugulares sinusque, qui jugularibus inferuntur: si ventriculi collecta limpha repleantur & distendantur &c. Unde cephalæa contumax sine causa externa, motus spasmodici, epilepsia, paralytis, cæcitas, vertigo, scotoma, lathargus, carus, apoplexia &c.

2. Pulmonem, cæteraque præcordia, quæ in pectore latent; ut si pulmonaris contextus duris crudisque tuberculis ita infarciatur, ut e molli, spongioso & dilatabili firmus, durus, skirrhodes fiat; si tacita tuberculorum suppuratione, abscessibus seu vomitibus multis scateat; si ab erosione discissive valis sanguinis in bronchia vesiculasque pulmonares effluat, inde expectorandus; si interior bronchiorum aut vesicularum facies latenter corrosa ab ulcere depascatur; si limpha a venis nimium compressis exundans thoracis cavum oppleat; si in cordis thalamis aut majorum arteriarum orificiis polyposæ sarcofes succrescant, aut sanguis crassior in polypiformes concretiones inspissetur &c. unde asthma & orthopnoea; hæmoptoe; phthisis tuberculosa vel ulcerosa; hydrôps pectoris, cordis tremor & palpitatio &c.

3. Hepar vasaque epatis propria; ut si ductus hepatis secretorii & excretorii spissiore bile ita oppleantur, ut bilis accedens in sanguinem cogatur retrogredi; si oppletis ductibus biliferis via sanguini per hepar transeunti præter

9. Pro gradu læsionis partium solidarum.

III. Eas omnes lues venereæ species gravissimas esse.

1. Quæ cerebrum.

2. Quæ pulmones.

3. Quæ hepar.

naturam præceditur, unde partis phlogosis; si præclusa circulationis via sanguis, qui per portarum venam in hepar jugiter contendit, in capillaribus venæ ejusdem principis cogatur subsistere, prodeuntibus e cunctis visceribus, quæ intra abdomen fluitantia sunt, si erosa aut discissa in hepate sanguifera vel bilifera vasa in abscessum latentem abeant &c. unde hepatitis infarctus, skirrhus, abscessus, iæterus, hæmorrhoides, vomitio sanguinis, fluxus hepaticus.

4. Quæ
uterum.

4. Uterum, partelque utero annexas; ut si interiorem uteri faciem ulcus cacoethes depalcatur, si vesiculosæ uteri glandulæ lacte uterino spissiore in skirrhum indurentur; si indurata dolore lancinante percellantur, & in carcinoma degenerent; si tacita suppuratione computrescant; si serosa colluvies in uteri cavum colligatur; si ovaria hydatidibus, gummatibus, skirrhosis intumescant; si tubæ Fallopiæ ejusdem vel similibus morbis afficiantur &c. unde uteri ulcus, skirrhus, cancer, abscessus, ac ovariorum multiplex tumor & suppuratio.

5. Quæ
prostatas
& vesicu-
las semi-
narias.

5. Prostatas, vesiculas feminarias, ac glandulas Cowperianas in viris, in foeminis vero prostatas & glandulas Cowperianas; ut si duræ & skirrodentes fiant; si in carcinomatoden naturam degeneraverint; si fistulosæ, & cavernosæ abscessibus perviæ sint; si erosæ & cuniculis multifariam suffossæ in labis consortium traxerint viciniores partes, ut in viris urethram, collum vesicæ, extremum rectum, natium alterutrum; in foeminis vero urethram, vesicæ collum, vulvam, vaginam, monticulum veneris, &c. unde dolor, stranguria, frequens micturitio, demum involuntaria urinæ excretio cum cuniculosis fistulis in finitima quæque loca.

6. Quæ
medul-
lam of-
fui.

6. Medullam osseam, tum quæ in cylindrum racematim collecta ossium grandiorum cavitatem, tum quæ in lacinias frustillatim distributa minorum cellulas occupat; ut si in sebum indurata skirrodens aut carcinomatoden naturam adipiscatur, cum superjecti ossis tumore; si suppurata in tabum diffuset cum ossis continentis carie, præsertim si hæc spongiosis ossium capitibus accidant, quæ artuum juncturas constituunt, aut iis ossibus, quæ nulla opera excindi possunt, ut ischio, sacro, vertebra, costis, omoplatæ, claviculæ; ossibus maxillarum, cranii aurium, narium &c. unde dolores osteocopi, hyperostoses, exostoses, ankyloses, caries; ulcera profunda, cacoethes, pure foetidissimo manantia; febris hæctica, marasmus.

7. Quæ
mammas
abscessi-
bus ulce-
ribus, car-
cinomate
&c. male
habet.

7. Partes quasvis totius corporis, mammas, labia, interiora narium, linguam, ranulas, uterum, penem, testium alterutrum, glandulas lymphaticas, quæ in inguinibus, axillis, collo, pone aures, propter axillas &c. prostant, si carcinomate occulto vel aperto infestentur, præsertim vero si partium affectarum situs, connexio, natura, usus &c. extirpationem non permittant.

8. Sicut
etiam

8. Demum ejusdem generis sunt lues quæcumque dependet a veneno venereo non puro, sed quod cum veneno rachitico vel strumoso, maxime

ve-

vero cum scorbutico ita intime commixtum sit, ut coitione bina venena in pestem alteram novam, quæ hybrida sit, degeneraverint. Nullum sane morbi monstrum forsan reperire est, quod ferocius sit, quod ægros pluribus modis miserrime torqueat, & quod curatu difficilior remediis efficacissimis pertinacius resistat.

IV. Ex dictis manifestum est posse lues veneream qualemcumque in tres gradus distinguere; ut jam pridem fert usus: *Primum*, quo comprehendatur lues venerea quævis, quæ recens sit; quæ fluida tantum infecerit, necdum attigerit solida; quæ pauciores functiones pervertat, & levi vitio pervertat; quæque adeo tutam ac plerumque facilem curationem admittat.

Alterum, qui complectatur lues omnes venereas, in quibus virus antiquius vel carius solidas corporis partes, sed ignobiles tantum labe varia, multiplici, gravi jam corruerit, sed tamen medicabili, & quam ideo tuto futura sit curatio, quanquam paulo difficilior.

Tertium denique, ad quem pertineant lues venereæ omnes, quas modo inter gravissimas sive lethales recensuimus, & quarum proinde neque tutam, neque facilem curationem polliceri unquam licet.

§. II. QUÆ LUES CURATU FACILIOR AUT DIFFICILIOR?

I. Constat lues omnes venereas curari radicitus, pleraque etiam satis facile, ope illius Mercurialis, qui modo rite adhibeatur, efficacissimum est contagii venerei rhizotomum. Et sane cum tot sint gravium morborum genera antiqua & ab orbe condito nota, ut phthisis, pestis, epilepsia, hydrophobia &c. in quibus abigendis curandisque medicina etiamnum cespitat, imo potius cæcutit, pro rara felicitate computandum est ad curationem luis quæ nova est, & quæ in Europa a duobus tribusve sæculis primum apparuerit, tam certum & præsentaneum remedium industria medentium sagacitate inventum esse, quo morbus omnium ferocissimus profigitur tuto, cito, imo vero jucunde.

1. *Tuto*. E centum enim ægrotantibus nullum, qui Mercurii usu melius non habeat; vix unum reperias, qui perfecte non convalescat, modo corpore prius rite præparato hydrargyrosis adhibeatur methodo, dosi, ordine, cautione, & dierum numero competenti, quod cæteris morbis etiam levioribus haud ita plerumque usu venit, ut quorum optima ea censeatur medicina qua inter centum ægros quinquaginta perfecte conlanantur.

2. *Cito*. Nam curatio numeris omnibus absoluta est intra triginta aut quadraginta dies, vel ad summum intra menses duos, quod vix de ullo alio morbo sperare licet, quorum plerorumque, si graviores fuerint, integra curatio ad annum & ultra non raro procrastinatur.

3. Imo vero *jucunde*. Fateor equidem id olim minus vere dici potuisse de antiqua unguenti Mercurialis administratione, in qua, cum immodico & præcipiti inunctionum usu gingivæ, palatum, & fauces exulcerarentur,

Bb 2 ubi

quæcum
rachitide
strumis,
scorbuto
conjun-
&c (un-
I V. Tria
esse luis
genera.
Primum,
Curatu
facilis.

Alterum,
Difficili-
orior.

Tertium,
Difficili-
lime.

Quid sen-
tiendum
sit de cu-
ratione
luis vene-
reæ.

I. In ge-
nere lue-
em quam
cumque
curari
posse.

1. Tuto.

2. Cito.

3. Nec
injuncun-
de.

uber & diuturnus foetidissimæ salivæ ptialismus ciceretur, & facies; caput ac lingua plerumque intumescerent, solebant ægrotantes tædio, agripnia, dolore confici, & miserimis mileris diutissime, macerari. Sed hæc jam pridem prudentiore & magis cauta hydrargyroseos methodo ita temperata sunt, ut si remedium jucundum dici merito non possit, quod forsitan in nullum vere cadit, ac saltem haud ita molestum sit ac vulgo creditur. Plerumque nullus proriturus ptialismus vel ad summum facile tolerabilis; nulla fit oris exulceratio, vel saltem levis & superficialia; demum minus fastidii atque molestiæ ægro jam exhauriendum est, ut ex lue venerea, saltem recente perfecte convalescat, quam ex febre quartana contumacior.

II. Dari tamen luem veneream, quæ difficilior curatur.

II. Minime tamen dissimulandum est nonnullas esse luis venereæ species, quæ curationem plenam & perfectam cæteris difficilior admittant, & quibus etiam post accuratissimam hydrargyrosim quædam supersint ex symptomatis, quæ ante ederant; sive ideo quod diutina morbi præsentia ea labes solidis corporis partibus illata sit, quam corrigere vel delere facile non sit; sive etiam, quod tamen rarius, ideo quod portio quædam semini venerei integra remanserit forma illibata, vel necdum satis perfecte destructa. Experimenta autem compertum est in hunc censum præcipue referendas esse sequentes luis venereæ species.

Ut 1. Quoties adfuerint dolores venerei.

1. Quotiescunque dolores venerei rheumatici sive fixi sive vagi, ægros torquent & discruciant, præsertim si diuturnitate invaluerint. Accidit enim frequenter post hydrargyrosim dolores eosdem pari fere vehementia sævire ac ante. An quod nodi, phymata, tubercula muscularum fibris tunicisve etiamnum impacta sanguinis & lymphæ viam angustando; an vero quod vasa sanguifera & lymphatica præpressis distensionibus in nimias varices dilatata sanguinis & lymphæ motum retardando, acrioris salisioris que feri decubitus locum præbeant?

2. Quoties arthritis venerea habitua est.

2. Quotiescunque habitualis est arthritica a veneno venereo orta. Licet enim inunctionibus ex arte adhibitis sæpenumero cedat, semper tamen non cedit, potissimum si inveterata sit & carebris insultibus vires jam dudum adeptæ. An quia tunc ea sunt in articulis vitia, quæ Mercurio corrigi non possint, & quæ novos similesque arthritidis insultus iterum atque iterum advocare valeant.

3. Quoties affectibus venereis defædatur.

3. Quotiescunque cutis impetigine, scabie, sed præsertim herpete sicco maligno, ekthyma sive erodente deturpatur; siquidem haud rarum est ab hoc symptomate totam Mercurii vim eludi, cui cætera cedunt. An quod in ea cutis infectione corpus reticulare sive mucosum cutis contagio venereo alteratum & erosum in filtrum perenne abierit, quo jam ubertim confluat quicquid sanguinosi & acris inest sanguini?

4. Quoties æger cephalæa

4. Quotiescunque adfuerint graves cephalææ, hemigranæ, aut dolores particulares, qui certam tantum capitis aream tenent, & *ovum* vel *clavus* dici solent, præsertim si fiant sine causa ulla externa; observatum est enim sæpius do-

dolores istiusmodi post adhibitam hydrargyrosim pristinam ferociam re-
tinuisse. An ideo quod dolores illi pendeant ab exostosi vel carie inte-
rioris cranii tabulæ, vel a nodis, phymatis, tuberculive in meningi-
bus cerebri, quæ Mercurii illitu resolvi & discuti non potuerint?

5. Quotiescunque ossa tument exostosi vel hyperostosi dura, antiqua,
invererata. Licet enim contingat usu Mercurii hyperostosis plerumque
resolvi, quæ recens est, imo etiam exostosis ipsam, præsertim si ca-
vernosa sit & producat ab inflatis medullæ osæ laciniis lamellas osæas
in cellulas dilatantibus, docuit tamen experientia spem similis successus
raro ratam fore, quoties hyperostosis aut exostosis temporis diuturnitate
induruerint, maxime vero si exostosis sit e genere exostosis vere osæa-
rum, quæ nec ebori cedant duritie. Inde repetendum est quod ankylosis
venerea profligato morbo sæpius supersit. Anne hæc ita eveniunt, quod
Mercurii efficacia, quæ solvendæ materiei osææ molliori & recens impactæ
sufficit, impar sit, resolvendæ duriori & in verum os jam solidatæ?

6. Quotiescunque testes ambo vel testium alteruter tument ab hærente
collecto, & inspissato semine. Solent enim sæpenumero tumores istiusmo-
di, si inveterati sunt & lapideam duritiem adepti, ita difficiles esse, ut re-
mediis rebelles nulli cedant hydrargyrosi. An ideo quod Mercurius nec
semen inspissatum & casei instar grumulosum, quo testes turgent, attenuare
& diluere; nec laxata vascula spermatica, quorum glomeratione testes
constant, nativo tono restituere valeat, unde gemina de causa nulla te-
stium resolutio speranda sit?

7. Quotiescunque adest gonorrhœa virulenta, sive recens sit, sive anti-
qua & inveterata. Quamvis enim nec semel observatum fuerit inunctionum
administratione cum cæteris symptomatis gonorrhœam quoque perfecte
curatam fuisse, id tamen perpetuum non est, acciditque multoties etiam
post legitimam hydrargyrosim, gonorrhœam, licet amplius venerea non
sit, fluxu æque uberi ac antea scaturie. An quia præter veneni vim inun-
ctionibus delectam, longiore temporis intervallo & fortiore ulceratæ par-
tis deterfione opus est, ut ulcus in prostaticis superstes cicatrice coeat?

8. Quotiescunque stranguria a prægressis gonorrhœis ostra ægrotantes
perit continuo, vel per intervalla. Malum enim, licet usu Mercurii
levius plerumque fiat, naturam tamen ita retinet, ut iterum pari ferme fe-
rocia sæviat identidem. An quod Mercurius impar sit resolvendis hyperlar-
cosibus quæ in urethra succrevæ, emolliendis durioribus cicatricibus aut
futuris, quæ in eodem ductu prostant, aut demum consolidandis ulceribus,
quibus eroditur, a quibus causis stranguriam dependere supra vidimus?

9. Denique quotiescunque strumosa vel scorbutica constitutio luis vene-
reæ comes est individua. Experientia enim compertum est eas luis venereæ
species usu Mercurialium, si sola sint, non iam expugnari quam provocari,

5. Quo-
ties ossa
male affi-
ciuntur.

6. Quo-
ties testes
indurati
tument

7. Quo-
ties gon-
orrhœa
virulenta
adjuvata
est.

8. Quo-
ties stran-
guria
prægressis
gonor-
rhœis
successit.

9. Quo-
ties stru-
mosa vel
scorbutica

constitu-
tio morbi
comes est.

arque ideo si radicitus unquam curentur, curari numquam, nisi anti-schorradica aut anti-scorbutica cum anti-venereis & Mercurialibus vel una vel alterne exhibeantur. An quod scrofulosi vel scorbutici semini guttulæ, veneni venerei guttulas aliquot in sinu ita intime recondant, ut inaccessæ fiant & inexpugnabiles; haud dispari modo ac in amalgamata auri & argenti solent auri atomi quædam ab argenti atomis undique ita obvolvi, ut ab aqua regia nequeant ullomodo nec attingi nec dissolvi.

III. Dari

genus al-
terum luis
venereæ,
in quo cu-
ratio peri-
culosa sit.

1. Si mor-
bus sit e
numero
gravissi-
morum.

a. Si con-
jungatur
cum scor-
butica oris-
tione.

3. Aut
cum scro-
fulis gra-
vioribus.

4. Aut
cum epi-
leptia, cu-
jus insul-
tus fre-
quentes
sint.

5. Aut
cum hypo-
chondriaco af-
fectu gra-
vi.

III. Datur & alterum luis venereæ genus præcedente pejus, in quo curationem morbi instituere adeo periculosum est, ut soleant inde gravia infortunia sæpenumero obvenire, nisi cautissime procedatur. Istius modi sunt lues venereas sequentes.

1. Quæcumque inter gravissimas lethalesve lues venereas, quas supra recensuimus, locum habent. Jure enim metuendum est ne ægrotantes gravi & diutina labe jam fracti, antiquove morbo exhausti, qui inunctionum usu plerumque exasperatur saltem initio, tædio & vehementiæ adhibiti remedia, atque provocati pyralismi molestiæ succumbant.

2. Quæcumque scorbutum comitem habent, quo gingivæ & oris interiora fœteant, liveant, putrescant & tumeant in fungos. Quippe ubi primum accedit oris phlogosis & exulceratio, qualis in pyralismo adest, solent semper oris tresses tum gingivæ, tum faucium palatique partes ab ulcere phagedænico & erodente depasci, quod in gangrænam brevi definit, vel proxime definitionem.

3. Quæcumque cum scrofulis strumifve adeo gravibus conjunctæ sunt, ut aures, collum aut maxilla utraque, multis, duris, tumidis, callosis glandulis obsideantur. Timendum est scilicet ne strumofæ glandulæ una cum salivalibus mole augeantur pyralismi tempore, & jugulares venas remolque venosus, qui in jugulares desinunt, ita comprimant & angustent, ut inde a retento sanguine, tum in ore major futura sit phlogosis & exulceratio cum periculo gangræne, tum quod gravius est, nimia cerebri oppressio, non sine vitæ discrimine.

4. Quæcumque epilepticos adoriuntur, qui frequentibus & gravibus paroxysmis corripiti solent. Nam periculum est ne pyralismi tempore dum glandulæ salivales tument, & tumefactione venas jugulares premunt, gravissimi advocentur insultus; unde tum major oris inflammatio exulceratio varia maxillarum distorsione & multiplici linguæ morsu, tum quod pejus est, immodica in cerebro hæmostasia; quæ periculo numquam vacat.

5. Quæcumque hypochondriacis accidunt. Cum enim natura & morbo meticulosa sint, vanis imaginibus percussi inani quidem pavore perterriti sunt toto curationis tempore, ac Medicum importunis querelis exagitant; sed hæc tolerabilia: At vero dum pyralismus acrius urget, animum plerumque ita despondent ex desperatione, ut frequent i & gravi deliquio subinde de-

de-

deficiant, unde improvisa salivæ fluentis suppressio, tumefactio glandularum salivalium, hærentia sanguinis in ore, capite, cerebro, adeoque hærumque partium inflammatio vel oppressio, quæ singula periculi plena sunt.

6. Quæcumque ad ægotantes pertinent qui diarrhœa laborant habitualli. Tunc enim vis tota Mercurii ad intestina ruens, quo tendit humorum impetus, vellicat, inflammat, rodit interiorem eorumdem tunicam, & ventris tormina gravissima, alvi fluxus multicolores cum tenesmo, imo dysenteriam advocat, & ea quidem vehementia quæ ulteriore inunctionum usum non raro dissuadeat. Idem plane dicendum, si inunctiones pyralismi loco diarrhœam ipsæ moveant, quod aliquando obtingit etiam in iis quibus alvus adstricta esse solet, sed numquam sine magno ægotantium detrimento.

7. Quæcumque mulieres male habent, quæ uterum gerunt. Siquidem periculum est ne abortiant, tum orgalino, quem Mercurius ciet in sanguine, tum tædio, dolore, agrypnia quæ pyralissimum consequuntur, tum maxime ventris torminibus & nisu desinendi, si alvus diarrhœa solvatur.

8. Quæcumque curandæ veniunt in fœminis laborantibus ulcere skirrho, carcinomate uteri sive a causa venerea, sive ab alia quavis. Contingit enim non semel sanguinem nimis attritum & comminutum, in angustata, infarcta, constricta uteri vasa arietare pyralismi tempore momento ita valido, ut viam sibi vi faciat, & hæmorrhagiam ex utero vel lethalem vel periculi plenam advocet.

9. Tandem quæcumque infantes senesve decrepitos invadunt. Cum viribus enim parum valeant, quæ in his grandiore ætate fractæ, in illis vero teneriore nondum confirmatæ sunt, de utrisque periode timendum est, ne misere succumbant, aut graviori casui, si quis forsan ingruat, aut etiam soli pyralismi vehementiæ, si diuturnior sit.

IV. Cæterum si de ægri salute ante conclamatum esse videatur, palliativis quidem remediis mitiganda est morbi ferocia, sed desperatis nulla hydrargyrosis adhibenda, ne temere infamentur ea remedia, quæ multis fuere salutis. At vero si qua spes effulgeat, quanquam exigua, remediorum alea tentanda est, cum ait Celsus, *in evidenti mortis periculo satius sit anceps remedium experiri, quam nullum*, sed tentanda est prudenti cautoque consilio.

Itaque 1. Si lues venerea sit e genere gravissimarum & quæ plerumque morte judicantur, post debitam præparationem Mercurius longioribus intervallis illinendus est & parca manu, ea scilicet dosi cui ferendæ vires pares esse videantur. Vix quidem sperare licet eo pacto morbum gravem & inveteratum plene extirpatum iri; at saltem ita mitigandum esse certum est, ut ægro, postquam remedio convaleuit, meliuscule sint. Tunc ergo redintegratis viribus, mercuriales inunctiones denuo sed majori dosi adhibendæ, quibus si morbi vehementia necdum cesserit, instauratis rursum auctisque viribus hydrargyrosis tertio repetenda, sed tandem tanquam re

6. Aut cum diarrhœa habitualli.

7. In mulieribus, quæ uterum gerunt,

8. Aut quibus uterus ulcere vel carcinomate affe-ctus est.

9. Tandem in infantibus, & senibus.

IV. Hydrargyrosim caute adhibendam esse.

1. Si lues venerea sit e genere gravissimarum.

ad triarios redacta, omni opera ea saltem vice jam enitendum est, ut virus omne perfectissime debellantur.

2. Si sit e numero earum, quæ curationem cum periculo admittunt. 2. Si lues sit ex earum numero, quæ curationem cum periculo admittunt, illitus mercuriales simili methodo raris quidem intervallis admovendi & pauca dosi, nempe ne quid mali præcipitantia accersatur, camarinam præpropere commovendo: At vero & pluries & diutius iterandi scilicet ut admixtus ea ratione Mercurius non modo æquet Mercurii quantitatem, quæ ad plenam curationem necessaria est, sed etiam aliquantulum superet. Quapropter inunctionum administratio non urgenda ante tempus, sed potius ultra tempus sustinenda est, cum in re tam gravi omnia factis cito fieri putanda sint, modo satis bene.
3. Si sit ex earum specie, quæ Mercurio difficile cedunt. 3. Si lues venerea locum habeat inter eas, quæ Mercurio difficile cedunt, inunctionibus & paulo majori dosi & paulo longiore temporis spatio utendum erit ut quicquid morbo si seminii inest sanguini, vi Mercurii vel salivatione omnino everratur, vel extinctionis via plenissime debelletur, atque adeo si non utraque ratione, saltem alterutra lues omnis venerea radicitus evellatur. Quod si vero supersint etiamnum post absolutam hydrargyrosim difficiliora quædam symptomata, ex eorum numero quæ ante aderant, cum jam amplius a lue venerea neque dependant neque foveantur, remediis communioribus corrigenda erunt, ut infra videbitur.
4. Si mulier infecta uterum gerat, partusque prope ad sit. 4. Si mulieri utero gravidæ, quæ lue venera infecta sit, partus prope instet, ab hydrargyrosi tunc quidem abstinendum est, ne in ipso pyralismo periculosus enixura esset: Sed ubi primum a puerperio refecta fuerit, ex arte sananda est, dum alumnus pendet etiam tum ab uberibus, ut una eademque opera sanetur & ipsa & infans, quocum vitium communicavit. At vero si legitimum puerperii tempus longe absit, cum periculum in mora maximum esse soleat, ommissa inani cunctatione inunctiones mercuriales statim adhibendæ sunt, sed eo gradu, quem mater & fœtus qui utero geritur sine detrimento tolerare possint.
5. Si infans inquinatus lacteat. 5. Si infans, qui lue venerea inquinatus est, lacteat, tenerrimæ quidem ejusdem ætati parcendum est, sed ipsius loco nutrix hydrargyrosi submitrenda, tanto quidem potiore jure, quod hæc ejusdem vitii particeps sit. Sic nutricem sanando sanabitur facili opera & alumnus, lactis ope, quocum mercuriales atomos ea quantitate hausurus est, quæ curationi sufficiat. Si infans vero jam a nutrice summotus fuerit, ipsemet sine cunctatione curandus est, vel præparatis Mercurialibus interne sumptis, vel quod tutius censeo inunctionibus ex Mercurio. Nec obstat huic therapie ætas tenerior, cum facile sit prudentia & consilio infantis incolumitati consulere.
6. Si æger sit senex decrepitu. 6. Idem dicendum de senibus, qui si lue venerea laboraverint, illitu Mercuriali ex arte curandi sunt, quamquam depontani & decrepiti, sed ea methodo curandi, qua depontanos & decreditos curare decet & licet.

CAPUT VI.

De Preparatione ad hydrargyrosim.

Satis constat ex iis, quæ supra dicta sunt *Lib. 2. cap. 9.* virus venereum nulla methodo certiore, tutiore, efficaciore profligari posse, quam hydrargyrosi. Hic ergo non de genere medicinæ, quæ confirmato morbo venereo conducatur, sed de medicinæ modo quaeritur, hoc est de recta inunctionum mercurialium administratione sive hydrargyrosi; siquidem tristi, sed nimium frequenti experientia compertum est, hanc ipsam hydrargyrosim, etsi periculo vacet rite adhibita, gravem esse, difficilem, & periculosam plenam alet, si temere, præpostere, inconsideranter, præpropere administretur. Quocirca cauto opus est, seduloque providendum, 1. Quid ante, 2. Quid per, 3. Quid post hydrargyrosim peragendum sit.

Ante hydrargyrosim prudentis Medici officium est ad quatuor attendere: 1. Ut præsens ægri status Mercurio ferendo par sit: 2. Ut anni tempestas remedio sit opportuna: 3. Ut diligens adhibeatur præparatio, qua vitia sanguinis, si qua fuerint, emendari, & noxæ quæ ab usu Mercurii plerumque imminet, declinari possint: 4. Demum ut recta sit unguenti mercurialis, quod illini debet, compositio.

Ante hydrargyrosim ad quatuor attendendum est.

§. I. AN PRÆSENS ÆGRI STATUS FERENDO REMEDIO PAR SIT?

Circa primum certa est & ab omnibus definita lex, ne hydrargyrosi ægrotanti ulli adhibeatur, qui ex morbo quovis periculose decumbat, aut quem vires morbo, venere, labore, inedia nimium exhaustæ fere destituant. Quorsum enim conduplicato malo morbum morbo addere, & ægrotum remedio difficili imparem imprudenti therapeja excruciare non sine evidenti vitæ discrimine?

Itaque I. Hydrargyrosi perpetuo superfedendum est, quoties syphiliticus acuto morbo tentatur, ut febre maligna, synocha, lipyria, caustione &c. pleuritide, peripneumonia, hæmoptoe &c.

II. Imo vero quoties morbo chronico detinetur, qui deploratus vel admodum periculosus sit, ut hydrope pectoris vel abdominis confirmato; gravi skirro hepatis, lienis, uteri; phthisi ad tertium gradum perducta; febre lenta diuturna &c.

III. Huic tamen legi minime parendum est, si certo constet vel saltem valde probabile sit morbos illos chronicos a lue venerea tanquam a causa primaria symptomatice dependere. Tunc enim ægro cum sit in præcipiti, ipse una est, nempe sublata semel morbi causa morbum quo-

1. Ut æger ferendo remedio par sit. Quocirca hydrargyrosi non adhibenda est 1. Nec iis qui acuto; 2. Nec iis qui chronico morbo deplorato tentantur. Nisi probabile sit morbos illos

chronicos quoque sublatum iri; atque adeo in evidenti morbis periculo satius est anceps remedium experiri quam nullum.

IV. Cæteri vero morbi chronici, quicunque natura vel intensione minus urgent, nullomodo obstant quominus hydrargyrosis adhibeatur. Neque enim puto quemquam ab hujus remedii ulu deterri posse, quod æger asthma v. g. cordis palpitatione, inappetentia, bradypnoea, cephalæa habituali, nephritide &c. labores.

3. Nec iis V. Quod ad vires, præsens illarum status prudenter expendendus est, quibus vires magnopere exhaustæ fuerint, hydrargyrosis usque differenda est, dum temporis diuturnitate, quiete, diætâ analeptica instaurantur, ne debiliior æger pyralismi tædii, doloribus, incommodis misere succumbat.

VI. Cæterum quandoquidem duplex est hydrargyrosis, altera plenior, quæ inunctionibus majoribus & quotidianis vel saltem frequentioribus, donec pyralismus citatur; parciior altera, quæ minoribus & rarioribus illibus perficitur, & qua nulla provocatur salivatio vel pauca, diversam cautionem adhibere necessum est, prout utram utri præferre visum fuerit, majorem nempe, si plenior hydrargyrosi pyralismus excitandus esse videatur, quia vires inde magis frangi certum est: Minorem vero, si hydrargyrosi parciore, quæ nullum pyralismum motura sit, uti placuerit, quoniam constat ea therapeja vires non exolvi, vel saltem multo minus exolvi.

4. De VII. Cum experientia docuerit salivationis impetum in mulieribus Mercurio inunctis plerumque ingravescere, cum instant catamenia, operæ compendium foret mercurialem therapejam intermedio tantum tempore, quod vacuum est, in illis instituere. Sed cum hydrargyrosis ultra mensem produci soleat, vix ulla ratione potest effici, quin cum purgatione illa menstrualis aliquomodo concurrat. At saltem diligenter curandum est ut in finem therapejæ incidat, dum salivatio incipit sponte sua remitti. Quamobrem præmissis remediis præparatoriis ante profluvium menstruum, hydrargyrosis confestim adhibenda est altero vel tertio die postquam desierit catameniorum fluxus, eo pacto non ante rediturus quam postremo curationis tempore, cum res in vado futura est.

§. II. QUÆ ANNI TEMPESTAS ELIGENDA SIT.

II. Ut anni De anni tempestate fere nulla quæstio est, nam I. Omnium opinio est tempestas hydrargyrosim nec hyeme, nec æstate administrandam esse, si commode idonea sit: ita liceat; non hyeme quidem, ne sanguis frigore inspissatus tardiusque circulus Mercurii efficaciam nimium eludat, ne corporis pori arctius constituti perspirationem parcius excludant; ne frigore subitaneo suppressa perspiratio, vel salivatio cohibita locum dent gravi catarrho in pectus, aut de-

decubitui in caput: Non *æstate* vero contrariis rationum momentis, ne sanguis calore fervidior, citatiusque motus nimiam a Mercurio eliquationem experiat; ne per cutis spiracula laxius patentia immodica fiat diaphnoe cum notabili virium detrimento; demum ne periculose turbæ & febriles orgasmi in sanguine excitentur ex leviori causa non sine aliquo ægrotantis discrimine.

II. Anni tempestates hydrargyrosi maxime opportunas vernam esse vel autumnalem, dum aer tepidior Mercurii energiam neque retardat, neque præcipitat, sed commode adjuvat, ac diaphoresi & ptyalismo utiliter favet.

III. Vernam tamen autumnali eo nomine præferendam videri, quod vetis tempore crescente in dies aeris suavitate ægri remediis jam defuncti restituantur celerius commodiusque, quam in autumno, præsertim extremo, quo aeris inclementia sensim ingravescit.

IV. Verum si morbus symptomatum gravitate urgeat, & periculum fuerit in mora, abjecta anxia commodioris temporis expectatione, hydrargyrosim confestim adhibendam esse vel ipsa æstate, aut hyeme media, ea tamen cautione atque provisione, ut in cubiculo, in quo æger decumbit, aeris fervor, frigorisve acerbitas omni arte atque opera quam maxime mitigentur.

V. Hyemen cæteris paribus hydrargyrosi minus inopportuna videri quam æstatem, quandoquidem certiora & tutiora supputant præsidia ad frigorum vim extenuandam, quam ad sedandas caloris molestias. Adde hyeme Mercurium tardius segniusque agere, atque adeo facilius regi & cum minore ægri periculo quam æstate.

§. III. QUALIS PRÆPARATIO AD HYDRARGYROSIM ADHIBENDA SIT?

Operæ pretium est hydrargyrosi præparatoria ea remedia præmittere, quæ emendatis sanguinis vitiis, si qua adsint, nimiam Mercurii efficaciam mederentur, turbas inde alioquin excitandas compeſcant, atque infortuniis occurrant, si qua forsan imminerent. *Istuc enim est sapere, ut Comicus (a) ait, non quod ante pedes modo est videre, sed etiam illa, quæ futura sunt, Prospicere.*

Primo. In hunc ergo finem 1. Minuenda est sanguinis quantitas & vasa deplenda, ut sanguini Mercurii vi rarefaciendo spatium fiat.

II. Everrenda cacochylia, quæ in primis viis congesta later; imo etiam bilis cæterique humores vitiosi, qui in sanguine redundant, evacuandi sunt, ne ptyalismi tempore mota Camarina intempestivas turbas ciet.

III. Diluendus est sanguis spissior, & si acrimonia peccaverit, de mulcendos, ut Mercurio atterenti facilius inde obsequatur, minorem fervorem contrahat, & tumores diuresi, diaphoresi, catharsi, ptyalismo educendos minus acres suggerat.

Sed verna vel autumnalis. Et præsertim verna eligenda est.

Si morbus urgeat, potest remedium adhiberi quavis tempestate. Sed hyemetamen commodius quam æstate

III. Ut diligens præparatio adhibeat.

Indicationes, quibus satisfaciendum est.

IV. De.

(a) Terent. *Adelp. Act. 3. Scen. 3.*

IV. Demum emolliendus est partium, & præsertim viscerum tonus, ut laxiora vascula & valculorum stamina sanguinis attritionem & circulationem citatorem, humorum secretionem & excretionem uberiores, & perfectam resolutionem obicem renitentium, si qui forsitan impacti hæreant, sine damno tolerare possint.

Secundo. Ut receptum est generalibus illis indicationibus sequenti methodo satisfacere.

Vulgaris
methodus
qua iis-
dem sa-
tisfit.

I. Vena tunditur in alterutro brachio, atque sanguis emittitur ad 3 xij.

II. Præmissio clystere emolliente catharticum sequente die exhibetur, pro varia ægotantis temperie varium, sed ut plurimum ex infuso 3ij. folliculorum vel foliorum fennæ orientalis, & 3j salis vegetalis, cum additis mannæ calabrinæ 3ii.

III. Deinde balnea aquæ communis tepidæ adhibentur, semel tantum in die, si æger imbecillior sit; si vero fortior fuerit, bis, mane jejuno ventriculo, & vespere post confectam prandii concoctionem. In quolibet balneo immorandum est ad horam unam, vel ad sesquihoram; cæterum in balneandis mulieribus quæ uterum gerunt, cauto opus est, ne balneis nimis aut diuturnioribus utero noxa inferatur, causaque detur abortioni.

IV. Propinatur quolibet mane in balneo vel in lecto haustus seriales depurati, chalybeati, & infusis chamædryos, nasturtii aquatici, ceresolii &c. foliis alterati; vel jusculam ex pullo gallinaceo, aut frustulo carnis vitulinæ cum decoctis herbis diluentibus, refrigerantibus, vulnerariis, nempe cichorio silvestri, pimpinella, agrimonia, scolopendrio, capillo veneris, nasturtio aquatico, & similibus.

V. Balneorum numerus certa lege non definitur, sed varius esse debet, & pro ægotantium temperie siccior vel humidior major minorve. Rarum tamen est balnea citra decem subsistere aut ascendere ultra sexdecim.

VI. Finito balneorum usu vena denuo secatur in plethoricis, ac deinde iteratur purgatio. Sin vero nulla adsit plethora, neque alia urgeat mittendi sanguinis indicatio, ommissa venæ sectione purgans denuo præscribetur, quale superius.

VII. Sunt qui balneum semel atque iterum repetant post hanc alteram purgationem, ut fervorem cathartico inductum temperent, quod ipse numquam improbo, imo in ægotantibus biliosæ temperaturæ & habitus siccioris utile esse judicio.

VIII. Cæterum toto præparationis stadio imperatur diæta temperans, humectans, refrigerans ex cibis eupeptis & euchymis, moderate assumptis, & in qua a vino, venere & exercitiis nimis tum corporis tum animi parcatur.

IX. Ex his liquet graviter eos errare, qui putant ægros ad hydrargyrosim præparandos esse remediis calefacientibus, jusculis v.g. viperinis; decoctis Guaiaci, Chinæ, Sarsæ parillæ & sassafras; præperatis Mercurialibus in-

ter.

terne sumptis &c. His enim sanguinis fervorem, siccitatem, acrimoniam augens; hi solidiorum fibras, stamina, vasa durant crispantque: Hinc ergo Mercurii vis in sanguinem magis tumultuosa, ne dicam incendiaria; hinc excretiones parciore & acriore, hinc demum frequentiores futuræ sunt oris & interaneorum phlogoses erysipelatodes, ulcerosæ, gangrænodes.

Tertio. Allata remedia satis sunt superque vulgo syphiliticorum, in quibus cæteroquin omnia sana sunt. At vero paulo operosiore præparatione opus est, si qua labes alia gravis lateat, quæ cum lue venerea conjuncta sit, ut liquet exemplis sequentibus, quæ notissimos & maxime obvios casus exhibent.

Præpara-
tio ope-
rosior,
quæ adhi-
benda est.

I. Itaque si æger pulmonarius, macilentus, febriculæ obnoxius, anhelosus, tussiens in phthisim vel tabem inclinaverit, neque ad hydrargyrosim, imo neque ad ullam ante hydrargyrosim præparationem properandum est.

1. In Pul-
monariis.

1. Nisi prius exhibitio lacte asinino, caprillo, vaccino &c. per unum aut alterum mensem, semel aut bis in die, imo etiam pro omni alimento, si ventriculus facile concoquat.

2. In ipsa præparatione blandis catharticis utendum est, manna scilicet vel medulla cassiæ; ac balnearum loco semi-cupia tantum adhibenda ne fortiorum pyrgantium vi vel nimia aquæ totum corporis habitum ambientis pressione pectus male habeat.

II. Si ægro lurido & cachectico pedes œdematosi, & viscera obstructiōibus infarcta sint. 1. Per duodecim vel quindecim dies exhibenda quotidie mane jejuno ventriculo opiata purgans & aperiens ex croco Martis aperiente, pulvere millepedum recente, aloë luceotrina, sale tartari, absinthii, vel ammoniaco &c. ut promota diuresi serum in corpore stagnans evacuetur.

2. In ca-
checticis.

1. Quarto vel quinto quoque die huic opiata addendum est jalapium ad gr. xv. vel xx. aut diagridium ad grana 1x. vel x11. ut catharsi facilius egerantur, quæ sensus tardiusque diuresi educenda forent.

3. Demum in ipsa præparatione nulla debet ut plurimum venæ sectio celebrari, vel saltem celebrari debet parciore manu: Balnea quoque minus multa adhibenda, ne solidorum fibris vasisque jam morbo laxioribus nimia laxitas concilietur.

III. In ictericis, quibus bilis, & hypochondriacis, quibus sanguis spissior est sicciorque, 1. Utile est exhibere per dies aliquot juscula vel apoze-
mata ex decoctis foliis cichorii, scolopendrii, pimpinellæ, agrimonix, nasturtii, cum tartaro Chalybeato solubili ad ℥j. vel arcano duplicato ad ℥g.

3. In icte-
ricis.

2. Possunt, si tempestatis ratio permiserit, aquæ minerales Chalybeatæ ex earum genere, quæ blandius agunt, quales sunt *lex Eaux de Forges, de Passy, de Carensac, de Spa &c.* per hebdomadas aliquot potandæ præscribi ad libras 11. vel 111. mane jejuno ventriculo, balneo Mariæ prius calefactas.

3. In

3. In ipsa præparatione balneorum usui diuturnius insistendum est, quibus & bilis ictericorum tenuior, & hypochondriacorum sanguis diluor fiat, unde minus periculum futurum sit, ne in ipsa hydrargyrosi turbas dent.

4. In epileptici.

IV. Si æger frequentibus insultibus epilepticis quati soleat, omni ope atque opera enitendum est, ut fracta prius morbi vehementia nulli vel leviores paroxysmi adfuturi sint tempore hydrargyroseos.

In hunc finem 1. Sanguis paulo largius mittendus est, & mittendus quidem e pede, ut a cerebro quam longissime evocetur.

2. Purgatio iterata non ignaviore cathartico molienda est, sed emetico, quo docuit experientia cerebri infarctus qualescumque efficacissime discuti vel imminui.

3. Balnea cautione adhibenda, ne noceat capiti nimia sanguinis copia, quæ ab habitu corporis intro repellitur aquæ superincumbentis gravitate: Sin secus omisiss balneis semi-cupiis utendum.

4. Toto præparationis tempore, imo etiam ante præparationem in usum advocanda sunt remedia, quæ anti-epileptica dicuntur, inter quæ fama potissimum valent pulveratum cranium hominis violenta morte perempti; ungula alcis; saliva volatilia viperarum, cranii, cornu cervi; pulvis ad gutteturam; radix valerianæ silvestris pulverata; martialia; Mercurialia, præsertim cinnabaris antimonialis &c. ex quibus varie commixtis confici possunt boli vel opiatæ mane jejuno ventriculo deglutendæ, superbibendo jusculum radice præniæ maris alteratum.

5. In scorbuticis.

V. Si in ægotante tibiæ maculis violaceis, lividis, nigris variz sint; si gingivæ molles, fungosæ, putres fuerint; uno verbo si adsit, vel status ad scorbutum manifeste inclinans, uno aut altero ante præparationem mense sanguinis dyscrasiæ & gingivarum putredini sedulo medendum est sequenti methodo.

1. Utendum est jusculis, apozematis, pitana ex decoctis radicibus herbisque anti-scorbuticis; v. g. radicibus polypodii, lapathi silvestris, lapathi aquatici, aristolochiæ rotundæ, ari, lepidii, raphani rusticani &c. foliis cochleariæ, armoraciæ, nasturtii aquatici, becabungæ, hederæ terrestres, lupuli, salviæ, argentinæ, crucæ, apii, chamædrys, chamæpityos &c.

2. Bolis aut opiatis ex remediis ejusdem similisve efficaciz, qualia sunt cortex Vvinteranus sive canella alba, gannaperis sive cortex Peruvianus, scacarilla, sæcula radices ari, semen nasturtii, crocus Martis aperiens cæteraque martialia, antimonium diaphoreticum, æthiops mineralis, salia volatilia omnia &c.

3. Aquis mineralibus Chalybeatibus, quæ sanguinis muriam eluant & vitiosam crassitiem emendent, quales sunt *les Eaux de Forges, de Passy, de Pougnes, de Spa, de Carenzac, de Vals* &c.

4. La-

4. Lacte asinino vel caprillo sincero, aut vaccino cum addito ad æquas vel ad tertias partes decocto ligni sancti semel in die, mane scilicet jejuno ventriculo; vel bis, nempe mane & sero.

5. Gingivæ putres, relictis prius fungis, si qui sint, & scarificata fungorum basi, Lanfranci collyrio, vel spiritu salis leviter imbuendæ sunt, quo putredini occurratur: Deinde gargarismatibus sive lotionibus antiscorbuticis abstergendæ sunt, quæ parantur ex aqua vitæ cum additis camphora, saccharo candido & alumine rupeo; vel ex decoctis radicum aristolochiæ rotundæ aut bistortæ, strobilorum pini, corticis aurantiorum amarorum, foliorum & fructuum sumach, cum addito spiritu vini camphorato & alumine rupeo ad s. q.

6. Mitigata iis remediis morbi ferocia, quod ad cætera adhibebitur vulgaris præparatio ad hydrargyrosim.

VI. Demum si syphiliticus diarrhœa detineatur contumaci & habituali, aliquot ante hydrargyrosim mensibus labrandum est ut morbus curetur, vel saltem mitigetur.

5. In iis qui diarrhœa habituali laborant.

3. Eo fine 1. Æger identidem purgandus est cum catholico pro ore ad ʒj. vel ij. aut syrupo magistrali ad ʒj. ʒ. vel ʒij.

2. Pro nota diarrhœæ causa remedia adhibenda sunt varia, nempe aquæ minerales Forgeses (de Forges) pro potu ordinario, si a bile acriore; pulvis corticis brasiliæ sive hipecacuanhæ ad gr. xx. xxv. vel xxx. si a pituita vitrea, mordicante; pulvis Simaroubæ ad gr. xx. in substantia vel ad ʒʒ. in decocto. si a sero salso morbus dependeat.

3. Exhausto vel mitigato morbi fomite ad absorbentia recurrendum, inter quæ potissima sunt corallia rubra præparata, terra sigillata, lapis hæmatites, terra Japonica sive catechu, crocus Martis astringens, cornu cervi ustum, malicorium, balaustia, gallæ, conserva rosarum, myva cydoniorum, theriaca, diascordium fracaistorii; syrupi de rosis siccis, corallorum, cydoniorum &c. opiatia omnia &c. ex quibus pulveres, opiatas, bolos conficere facile est.

4. Dieta imperanda est tenuis ex cibis eupeptis & euchymis, qui ventriculum non gravent, nec in vitiosa liquamina degenerare possint.

5. Denique præparationis tempore balneis paucioribus utendum erit, ne alvus jam laxior nimium solvatur.

Hactenus de morbis variis, quos plerumque contingit cum lue venerea concurrere, circa quos velim prudentem Medicum perpetuo memorem esse unguentum mercuriale tunc temporis, si unquam alias, & parce & lente administrandum esse, hoc est raris inunctionibus & dosibus parvis, unde non repentinus & tumultuarius in sanguinem impetus fiat, ut ab inunctionibus largiariis & frequentioribus, sed tardus ac segnis, quem proinde, si res forsân male cederet, reprimere vel coercere facile futurum sit.

Quar.

Nonnulli
sunt mor-
borum
casus qui
præpara-
tionis
moras
non pa-
tiantur.

Quarto. Contra vero sunt aliæ morbi venerei facies, quæ nedum longiorem præparationem exposcant, sed ne vulgaris quidem præparationis moras permittant, si nempe os in artuum quodam laenter cariosum levifilum vel istu derepente diffractum sit, unde virulenta tabes circum diffuat; si caries in osse quodam altior ad medullam propius accedat; si exostosis calens, dolens, lacinians in apostema videatur proxime degeneratura. Tunc sane, cum periculum sit in mora summum, omiffa penitus præparatione, vel ad summum præmissa venæ sectione & purgatione ad hydrargyrosim ocyus properandum est, quæ majoribus fiet inunctionibus semel atque iterum, si ad retundendam symptomatis urgentis vehementiam uberiore Mercurii dosi opus esse videatur: At vero mitigato semel morbi impetu, tardiore gradu deinceps procedendum erit, tum ut Mercurius in sanguine diutius restitans vim majorem exerat, tum ne præcipitancia infortunium quoddam imprudenter advocetur.

Sed, si casus illos numero paucos excipias, auctore esse nolumus ut diligens ægrotantium præparatio ante hydrargyrosim unquam omittatur, quam non modo utilem, sed etiam necessariam esse puto, tum ut vitia, a lue venerea aliena, si qua in sanguine vel in primis viis lateant, emendentur, tum ut admittendus Mercurius effectos suos feliciter tutiusque præstare valeat. Itaque Sydenhamium, virum cæteroqui magni nominis, hac in re minime audiendum esse cenfeo, dum in *Epistola responsoria* 2. *De Morbis Venereis* contendit præludia istiusmodi tanquam damosa semper omittenda esse, ac præstare nihil agere, quam venæ sectione & tenuiore diæta vires frangere, & importune satagendo nocere. Quasi vero periculum esset ne vires ægrotantium missione sanguinis & purgatione una aut altera intra dies quindecim ita exhaurirentur, ut Mercurio ferendo impares fierent: Cum e contrario manifestum sit cauta illa præparatione 1. Eliminata primarum viarum cacochylia, 2. Imminuta vasorum plethora, 3. Relaxato solidarum partium erethismo, Mercurii in sanguinem efficaciz, sanguinis cæterorumque humorum attritioni, demum vitiosorum humorum excretioni per oris, intestinorum, cutis, renumve cola viam faciliorem parari.

§. IV. QUÆ SIT COMPOSITIO UNGUENTI MERCURIALIS SIVE NEAPOLITANI.

IV. Ut
unguen-
tum mer-
curiale
vivas
ponatur.

Una est admodum simplex ratio unguenti mercurialis seu Neapolitani componendi, quæ nunc usu recepta sit.
I. Eligendus est Mercurius minime adulteratus, ex cinnabari redi-vivus, aut saltem per corium sæpius trajectus, atque adeo a plumbagine quam maxime purgatus.

II. In

II. In mortario conterendus est addita paucissima quidem, sed tamen sufficiente terebinthinæ quantitate, donec in fuscum nigrumve pulverem extingatur.

III. Cum illo pulvere miscenda est pars æqua axungię suillę non salitę, non rancidę, non liquefactę, sed a suis membranıs purgatę, & una tandiu subigenda pistillo, dum pulvis mercurialis in tenuissimas atomos distributus sit, quę oculi etiam armati aciem effugiant, & per totam unguenti massam ex æquo disperantur.

IV. Potest etiam, si ita videatur, non æqua sed dupla axungię pars cum pulvere Mercuriali misceri, unde tertia parte debilior futura est unguenti facultas; sed hæc medentium judicio permittenda sunt quorum officium est ex nota ægroti temperie, morbiq; curandi inveteratione unguenti, quo uti placuerit, virtutem metiri ac moderari.

V. Usum illorum minime laudo, qui exungię loco unguentum mercuriale cum butyro conficiunt; nam eo pacto unguentum colliquescit facilius nec inunçtę parti satis adhæret. Adde mercuriales atomos minus distrahctas & interjecto liquidiorẽ butyro laxius coercitas in majores guttas facilius coire, quę in cutis poros tanto difficilius penetraturę sunt.

VI. Censeo tamen gravius peccari, si ex antiquorum Medicorum præjudicio, quibus persualum erat Mercurium frigidę naturę esse, unguento mercuriali calidiora remedia adjiciantur ad imaginariam illam noxam emendandam, ut oleum laurinum, chamæmelinum, irinum, rutaceum, sesaminum, anethinum; unguentum martiatum, aregon, enulatum; thus, styrax, iris florentina pulverata, cinis sarmentorum, & alia ejusdem generis sexcenta. Etenim ea medicamina nullius utilitatis sunt, cum Mercurius frigiditate non peccet, & plerumque idẽo nociva, quod cruori una cum Mercurio instillata febrem aliquando cieant; quod saltem cuti illita, quam acredine irritant & inflammant, exanthemata, phlyctenas, & erysipelata producant, quibus æger, si in periculum non deducitur, at certe mirum in modum molestatur.

C A P U T VII.

De Administratione unguenti seu potius linimenti Mercurialis, sive de hydrargyrosi.

Geminam esse hydrargyrosim non semel diximus; alteram in qua continuis vel saltem frequentibus & magnis inunctionibus salivatio cieatur uberior; alteram in qua rarioribus & minoribus frictionibus lues venerea extirpatur parciori salivatione. Utraque suas habet utilitates pro ægrotantium ætate, temperie, statu, aut morbi gradu & invetera-

Gemina est hydrargyrosicos methodus.

C c

tio-

tione ; ideoque nostri muneris esse reputamus utramque ordine proponere & explicare.

§. I. DE HYDRARGYROSI PLENIORE.

I, Plenior, cuius tria sunt stadia. In hac methodo tria distinguuntur stadia : Unum in quo administratis frictionibus pyralismus proritur : alterum , in quo motus semel pyralismus caute regitur ; tertium , in quo perfecta morbi curatione superstiti pyralismo & pyralismi reliquiis medicina adhibetur.

Primum, in quo adhibitis legit mis frictionibus pyralismus movetur. 1. In primo stadio, 1. Tribus primis diebus, atque adeo singulo quoque die; vel quod tutius prudentiusque videtur, intra primos quinque dies atque adeo diebus tantum alternis frictiones tres adhiberi plerumque solent. Dosis unguenti ad frictionem quamlibet, ut raro infra drachmas duas, sic etiam raro supra unciam semissem esse debet. Prima quidem frictio a pedibus ad tibiarum suras, altera vero a suris ad crura media, tertia demum a crurum medio ultra nates ut plurimum extenditur. Frictionibus perinde opportuna sunt tum serotinae, tum matutinae diei horae, modo mane ante cibum, vespere perfecta concoctione adhibeantur.

2. Frictionis administrandae methodus semper eadem est, nempe agro ad ignem flammantem sedente vel stante, pars ea corporis, quae unguento inungi debet, manu sicca ab latrialepta prius confricatur ad ruborem usque, ut calore affrictus porri laxius patefiant. Tunc destinata unguenti dosis inter latus utrumque aequaliter distribuitur, & nudis manibus ad ignem tandiu illinitur, donec intra cutim sensum imbibita exaruerit. Postea inunctus locus tibialibus linteis in tibiis, femoralibus in femoralibus; vel indusio in reliquo corpore obtegatur, quae indumenta tandiu gestari necessum est, quamquam sordida sint, quandiu re esse videbitur, ut inceptus pyralismus sustentetur & prolatetur; cum enim unguento a cute abrafo semel infecta sunt, emplastri mercurialis vices gerunt, quo Mercurii in sanguinem admisti energia continenter promovetur. Denique inunctus aeger calefactum lectum confestim repetit, ubi per unam aut alteram horam sese continet, donec illitum unguentum altius penetraverit.

Et tuto quidem promovetur, modo caute procedatur.

3. De uno post frictionem tertiam in oris interiora attente introspectendum est, an forte adsint ulla signa futuri pyralismi, qui per id tempus ut plurimum ingruit. Imo vero quantumvis duce experientia compertum sit salivationem raro moveri ante frictionem tertiam, potissimum parvioribus unguenti dosibus, quales aetate nostra illinuntur, nihilominus tamen sapientis est ad secundam, multoque magis ad tertiam frictionem non prius procedere, quam ore inspecto de Mercurii vi certum augurium ductum sit. Multa sunt autem, quae imminentem pyralismum praesagiant, remote quidem virium languor, cardialgia, capitis gravitas, pulsus frequentia &c.

Pro-

Proxime vero parotidum & glandularum maxillarium tumor & dolor, dentium stupor, rubor & inflammatio extremorum ductuum salivarium tum superiorum tum inferiorum, linguæ & gingivarum rubor & inflammatio, oris calor & fœtor, aucta salivæ secretio, frequentior sputatio &c.

4. Quod si die septimo nihil in ore novum, nihil mutatum appareat, tunc abjecta cunctatione ad quartam frictionem non modo properandum, quæ lumbis & dorso a natibus ad collum usque illinenda est, sed etiam paulo majore unguenti dosi utendum est. Imo si post quartam illam frictionem res in eodem statu perstiterit, die nono quinta frictio adhibenda pari similique dosi unguenti, super utraque brachia a summis scapulis ad pugnones usque.

5. Contra vero, si die illo septimo præsens gingivarum, linguæ & buccarum status imminens ptyalismum prænuntiet, ne quid temeritati datum videatur, subsistendum est, donec aperte liqueat quo res abitura sit. Si in plenum & legitimum ptyalismum erumpat, bene est, & ab ulteriore frictione penitus cessandum, motaque salivatio ex artis legibus infra proponendis regenda est. Sin vero apparentia signa brevi evanida spem cludent, post dies aliquot quarta frictio celebranda, imo & quinta sub cautione eadem, donec tandem optatus appareat ptyalismus.

6. A prima frictione æger in cubiculo temperate calido continendus; vino & solidioribus cibis interdicens, si gravem diarrhœam, imo dysenteriam declinare cupiat, jusculisque nutriendus, vel ad summum levioribus offis. Pro potu exhibenda prisana tepens ex decocto hordeo vel gramine cum liquiritia, quæ assatim potanda est tum ut præcaveatur febris incandescencia, tum ut sufficiens materia salivationi subministraretur.

II. Moto semel ptyalismo, qui plenus & legitimus sit, stadium adest curationis alterum, de quo nunc paucis.

1. Plenum & legitimum ptyalismum illum dicimus, in quo saliva lenta, tenax, viscosa & pituitosa fluxu jugi, vel parum interrupto ab ore manat ad quatuor, quinque vel sex libras intra nycthemeri spatium, quod tamen neque de incipiente, neque de desinente ptyalismo intelligi, velim, ubi salivatio necdum ita uber, vel jam parcius est, sed de ptyalismo ad statum deducto, dum maxime viger, cujusque legitimos limites a tribus ad sex libras esse puto, quas ultra citraque nequeat rectum consistere. Si enim fluxus infra libras tres subsistat, æquo minor futurus est, & qui debellando morbo ægre par sit, nisi per plures dies prorogetur. Sin vero ultra sex invalecat, fortior, nec quem æger facile tolerare possit per sufficiens dierum spatium, ut morbus extirpetur. Potest autem salivationis gradus non modo præsens ex effluentis salivæ copia æstimari, sed etiam futurus ex ulcerum, quæ in ore pullulant situ, numero, gradu satis tuto prænosci, ut explicabitur infra.

2. Si ptyalismus modum debitum teneat, nec excitandus, nec coer-

Et ægri dicto audientes sint.

Alterum, in quo 1. Motus semel ptyalismus ex artis legibus regitur.

cendus, sed uno & eodem tenore fovendus est per dies 15. 18. 20. 25. prout uberior vel parcius fuerit.

Si vero pyralismus excessu peccet & nimius esse videatur, compescendus est & ad debitum modum revocandus, 1. Detractis tibialibus, femoralibus, indusio, lectique linteis, quæ ab illito Mercurio sordent. 2. Deterfis oris ulculculis & attractu collyrii Lanfranci coercitis. 3. Adhibitis etiam, si opus fuerit, catharticis, quæ partem limphæ & Mercurii ad os impetuosius tendentium versus inferiora divertant.

E contra si pyralismus defectu peccaverit & æquo parcius sit, calcar torpenti Mercurio adhibendum est novis iteratisque frictionibus, nempe sexta, septima, octava &c. sed ea tamen cautione non ante administrandis, quam ex observato oris statu constiterit largiorem salivationem non expectandam esse, nisi nova Mercurii additione concitetur.

3. Sic ergo ex pyralismi modo ac præsentis oris statu salivatoris therapie canon & ordo perpetuo dirigendus est, uti solet ex inspecta pyxide nautica cursus navigii. Hinc unice liquere potest standumne in administranda hydrargyrosi, an procedendum vel retrocedendum sit; atque adeo ea est indubia curationis norma, a qua si nec temeritate nec inconsiderantia quicumque commisit ægrotantium saluti provide consulit, aberraverit unquam, non esse cur timeat ulla in curationis stadio infortunata, vel saltem cur gravia timeat & quæ possint ægros in discrimen conjicere.

1. Ulcerum situs, quæ in ore fiunt, diligenter observetur.

4. Ulcerum, quæ in ore Mercurii efficacia fiunt, & quibus pyralismus promovetur, diversa ratio habenda est pro diverso situ quem in ore tenent. Alia enim inutilia sunt, imo periculosa; utilia alia & a periculo omni vacua. Illa quidem omni ope atque opera quam celerrime cohibenda sunt, & ad cicatricem ducenda, ut quæ nocere possint. E contra vero hæc tota curationis periodo blande fovenda, ut a quibus salivationis tenor dependeat.

5. Ad priorem speciem referenda sunt, 1. Quæcumque sine utilitate molesta sunt, ulcuscula, quæ labia superiora vel inferiora; palatum; apicem, dorsum vel inferiorem faciem linguæ &c. occupant, unde docuit experientia ægros inani dolore angere & excruciarier, sine promotæ salivationis emolumento. 2. Quæcumque incommoda sunt cum periculo, ut ulcuscula quæ gingivas depascuntur, unde dentium vacillatio & spontaneus casus; quæ columellæ & tonsillis sive paristhmiis, insident, unde difficultas deglutendi; quæ in radice linguæ adsunt, unde inflammatorius linguæ tumor, qui vocis usum intercipit; quæ ipsis maxillarum commissuris interne adnascuntur juxta tendines musculorum manforiorum, nempe crotaphytis, masseteris, pterygoidis interni, unde erosio convulsivæ illis tendinibus inducitur oris strictura, vulgo *bridure*.

6. Ad posteriorem classem pertinent 1. Quæcumque in genarum medio ad ostia ductuum salivalium superiorum sive Stenonianorum prope ad-

adstant; 2. Quæcumque fræno linguæ hinc & inde assident, extremis ostiis ductum salivarium inferiorum sive Vvarthonianorum confinia; 3. Demum quæcumque mediæ linguæ margines dentibus molaribus hinc & inde contiguos occupant, utpote quibus omnibus experientia compertum sit, irritando, pungendo, lancinando pyralismum ex sympathiarum legibus alibi explicatis efficacissime & uberrime prolici.

7. Debent ulculcula prioris generis; ubi primum pyralismus apparuerit, ocysissime cohiberi, ne mora nimium excrescant. In hunc finem cum penicillo linteo imbuto collyrio Lanfranci, quod in officinis prostat, bis in die detergenda sunt, donec derafo albicante muco rubra fiant & ad cicatricem ducendam comparentur. Quod si collyrium viribus impar esse videatur, admisceri possunt guttæ aliquot spiritus vitrioli vel spiritus salis; imo in usum vocari spiritus iidem melle addito mitigati, vel etiam sinceri. Qualibet vice post admotum penicillum collyrio vel spiritu acido intestum dolor aliquandiu sustinendus est, ut liquor ulceris crustam penetret; at intra momentum prisana tepida os poterit ablui; a deglutitione cavendo.

8. Cætera ulculcula alterius speciei, quorum certa est utilitas, blande fovenda sunt ac sibi permittenda tota salivationis periodo. In summa si atrocius doleant leniri possunt decocto tepido radicis althææ vel passularum & ficuum pinguium; infuso seminum lini & psylli; aqua spermatis ranarum; vel quod cæteris præstat lacte vaccino vel caprillo tepificato, solo vel cum croco infuso &c. quibus os identidem coluendum est. At vero numquam temere cohibenda, nisi ex immoderata humoris affluentis acrimonia contigerit ut eadem altius excaventur vel latius serpent, plerumque non sine notabili vasorum confinium erosionem, atque adeo cum summo hæmorrhagiæ periculo, in quo casu utile futurum est ulcera nimium luxuriantia tactu remedium, quæ proposuimus, ita reprimi ut debitos limites minus excedant.

9. Interea, si exostosis, dolor, tumor, gummatum, nodus, morbusve ullus localis peculiarem corporis locum infectum habeat, pars illa singula quaque die si pyralismus moderatus; alterna aut tertia tantum die, si nimius sit, ex artis legibus inungenda est una aut altera pro vice qualibet unguenti mercurialis drachma, ut ea ratione, dum Mercurius in sanguinem majoribus inunctionibus transfusus potissimas in curando morbo partes implet, superaddita Mercurii dosi, quasi nova mantissa, in symbolum veniat, morbumque in parte quadam peculiari radicum specialius impetat & extirpet. Verumtamen cauto opus est ne levioribus illis frictionibus pyralismus jam motus nimium intendatur.

10. Toto illo altero curationis stadio æger solis jussulis nutriendus est; & si esuriat, ova sorbilia ad summum concedenda sunt, modo febris ablit.

3. Quæ molesta & inutilia deteguntur, ut ad cicatricem veniant.

3. Foveatur reliqua, quæ ad fluxus ubertatem faciunt, sine molestia.

4. Diligens diaeta ægro

præscri-
bitur.

Largissimus pitisanæ tepentis potus ingerendus est, ut minimum ad libras iv. vel vj. quovis nycthemero. Debet autem os pitisana caute prius collui, quotiescumque iuscula vel pitisana exhaurienda sunt, ne pituita acrior viscidiorque, quæ in ore hæret, abrepta in ventriculum molesta tormina inferat.

11. Licet ægro, si vires valeant, e lecto identidem surgere, & ad ignem sedere intra cubiculum tepidum; si vero lectum teneat, debet in illo plerumque assidere erecto corporis trunco & capite antrorsum pendulo, ut saliva spissior ab ore facilius effluat. Demum quoties præ virium imbecillitate exporrectus cogetur decumbere, jaceat in os pronus, neque in alio corporis situ ad somnum se unquam componat, nempe ut saliva perpetim in os affluens sola viæ declivitate sponte foras manare possit & a ventriculo averti. Porro ne nimio humorum decubitu alterutra pars oris, linguæ, genarumve immoderatus tumeat, curæ sit ut æger, si fieri possit, in utrumque latus alternatim jaceat. Tandem si alvus pigrior sit, altero vel tertio quoque die enemate subducatur.

Tertium
in quo
ptyalif-
mus ex-
hauritur.

III. Ea methodo ptyalismus regendus est tota stadii secundi periodo, hoc est per dies xv. xx. xxv. si perfecta quærat morbi curatio. Hinc vero salivatione sponte fatisciente incipit stadium tertium, in quo ptyalismi reliquias exhaurire, oris noxas reparare, & exhaustas ægrotantis vires instaurare necesse est.

Itaque 1. Lintea omnia, quæ a Mercurio sordida sunt, ut tibialia, femoralia, indusium, detrahenda sunt, & mutanda lecti, in quo æger jacet, lintea, ut omnia munda sint. Summa cutis, quæcumque Mercurii illitu spurca est, oleo amygdalarum dulcium primum, inde aqua vitæ detergenda, ne qua Mercurii portio in cute reliqua salivationem æquo diutius protrahat. Tunc quoque alvus, quæ plerumque ptyalismi temporis priga, imo adstricta solet esse ob humoris confluxum versus os, primum enemate eccoprotico, mox purgante laxanda est ex decocto foliorum verbasci & seminis lini, addito butyro recente aut oleo amygdalarum dulcium, vel cassia recenter extracta ad ʒjss. aut catholico ad ʒj.

2. Die sequente exhibenda purgatio ex senna, rhubarbaro, sale vegetali, manna, cassia, aliisque hujus generis blandioribus catharticis, quæ si ptyalismus uberior sit, alternis diebus iterum atque iterum repetenda est, donec ptyalismus pedetentim exhauriatur.

Oris ul-
cera cu-
rantur.

3. Oris ulcera, quibus buseusque parcere visum fuit, detergenda arte eadem, quam ad molesta vel periculosa adhibendam esse modo dicebamus, nempe bis in die intingenda ope penicilli liniei collyrio Lanfranci, vel solo, vel quod additis spiritus sive vitrioli sive salis guttis aliquot acuat; imo, si collyrium Lanfranci inefficax esse videatur, spiritu ipso vitrioli vel salis melle temperato. Inde sæpius eluenda aquis thermalibus tepentibus, v. g. aquis balerucanis, vel decocto tepido radices althææ, vel hordei integri cum melle rosaceo, cui post dies aliquot vinum rubrum guttatim

ratim debet infundi, ut ulcera ad optatam cicatricem felicius citiusque deducantur. Tandem vinum rubrum purumque adhibendum est, quo nihil præstantius ad curationem.

4. Paulo solidior cibis paulatim exhibendus est post purgationem, ^{Solidior} ut offæ, cremores oryæ, panatellæ ex crusta panis, aut ex carne ^{cibus per-} gallinæ contrita, ova sorbilia &c. imo pullorum vel gallinarum caro ^{mittitur.} assata aut elixa, modo ulcerosus oris status solidiorum ciborum masticationem & deglutitionem pati possit. Cæterum cum ægotantes, qui ab hydrargyrosi convalescunt, fame seu potius efurie tentari soleant, cavendum ne immodica ciborum ingurgitatione morborum novum sibi accersant.

5. Dum ulcera coeunt, curandum ne linguæ latera marginesve cum internis gingivis, aut cum externis interior genarum facies conglutinentur, ideoque ægotanti curæ sit, ut intruso in os digito linguæ margines, genasque internas, a gingivis hinc & inde identidem disjungat. Oportet etiam os sæpius deduci & maxillarum commissuras distrahi quam maxime, ne ulcera locis illis inusta in sese contrahantur & compliceantur, & arctiore cicatrice coeant, quæ naturalibus maxillæ & buccarum motibus officiat.

6. Ulcera semel repressa neque amplius gliscentia naturæ viribus & temporis efficaciz permittenda sunt, donec paulatim gradaria cicatrice obducantur. Periculum enim est ne in duriores & callosas cicatrices abeant, si festinatione nimia, quæ moræ impatiens sit, collyrio Lanfranci vel spiritu salis frequentius imbuantur.

7. Dum omnia in melius sensum abeunt, tunc primum aer paulo liberius ^{Vires de-} in cubiculum admittendus est reclusa porta vel fenestra, vel quod præstat ^{mum in-} ab illo cubiculo demigrandum; imo vero ægotantibus magnopere condu- ^{stantur.} cit rus se conferre, ut cælo puriore uti & auram liberiores captare possint, quæ ad perfectam celeremque virium instaurationem non parum faciunt.

8. Demum si ita e re esse videatur ex nota siccior, acrior, fervidior ægri temperie, usus lactis asinini, caprilli, vel vaccini per mensem præscribendus est, semel aut bis in die, scilicet mane & sero, quo pleurumque nihil efficacius est ad prægressæ salivationis reliquias exhauriendas, ulcera quæ in ore supersunt sananda, viresque remedio & inedia debilitatas reparandas.

§. II. DE PARCIORE HYDRARGYROSI.

Hæc altera methodus priore facilior, expeditior, commodior est; utinam æque certa & efficax: Cum præcedente convenit præparationis modo, unguenti adhibendi qualitate, similique cautionum natura, quæ potissima sunt curationis capita: Ab eadem vero in eo tantum differt, quod minoribus unguenti dosibus & longioribus inunctionum intervallis administretur.

II. Hydrargyrosi par-cior.

In qua
minori-
bus un-
guenti
dosibus.

1. Dosis unguenti mercurialis ad unctionem unamquamque potest esse a drachma una ad drachmas duas, quæ methodo eadem, similique opera partibus successively ad ignem illinenda; hoc tantum discrimine quod pro unguenti paucitate pars quoque corpori, superficie minus extensa inungenda sit, v.g. pedes tantum prima, tibiæ ad suras ulque secunda, genua tertia, crura ulque ad nates quarta, nates & interfemineum quinta, lumbi sexta, dorsum & interscapulium septima, octava demum & nona, si locum habeant, utrumque brachium ad pugnosc ulque.

2. Sunt qui reliquias unguenti, quæ cuti illitæ superiunt, toleant dedita opera abstergere post finitam frictionem, ne linimenti superstitis odor remedium prodar: Quod quidem facile condonandum esse jam supra monuimus, *Liv. II. Cap. 9.* quoties necesse est ægrum se præsentem sistere quotidie coram amicis, parentibus, conjuge, plurimique refert genus remedii celari, quod clam adhibetur. Verum enim vero, ut ibidem quoque monuimus, simul operæ pretium est, si faustus remedii successus curæ fuerit, quidquid inde deirahitur de efficacia unguenti adhibiti deterfione præfessina, abunde compensari. 1. Diuturniore frictione, qua unguenti particula & copiosius & alius penetrent; 2. Paulo majore unguenti dosi ad frictionem quamlibet, unde mercuriales atoni in sanguinem transfundantur largiore proveniunt.

Et inun-
ctionibus
rarioribus.

3. Inter frictiones singulas necesse est ut intercedant tres, quatuor quinque dies, imo etiam sex septemve, si æger valetudine vel natura infirmior sit. Ac ne soli quidem dierum intervallo, quantumvis longo, ullomodo fidendum est, sed ad ulteriorem inunctionem numquam procedendum, nisi prius ex inspectis buccis, lingua, gingivis &c. aperte liqueat rem in præcipitem pyralissimum proxime emerfuram non esse.

Atque
adeo sa-
livatione
parcior
inorbus
extirpa-
tur.

4. Itaque lente festinandum tota curationis periodo levioribus & rarioribus inunctionibus, nempe diligenter cavendo ne quid infortunii accidat ex moto largiore vel nimium præcipite pyralismo; sed festinandum tamen, & si necesse sit, aucta unguenti dosi vel contracto inunctionum intervallo opus paulatim ita urgendum est, ut post quartam quintamve frictionem salivatio cieatur non quidem præceps; tumuluosa; subitum oris, colli, capitis tumorem inferens; inflammatoria, phlogodes, alte lateque ulcerosa; fræni impatiens, immoderata; in qua emissæ saliva ascendat die qualibet ad libras viii. ix. x.; qualem a pleniore hydrargyrosi induci frequenter dolemus; qua ægros non paucos suffocari, qua plerisque in manifestum discrimen venire notum est: Sed e contrario lenta lenis, facilis regi; nullo capitis tumore stipata; leviter aphthodes, vel ad summum superficiei phlyctænodes; moderata; quæ libram unam aut alteram salivæ tantum suggerat quovis nycthemero; sine qua vix quidem licet unquam sperare morbum venereum extirpari posse, maxime si inverte-

ratus fuerit, ut infra probabitur *sequente Capite*; qua vero constanti experientia compertum est ægrotantium salutem numquam periclitari.

5. Quandiu salivatio ea ratione mota modum tenet, qualem describimus, tandiu caute fovenda est ex artis legibus, ab ulteriori inunctione abstinendo. Quod si exhalante sensim Mercurio remissior fiat & paulatim ita concedat fatiscatque, ut cessaturæ proxima videatur, tunc renovatis eadem cautione frictionibus toties intendenda vel inflauranda est, quoties morbus gradu, malignitate, inveteratione, ita exigere videbitur ad plenam perfectamque mali curationem, ut eo pacto tota therapieæ periodo idem salivationis tenor arte sustentetur.

Sed cavendum, ut salivatio foveatur, si moderata.

6. Contra si pyralismus derepente erumpat, quod sane, rarum non est post inunctiones ter, quater, quinque adhibitas, præsertim si dosi nimia aut breviori intervallo administratæ fuerint, tunc frictionibus superfedendum est diebus aliquot, alvus enematis solvenda, largus ptisanæ potus exhibendus, neque prius inunctio denuo repetenda, quam temporis mora, diaphoresi, diuresi, vel alvi resolutione impetus materiæ nimium pyralismum molementis retalus sit, & salivationi immoderatiore fovendæ jam plane impar.

Coni-neatur, si nimia.

7. At vero si pyralismus ea methodo sibi aliquandiu permixtus sponte non remittatur, sed contra sensum gliscens in inflammatoriam aut ulcerosam salivationem proxime abiturus videatur tunc iteratis purgationibus ex senna, sale vegetali, manna, cassia, &c. alvus blande subducenda semel atque iterum, ut turgens materia; quæ in os vim, tumultuose factura foret, ad inferiora divertatur.

Reprimatur, si immoderata.

8. Quod si forte contigerit ut pyralismi impetu iteratis purgationibus nimium coercito vel represso salivæ fluxus inde penitus cesset, vel fiat æquior tardior, lentiorque post inducias dierum aliquot ad frictionum usum redeundum erit, sed ea cautione, ut cum experientia jam liqueat in ægrotante sanguinem energiz Mercurii iusto facilius obsequi, unguentum ideo minore jam dosi & intervallis longioribus administretur, ne sit error novissimus pejor priore.

Demum renovetur, si superpressa sit.

9. Difficile est a priori definire quantam unguenti copiam inungi necesse sit tota periodo ad perfectam morbi curationem; in hoc siquidem multipliciter variari solet pro ægrotantium ætate, sexu, temperamento; morbi malignitate, gradu inveteratione; partium affectarum numero, nobilitate, usu &c. Proinde certum iudicium hac de re a posteriori faciendum est ex accepto levamine & cessatione symptomatum, ut probabimus *Capite sequente*. Frequenti tamen observatione compertum habemus totam illi unguenti copiam nec infra uncias duas subsistere, nec supra tres quatuorve ascendere ut plurimum debere.

Unguenti quantitas, quæ in hac periodo inungi debet.

10. Similibus consiliis tota curationis periodus regi debet, salivatione permessa quidem, sed lenta, gradaria, leni, parum ulcerosa, ut modo di-

Sicut etiam curationis

diuturnitas ex
accepto
levamine
definien-
da sunt.

dicebamus. Cæterum in hac methodo tanto diutius curationi immorandum est, quanto minoribus dosibus & longioribus intervallis Mercurius adhibetur: Inde enim tardius, lentius, inefficacius agat necesse est. Quamobrem diuturniore mora opus est, quam in præcedente methodo, ut quodcumque de remedii vi detractum est, tempore compensetur. Itaque a carceribus remedii ad metam dies 30. 40. 50. imo etiam plures computandi sunt pro diverso tum morbi gradu, tum inunctionum adhibitarum numero, hoc est a prima inunctione ægro tandiu in linteis unguento delibutis fordescendum est, nisi malit spontaneæ recidivæ aleam experiri.

11. Ubi semel visum fuerit lintea sordida posse ægro detrahi, cætera omnia, ut in priorè methodo, simili eademque ratione geri debent. Itaque purgatione una aut altera alvus moveatur; diæta largior sensim concedatur; permittatur aer purior, liberior; præcribatur matutinus lactis usus, ac demum æger suis muniis restituatur.

Quid agendum sit si res in manifestum ptyalismum erumpat?

12. Verum si accidat unquam, ut Mercurii efficacia casu, errore, imprudentia, eo usque processerit, unde gradum revocare nullo modo liceat; motaque adeo salivatio; eluso catharticoorum usu, fræni omnis impatiens esse videatur, nequaquam contra enitendum diutius frustraneo conatu, sed prudenter obtemperando res eo deducenda potius quo natura vergit. Apertus itaque ptyalismus permittendus, regendusque ex legibus in priorè methodo propositis, fovendus scilicet, si moderatus; contra compescendus si nimius fuerit, donec post dies 18. 20. 24. præmissa, ut moris est, purgatione, oris ulcera detergere, ciborum usum concedere, & ægrum vitæ prioris reddere liceat.

Quznam diæta conducatur in hac methodo?

13. In ista methodo, modo carniū & vini usus ex toto circumcidatur, diæta paulo largior esse potest, adeoque leves offæ, cremores oryzae, panatellæ &c. permitti possunt, imo etiam usus lactis vaccini semel in die, horis nempe matutinis, si ita e re esse videatur ex nota sanguinis diathesi, quandiu nec ulla salivatio, nec ulla aderunt instantis salivationis indicia; sin aliter enim æger ut in priorè methodo dictum fuit, solis iusculis nutrirī deberet. Cæterum largius ptisanæ tepentis potus imperandus est, ut venerea sanguinis colluvies eluta per diuresim vel diaphoresim elabatur; & alvus si contracta sit, emollientibus enematis ad egestionem sæcum identidem sollicitanda.

14. Aëris licitum est e lecto singulis, solidisque diebus surgere; modo tamen intra conclave temperate calens sese contineant ab externis aeris injuriis tutos: Neque enim illorum usum probandum censeo, qui in ipsa therapeia ægrotis tota urbe vagandi copiam faciunt. Certe si nimia illa indulgentia semel forsan atque iterum non male cesserit, propter tardiozem in ægris quibusdam Mercurii efficaciam, at contra experientia compertum est ægros inde in extremum capitis periculum pluries adductos fuisse; nec proinde auctor esse velim, ut ullus viam tam lubricam & periculofam unquam insinuat.

Patet hinc ad summam in hydrargyrosi quacumque ad quatuor potissimum attendendum esse.

1. Numerum, dosim, frequentiam inunctionum mercurialium nulla certa lege definiri posse, quæ æquum sit ægrotantes omnes indiscriminatim adstringi, sed in variis pro temperamento, ætate, viribus, morbi gradu & inveteratione, varie variare: Rem totam proinde medentium prudentiæ permittendam esse, quam pro re nata diversimode restituri sint: Monendos esse tantum, ut cauti sint, diem unum atque alterum inter frictiones plerumque interponant, ad ulteriorem inunctionem nunquam procedant, nisi prius inspectus oris status aperte permiserit, uno verbo lente festinent ac curent diligentissime *Ne quid nimis*: Mercurium in sanguinem iteratis inunctionibus introducere facillimum quidem, si forsân desit; semel vero introductum educere, si copia peccaverit, perquam difficile esse: Quocirca in adhibendo remedio istiusmodi satius tutiusque semper fore, si calcare, quam si fræno utendum sit.

2. Cauto opus esse potissimum, si dum æger inungitur, cælum flante austro æstuosus fiat, siquidem compertum est ob acceleratum cruentis motum & laxatum partium tonum Mercuriales atomos, quæ in sanguine confusæ latent, ferri majore impetu ac pyralissimum nimis præcipitem plerumque movere, ut jam supra *Capite 6.* dictum est de æstiva tempestate. Contra vero minus esse periculi a Mercurii energia, si tempore inunctionum spirante aquilone frigus invalescat, cum enim contrariorum contraria sint consequentia, tunc ob retardatum cruoris motum & astrictum viscerum tonum futurum est, ut ab atomis mercurialibus minores tardioresque turbæ cieantur.

3. Pro piaculo vulgo etiamnum haberi, si venter, thorax, caput mercuriali unguento inungantur: Videri horrorem illum ex antiquo Medicodum præjudicio olim natum, Mercurium nempe venenatæ qualitatis esse, neque adeo posse ad vitales nobilioresque partes propius illini sine periculo: Experientia quidem jam dudum compertum fuisse Mercurium ex se plane esse innoxium; necdum tamen intermissum esse morem illum parcendi ventri, thoraci, capiti inter inungendum, quin imo, cum Mercurius perinde aget cuicumque corporis parti illinatur, nec temere intermittendum videri, ne forsân qui secus fecerit; male audiat apud imperitos, si quid infortunii ex alia qualicumque causa evenierit: At vero si nodus, ganglion, æxostosis, tumor, ulcus, uno verbo morbus quivis localis ventrem thoracem, aut calvariam occupet, tunc inani præjudicio nequaquam obsequendum esse; sed localibus inunctionibus partem affectam illinendam esse ex arte, quod non modo sine ulla noxa, sed etiam cum emolumento maximo fieri posse experientia non semel ipse didici.

4. Narcoticorum usum, præsertim opiaticorum, quæ impermixta & fortio-

tiora sunt, ægrotis nunquam concedendum esse salivationis tempore; quantumvis doloris ulcerosi quo torquentur, & agrypnia contumax quam patiuntur, contra suadere videantur. Timendum enim si salivæ fluxus narcoticorum energia derепente supprimatur vel nimium retardetur, ne locus detur tumefactioni glandularum salivalium, tum superiorum, tum inferiorum, unde sanguis a regreſſu cohibitus & in cerebro reſtitans veternum inexpugnabile producturus ſit. Itaque poteſt ad ſummum modo febris aſſit, permitti modica theriacæ doſis ad ʒß. quæ præſertim conducit, remedium tædio & labore æger confectus tum viribus tum animo deficiat.

CAPUT VIII.

De Infortuniis, quæ in hydrargyroſi pleniore quandoque eveniunt & de eorundem remediis.

Expedi
in adhi-
benda hy-
dargyroſi
methodos
ſingulas
callere,
quibus
infortu-
niis me-
deri li-
ceat, ſi
qua eve-
niant.

Infortu-
nia quæ
plenio-
rem hy-
dargyro-
ſim ſe-
quuntur,
in tres
claſſes di-
ſtingui
ſolent
pro tri-
plici
therape-
uticæ ſtadio.

Quemadmodum peregrinantibus prodeſt noſſe non modo ſtratam viam regionis, qua iter eſt, ſed etiam calles ſemitalque, quibus, ſi forſan aberratum ſit, liceat viæ compendio regredi; ratione eadem in mercuriali therapeja medentibus utile eſt præter methodum, quam in præcedente Capite deſcripſimus, & quæ communiffima eſt, cæteras quoque methodos jam deſcribendas perſpectas habere, licet uſu rariores ſint. Si certa eſt & explorata illius utilitas, quoties pryalismus ex voto ſuccedit, ſic hæc locum habent peruritæ & ſalutarem, quoties infortunium qualecunque in hydrargyroſi advenit. Quocirca ne qua nova morbi facies, inopinave ſurgat, omnes methodos illas ante percepiffe expedit, cum omnes perinde pertineant ad artis Medicæ complementum ut quæ non minus obliqui quod male, quam recti quod bene cedit, conſultrix eſſe debeat.

Infortunia, quæ in hydrargyroſi evenire ſolent, numero multa & natura diſſimilia ſunt, quorum nonnulla utrique hydrargyroſeos methodo, pleniori & pariori, communia; pleraque alterutri tantum propria ſunt. Ut ergo ſingula ordine proponantur, viſum eſt univerſa in duas claſſes diſtribuere, & ea quæ plenioræ in hoc, cætera quæ parciorem hydrargyroſim ſequi ſolent, in ſequente Capite ſigillatim tractare.

Solemne eſt in pleniore hydrargyroſi tria ſtadia diſtingui, ut ſupra dictum eſt, quorum unumquodque ſua habeat infortunia.

§. I. INFORTUNIA PRIMI STADII.

In primo, dum Mercurius ſanguini latenter inſtillatus tumultuatur exitum ſibi moliturus qua data porta.

I. Subita
capitis

L. accidit aliquando poſt tertiam quartamve inunctionem, ut ſalivales gland.

glandulæ tum maxillares, tum parotides tonsillæque derepente tumeant, caleant, doleant; lingua tumefiat & foras promineat; facies totumque caput turgescant, unde deglutitio & respiratio difficilis; vox suppressa vel incondita, & mugitui similis; sopor, veternum, lethargus; febris &c. quæ si non omnia semper adsint, at saltem pleraque solent una concurrere.

tumefactio cum calore & dolore.

Dependent mala hæc omnia a Mercurio nimis & frequentioribus dosibus administrato, quo glandulas salivales tonsillasque, in quas impetuosis ruit, subito dilatari, cohibitoque proinde sanguinis refluxu a cerebro per appositæ jugulares venas, cætera omnia consequi necessum est.

Una salus est, quoties contingit ut ægri funesta illorum symptomatum syndrome opprimantur; nempe nimium Mercurii impetum occisive retundere coercere, vel saltem aliorum divertere, ut detumescant salivalibus glandulis lethalis in cerebro hæmostasia declinetur.

Itaque 1. Vena illico incidatur in brachio, vel quod præstat in pede, sanguisque non semel, sed iterum atque iterum mittatur & larga quidem manu, si morbus urgeat, & ægrotantis vires tolerando pares sint.

2. Detrahantur extemplo indusia omnia Mercurio intincta, mutenturque lecti lintea; imo si commode fieri possit, mercurialis sordities, quæ cuti inhærescit, detergatur, ne Mercurio intus furenti tacitas feret suppetias.

3. Immittatur, si per tempus liceat, clyster purgans ex decocto foliorum fennæ, cum diaphœnico aut hiera picra; imo cum aqua benedicta Rullandi turbida, ut egestis facibus, quæ in crassioribus intestinis indurata hærent, futuræ purgationi via fiat liberior.

Deinceps sine mora exhibeatur catharticum, pro morbi gradu & ægrotantis ætate vel viribus varium, sed plerumque ex infuso folliculorum sennæ, radicis rhei, & salis regalis cum addita manna. Imo si grave periculum mimineat, cum aqua benedicta Rullandi, seu vino emetico ad ʒjss. Verum tamen, si ob præclusum guttur a tonsillarum tumore vomitio difficilior futura esse videatur, præstaret grana aliquot tartari stibiati solubilis, v. g. v. in aquæ libris ij. dissolvere, & partitis haustibus potanda præbere; sic enim fracta adeoque vomitioni promovendæ impar deorsum ire perget sibi vis, quæ paulo fortior impetum sursum factura fuisset.

5. Caveatur sollicite ne lingua tumens & extra os exserta primoribus dentibus vulneretur, imo etiam, quod pejus est, nec cadatur, ut non semel observatum fuit. Itaque lignei cuneoli utrimque alte adigantur inter maxillas, ut dentes nec sibi invicem allidere, nec linguæ, quæ intermedia est noxam ullo modo inferre valeant.

6. Represso semel ferocientis Mercurii impetu, quo æger in capitis discrimen deducebatur, oris interiora, in quæ tota perniciis mox eruptura est sedulo temperentur ne phagedænicam exulcerationem contrahant, &

in

in hunc finem foveantur jugiter lacte tepido, solo vel cum infuso croco orientali; decocto radicum althææ, nymphææ &c. seminum lactucæ, papaveris albi, hyoscyami albi, melonum &c. infuso seminum lini, psylli &c. in aqua communi; aqua distillata spermatis ranarum &c. caute abstinendo gargarismatis quibuscunque acidis, astringentibus, & repercutientibus, quæ salivam exiturientem retinendo gravissimos & periculosos decubitus in glandulas salivales possint accerere.

7. Ptyalisinus, si vehementior uberiorque succedat, ut succedit plerumque, ex artis legibus prudenter compescatur diætâ tenuissima, largo ptisanæ potu, usu clysterum quotidiano, iterata purgantium exhibitione &c. Quod si vero accidat casu vel forte fortuna, ut admissi Mercurii vis adhibitis remediis frangatur, & salivatio vel nulla, vel votis minor jam cieatur, poterit tunc Mercurii efficacia intendi vel renovari restitutis linteis Mercurio sordidis, quæ detracta sunt, vel adhibitis denuo frictionibus aliquot, sed prudenter, parce ac longioribus intervallis, ne iterata culpa ad eundem lapidem iterum offendantur.

II. Febris
continua
vel inter-
mittens.

II. Quandoque citra graviorem ullam perniciem æger febre tentatur post tertiam quartamve inunctionem, continua vel intermittente, intensa vel remissa &c. qua oris interiora impense calent, salivatio supprimitur vel remittitur, spiritus ægre ducitur, cæteraque omnia invehuntur symptomata, quæ febris propria sunt, sed vulgaribus tanto pejora, quod Mercurius per diversa loca exitum moliens in sanguine tumultuetur.

Provenit febris illa a gemina causa, 1. Quod neglecta ante hydrargyrosam præparationem nec primarum viarum cacoehylia educta fuerit, nec vitiosa sanguinis acrimonia emendata: 2. Quod Mercurius præcipitantius administratus sit, atque adeo impete facto turbas nimias in sanguine cieat.

Cæterum, a quacunque causa dependeat, huic mederi satis facile est, si levior sit, diætâ tenui ex jusculis aquosioribus, largo ptisanæ potu, usu enematum emollientium, cessatione ac ulteriore inunctione, deductione linteorum &c. at vero si gravior sit curatu difficilior diætâ non cedat, imo si invaleseat in dies, ad tutiora & efficaciora recurrendum erit.

Itaque 1. Vena secabitur semel iterumque, si morbi vehementia videatur iterationem exigere.

2. Purgatio instituetur ex infuso folliculorum fennæ & salis vegetalis, cum addita manna vel medulla cassiæ, quibus si pigrior alvus sit, aliquot tartari stibiati solubilis grana adjicientur.

3. Si febris periodice intermittat, adhibebitur cortex peruvianus, vulgo *Kinkina*, in substantia vel in decocto, semel pluriesve in die, ad ʒj. vel ij. dosi qualibet, cujus efficacia explorata est in curandis febribus periodicis, tum continuis, tum intermittentibus.

4. Curata semel febre, si æger infirmior esse videatur, Mercurialis the-

rapeia in aliud tempus differetur: Si vero viribus satis valeat, salivatio urgebitur, si ob adhibita remedia remiserit tantum, vel renovabitur, cessaverit, quem in finem oportet & lintea reddi, quæ Mercurio sordidata sunt, & novas aliquot inunctiones, sed caute iterari, cæteraque omnia regi juxta leges supra explicatas.

III. Solet in nonnullis secundæ vel tertiæ inunctioni pyralismi loco gravis diarrhœa succedere, quæ si negligatur, cito abitura est in manifestam dysenteriam, in qua tormina maxima, tenesmus fere perpetuus, difficilis excretio paucæ, mucosæ, sanguinolentæ materiei, non raro cum febricula, quæ identidem recurrit vel ingravescit.

III. Gravis diarrhœa in dysenteriam sæpe degeneret.

Id mali frequens est 1. In iis qui nulla ad hydrargyrosim præparatione usi sunt, vel negligentius usi. 2. In iis qui a primo curationis die regulis diætæ non obtemperant, sed vinum potant, aut cibus nimium sese ingurgitant. 3. In iis, quibus infirmior est intestinorum tonus rariorque glandularum intestinalium textura, unde fit ut pro minori resistentia Mercurius in corpore tumultuans in hæc loca impetum majorem faciat.

Tunc una curationis ratio est, nempe remedia anodyna & paregorica qualicunque via adhibere, quæ humorum defluentium acrimoniam demulcere valeant & partium solidarum erethismum compescere.

Itaque 1. Sustineatur nimius Mercurii impetus cessando ab ulteriore inunctione; imo si immoderatus videatur, coerceatur detrahendo lintea, quæ morbo fomitem suggerunt.

2. Vena secetur in brachio alterutro, unde sanguis educatur ad ʒ xij. si calor dolorque intestina male habeant cum manifesto phlogoseos, imo inflammationis periculo.

3. Oleum amygdalarum dulcium recens & ἀγυρον exhibeatur partitis haustibus inter singula jacula ad ʒß. vel ʒ. qualibet dosi; & prisana parata ex decoctis radicibus althææ, foliis verbasci, floribus malvæ, verbasci &c. largiter potetur.

4. Infundantur in alvum altera quaque hora unicæ sex septemve lactis capilli cum infusis floribus croci, vel decocti anodynini omazorum pingujum vituli; foliorum verbasci, plantaginis, bursæ pastoris, cynoglossi &c. seminum lini, thalictri, lactucæ, papaveris &c. florum hyssopici, tussilaginis, rosarum rubrarum &c. cujus libris duabus addita sit terebinthinæ Venetæ duobus ovi vitellis solutæ ʒß. vel ʒj.

5. Si morbus gravior urgeat, dissolvantur in injectionum una aut altera die qualibet grana aliquot Philonii Romani, v. g. 10. 15. 20. imo exhibeatur semel aut bis in die Dialcoridium Fracastorii ad ʒß. boli instar deglutendum, vel in aliquot juculi cochlearibus diluendum.

6. Si morbus difficilior remediis non cedat, in usum advocetur pulvis radicis brasiliænæ, vulgo *Hypocistanea* a granis xx. ad xxx. quo nihil efficacius

cuius

cuius est ad liquefaciendam & everrendam acriorem pituitam, qua intestina irritantur & ad excretionem continenter sollicitantur.

7. Mitescere alvi profluvio præscribatur ex catholici pro ore & mannæ calabrinæ ana ʒj. in decocto foliorum verbasci, vel ex ʒij. syrupi Magistralis in eodem decocto diluti, ut fomitis morbosæ reliquæ, si quæ supersint, educantur.

8. Demum posthinc caute attendatur an per ægri statum liceat in proposito suceproque consilio perseverare, necne? Si prius, therapeja aliquandiu intermissa ex artis legibus instauretur. Sin contra, curatio malis avibus instituta in tempus opportunius differatur, dum ægrotantis vires confirmatæ fuerint.

IV. Absoluta salivatio-
nis absen-
tia, quan-
tumq;
diligen-
tia hy-
dragyro-
sis admi-
nistretur.

IV. Ulu venit in ægrotantibus nonnullis, ut post inunctiones quinque legitime administratas nec salivatio ulla, nec ulla etiam signa appareant futuræ salivationis prænuntia, quasi Mercurius, cujus in plerisque nimiam efficacitatem jure reformidamus, in his plane iners ac suæ virtutis degener hebesceret. Phænomenum profecto singulare, cujus causas, quæ in alto latent, eruere attentavimus supra *Lib. II. Cap. 8.* quo nullus quidem dubito, quin primum creditum fuerit in therapejam Mercurialium pessum ituram, sed quo tamen experientia jam pridem compertum est remedii exitum nec hilum infringi aut in deterius perverti, modo sequens methodus ex arte adhibeatur.

1. Quoties contingit ut legitimis unguenti mercurialis inunctionibus quinquies repetitis per dies novem salivatio nulla succedat, mora interponenda est dierum quatuor vel quinque, ut explorare liceat, num per id tempus Mercurius sat magna copia jam illitus in apertum pyralismum erupturus sit. Interea æger parce nutriatur, ut sanguis a chylo purior adeoque fluxilior humores fecernes secernendos facilius deponat; & largo tepentis ptisanæ potu eluatur, ut atomi mercuriales latius deductæ per intricatissimos vasorum poros liberius permeent, obstructa viscera efficacius referent, & si quid moturæ sint, ocyus moveant.

2. Postea, si nullomodo turbatum sit, per novem dies sequentes frictiones aliz quinque iterandæ sunt, eadem methodo, pari vel etiam majori unguenti dosi, similique cautionum diligentia, alvum quotidie clystere eluendo, & os diligenter introspeciendo, ne quid mali a dupla unguenti quantitate, quæ adhibetur, ex improvviso superveniat.

3. Quod si pyralismus tandem obrepat, regendus est ex artis legibus supra propostis, *Cap. præcedente*, fovendus scilicet si moderatus, compescendus vero si nimius fuerit; cæterum satis longo dierum spatio permittendus donec morbus extirpatus esse videatur.

4. Contra si nullus adveniat pyralismus novem illis alteris diebus interponenda rursus mora altera dierum novem vel decem, ut Mercurio spa-

spatium non desit vim suam exerendi, quibus transactis tuto & sine ullius recidivæ periculo licet ex artis regulis cutem detergere, lintea detrahere, purgationum aliquoties iterare, pleniorē diætā paulatim concedere, ac demum ægrum priori vitæ reddere.

§. Interim tota curationis periodo bonis verbis confirmandi & erigendi ægrotantes, qui deficiente pyalismo quem præstolabantur, nihil non metuunt, ac vana sibi fingunt portenta, quibus misere animo angi solent.

Sunt qui ab omni lue se vacuos fuisse, & ad remedium sine causa damnatos inde arguant, quod Mercurius nullam salivationem valeat movere; quasi vero hydrargyrosis in sanis semper inefficax ab infectis tantum pyalismum proliceret, cum e contrario experientia certa liqueat salivationem tum in sanis tum in contaminatis venereo contagio illito Mercurio perinde excitari.

Sunt alii, qui anxie timeant ne quid vel in componendo vel in administrando unguento peccatum sit, unde oriatur salivationis absentia; cum tamen error in his difficillime dari possit, si detur unquam; cum e contra certissimum sit iterata observatione inunctionibus etiam legitimis & summa cura adhibitis pyalismum nullum aliquando succedere.

Plerique demum de futuro remedii successu male inde augurantur, veriti ne defectu salivationis curatio quoque defectura sit; quasi seminum morbosum profligari non possit nisi foras exterminetur. Sed ne illi errore tenentur maximo: Jam pridem enim palam est observationibus multis veneream lue sine salivatione ulla radicitus non raro extirpari. Et sane cum morbus ille contrahatur sine humore ullo conspicuo qui intro subeat, nequaquam mirum videri debet si perfectam curationem recipere possit sine manifesta ullius humoris evacuatione. Adde porro defectum salivationis plerumque suppleri alvi fusione, diuresi, sudatione, vel saltem insensibili perspiratione, quæ singulæ evacuationes deficientis salivationis vicariæ esse solent.

Igitur tantum abest ut ægrotantibus, quos in hydrargyrosi pyalismus destituit, causa ulla sit cur vicem suam doleant, modo recte & ex artis legibus procedatur, ut contra potius sibi jure merito gratulari debeant, quod sibi datum sit rara satis felicitate absque tædio & periculo salivationis, atque adeo tutiusque commodiusque a venereo morbo perfecte convalescere.

§. II. INFORTUNIA SECUNDI STADII.

In altero curationis stadio sanguis mercurialibus atomis, quas secum confusas vehit, nimium attritus & rarefactus, ætusque citatius in omnes corporis partes validiore momento quam par sit, si qua debilius resistat hac viam sibi facturus est, unde infortunia non pauca stadium hoc infestum habere solent.

Dd

I. Tuf.

I. Exspu-
tio san-
guinis si-
ve hæmo-
ptysis.

1. Tussiculosi, pulmonarii, hæmoptysici, sanguinem solent exspuere; purum modo, liquidum, floridum, spumosum; modo cum pituita confusum, nigrum, grumosumque. Sed quocumque modo sanguis exspuatur, res est periculi plena, & quæ cito auxilio opus habeat.

Itaque 1. Reprimatur omni arte atque opera nimius Mercurii impetus, abstinendo ab inunctionibus, indulgia detrahendo, ægri cutim detergendo, lintea lecti mutando &c.

2. Vena secetur bis & ter in die, imo vero quarta quaque hora, & sanguis largiter educatur primis potissimum missionibus. Nullum enim remedium est quo sanguinis ad pectus ruentis impetus, & in pulmonaria vasa a rietantis momentum celerius & efficacius retundi possint.

3. Pro potu exhibeatur leve decoctum radicis symphyti majoris; parentur juscula ex carne vitulina cum radice ejusdem plantæ, semine lini, aut pauca oryza; imo ex piscibus saxatilibus, si ad obtundendam cruoris acrimoniam, & procurandam valorum discissorum conclutinationem Colleticis opus esse videatur.

4. In usum advocentur cætera omnia remedia, quæ ad hæmoptoen valent, ut bolus armena, terra sigillata, sanguis draconis, margaritæ præparatæ, spodium, cornu cervi ustum vel philosophice præparatum, terra Japonica vulgo *Catechu* sive *Catbou*, amyllum torrefactum, corallia præparata &c. a gr. xv. ad ℥j. gummi Arabicum, Tragacanthæ &c. a gr. xx. ad xxx. succi depurati urticæ, millefolii plantaginis, vel si deficient succi, aquæ stillatitiæ earundem plantarum ab ℥j. ad ij. syrupi de rosis siccis; cydoniorum; myrtini; de succo portulacæ, aut plantaginis; de symphyto Fernelii; corallorum &c. ab ℥ss. ad ℥ ij. e quibus boli, opiatæ, julepi, mixturæ varie confici possunt ex arte, prout morbo conducere visum fuerit.

5. Demum post hæmoptoes curationem de ægri convalescentis statu cauto judicetur; si morbus in ipso curationis ingressu invalerit, si æger morbo debilitatus difficili & diuturniori remedio impar esse videatur, hydrargyrosis in aliud tempus differenda: Sin contra æger satis commode valeat, ac therapeja jam vergat ad exitum, quæ superlunt ex artis legibus regenda sunt.

II. Insul-
tus mor-
bi caduci,
sive Epi-
lepsia.

II. Frequenter accidit ut Epileptici in hydrargyrosi media, dum sanguis Mercurii vi impensius rarefcit atque æstuat, insultu corripiantur, ac in terram præcipientes ruant convulsi cum stertore, oris spuma, cæterisque symptomatis, quæ in morbo caduco perpetua sunt.

Tunc 1. Si insultus levior sit, nihil prorsus movendum est; cavendum tantum ne æger damnum sibi afferat dum convellitur, ac cuneoli lignei inter dentes adigendi ne maxilla inferior convulsione acta morsu linguam lædat.

2. Sin vero periculum sit ne paroxysmus diuturnior graviorque in apoplexiam degeneret, secta prius vena, depletisque vasibus cerebri hærente san-

sanguine nimium turgidis exhibendæ vini emetici ʒij. quibus vomitio cefatur ac solvatur infultus.

3. Quocumque modo paroxysmus vel sponte vel arte discussus fuerit, ad hydrargyrosim redeundum est sed cautius procedendo, & adhibitis semel, imo etiam bis in die remediis, quæ vi anti- epileptica valere creduntur, quorum potissima supra recensita sunt *Cap. 6. §. 3. n. IV.* & ex quibus bolos aut opiatas conficere facile est.

III. Haud rarum est Podagricos, eosque qui doloribus rheumaticis, ischiadicis, articularibus obnoxii sunt, pati in ipsa hydrargyrosi novas molestasque dolorum exacerbationes. Sed quibus una certe est medendi ratio.

1. Salivationi largius fluenti moderandum quidem est, sed ita tamen ut ex toto non cohibeatur, nisi dolorum accessio vehementior febrem advocet.

2. Doloris morsus mitigandus diætâ tenuissima, largo potu pituita lenientis & diureticæ, usu clysterum quotidiano ex decocto communi emolliente vel anodyno, nempe foliorum verbasci, seminisque lini, cum oleo amygdalarum dulcium aut butyro insulso, imo cum medulla cassiæ, si alvus pigrior sit.

3. Sanguis jugiter eluendus usu infusionis foliorum theæ vel herbarum vulnerarium ex blandiorum genere, quales sunt scolopendrium, urtica, salvia, veronica, virga aurea, melissa, chamæpitys &c. cujus mane & sero possunt pocilla aliquot sorbillari, ut levis mador proliciatur, quo dolores si non discurantur, saltem leniantur & mitigentur.

IV. Solent in mulieribus erumpere catamenia, nunc quidem statâ periodo, quoties scilicet in aggrediendo remedio de tempore, quo recursura essent, parum provisum fuerit; nunc vero extra ordinem & vi Mercurii ante tempus proritata, atque adeo frustrata cautione, quantacumque de vitando illorum regressu adhibita sit. Sed quacumque ratione vel periodo contigerit, ut menstrua hydrargyrosi superveniant.

1. Tunc sustinendus est salivationis impetus, si forte vehementior sit: Ea tamen cavisse vix unquam opus est, cum experientia comperitum sit, pryalissimum sponte satisfacere, quandiu menstrua uberius manant, materia scilicet, quæ ad os, confluebat, deorsum divertente.

2. Si catamenia moderare fluant, bene est, resque tota naturæ viribus committenda, hac una cautione ut dum fluunt juscula sint valentiora, vel additis cremore oryzzæ aut ovi vitello firmitiora fiant.

3. Si vero immoderatus manaverint, iis utendum remediis quæ adversus immodicum menstruorum fluxum valent, ut sunt remedia fere omnia supra recensita *articulo 1. hujus stadii*, ubi de hæmoptoe; sed præsertim decoctum aurantiorum immaturorum, alumem rupeum sub forma boli ad ʒß. quolibet quadrihorio devoratum; vel bolus ex æquis aluminis rupei, sanguinis draconis & sacchari rubri partibus, cujus

Dd 2

dosis

III. Exacerbatio dolorum arthriticorum, rheumaticorum, ischiadicorum.

IV. Erupcio catameniorum.

doſis ad 3j. quolibet quadrihorio iteranda eſt ſi morbus urgeat.

V. Abortus in prægnantibus.

V. Mulieres, quæ uterum gerunt, aliquando in ipſa hydrargyroſi abortiunt, ſive citiore impetu quo ſanguis agitur a Mercurio tumul- tuante, ſive irrequietis fœtus; qui tunc ipſe male habet, calcitrationibus.

Ubi primum ex ſanguinis profluvi- o, ex depreſſione ventris, ex dolore in utero & ex enixuum præſentia manifeſtum eſt abortum inſtare.

1. Hydrargyroſeos vehementia, quam maxime fieri poterit, ſuſtinen- da ex artis regulis, ut jam ſæpius dictum eſt.

2. Parturienti ex arte obſtetricandum eſt, & exclusus infans, ſi vi- vus ſit, baptiſmo conſeſtim luſtrandus, ne præmatura morte occum- bat Cætera vero omnia circa matrem procuranda, ut procurari ſolent in puerperis, quæ morbo immunes ſunt.

3. Si lochia rite & moderate fluunt, res tota naturæ permittenda donec ſponte ceſſent, quo tempore Mercurii efficaciaſt inſtauranda, ſi nimum intermiſſa videatur: Ad minus remedi- i diuturnitas ad plures dies proroganda, ut quod ad intentionem & efficaciam forſan deeſt, tem- poris diuturnitate compenſetur.

4. Si contingat vero ut lochia ſupprimantur, vel parcius manent, pari proſus methodo medendum eſt, ac ſi therapeja mercurialis adhibita non fuiſſet, nempe clyſterum uterinorum uſu, venæ ſecti- one in brachio vel in talo pro ſuppreſſionis modo & gradu, emenagogis blandis, purgationibus &c. quæ non ſunt hujus loci.

5. Cæterum infantem, ſi vivat, a matre lactari neceſſe eſt, ut ſi lue vene- rea etiamnum forte labore- t, ceu laborat, plerumque quoties nondum abſoluta curatione in lucem editur, proſtigatis uſu lactis materni, quod mercurialibus atomis turgidum eſt, morboſi ſeminii reliquiis integræ reſti- tuatur valetudini.

VI. Inania phan- taſmata, quibus hypo- chondriaci perſe- celli ſolent.

VI. Hypochondriaci, qui natura maticuloſi ſunt, remedi- i tædio a diuturnitate, dolore cito fracti curatione quidem affecta de ſalute deſperare, conſecta vero de valetudine ſolent diffidere, ac in utro- que caſu medentes aſſidu- is querimoniis enecare & plerumque ſine cauſa.

Certum eſt cum illis cauſiſſime procedendum eſſe, ut qui morbi im- patientes ſint, omnia tuta timeant, ac pro nihilo portenta ſibi ſingant, qui- bus mirifice conſternantur. Itaque bonis verbis erigendi ſunt, quandiu therapeja mercurialis durat, ne animo deſpondeant, quod numquam peri- culolum non eſt; finita vero curatione manifeſtis rationum momentis ar- guendi, ut de valetudine diffiteri nullomodo poſſint. Sed in utroque ſcias ve- lim plurimum ineſſe difficultatis ac laboris; *In illo*, quod hypochondriaci ex vivida phantaſia vi, qua multum valent, morbi ſpecie gravius affici ſoleant, quam plerique alii morbo ipſo: *In hoc*, quod cum cæteri id verum eſſe ſa- cile

eile putent quod multum expetunt, ii contra id solum verum esse credent, quod maxime sibi metuunt.

VII. Scorbutici aut qui ad scorbutum inclinant, quibus gingivæ natura molles & fungosæ sunt, aut in quibus sanguis ac proinde gingivarum mucus ammoniacali peccat dyscrasia, gravia in toto ore ulcuscula pati solent, serpentia, phagedenica, fœtida, gangrænodea, quæ buccas, gingivas, linguam, palatum fœde depascantur; quæ si consillis, columellæ, vel paristhmiis assideant, deglutioni magnopere efficiunt; & quibus proinde, cum maximum sit in mora periculum, celeriter occurrendum est.

VII. Ulcera oris phagedænica in scorbuticis.

1. Coercendo vel sustinendo adhibiti Mercurii impetum, ne immoderatus invalescat.

2. Ulcera omnia probe detergendo collyrio Lanfranci, & si collyrium impar sit, spiritu salis marini vel vitrioli additione mellis temperato, imo etiam sincera si morbi vehementia ita suadeat.

3. Os identidem abluendo decocto radicum aristolochiæ rotundæ, bistortæ, raphani rusticani, &c. foliorum cochleariæ, aquilegiæ, salviæ, becabungæ &c. corticis aurantium amarorum; balaustiorum, fructuum lumach, strobilorum pini &c. cum addito spiritu vini camphorato & alumine rupeo ad q. s.

§. III. INFORTUNIA TERTII STADII.

In tertio demum & ultimo therapejæ mercurialis stadio, dum attrito, eliminato, profligato morbofo seminio opus est vela jam contrahere, promotæ salivatio finem imponere, & illatam ori noxam emendare, nova solet ingruere malorum cohors, quæ plerumque non tam remedii adhibiti virulentia, quam medentium incuriæ vel inconsiderantiæ debent accepta referri.

I. Nonnumquam ulcera numerosa, profunda, sordida, depascentia, dysepulota, oris interiora pessime habent, unde pyralismus diuturnior, quem compescere vix licet, necdum sistere, quo tamen ægrotautes pedetentim macescunt & extenuantur.

Id perpetuum esse solet, 1. Quoties Mercurius vel uberius vel præcipitantius administratus est: 2. Quoties ulcusculis in ore efflorescentibus tempestive occursum non fuit, si nimia fuerint aut in alienis locis infederint 3. Quoties acrior est falsiorque humorum crasis in ægrotaante, unde ulcera cicatrici diutius repugnant: 4. Denique quoties mollior est, laxior, nimisque fungosa gingivarum & interioris oris caro, qualis in scorbuticis unde ab ulcerum tabo facilius eroditur.

Hinc palam est Medicos in manifesta culpa esse in prioribus duobus casibus, ut qui temere vel inconsulte se gesserint: a culpa vero plane

Dd 3 non

I. Ulcera oris dyssepulota.

non vacare in duobus posterioribus, ut qui ad ægotantium, qui se illorum fidei dedere, temperiem statumque satis caute non autenderint in administrando Mercurio.

Porro a qualicumque causa id mali proveniat, unica est medendi ratio.

1. Nempe si oris interiora caleant, doleant rubeantque inflammatorie vel erysipelatose, vena incidenda est semel atque iterum, modo vires ægotantis permittant.

2. Ulcuscula tepide fovenda lacte vaccino vel caprilol, decocto radicum althææ, infuso feminis lini, aqua spermatis ranarum, similibusque quæ in ore perpetuo contineri debent identidem renovando.

3. Bis in die detergenda sunt decocto hordei cum melle rosaceo, vino rubro aqua temperato, aquis thermalibus v.g. Balerucanis, quæ si ita videatur, temperari possunt decocto radicum althææ: Imo si ulcera valde sordida fuerint, collyrio Lanfranci identidem imbuenda, attamen parce ne fibræ acris lacescit ærethismo intensiore percellantur.

4. Alvus subducenda est quotidie enemate emolliente & eccoproptico, & tertia quaque die blando cathartico ex fenna, manna, cassia, sale vegetali &c. ut humor, qui ad os copiosius affluit, versus inferiora sensim divertatur.

5. Interim æger nutriendus est solo lacte vaccino, si ventriculus hujus nutrimenti patiens sit; lac saltem semel aut bis in die exhibendum, mane scilicet, & sero: De cætero præscribendæ sorbitiones, quæ eupeptæ & euchymæ sint, & quæ sine masticatione possint exhauriri.

6. Ægotanti non modo permittendus, sed etiam imperandus est liberioris aeris usus, si tempestatis ratio permittat, ut promota, uberiore diapnoe, atomisque mercurialibus copiosius ideo exhalantibus sensim compellatur tumultus quem in sanguine faciunt, ac imminuatur nimius humorum confusus quem versus os sollicitant. Cæterum modo ulcera videantur cicatricem paulatim contrahere, cura superstitis pyralismi temporis tota committenda est; licet enim tarda sit illa medicina, quam affert longinquitas & dies, at certe experientia compertum est & magnam & efficacem esse.

7. Sunt qui ad reprimendum pyralismum largiorem & diuturniorem uti soleant gargarismatis astringentibus ex balaustis, rosis rubris, myrtillis, sumach, acacia, baccis berberum, Gallis, malicorio, alumine rupeo &c. ut laxiora ductuum salivalium ostiola coarctentur. Sunt alii qui nummos aureos in ore volutandos præscribant pilulæve quæ auri scobem; calcemve vel bractæas recipiant, devorandas exhibeant, ut mercuriales atomi, quæ copia nocent, auri ramentis, quibuscum jungi amant, absorbeantur & una simul educantur. Sed utrumque jam pridem a gnaris & prudentibus Medicis merito damnatur. Prius quidem ceu periculosum, neque enim unquam tutum est pyralismum, dum largius fluit, astringentium vi intempestive coercere: *Posterior* vero ceu vanum & inutile non quidem quod negem quod

aper-

aperte liquet, scilicet auri ramentis mercuriales atomos nonnullas in ore aut intestinis abripi & induci, sed nego satis magna copia ea ratione unquam deduci, præsertim e sanguine, ubi potissima scena est, ut ea therapeja in ægrotantium commodum cedere possit, nisi efficaciora & tutiora remedia adhibeantur.

II. Dum ulcerum escharæ decidunt, superveniunt non raro hæmorrhagiæ ab erosione lacerisve vasis, quæ ulcera depasta sunt. Id mali frequens est quoties ulcera profundiora altius excavantur, præsertim si ab ægro crustæ ulceribus inustæ præcipitanti detrahantur, ut a medentibus citius deradantur frequentiore affricu penicilli collyrio imbuti.

II. Hæmorrhagia ab ulceribus oris.

Leve quidem malum est & quod naturæ committi potest, si sanguis paucus extillet ex vasis tenuioribus venosisque: At vero gravius, & cui mædici oporteat, si ubertim manet ab arteriosis & amplioribus vasis.

Tunc ergo 1. Abluto ore locus unde sanguis fluit, si oculis pateat, ut patet perpetuo dum hæmorrhagia manat a gingivis, lingua, buccis aut maxillarum commissuris, collyrio Lanfranci, solutione aluminis rupei in aqua plantaginis, aqua styptica, aqua aluminosa Fernellii, aut qui cæteris præstat, spiritu vitrioli imbuatur. Si hæc sistendo sanguini paria non sint, vasi discisso cauterium æstuale sed leviter calens imponatur, atque eschara ea ratione inusta caute foveatur, ut supra dictum n. 2. *paragaphi præcedentis*, ne decadat præpostere. Interea vero æger nutriatur jusculis, forbitionibus, panatellis, cremoribus oryzae, ovorumque vitellis, & damnetur silentii, ne masticationis motu, vocisve contentione eschara sede dimoveatur & hæmorrhagia renovetur.

2. Verum si locus, unde sanguis manat, in occulto sit, ut dum latet in faucibus aut in postica facie lacunaris narium, incidatur vena semel iterumque si morbi vehementia ita exigat, & ægri vires ferendo pares esse videantur. Interim os sæpius abluatur decocto altringente & styptico balaustrorum, rosarum rubrarum, sumach, gallarum, malicorii cum additis aquæ Rabelii guttis aliquot; & pro potu ordinario exhibeatur decoctum radices graminis vel cichorii silvestris aqua eadem Rabelii imprægnatum ad gratam aciditatem.

3. Memini in casu simili profuisse in ægrotante quodam narium interiora, quæ faucibus proxima adstant, unde hæmorrhagiam gravem patiebatur, ferro tenuiore, recurvo & leviter candente, canalisi ope in nasum extrinsecus immisso, comburete; duro quidem consilio, sed quod durior necessitas suadebat, & quod felici comprobatum fuit exitu, cum ea ratione & hæmorrhagia restincta, & æger ab oris faucibus revocatus fuerit.

III. Contingit nonnumquam, ut cum oris ulcera ad cicatricem veniant, erosæ linguæ latera præsertim circa radicem cum interioribus gingivis

III. Conglutina-vis

tio lin-
guæ cum
gingivis
gingiva-
rum cum
buccis,
uvulæ
cum vici-
nis parti-
tibus.

vis quæ appositæ sunt, gingivæ exteriores cum adversis buccis, aut uvula five columella cum finitimo lacunaris fornice coalescant.

Leve quidem malum & quod omitti potest, si nullum afferat incommodum. Sin aliter vero oportet medicinam adhibere & promptam & facilem, nempe dum cicatrix recens est, partes male coalitæ adæsto digito dissociandæ; si vero firmior & antiquior sit, scalpello ex arte dissecandæ; ac postea cavendum ne semel discretæ denuo invicem agglutinentur, ideoque interjecto penicillo molliore, qui decocto detergente vel vino rubro imbutus sit, blande pluries in die fovendæ sunt, donec cicatrix obducatur.

IV. Oris
strictura
seu capi-
stratio,
vulgo *bri-
dure* :

IV. Tandem superest aliquando post curata ulcera ea oris strictura, vulgo *bridure*, qua maxilla inferior fere immobilis & quasi capistrata nequit a superiore deduci ulla ratione, vel saltem ita parum deducitur, ut os adstrictis fortiter dentibus nullo vel angusto tantum hiatu pateat, unde alimenta solidiora in os indit, inditave masticari, aut vocis sonus distincte exprimi vix possunt.

Solet hoc malum fere perpetuum esse, quotiescumque tendines musculorum manforiorum, qui in maxillarum commissuris adsunt, male affecti sunt vel ab altioribus ulceribus ea oris loca depascentibus, vel ab acrioribus catharteticis, quæ ad extirpanda earum partium ulcera affricantur. Hinc enim elastica stamina, quibus tendinei funiculi constant, puncta, irritata, lacerata quomodocunque crispari & in brevius contrahi necessum est, haud dispari fere modo ac cartha pergamena ad ignem propius admota corrugatur. Quapropter minime mirum si retracti eo modo tendines ac extensionis pristinæ jam nescii inferiorem maxillam superiori tam firmiter applicitam detineant, & oris diductioni tam valide obstant, ut quantumvis nifus in adversum fiat, renitentur ipsi momento superiore, donec discerpantur.

Grave quidem malum est, tantoque gravius quod inemendabile. Sunt qui gargarismatis emollientibus ex decoctis radicibus althææ, brançæ, ursinæ, malvæ, seminibusque lini, psyllii &c. contractos tendines tententer relaxari, sed frustra; neque enim observatione hætenus compertum est posse eos unquam nativæ mollietati ullo modo restitui.

Sunt alii qui adaectis intra dentes cuneolis ligneis maxillam vi diducere, ac manforiorum tendines ad nativam extensionem revocare conentur, nec feliciore tamen exitu; nihil enim minimum proficiunt labore maximo, ac ubi primum ab opere tædioso cessatum est, cito perit diuturni laboris utilitas.

Demum non desunt qui duriore sed æque inutili consilio firmiores cicatrices internis maxillarum commissuris obductas incisuris scarificent, eo scilicet fine ut maxilla inferior facilius moveri possit; quasi vero durioribus oris cicatricibus malum induceretur, quod a retractis crispatisque musculo-

rum

rum manseriorum tendinibus unice pender, incisive cicatricibus superficialiis morbus curari posset, cui medicina efficax adhiberi nulla ratione potest, nisi sectione tendinum, quam tentare piaculum foret.

Quorsum ero ægrotantium animos inani spe frustra tam diu lactare, aut quod pejus, novis miseriis illorum misérias quotidie cumulare; Discant tandem se immedicabili morbo detineri, ac dimissa non frustranea modo sed etiam periculosa medicina ea sibi parent levamenta, quæ possint conducere, quæ nocere non possint. Cum solidiores cibos nec devorare nec masticare queant, liquidioribus utantur admissis per rimam qua patet os, vel per eam quam facit dens unus data opera evulsus; eoque artificio, si non delicate, at saltem placide vitam traducant. De cætero *durum* sed immedicabile infortunium foriti ferant animo, ut (a) *lexius fiat patientia quicquid corrigere est nefas*.

CAPUT IX.

De Infortuniis, quæ in parciore hydrargyrosi interdum accidunt, & de eorundem medicina.

JAM supra monuimus *Cap. 7. §. 2.* omnia mitiora esse & pacatiora in parciore hydrargyroseos administratione. Cum enim Mercurius minore dosi inungatur, tumultus in sanguine, si quis fiat, minor inde futurus est; & cum inunctiones longioribus intervallis repetantur, impendentia mala prævidere & prævisus ante occurrere facilius est. Inde tamen putari nolim hac methodo in curanda lue venerea navigationis cursum teneri quasi per mare pacificum, quod procellas nullas experiatur quod nulla viderit unquam naufragia; siquidem hæc ipsa methodus sua quoque patitur infortunia, quorum alia quidem parit ægrotantium imprudentia, qui Medicis monentibus morem non gerunt; & hæc huic methodo cum præcedente plerumque communia sunt: Alia vero accidunt Medicorum incuria, qui sese ægrosque frustrari solent, dum per errorem medicinam imparem morbo adhibent; & ea huic methodo quasi propria sunt.

Hydrargyrosi parciore sua quoque patitur infortunia.

§. I. DE INFORTUNIIS HUIC METHODO CUM PRÆCEDENTE COMMUNIBUS.

I. Ægrotantes, cum in hac methodo ab exulceratione oris & salivatione immunes noxam nullam patientur, tædet plerumque in cubiculo conclusos tandiu detineri. Conniventibus itaque, vel saltem, dissimulantibus Medicis amant per urbem vagari, ignari malorum quæ sibi possunt parere, cum Mercurio nulla unquam fides sit. Vidi equidem neque semel rem satis pro-

I. Febris advenit & caput intumescit, si ægri va-

gentur
dum re-
media ad-
hibent.

prosperè, saltem sine damno successisse in regione calidiore, qualis est Occitania, tempestate æstiva, in ægrotantibus demum in quibus tardior erat & hebetior Mercurii energia: At vero ægrotantes alios & numero plures ibidem vidi, quibus simili imprudentia gravissima parata sunt infortunia, unde in apertum capitis discrimen venire.

Neque sane mirum, quippe si dum interiora calent & æstuant a Mercurio intus tumultuante, contingat ut extimus corporis habitus vento, frigore, humiditate derepente refrigeretur, necesse est pro constipata eue & densatis spiramentis, quibus pervia est, insensibilem perspirationem subito inhiberi. Hinc particulæ morbificæ, quæ in hac methodo a cæteris emissariis præclusæ, saltem tacite hæc exhalabant; hinc non pauca mercuriales atomi, quæ circulationis motu abreptæ latenter evanescabant via eadem, intra corpus jam retineri, & retentæ tragœdiam agere debent periculi plenam: Modo scilicet intra sanguifera vasa coercitæ motum circulationis cruoris intendendo, carneasque tum cordis tum arteriarum fibras ad oscillationem frequentius sollicitando, febrem accendere, ut dictum est *Cap. præced. §. 1. artic. 2.* Modo vero impete factò in salivales glandulas, tum parotides, tum maxillares, subitum illarum tumorem, calorem, dolorem inferre, cum insigni linguæ totiusque capitis tumefactione, ut *ibidem* dictum est *§. 1. artic. 1.* Modo tandem tum in vasa sanguifera, tum in salivales glandulas vim simul exerendo, una eademque opera & febrem inducere, & glandularum salivalium tumefactioni locum dare.

Sic ergo in hydrargyrosi ipsamet parciore, ægrotantium imprudentia infortunia eadem non raro accidunt, quibus supra diximus præcedente Capite, *§. 1. artic. 1. & 2.* pleniorẽ hydrargyrolim infestam & infamem haberi, sed quibus eadem quoque medicina facienda est, quam idcirco, ne actum agere videamur, repeti volumus ex præcedente Capite.

II. Febris cum diarrhœa, & dysenteria, si ægri cibi seie ingurgitent, aut gulæ indulgeant.

II. Nonnulli, qui natura multi cibi sunt, cum inedie impatientes tenuiorem dietam, quæ imperatur, observare nolint vel nequeant, non largiorem modo sibi concedunt, ut famem depellant, quod condonari facile posset, modo offis tantum, cremoribus, panatellis & ovorum vitellis uterentur; sed etiam gulæ interdum ita indulgent, ut cum oris interiora ab exulceratione libera ad masticationem & deglutationem prompta sint, non dubitent cibis ingurgitari; carne, edulis, ferculis, cupediis promiscue vesci; quin imo vinum adhibere, quasi in therapeja tam lubrica pergræcari licitum foret.

Sed delictum gravis pœna plerumque sequitur, neque *pede claudo*. Cum enim in hydrargyrosi quavis concoëtrix ventriculi facultas manifeste infrigatur copiosiore, ut opinor, muco tunc temporis in stomachum confluyente, quo tonus ventriculi relaxatur, & hebetatur fermenti chylopoï energia, inde fit ut ingesta cibaria & male confici, & in vitiosam abire soleant

leant cacochyliam, acidam, acrem, biliosam, qua quidem, si in sanguinem transfundatur, febrem moveri, qualem supra descripsimus, *Cap. præcedente* §. 1. *artic.* 2. qua vero, si in intestina provolvatur, diarrhæam produci necesse est in dysentericum fluxum brevi degenerem, de qua *ibidem*, *artic.* 3.

Siergo in hac etiam methodo ægrotantium intemperantia mala sæpe creantur gravissima, quæ ut natura eadem sunt cum affectibus iis, de quibus supra, qui in pleniore hydrargyrosi eveniunt, sic cum iisdem nonnumquam gradu & intensione fere paria fiunt, atque adeo iisdem remediis impugnanda sunt, de quibus *supra loco laudato*.

III. Huic alteri hydrargyrosi, de qua nunc quæstio est, ut quæ ad patiendum & tolerandum multo facilior sit, moris est novitii quidem, sed jam recepti ægrotantes plurimos credere natura infirmos, viribus parum valentes, morbo habituali exhaustos, ut pulmonarios, tabidos, hæmoptoicos, epilepticos, scorbuticos, podagricos, mulierisque uterum gerentes, quibus plerisque pleniore hydrargyrosi olim interdictum erat. Neque sane mutati consilii pœnitendum esse videtur, quo non solum ulciturum sed etiam quotidianum est ægrotantium plurimos ab inveterato morbo feliciter convalescere, qui tanquam deplorati naturæ viribus, vel ad summum mitigatoris sed inefficacibus quibuscumque auxiliis quondam permittebantur, donec paulatim morbo confecti mortem miseram occumberent ante diem.

At vero, cum nihil occurrat quod ex omni parte a periculo tutum sit, inde simul effectum est ut mitior hæc ipsa hydrargyroscos species, utcumque natura blanda sit, infortunis tamen non paucis obnoxia interdum esse soleat, quæ cum altera communia habet, ut sputo sanguinis in hæmoptoicis, insultibus morbi caduci sive fontici in epilepticis, ulceribus oris phagedænicis in scorbuticis, paroxysmis podagricis, abortui, cæterisque id genus numero fac multis. Quantumvis enim & parvis dosibus & longis intervallis Mercurius adhibeatur, quantumvis tacite vim suam exerat in profrigando seminio morbofo, vix unquam fieri potest ut nec in liquidis organum, nec in solidis erechthum ullum excitet; neutrum vero excitare unquam potest in ægrotantibus natura infirmis, cachecticis, corpore male constitutis, quin periculum maximum inde immineat, ne therapeja in infortunium quoddam eruptura sit, varium quidem pro vario ægri statu, sed numquam a periculo vacuum.

Sic ergo in paciore quoque hydrargyrosi, ægrotantium infirmitate infortunia eadem interdum contingunt, ac in pleniore. Plerumque tamen paulo mitiore quibus proinde medendum est auxiliis iisdem, quæ allata sunt *Capite superiore* §. 2.

IV. Rarum est oris ulcera altius penetrare in hac hydrargyroscos specie, rarius ulcera eadem fieri maligna, cacœthæa, dysepulota. Potest

III. Cæra pleraquæ præcedentis methodi infortunia si hydrargyrosi patior cæchecticis ac corpore male constitutis admittitur

IV. Aliquando

ta-

ulcera oris altius, penetrant & fiunt maligna. tamen utrumque medentium indiligentia aliquando contingere; & tunc eadem omnia infortunia timenda sunt, de quibus *superiore Capite* dictum est, §. 3. Sed ut illa infortunia natura, causa, periculo cum iis proxime conveniunt, quæ laudato loco recensentur, sic medicina ad illa efficax cum ea convenit, quæ ibidem proposita fuit, & ex eodem Capite repetenda est indiligentia.

§. II. DE INFORTUNIIS HUIC METHODO QUASI PROPRIIS.

Irritus hy-
drargy-
roscosus.

Haftenus sed paucis de infortuniis, quæ hydrargyrosis parciore commu-
nia quidem habet cum pleniore, sed quæ tamen mitiora & rariora patitur;
Nunc paulo fusius de infortunio illo, quod licet cum utraque commune sit,
ad parciorem tamen specialius & frequentius pertinet; nempe de irritio
Mercurii successu, gravi sane infortunii genere, & si ea excipias, quæ ca-
pitis discrimen advocant omnium gravissimo, quo fit ut morbus male ex-
tirpatus post breves inducias sponte reviviscat, agatque tragiædiā alteram
priore pejorem.

Qui cum
pleniore
hydrargy-
roscosus
communis
est sed qui
in parciore
frequen-
tius acci-
dit.

Novum quidem non est pleniorē hydrargyrosim ipsam quoque omnem
plane successu aliquando destitui; sed id tamen rariū est, neque unquam
fere accidit, nisi cum adhibita therapeja vel nimia medentium testinatione
vel præsentia graviorum infortuniorum, quæ urgent, citius quam par
esset intermittitur, unde vix potest tunc ignorari & erroris admitti causa,
& emendandi ratio. In parciore vero hydrargyrosi id infortunii genus &
frequens & pervulgatum est, & quod maxime mireris, tum etiam cum
omnia ex artis legibus rite administrata videntur, ac cum therapeja mo-
ram ac sustentationem satis diuturnam habuit, ita ut nec latis liqucat ple-
rumque in quo peccatum sit, nec ab admittenda culpa cavere, aut admittæ
mederi facile sit.

Causæ ir-
ritæ hy-
drargyro-
scos.

Itaque operæ pretium est latentes causas curationis in ea methodo nam
sæpe insectæ retegere, modumque simul indicare, quo in posterum ab in-
fortunio caveatur. Sic illa curatoria methodus, quæ blandior, tutior,
faciliorque ab omnibus censetur, nota inefficaciæ unde male audit semel
purgata poterit ab omnibus tuto admitti non parvo therapejæ compendio,
maximoque ægrotantium emolumento. Sed cum ea quæstio obscura sit &
difficiles explicatus habeat, rem paulo altius repetere necessum est.

In causa
efficiente
quacun-
que requi-
ri & cer-
tum gra-
dum in-

Constat cum ratione, tum experientia effectum quemcumque causam
habere certam, quæ sit certi gradus, & quæ certo egeat temporis interval-
lo, ut efficax sit. Sic, ut exemplis utar vulgaribus & obviis, cera liquefcit
certo tantum gradu caloris, & eo caloris gradu quem certo temporis spatio
experta sit: Sic aqua congelatur certo tantum gradu frigoris & eo frigoris
gradu, cui per certum tempus objecta fuerit. Nulla arte, nulla opera fieri un-
quam

quam potest ut cera liquefeat, aut aqua congeletur, nisi causæ singulæ, a quibus singuli illi effectus producuntur, ad certum illum intensiōis gradum evehantur, qui effectui producendo correspondeat, & in subiecta agat per eam temporis moram, quæ ad effectus illos producendos requiritur.

Sic ergo & pari prorsus ratione profligatio & exterminatio semini syphilitici, qualitercunque fiat, 1. Certam ac determinatam in Mercurio vim & energiam postulat, qua in virus agat: 2. Certam ac determinatam requirit temporis diuturnitatem, per quam ea Mercurii quantitas in virus agat. Si alterutrum defecerit, luditur opera, neque unquam sperandum est fore ut virus venereum radicitus debellari possit, a causâ, quæ alterutro nomine imbellis, vel potius impar est.

Jam vero cum Mercurius homogeneus sit, & e particulis simillimis & simplicissimis totus componatur, quæ nullam in sanguine mutationem pati possunt, unde mutetur earundem efficacia, palam est certum illum virtutis & energiæ gradum, qui in adhibito Mercurio desideratur, ut virus venereum profligari & exterminari possit, non distingui ab ipsamet adhibiti Mercurii quantitate, atque adeo ad eradicandum morbi venerei formam necessum esse. 1. Certam ac determinatam Mercurii quantitatem sanguini syphiliticorum instillari, unde est certa adhibiti Mercurii efficacia: 2. Semel instillatam satis diu in eodem morari, unde æstimanda est certa temporis diuturnitas, quæ in agente Mercurio requiritur.

Liquet ergo duas esse leges in adhibendo Mercurio perpetuo observandas, si optato successu potiri quis velit; 1. Ut ea Mercurii quantitas, quæ ad perfectam luis venereæ curationem requiritur, agat in sanguinem & agat eo momento, quod producendo effectui aptum sit; sin secus enim, numquam vim in illum exertura, impetumve factura est ejus gradus, qui ad effectum necessarius est: 2. Ut admissa Mercurii quantitas in sanguinem pari eademque vi satis diu agat, ac incoactam in illo mutationem satis diuturno temporis spatio urgeat, donec totum sanguinem, vasa singula, recessus omnes pervaserit, ne quid in accessu uspiam supersit, ubi morbi fomes abdi, & unde recidiva pari possit.

Peccant in priorem quidem legem quicumque Mercurium dosibus æquo parvioribus & intervalis justo longioribus administrant, unde deest in sanguine ea Mercurii quantitas, quæ ad producendum effectum necessaria est: In posteriorem vero, quicumque affectam Mercurii administrationem citius quam par est, intermittunt, ex quo efficitur ut mutatio sanguini jam inducta satis diu non sustineatur, ut morbus radicitus possit extirpari.

Utrumque peccati genus frequens est in hydrargyrosi parciore. Hinc in illa methodo vani illi & irriti successus curationum Mercurialium, quibus mitigatur quidem symptomatum sævitia, malumque remittitur; sed quibus non deletur morbi fomes, nec proinde morbus funditus extirpatur.

Hinc

tenfionis
& ce iam
temporis
moram.

Duo eadem in
Mercurio requi-
riti, ut ef-
fectum præstare
possit.

Duas proinde le-
ges esse in adhiben-
do Mercurio ob-
servandas
1. Ut certa
dosi;
2. Ut certo
temporis inter-
vallo ad-
hibeatur.

Peccare in Priorem, qui Mercurium parvioribus dosibus administrant; & in posteriorem, qui hydrargyro citius intermitunt. Hinc fallaces illæ & male

certæ luis
venereæ
curationes.

Necque va-
lent argu-
menta,
quæ pro
damnata
methodo
afferun-
tur.

Argumen-
tum pri-
mum.

Argumen-
tum alte-
rius.

Solvitur
argumen-
tum prius

Hinc fallaces illæ morbi therapæ irritis ipsis successibus peiores, in quibus evanescunt quidem symptomata, unde ægrotantes male providi fausta omnia sibi temere despondent, sed quæ post breves inducias in recidivas abeunt priore morbo plerumque difficiliore.

Probe teneo quid illi errent, qui solent ad hunc modum Mercurio uti vel abuti potius, nec ignarus sum officiarum, quas sibi ipsi faciunt, ut methodum eam probent Mercurii & parciore quantitate & breviori temporis spatio administrandi.

Nempe circa prius sic argutantur; unciz tres unguenti mercurialis tribus frictionibus intra quinque dies ægrotanti illitz luem radicitus plerumque sanant. Ergo unciz totidem ejusdem unguenti frictionibus octo intra dies viginti duos administratz morbum eundem pari facilitate similique efficacia eradicaturz sunt.

Circa posterius vero sic amant sibi sueum facere. Constat, *inquiunt*, sanguinem totum per corpus pluries hora qualibet circumvehi. Possunt ergo mercuriales atomi in sanguinem celeriter distribui, universa corporis vala pluries hora qualibet legere & relegere, & causam morificam ubicumque lateat, efficaciter impetere; atque adeo debent intra spatium temporis opinione brevius morbum penitus delere.

At vero in utroque perinde hallucinantur. Circa prius quidem nec damus tres unguenti uncias ad curationem luis semper satis esse, nec ab omnibus in parciore hydrargyrosi uncias tres unguenti semper adhiberi, quod utrumque gratis assument. Sic ergo ruentibus præmissis conclusionem funditus ruere necessum est.

Verum ut etiam demus duas illas sumptiones, assumptio tamen non dabitur. Certum est enim haud leve discrimen inter collatos casus intercedere, 1. Ex diverso administrationis modo: 2. Ex inæquali intervallo, quod inter frictiones interjicitur: 3. Ex diversa mora, quam Mercurius trahit in sanguine.

1. *Ex diverso quidem administrationis modo.* Cum enim tres unciz unguenti mercurialis tribus frictionibus adhibentur, manifestum est frictione qualibet illini unciam unam unguenti, ex qua circiter semuncia Mercurii in sanguinem transfundi potest. Contra vero, cum unciz totidem frictionibus octo illinuntur, unguenti quantitas vice qualibet obliti non ascendit supra drachmas tres, ex quibus ad summum circiter sesquidrachma Mercurii in sanguinem exprimitur. Liqueat ergo momentum, quod potest a Mercurio exerceri in priore casu, esse ad momentum quod ab eodem exercetur in posteriore, ut semuncia est ad sesquidrachmam, seu quod idem est ut 8. ad 3.

2. *Ex inæquali temporis intervallo, quod inter frictiones singulas interjicitur.* Cum enim in priore casu frictiones altero quoque die administrantur, brevior-

viore intervallo quod horas 48. non excedit, parciore quantitas Mercurii ex præcedente inunctione admissi debet evanescere, unde tanto major futura est Mercurii summa ex frictionibus omnibus in sanguine collecta. Contra vero, cum frictiones tertio vel quarto tantum quoque die fiunt, longiore intervallo quod horas 72. vel 96. æquat, majus debet esse dispendium Mercurii præcedente inunctione intromissi, unde tanto minor futura est in sanguine solida Mercurii summa ex frictionibus omnibus reliqua.

3. *Ex diversa mora, quam Mercurii summa ducit in sanguine.* Nam in priore casu quantitas Mercurii quantacumque administratur, die ipsa quinta tota cum sanguine confusa adest, adeoque momento, quo maxime pollere potest, sanguinem impetit, ac virus exterminat per dies ad minus quindecim vel viginti. Contra vero in casu altero quantitas eadem Mercurii, tamen in illo quantitas eadem possit unquam sanguini simul inesse; quod sane ex præcedente articulo nequaquam credibile est, non ante collecta erit, quam die vicesimo secundo, atque adeo vix per diem unum, aut ad summum per dies 3. potest adunato impetu vim integram in sanguinem exercere.

Sic ergo colligere est Mercurium, 1. Parciore dosibus illitum: 2. Longioribus intervallis administratum: 3. Tardius in corpore adunatum, debilius momentum cum in sanguinem, tum in virus cum sanguine permixtum exercere, quam si majoribus & frequentioribus inunctionibus adhibeatur, utcumque cæteroqui supponatur eadem copia administrari; atque adeo quicumque crediderit posse utraque methodo luem veneream æque efficaciter profligare, credat idem oportet januam, quæ valido ariete impulsæ labat, posse perinde perfringi, si frustulis, in quæ aries ille dissectus fuerit, successive impetatur; aut murum, qui globo tormentario facile disjicitur, perinde diruendum esse glandibus minoribus, quarum ponderis summo pondus æquet globi tormentarii, & quæ singulæ vi eadem sed successive emittantur.

Jam vero circa posterius 1. Confitemur quidem sanguinem per corpus circumvehi pluries intra horam, sed hæc de majoribus tantum vasis vera sunt. Negamus enim ejusdem cursum in angustissimis vasculis æque celerem esse, atque per illa tam sæpe iterari. Ergo sequitur inde Mercurium inunctionibus admissum per majora quidem vasa satis prompte distribui: At vero sequetur inde nunquam pari celeritate distribuendum esse per intricatissimos glandularum viscerumque ductus, ubi latet potissima morbi causa.

2. Nihilominus ultro demus Mercurium per omnia corporis vasa, etiam minima mira celeritate distribui. Quid tum? An inde efficietur unquam ut Mercurius pari celeritate optatum effectum præster? Minime gentium nempe ad perfectam luis veneræ curationem singulæ sanguinis guttulæ pervadendæ & a seminio venero expurgandæ; perlustrandi recessus omnes

Solvi tur
posse-
rius.

in.

intricatifsimi viscerum, glandularum & medullæ ossium; obices demum; si qui ubicumque adsint, atterendi & dissipandi ita redituque multiplici; ad quæ singula tempus requiritur idoneum, quod experientia docuit diuturnius esse plerumque, quam quis prima fronte putaverit.

Ex his itaque palam est, ut jam redeat oratio, unde primum digressa fuit usui Mercurii ad lucem veneream extirpandam certos fines esse tum in administrandi modo, tum in administrationis diuturnitate, quos intra Mercurius morbum perfecte curet, curetque minima ægotantium ærumna: Quos ultra morbum curet etiam, sed majore ægotantium labore, imo sæpe non sine periculo: Demum quos citra ærumnam quidem minimam inferat, sed simul etiam curationem nullam vel imperfectam præstet,

Quocirca therapie mercurialis cardo in eo totus vertitur, ut certus statuatur modus tum quantitati adhibendi Mercurii, tum mercurialis administrationis diuturnitati, unde emolumentum quidem accedat quam maximum, curatio scilicet omnibus numeris perfectissima, damnum vero quam minimum accersatur, scilicet molestia noxæque quam levissima.

Sed hoc opus, hic labor est, quippe variam esse necesse est tum adhibendi Mercurii quantitatem, tum administrationis diuturnitatem pro morbi novitate vel inveteratione, diverso intensiōis gradu, partium affectarum natura aut affectionum specie, symptomatum numero & sævitia, atque ægotantium ætate, sexu, valetudine, quæ

Incerta (a) si tu postules.

Ratione certa facere, nibilo plus agas

Quam si des operam, ut cum ratione insanias.

Nihil ergo licet hac de re definire quod certum sit, ratione sola seu ut aiunt *a priori*, sed duce tantum experientia & ab effectibus, seu ut vulgo dicunt *a posteriori*. Quæ autem multiplici & iterata observatione hac in re maxime explorata ipse hæctenus habeam, lubet paucis exponere, ut si quis quid noveris istis rebus, candidus impertiat, si non his utatur mecum.

I. Itaque compertum est experientia Mercurium extirpandæ lvi venereæ parem esse, quoties legitimum pytalismum movet. Quocirca danda est opera ut salivatio ciat, non subitanea, tumultuaria, immodica, qualis in plenior hydrargyrosi, unde salivales glandulæ tumeant, oris interiora inflammantur, plura & profunda ulculcula in ore emergant, saliva ad libra octo, novem, decem defluat intra nycthemerum; sed placida, moderata, remissa, facile tractabilis, quæ ori inflammationem nullam, vel levem, quæ ulcera pauca & superficialia inferat, quæ unam aut alteram, vel ad summum tres salivæ libras intra horas 24. suggerat.

Igitur, statim atque ex tribus primis frictionibus innotuerit quid in ægotantis sanguinem Mercurius valeat, reliqua in hunc finem ita dirigatur

Palmarium esse, si certus ad ministrandi Mercurii modus definitur, tum in quantitate Mercurii, tum in administrationis diuturnitate.

At neutrum ratione definire potest, sed experientia. Quæ duce compertum est Mercurium ea quantitate adhibendum esse, ut blanda moveatur salivatio.

tur curatio, modo inunctionum dosim, modo crebritatem, modo crebritatem simul & dosim intendendo, ut salivatio ex votis tandem succedat, quæ si moderata, fovenda; si parcior, confirmanda novis frictionibus; si forsitan immoderata sit, reprimenda est, & ad modum reducenda ex artis legibus. Proinde ut ex cynoluræ aspectu navigationis cursus, sic ex salivationis præsentia & gradum mercurialis therapeia semper regenda est.

Errant igitur, qui putant salivationem incuranda lue venerea cane pejus & angue vitandam esse, ideoque in eo toti sunt ut parcissimas rarissimasque frictiones adhibeant: Sic enim operam ludunt suam, suosque deludunt ægrotantes.

Nec multo levius peccant, qui moram vel imminensem salivationem intempestivis purgationibus reprimunt vel coercent, atque adeo Mercurium, dum optato instat operi, evocant & amovent; sic enim id unum videntur agere, ut operose nihil agant.

Haud equidem nego aliquoties sine salivatione luem veneream feliciter extirpatam fuisse, quæ recens esset & levis, & quæ ægrotantes afficeret Mercurio facile obsequiosos: At vero pernego posse inde unquam colligi salivationem semper omittendam esse in curatione luis venereæ cujuscumque. Quasi vero, si quid semel iterumve prospere successerit casu vel fortuna, debeat illico inde exemplum sumi, quod in posterum norma fiat, etiam contra æquum & bonum: Aut quod pejus est, quasi nefas foret ad consilia tutius exequenda novis & munitioribus viis uti, quas indefessa rerum observatio feliciter parturit ad utilitates nostras. Næ mihi videntur, sic vitiligant non firmiore causa niti, quam si quis præfraete ideo contendant navigationis cursum sine pyxida nautica feliciter nunc regi & posse & debere, quod contigerit forsitan aliquando, ut in regenda navi ventis secundis acta pxyis nulli fuerit usui, vel quod constet Scriptorum testimoniis a veteribus olim pyxide destitutis satis feliciter aliquoties navigatum fuisse.

II. Altera curationis regula est ut promota salivatio nulla ratione prius cohibeatur, quam morbola symptomata, quæ a lue venerea ortum habent, evanuerint. Neque enim licet aliunde criterio ullo, quod certum sit de sanguinis dyscrasia emendata, de profligato luis seminio, demum de causa morbi funditus deleta tuto decernere, quam ex affectuum, quos morbus produxit, cessatione.

Errant ergo quicumque, non ex symptomatum curatione, sed ex solo dierum numero therapeiam mercurialem metiuntur & circumscribunt. Etenim quæ morbi gradus sanguinisque constitutio numquam sibi similes sint in diversis ægrotis, nihil ineptius fingi potest, quam methodum eandem adhibere singulis, & ut vulgari fertur adagio omnes eodem callopodio caleare, quod olim a Galeno, *Method. Medend. Lib. 9. cap. 16.* dictum

E c

m c-

Et mor-
tam sali-
vatio-
nem tan-
dium fo-
vendam
esse, dum
morbola
sympto-
mata eva-
nuerint.

memini in Medicos quosdam imperitos, qui non habita ratione temperamenti diversi eadem remedia omnibus admovebant.

Porro tamen noluerim otiose quisquam diutius expectet dum omnia symptomata evanuerint, quæ a lue venerea ortum ducunt. Neque enim sperandum est fore ut omnia semper evanescant, quandoquidem nec eadem est omnium natura, nec similis productionis ratio: Quippe alia luis venereæ symptomata, scilicet ea omnia quæ inducuntur solo humorum sive fluidorum vicio, aut ad summum erethismo solidorum & citra labem ullam ulteriorem, pendent a seminio venereo tanquam a causa *continente*, atque adeo inde necessario futurum est, ut sublata ea causa, hoc est prostrigato seminio venereo, ipsa quoque perpetuo tollantur. Alia vero, nempe ea omnia, quæ a qualicumque labe solidis illata nascuntur; pendent quoque ab eodem seminio venereo, sed tanquam causa simpliciter *conjuncta*, atque adeo licet posita ea causa ipsa posita fuerint, attamen consequens non est fore ut eadem sublata, hoc est exterminato seminio, ipsa quoque tollantur illico. Quæ dicta abunde indicant sedulo distinguendum esse inter diversa illa symptomatum genera, & diligenter cavendum ne remoto omni discrimine idem de omnibus judicium temere interponatur; sed de his fusius in sequentibus.

C A P U T X.

De Affectibus, qui post hydrargyrosin reliqui sunt, sed quibus medicina reperiri potest.

Peccant, qui ab hydrargyrosi nimium diffidunt, & qui eadem condunt nimium.

UT nonnulli adsunt, qui ab hydrargyrosi abhorrent sine causa, sic contra non desunt, qui eidem nimium credant. Illi sibi nihil non timent a Mercurio, ceu ab infido & male tuto remedio: Hi nihil non sperant ab eodem, ceu a certissima & absolutoria medicina; & si forte non putent fore ut inde rejuvenescant, quod Poetæ olim finxere de Ælone Jasonis patre, Madæ artibus juventæ reddito, ac putant certe se ab omni morbo liberos integerrimæ valetudini restitutum iri, quali olim ante conceptam luem maxime valuerunt. Sed utrique, dum diversi abeunt, in contraria peccant: Illi nempe, quod de Mercurio nimium diffidunt, cujus usus legitimus tutus est & periculi expers, ut supra probavimus *Lib. 2. capite 9.* Hi vero quod eidem confidunt nimium; quantumvis enim Mercurius remedium sit & opiferum & efficax, non ideo tamen sequitur hujus usu omnia symptomata, quæ a lue venerea inducta sunt, semper deletum iri, ut in sequentibus probabimus.

Jam supra *Cap. 5. §. 1. hujus Libri* vidimus tres esse luis venereæ species, primam, in qua virus paucum, benignum, recens admissum humores solos corporis, plures pauciorve inficit, illæsis partibus: Alteram tertiamque, in qua virus uber, acre, in veteratione auctum & multiplicatum

Duz sunt luis vene

rum ad organa varia corporis penetravit, partesque solidas non paucas læsit vitio multiplici, phlogosi, inflammatione, infarctu, tumore, gummato, skirrho, erosione, exulceratione, carie &c.

Prima quidem luis venereæ species perfectæ curatur hydrargyrosi legitima; nec sane mirum, cum enim virus venereum, quod in humoribus latet solidas corporis partes nondum vitiaverit, consequens est, ut si e sanguine cæterisque humoribus semel exterminetur, nullum illius vestigium extet, nec ullæ maneant morbi reliquæ: Et sane compertum est luem veneream eo successu totis curari, quoties recens & levis in solis humoribus etiamnum insidet. Solet quidem ab hydrargyrosi sanguini cæterisque humoribus, dum Mercurio atteruntur & subiguntur acrimoniz quidpiam non raro accedere, sed id plerumque leve est, & diæta humectante ac refrigerante, vel si opus fuerit, usu lactis facile emendatur.

At vero raro, vel potius nunquam accidit ut duæ aliæ luis species pari felicitate curentur. Utrumque enim remedio profligatum sit virus omne, quod humoribus inest, humoresque inficit, nihilominus tamen supersunt plerumque vitia illa, quæ solidis partibus morbo jam illata sunt; & quando supersunt, tandiu affectiones non paucas ex pristinarum genere & foveri & perennare necessum est, unde fit ut irrita spe plerumque doleant, quicumque male providi nec rerum satis gnari perfectam expectabant, numerisque omnibus obsoletam curationem inveteratæ luis venereæ, partesque solidas jam dudum insidentis.

Ex vitiiis autem, quæ in solidis partibus post exterminatum virus venereum supresse solent, possunt alia arte atque remedii emendari, & hinc proveniunt affectiones superstites quidem luis venereæ, sed tamen sanabiles, de quibus in hac: Alia vero nequeunt nec opera nec medicina ulla corrigi, & hinc fiunt affectiones non modo luis venereæ superstites, sed etiam omnino insanabiles, de quibus in sequente Capite agemus.

Ideo mihi visum est hoc argumentum accuratius tractare, quod exploratum habeam quanti referat in medicina syphiliticis facienda prius nosse, quid de singulis morbi symptomatis sentiendum sit atque prælagendum, quam hydrargyrosi adhibeatur; nam ut ait Celsus, *Lib. 5. cap. 26. ars. 1. Ante omnia scire Medicus debet quæ insanabilia sint: & quæ difficilem curationem habeant, quæ promptiorem. Est enim prudentis hominis, primum cum qui servari non potest, non attingere, nec subire speciem ejus ut occisi, quem fors ipsius interemit: Deinde ubi gravis metus sine certa tamen desperatione, indicare necessariis periclitantis in difficili rem esse, nisi victa ars malo fuerit, vel ignorasse vel seselesse videatur. Sed recta subdit ille, ut hæc prudenti viro conveniunt, sic rursus histronis est parvam rem attollere, quo plus præstittisse videatur.*

Cæterum in enartandis affectionibus illis tum prioris tum posterioris

reæ species, altera, quæ humores tantum inficit, altera, quæ solidas partes lædit.

Prior plerumque perfecte curatur hydrargyrosi. At posterior etiam curatæ supersunt ut plurimum vitia quæ solidis jam illata sunt.

Ex vitiiis illis aliæ insanabiles affectiones constituunt. Plurimum interest utrumque affectionum genus distinguere.

generis, quæ post hydrargyrosim legitimam reliquæ solent esse, ordine singulas ita persequemur & in isto & in sequente Capite, ut primum quæ frequentius, deinceps vero recenseantur quæ rarius occurrunt.

§. I. GONORRHOEA.

I. Gonorrhœa, sive phlogodes fuerit & recente contagione contracta sive inveterata & in habituale seminis profluvium jam degener, hydrargyrosi etiam legitimæ plerumque superesse solet, non quidem virulenta, qualis fuit ante inunctionum ulum, sed simplex, quam virus nullum jam foveat, & quæ proinde contagione communicari amplius non possit. Retinet hæc in viris gonorrhœæ nomen, sed in mulieribus cum fluore albo seu muliebri fluxu confundi solet, quo nomine amant illæ reliquias male curatæ gonorrhœæ prætexere.

Quare quæ recens est? Vidimus supra *Lib. III. cap. 1. §. 2.* virulentam gonorrhœam, quæ recentè contracta est, pendere semper a phlogosi vel inflammatione ulcerosa, in viris urethræ, glandularum cellulolarum in urethram hiantium, glandularum Convperianarum, prostaticarum aut vesicularum seminalium: In foeminis vero urethræ, cellularum quæ in urethram patent, prostaticarum, glandularum Convperianarum, aut glandularum botryformium, quibus vaginæ facies constrata est. Potest autem phlogosis & exulceratio in una aut pluribus enumeratarum partium semel insidens aliquandiu superesse, etiam post seminium omne hydrargyrosi discussum & exterminatum. Haud igitur mirum esse debet, quod post hydrargyrosim rite administratam gonorrhœa recentè contracta supersit aliquando in utroque sexu.

Quare quæ inveterata? Vidimus pariter ibidem, *cap. 3. §. 3.* gonorrhœam inveteratam, quæ neglectu abiit in habituale seminis stilicidium, pendere in viris vel ab aucta amplitudine, vel a nimia laxitate & atonia ductuum excretoriorum, quibus cellulæ per urethram sparsæ, vesiculæ seminarie glandulæ Convperianæ, & prostata in urethram patent: Quod de foeminis quoque verum est, si pro vesiculis seminalibus, quibus carent, intelligas vesiculas sive glandulas racematim congestas, quæ internam vaginam convestiunt. At vero post curatam luem veneream permanet eadem tum amplitudo, tum atonia ductuum illorum, ac fuit antea. Ergo consequens est ut maneat etiam habitualis eadem gonorrhœa in utroque sexu.

Utraque illa gonorrhœæ species, licet curationem perfectam non admiserit, sensit tamen vim & energiam Mercurii, cum pristinam malitiam deposuerit. Namque post hydrargyrosim neutra nec seminio jam fovetur, nec ullum seminium ipsa fovet; neutra virulenta est; neutra contagione traduci potest; sed ambæ jam simplices & sine fomite ullo, a simplicibus partium vitiis pendent, quibus sanandis sufficit aliquando mora temporis & legi-

Utraque tamen Mercurii efficaciam sentit.

& legitima diæta; quibus tamen, ne diuturnitate noceant, satius est adhibere remedia, qualia supra jam proposuimus, *Lib. III. cap. 1. & 3.* nempe 1. Quæ demulceant nativam vel adventitiam sanguinis & cæterorum humorum acrimoniam. 2. Quæ affectarum partium ulcera eluant, detergant, mundificent. 3. Demum, quæ pristinum partibus laxioribus tonum restituant.

Itaque 1. Exhibeatur aliquandiu, vel semel in die & mane; vel bis, mane atque sero, lac asininum, caprillum, aut vaccinum: Primum quidem & alterum purum & sincerum; tertium vero vel sincerum & impermixtum, vel æqua parte decocti hordei, aut graminis, aut radicis symphyti alteratum, prout ægro lubitum fuerit aut Medico visum.

2. Deinde poter æger cum regimine ad libras tres quatuorve mane jejuno ventriculo, per dies quindecim aut viginti, aquas minerales acidulas vitriolicas chalybeatas, ut *les eaux de Fougès, de Capverd, de Passy &c.* quales nullibi non scaturiunt, & quæ in Galliis nostris præsertim frequentes sunt.

3. In usum veniant ballamica, quæ latentes in urethra exulcerationes detergant & ad cicatricem ducant. Præstant autem inter cætera balsamum Copaivanum & Canadenie cujus alterutrius guttæ sex, octo, vel duodecim possunt alternis diebus per hebdomadam unam aut alteram devorari, cum pulverato saccharo in boli speciem conformata. Juxta Frideric. Hofmannum, in *Clavi Pharmac. Schroederiana, Lib. 3. cap. 13. art. 158. Saccharum Saturni in ole terebinthina solutum & leni calore cinerum digestum egregium & fere divinum præbet in gonorrhœa remedium, in primis si aliquid addatur camphoræ.* Illius dosis est aliquot guttas in idosæo vehiculo.

4. Intus assumantur astringentia ex blandiorum genere, quæ ulcerata loca exsiccent, & relaxata dentent atque constipent, ut 1. Haustus Teisiformes ex infusis foliis menthæ, marrubii, agrimonie, plantaginis, rosarum, burse pastoris, pilosellæ, salviæ, melistæ, viridis, capreolis ejuldem, aut summatibus rubi. 2. Aqua composita menthæ a Josepho Quercetano descripta in *Pharmacopœa Dogmaticorum restituta* & a Lazaro Riverio sæpius laudata ad gonorrhœas contumaces. *Observat. 25. & 36. Centuria prima, & Observat. 30. & 74. Centuria 2.* cujus descriptio infra *Cap. XII.* proponetur: Aut aqua destillata ex fructibus brusci, quam laudat Samuel Formius Chirurgus Montpelienensis, 47. *Observationum* quas cum Riverio communicavit. Aquæ utriusque dosis est ad cochlearia duo mane jejuno ventriculo per dies aliquot. 3. Opiatæ sive boli ex coralliis præparatis, terra Japonica, vulgo *Catechu* sive *Cachou*, balauistiis, malicorio, sanguine draconis, terra sigillata, bolo armena, lapide hæmatite, alumine dulci, cornu cervi usto, ebore, ossæ sepiæ, camphora, & præsertim croco Martis astringente, quorum singulorum dosis est a gr. x. ad xx. Celebrantur ad eundem usum in *Pharmacopœa Bateana* pilulæ decreta Palmarii ad ðj. vel jī. pro dosi quali-

Quæ curatio utriusque gonorrhœæ adhibenda sit?

bet, quarum dispensationem infra vide ad *hujus Libri* calcem. 4. Conserva astringentes, ut rosarum rubrarum, cydoniorum, fructuum cynosbati; foliorum methæ vel rutæ, prunorum sylvestrium, & præsertim fructuum brulci, quarum dosis est a 3j. ad ij. si seorsim præscribantur.

5. Prodest etiam aqua Rabelii, cujus parandæ ratio infra proponetur *Cap. XII.* Solet autem hæc aqua ad gratam aciditatem instillari guttatim libræ i. aut libris ij. pitulanz vulgaris, quæ per dies aliquot continuos addito syrupo quocumque, v. g. capillorum veneris, vel violaceo, exsorbenda offeruntur per intervalla mane quidem jejuno ventriculo, vel post meridiem sed longissime a pastu. Potest etiam aqua eadem ambra grisea vel myrrha imprægnari ex methodo infra proponenda *Cap. XII.* & ad guttas vj. viii. x. exhiberi quotidie per dies aliquot in bolo aut vehiculo qualicumque; quo remedii genere ab egregio Viro narrari memini gonorrhœam habitualement nuper felicissime curatam fuisse, cui reprimendæ cætera remedia imparia fuerant.

6. In urethram in viris, in scæminis in vaginam immittantur syphonis ope injectiones ex infuso decoctove eorumdem remediorum in aqua calcis secunda; vel ex dissolutione lapidis styptici, qui vulgo *de Verny* dicitur, cujus processum infra describemus ad hujus Libri calcem, aut lapidis medicamentosi Crollii. Sed ea caute & parce adhibeantur velim, ne acrimonia phlogosin excitent, vel repentina nimiaque adstrictione prostaticarum & vesicularum seminariorum emissaria nimium constipent.

7. Denique si laxitas in causa fuerit, cur oscula ductuum seminariorum præter naturam hiantia seminale humorem, quem laxius concludunt, stillatim profundant, proderit embrochen aut balnea aquarum thermalium, ut sunt *les eaux de Balaruc, de Bourbon, de Barege, d'Aix la Chapelle* &c. experiri, quæ ad partium tonum firmandum efficaciter valent.

§. II. PORRI VENEREL

II. Porri venerei, qui in partibus pudendis insident, cum æcentes, exiles, molles sunt, exterminato per hydrargyrosim seminio venereo unde psonati fuere, solent aliquando marcescere, arefieri & sponte decidere. At contra nonnumquam, præsertim si crassiores, duriores, & altius radicati fuerint, etiam post hydrargyrosim legitime administratam integri permanent, quod nutritivum pediculo succoso jugiter in illos illabatur; haut dilpari modo ac in verrucas quarumcumque partium solet illabi, quæ lucem veneream causam non habent.

De futuro porrorum exitu haud difficile est judicium ferre, dum hydrargyrosim ad finem jam properat, atque adeo naturæ viribus & remedii efficaciz permittendi, si sponte videantur delapsuri Sin aliter, 1. Forfice pro-

xime

Quaratione curandi sint si post hy

xime ad cutim refecandi sunt, ac si basis mollis fuerit utendum emplastro confecto ex æquis partibus emplastri Vigonis quadruplicato Mercurio, & emplastri Diachyli cum gummis, quo promoveatur blanda suppuration & absoluta callorum resolutio, si qui forsan exigui basi substrati sint, priusquam recisorum pororum plagæ cicatrice solidescere permittantur.

2. At vero si basis durior sit, & multis, duris, atrisque callis obsita, tunc ut supra dictum est *Lib. III. Cap. 9.* leves in vicinia inunctiones mercuriales identidem repetendæ, & resectis porris superimponendum unguentum basilicum cum addito præcipitato rubro, ut callis partim erosione, partim resolutione sensim evanescentibus emollita ulcerum ora possint sine periculo recidivæ in cicatricem duci.

3. Imo vero possunt, si ita videatur, efficaciora cathartica in usum advocari, qualia supra proposuimus *loco jam laudato*; sed raro vel fere numquam accidit, ut iis opus sit post hydrargyrosim rite administratam, cum legitimus inunctionum usus plerisque callis certam & efficacem medicinam jam attulerit.

§. III. PHIMOS ET PARAPHIMOSIS HABITUALIS.

III. Contingit aliquando in viris, quibus tumuit balanus aut præputium ab ulcusculis venereis, & qui ideo phimosis vel paraphimosis experti sunt, ut curatis ulcusculis; imo etiam exterminato morbi semine ulu mercurialium inunctionum, phimosis tamen aut paraphimosis habitualis remaneat, unde constrictum præputium deduci, aut corrugatum adduci non potest. Hoc utrumque infortunii genus frequens est quoties præputii tumor & diuturnus & skirrhodes fuit, in quo scilicet constrictæ vel corrugatæ præputii fibræ impacta limpha turgent ita indurata, ut Mercurii efficacia eludatur.

Adest & in fœminis quadumque morbus tum natura, tum causa proxime congener, nempe præternaturalis coarctatio muliebrium, maxime ostii vaginæ, seu phimosis habitualis constrictione vel coalitu inducta. Causa utraque familiaris est fœminis, quarum vulva ac vaginæ principium ulcusculis venereis multis, spissis, profundis, callosis male affecta fuerunt; neutra vero adhibito etiam Mercurio fere unquam cedit.

Id mali in utroque sexu natura leve est, & facile tolerari potest, ut quod nec periculum vitæ nec gravem molestiam inferat. Attamen cum generationis operi officiat, si medicinam ideo facere lubeat sequenti methodo facienda est.

1. Paretur de coctum mucilagineum & emollies ex radicibus alchææ, Metho-
nymphææ, liliorum alborum; foliis brancæ ursinæ, malvæ; seminibus
lini, psylli &c. in quo tepente penis totus intingatur per horam unam aut
alteram bis in die. Reliquo diei tempore totum penis caput cataplasmate ex
cum in

Ec 4

pul-

drargyro-
sim rema-
neant?

III. Phi-
mosis &
paraphi-
mosis ha-
bitualis
in viris

Phimosis
in fœmi-
nis.

viris, tum
in femi-
nis.

pulpa radicum, foliorum, seminumque decoctorum circumtegatur; aut saltem tepide foveatur linteis decocto illo madidis, sæpiusque renovandis. Imo vero in phimosi decoctum idem subter præputium syphone infundendum est, ac in primam, qua præputium dehiscit, intrudendus penicillus, vel tenuis spongia; quæ eodem decocto perfusa sint, ut ea ratione corrugata præputii fibræ decoctum alte, perpetuo, undique imbibant, quo tandem mollescant & relaxentur.

2. Similiter in fœminis debent muliebria ac vaginæ principium decocto eodem sæpius in die foveri, atque pulpa plantarum seminumque decoctorum linteis obducta in formam pessarii, aut quod plerumque expeditus est, pessarium linteum, vel spongia decocto illo e molliente imbuta in vaginam immitti, ut hac opera constrictæ partes humere emolliente jugiter madeant & humescant.

3. Emollita semel loca mechanica quavis arte caute tamen dilatanda sunt, ut nativæ amplitudini sensim reddantur: Nempe in parapimosi subter præputium pone glandis coronam corrugatum, quod manu sinistra molli-ter retinendum est, balanus blande intro repellendus, præputium antrosum simul adducendo, & illius rugas paulatim explicando. In phimosi vero rima; qua præputium pervium est, paulatim amplianda est speculo ani, quod summo apice primum introductum, dein pedetentim explicatur. Demum in fœminis constrictum vaginæ principium, intruso ani vel matricis speculo, gradatim dilatandum est simili methodo, quæ singula pluries sed modice & caute repetenda sunt; donec emolli- tione & distractione alternantibus corrugata partes pristinae amplitudini sensim & sine sensu restituantur.

4. Quod si ea non succedant, sectione utendum est, nempe in paraphimosi plicæ corrugati præputii hinc & inde perpendiculari & satis alta plaga incidendæ, ut laxatum præputium libere adduci: In phimosi vero annulus constricti præputii hinc & inde fornice dissecandus, ut præputium deduci possit. Solent autem in utroque casu penis latera ad sectionem eligi, quod anatomia compertum sit illa paucioribus & tenuioribus vasis sanguiferis perlui, unde minoris hæmorrhagiæ periculum. Cæterum vulnerata loca ex artis legibus curanda sunt, primum digestivo, & dein balsamo Arcæi, diligenter cavando ne cicatrix in angustias contracta præputii deductioni & adductioni obesse, & morbum renovare possit.

5. In mulieribus sectioni nullus locus est, nisi aperte liqueat phimosis pendere a coalitu laterum vaginæ vel vulvæ, quæ possint proinde sine periculo sectione divelli. Sin aliter a sectione omni abstinendum est, neque enim licet tunicas vaginæ in anulum corrugatas & constrictas temere medias discindere plaga difficilis futura sit, cum cicatrix plagæ inducenda locum denuo coactura sit. Sed quid in his diutius morar? Quasi vero mulieres illæ, quæ in venerea palæstra jam pridem meruere, nostra curarent

con-

consilia, opemque implorarent, & non mallent e mentitam illam virginitatem incauto cuidam, sed opus strenuo juveni concedere, cui se pertundendas præbeant.

§. IV. CONDYLOMATA ET CRISTÆ.

IV. Spes nulla est fore ut condylomata, cristæ, fraga, mora, fici, Condylomata, cristæ, & extenuatæ sponte unquam desistant; quippe quod lato, crasso, succoso pediculo radicatæ nutrimentum uberius accipiant. Quocirca abjecta omni cunctatione, in hydrargyrosi ipsa, cum ad exitum vergit si æger viribus fatis valeat; si vero infirmus sit post instauratas vires aliquot dierum induciis, deradendæ & detondendæ sunt quam proxime ad cutim; calli, si qui in basi subsint, carhæreticis exedendi vel igne adurendi; demum plaga superstes suppuranda, detergenda & cicatrice obducenda est ex artis legibus, quas supra proposuimus *Lib. III. cap. 10.*

§. V. FISTULA ANI, ET LACRYMALIS.

V. Idem esto iudicium de fistula ani, quæ a lue venerea ortum habet. Læter aliquando inter ipsas ani sicos mariscasve, aliquando vero absque lærescentiis ullis tacitos agit cuniculos, sed ideo in utroque casu hydrargyrosi cedere perinde nescia est, quod pus saniesve, quæ sinuum anfractus suppleant, cum purgari & extergi nequeant, virium perpetuent. Idcirco omili quoque methodo, dum hydrargyrosi ad exitum properat, vel saltem postquam æger viribus infirmior ab hydrargyrosi aliquantisper convaleuit, ani fistula sinibus omnibus diligenter prius exploratis incidenda est; putrida & ulcerata labra resecanda; profundiores calli, si qui forte adsint, vel summis forficibus statim excindendi, vel cateriticis paulatim absumendi; denique vulnus emollitum suppuratum, deterfum, mundificatum ad optatam cicatricem deducendum est, qua de re consuli velim Auctores, qui de Chirurgicis operationibus nuper scripsere, vel si lubuerit, Diatribam quam de ani fistula publici juris olim ipsi fecimus.

Quæ autem de ani fistula dicta sunt modo, debent eadem intelligi de fistula lacrymali sive Ægrilope, si a lue venerea ortum ducat, cui curandæ manum prius admoveere nefas est, quam seminium venereum, quo fovetur, hydrargyrosi profligatum fuerit.

§. VI. DOLORES RHEËMATICI ET ARTHRITICI.

VI. Experientia notum est dolores rheumaticos, arthriticos, & ischiadicos, VI. Dolores rheu-

Condylomata, cristæ, & extenuatæ sponte unquam desistant; quippe quod lato, crasso, succoso pediculo radicatæ nutrimentum uberius accipiant. Quocirca abjecta omni cunctatione, in hydrargyrosi ipsa, cum ad exitum vergit si æger viribus fatis valeat; si vero infirmus sit post instauratas vires aliquot dierum induciis, deradendæ & detondendæ sunt quam proxime ad cutim; calli, si qui in basi subsint, carhæreticis exedendi vel igne adurendi; demum plaga superstes suppuranda, detergenda & cicatrice obducenda est ex artis legibus, quas supra proposuimus *Lib. III. cap. 10.*

V. Fistula ani contra Mercurium pervicax sectione curanda est.

Idem dicendum de fistula lacrymali.

VI. Dolores rheu-

matici &
arthritici
foventur
a triplici
causa con-
tra Mer-
curii effi-
caciam.

dicos, tum cum maxime a seminio venereo produci creduntur, plerumque tamen legitimæ hydrargyrosi superesse, dum cætera luis symptomata avanescent: Quod videtur a triplici causa pendere, 1. Ab acrimonia, quam sanguis ab admixto contagio venereo contrahit, unde falsior acriorque limpha tendineis fibrosisque partibus infunditur: 2. A visciditate nimia sanguinis & limphæ, unde tardius per angusta partium vasa circulantur, & in iisdem hærent stagnantque facilius: 3. Ab atonia & laxitatorum, tendinum & musculosarum tunicarum staminibus, unde futuræ falsioris limphæ stagnationi facilius patent.

Hinc ergo liquet ad dolores illos, qui curato morbo venereo superstitēs sunt, leniendos, vel quod pluris interest, discutiendos, vitiis sanguinis & limphæ, ac atoniæ tendinarum fibrosarumque partium occurrendum esse.

Eo-um-
dem the-
rapeia.

Itaque 1. Præmissis universalioribus remediis, conducunt in falsa & muriatica sanguinis dyscrasia, 1. Omnia lactis genera, ut asinum, caprillum, vaccinum; semel, bis in die, pro omni alimento, per duos, pluresve menses; modo ventriculus digerendo par sit: 2. Juscula ex pullo gallinaceo juniore, vel frustulo carnis vitulinæ cum herbis temperantibus, cichorio silvestri, borragine, scolopeddrio, fumaria, agrimonia, pimpinella, nasturtio aquatico &c. 3. Aquæ minerales acidulæ per plures dies epotæ ad libras ij. vel iij. iv. ve qualibet die.

2. Conferunt in viscida sanguinis constitutione, 1. Blanda sudorifica, quæ sanguinem atterant, & excedentem sanguinis muriam diuresi vel diaphoresi excludant, ut decocta & bocheta ex lignis, corticibus, radicibusque sudorificis, ut ex ligno Guaiaco & lassafra; cortice Guaiaci; radicibus Chinæ, salsæ-parillæ &c. quorum duo vel tres haustus absorbentur in die per hebdomadas duas. 2. Juscula ex viperis vel colubris quæ per dies 14. vel 20. repetuntur cum debito regimine.

3. Quod si ea sanguinis vitia, acrimonia nempe atque visciditas una concurrant, tunc necessum est proposita quoque remedia conjunctim vel alternatim exhiberi. *Conjunctim* quidem, ut si lac decocto sudorifico alteretur, aut si horis serotinis jusculum ex vipera, matutinis lac præbeatur: *Alternatim* vero, ut si sudorifica decocta vel viperina juscula lacti jusculisque temperantibus; lac vero jusculaque temperantia decoctis sudorificis, jusculisque viperinis per vices succedant.

4. Dum hæc intro adhibentur, ut emendentur vitia sanguinis, extus faciunt ad firmandum partium dolentium tonum 1. Fricationes siccæ cum panno laneo molliore ad cutis ruborem: 2. Inunctiones multigenæ cum axungia ursi, taxi, viperarum, serpentum humana &c. cum oleo chamæmelino, laurino, anethino, ruraceo, scorpionum Matthioli, catelorum, lumbricorum, nucistæ, laterum sive philosoporum &c. cum sapone duro & spiritui vini vel aqua vulneraria &c. cum balsamo tranquillo, & aliis hujus generis excentis:

3. Exer-

3. Exercitationes jejuno ventriculo ad madorem usque: 4. Usus quotidianus subuculæ lanæ quæ ad cutim proxima sit &c. quæ si irrita sint aut minus efficacia ad embroches, balneaque thermerum, præsertim earum quæ sunt e sulphurearum genere, confugiendum est, quasi ad sacram anchoram.

5. Cæterum diligenter inquirendum est, num dolores illi qui curatu difficiles sunt, a seminio scorbutico forte proveniant, de quo conjectura erit ex ulcerosa gingivarum putredine, aut ex rubris, violaceis, nigris tibiæ maculis & vicibus; quæ si appareant, iis remediis potissimum insistendum erit, quæ adversus scorbutum efficacius valent, de quibus supra hujusce Libri *Cap. 6. §. 3. art. 3. n. 5.* iis tamen non omissis, quæ modo proposuimus.

§. VII. HERPETES ET LICHENES.

VII. Nec dispari fere methodo herpetibus, lichenibus, impetigini, cæterisque cutis vitis medendum est, si post ulum hydrargyroscos permaneant, quod non rarum; aut quod frequentius est, si per intervalla renoventur. Nam cum utrumque repeiendum sit, ut de doloribus modo dicebamus, 1. Vel ab acrimonia sanguinis, aique adeo humoris sebacei & mucosi, quibus cutis jugiter madescit: 2. Vela a viciditate eorumdem humorum, præsertim quæ cum acritate conjuncta sit: 3. Vel ab ulcerosa mollitie glandularum corporis reticulati seu mucosi, & superjectæ cuticulæ, quæ viciosos succos a sanguine facile imbibant *filtri* instar, consequens est ad affectiones illas cutaneas radicitus curandas adhibenda esse.

1. Eadem remedia, quæ modo proposuimus adversus eadem sanguinis vitia, humorumque qui a sanguine scaturiunt, acrimoniam scilicet aut visciditatem morbosam. VIII. Herpetes & lichenes.

2. Cum iisdem jungenda esse, quæcumque contra cutis vitia valent, si illinantur, ut sunt lucci expressi e radicibus lapathi acuti, ciclaminis, foliisque arthemisiæ, & nicotianæ; aqua calcis, aqua sale marino saturata; oleum carthæ, tritici adusti, tartari per deliquium; lana succida ad nigrorem in olla clausa torrefacta, pulverata, & in aqua roforum diluta; præcipitatum rubrum vel album cum pomata quavis permixtum, ea dosi quæ idonea visa fuerit; aqua phagedænica &c. quæ quidem, ut gradu varia sunt, sic etiam majore vel minore cautione debent admoveri. Quomodo curantur.

§. VIII. RHAGADES MANUUM.

VIII. Raro & insolenter accidit in iis, qui se corpusque molliter curant, ut volæ manuum plantæque pedum ullis unquam deturpente r rhagadibus in lue venerea, propterea quod manuum pedumque cutis sæpe lota, VIII. Rhagades manuum.

nec

nec labore attrita tenuior est molliorque, quam ut in fissuras dehiscat. Contra vero id mali haud infrequens est in iis, quibus manuum volæ, pedumque plantæ squallore & labore ita occalescunt & exsiccantur, ut rimas sponte agant, quæ affluxu virulenti humoris in dies ingravescent.

Curantur
iisdem re-
mediis ac
ac herpe-
tes.

Adversus rhagades, si quæ hydragryrosi superflint, utilia sunt remedia omnia, quæ mox contra herpes proposita sunt, quibuscum videlicet rhagadia natura & causa proxime convenire certum est. Inter hæc autem prælentissima sunt præcipitata Mercurialia omnia cum pomata quavis ad mixta, majore vel minore dosi pro diversa morbi malitia.

§. IX. ULCERA CONTUMACIA.

IX. Ulce-
ra contu-
macia ex
quatuor
causis.

IX. Solent ulcera, quæ in diversis corporis locis fiunt a phymatis, nodis, gangliis, gunnatisve abscedentibus, & quæ proinde a venerea causa certissime proveniunt, post adhibitam etiam hydrargyrosim cicatricem tarde trahere, nec si ampla fuerint, sanari plerumque nisi latis longo post intervallo.

• Modo tamen ulceris confinia mollia neque valde caleant, neque intense rubeant, neque insigniter tumeant; modo caro, quæ ab ulceris fundo succreuit, firma, densa, gronosa, roseique coloris sit; modo demum pus, quod ab ulcere manat, paucum, spissum, læve, album sit, & limphæ nutritiæ seu rori partium simillimum, res salva est. Hæc enim indicant ulcus ad curationem feliciter quidem tendere, sed ut coalescat, paulo longiore temporis mora opus esse, facile & tuto concedenda.

Sin vero hæc contra ac dico, essent omnia, vel saltem pleraque, gravis inde noxa foret, & quæ perdifficilem curationem habitura esset. Solent autem ulcera istiusmodi, quæ post exterminatum virus chionia & dysepulota sunt, quadruplicem causam agnoscere, 1. Sinus & cuniculos per vicina ulcerum labra latenter suffositos, unde pus foetidum jugiter effluit: 2. Cariem subiecti ossis, unde purulentum ichor perpetim manat: 3. & 4. Morbificum in sanguine seminum scorbuticum strumofumve, quibus inficitur limpha nutritia, quæ ad reparandum ulcus appellit, unde certa perniciēs ulceri continuo affertur.

Prima causa dignoscitur tumore, dolore, calore, rubore, renitentia partis cujusdam ulceri confinis; affluxu puris aut purulenti ichoris, dum pars illa de industria premitur; denique specillo, quo suspensa manu per obvium ostium introducto sinus latentis situm, altitudinem, directionem explorare facile est.

Patet altera, si labra, neque tumeant, neque doleant, neque renitentur, & ulcus tamen cicatrici repugnet; si ulceris fundus licet deterfus spongiosa, molli, facile in putredinem colliquefcente carne oppleatur,

&

& ichore fœtido perpetuo madescat; demum si visu vel specilli attractu palam se os subjectum nudatum, scabrum, asperum, inæquabile, foraminulentum, uno verbo cariolum esse.

Tandem innotescunt tertia & quarta signis, quæ seminium scorbuticum vel strumosum solet indicare: *Scorbuticum*, si gingivæ fœteant & putrescant, aut si tibiarum maculis conspersæ livefiant: *Strumosum*, si ulcus in glandulosa parte insideat, si ulceris basis skirrhodes sit, si glandulæ aliæ, sive ulceri confines, sive in aliis locis sitæ, simili tumore skirrhode laborent.

De tribus ultimis causis mox agemus articulis sequentibus. Nunc de prima tantum causa ulceris Chironii questio est, nempe de fistulosis sinibus.

Certum est & indubiatum Chirurgiæ axioma vulnera ulcerave tutius, citiusque nunquam sanari cæteris paribus, quam dum reclusis recessibus cunctis omnia sunt in propatulo, & ita obvia ut pus nullibi lateat, singulaque loca suppurari, detergi, elui & mundari facile possint.

Itaque 1. Si commodè fieri possit, sinus omnes quantumque sint incidendi, forficibus quidem si cutanei; scalpello, *bistouri* dicto, quod specillo sulcato in sinus immisso rogatur, si altiores fuerint; labraque pendula hinc & inde refecanda, ut ad fundum facilius pateat aditus.

2. Præstat tamen aliquando, ut sectioni parcatur, si longior sinus ad oppositam partem proxime attingat, ex adverso aperturam facere, unde gemina pateat via puri exiturienti, facilisque sit ultro citroque commearius, ut omnia possint injectionibus probe elui, & immixtis medicamentis facile detergi.

3. Quod si ulceris situs, partiumve adjacentium natura neutrum permittat, saltem necesse est ostium sinus ita dilatare scalpello hinc & inde, vel admotis cathæreticis ita ampliare, ut fundus oculis, digitis, remediis facile obvis fiat; affectamque partem ita deligare, & in eo situ retinere si liceat, ut a fundo sinus in plagam via declivis sit puri effluxuro.

4. His ita comparatis tota ulceris facies ex arte suppuranda digestivo simplici, vel cum oleo hyperici, imo cum tinctura myrrhæ, si odorem spiret fœtidum & graveolentem ac colorem sublividum præ se ferat. Postea iteratis injectionibus eluenda, nempe decocto hordei cum melle rosaceo, decocto agrimoniarum, hyperici, betonicæ, bugulæ &c. & balsamo Arcei curanda, quorum si carnes luxuriaverint, proderit admiscere balsamum viride Metense. Quod si carnes molliores & fungosæ videantur, reprimantur pulvere insperso aluminis usti, vel levi attractu lapidis infernalis, ac demum cicatrix advocabitur appositione linamenti carpti, aut usu pulveris terebinthinæ coctæ, cæterorumve epuloticorum.

5. Dum ea extraheruntur, intra adhibenda sunt quæ ad corrigendam sanguinis dyscrasiam faciunt, nempe epicrastica seu temperantia & edulcantia, sola scilicet, qualia modo proposuimus *hujus Capitis* §. 6. si pifera
fia

Quomodo
primæ
ex illis
causis me
dendum
sit.

sia falso-muriatica sit; edulcantia vero cum diaphoreticis & attenuantibus permixta, qualia protulimus *ibidem*, si ex acri oleosa sit viscidaque.

6. Profuit aliquando labra, confiniaque ulcerum chironiorum, quæ a seminio venereo ortum primum habuerunt, unguento mercuriali identidem illinere, quod callos, si qui adsint, resolvit, quod vitia lymphæ ad ulcus confluentis emendat, ideoque ad laborum mollitiem & cicatricis progressum utilissime confert.

7. Denique in ulceribus chironiis, quod de doloribus quoque & herpetibus, qui post curatam luem veneream supersunt, volumus intelligi, utile est fonticulos occipiti, brachiorum aut poplitum alterutri inurere, qui partem acrioris lymphæ educant, vel avertant saltem ad effectio loco.

§. X. CARIES OSSIUM.

X Offium
caries, &
diversæ
cariæ spe-
cies.

X. Caries venerea, qua ossa tentantur, hydrargyrosi etiam rite administratæ raro sponte cedit; nec sane mirum cum ad ejus curationem opus sit & operosiore therapæia, & diuturniore temporis intervallo.

Os carie affectum modo carne & perioestio plane denudatur & oculis ipsis obvium est: Modo contra carne tegitur, sed molli, fungosa, sanguinolenta, quæ nunc rubicunda est, nunc albida, nunc sublivida, & quæ subjecto ossi non adhærescit. Prior manifesta; posterior occulta caries dicitur, sed quam tamen dignoscere facile est ex natura carniū, quæ ulceris fundum replent; ex ichore graveolente, quod eodem confluit; demum quæ certissima exploratio est, ope specilli, cujus tactu liquet os subiectum detectum & nudum esse atque cariosum.

Hoc utrumque cariei genus in duas species subdividendum est in praxi, alteram, in qua ossis superficies suo quidem perioestio nuda est, arida, exsucca, sanguini aut lymphæ nutritiæ admittendis inepta, sed in qua nulla apparent manifestæ erosionis signa, & illo ossis *exarescentia*: Alteram, in qua ossis superficies scabra, inæquabilis, aspera est, imo non raro varie foraminulenta, atque adeo in qua conspicua sunt erosionis indicia; & hæc *caries* vere dicitur. Ambæ diuturnitate tantum differunt invicem; illa enim recentiore, a qua levior labes; hæc vero antiquiorem causam habet, a qua labes gravior illata est.

Remedia
cariæ.

1. In utraque, si caro semi-putris cariosum locum contegat, vel scalpello ita deradenda est, modo commode possit, vel admotis cathæreticis ita absumenda, ut os nudum oculis usurpetur & adhibendis remediis obvium sit.

2. In priore cariei specie sufficit plerumque, singula quaque curatione ossi imponere penicillum linteum imbutum aqua vitæ; spiritu vini; tinctura myrrhæ, aloes, euphorbii &c. vel inspergere pulverem radicis

ircos

ireos Florentinæ, aut pulveratum euphorbium, aut ad summum identidem infundere guttas aliquot olei Guaiaci, aut quæ efficacior est, dissolutionis Mercurii in aqua stygia.

3. In posteriore vero necessum est cauterium actuale admovere, quo facies ossis, quæ cariosa est, deuratur. Sed cauto opus est. 1. Ut labra ulceris linteis aqua madidis prius contestâ adversus ignis vim muniantur: 2. Ut media ossis carioli pars, ubi labes maxima, paulo fortius, debilius vero ejusdem ambitus comburatur: 3. Ut ustionis intensio, quæ pender tum a gradu caloris, tum a mora temporis per quam cauterium admovetur, morbi gradui respondeat, scilicet major minorve sit pro diversa cariei altitudine, pro diversa cariei siccioris vel humidioris natura, pro diversa ossis qualitate, ut magis vel minus spongiosum est.

4. Lamella ossis, quæ cariola est, remediis vel igne exsiccata aliquanto post tempore ab osse subiecto sponte secedit seu *exfoliatur*; nempe constitutis in hunc modum & arefactis illius lamellæ fibris, necessum est omne sanguinis ac limphæ commercium intercipi inter hanc quæ plane emortura est, subiectasque ossis lamellas quæ vita fruuntur; quapropter cogitur limpha nutritia jugiter appellens, cum ulterius progredi nequeat, subter lamellam guttatim colligi, & in carnem sensim efflorescere, firmam; densam, granosam, candidam, ab ossis sani facie pullulantem, eique firmiter adhærescentem, qua succrescente os cariolum a subiecto sensim divellitur, tanto quidem facilius quod lamella illa exsiccatione in brevius spatium contracta locum, quem antea occupabat, iam laxius repleat, atque adeo possit e sede facile deturbari.

5. Donec optata carioli ossis exfoliatio successerit, ulceris labra continenda sunt, ne fundus importuna carne oppleatur. Solent in hunc finem admoventi penicilli e linamento sicco, vel si caro nimium luxuriet, unguento sulco imbuti, quod sit ex unguento basilico cum addita præcipitati rubri dosi varie varia, prout ulus fuerit.

6. Verum ubi primum delapsa cariosa lamella locum cesserit carni ab osse sano succrescenti, quæ cum ulceris labris confociari possit, res tota naturæ viribus permittenda est, cavendo tantum, ut caro, si mollior sit aut præcipitantiùs excreseat, arte reprimatur, nempe alumine usto, aqua calcis, aqua phagedænica, unguento ægyptiaco, balsamo viridi Metensium, balsamo sulco de quo mox, cæterisque similis efficaciz.

7. Interea toto curationis studio, 1. Dyscrasia, si qua sanguis forsan peccaverit, iisdem remediis emendanda est, de quibus supra, nec semel. 2. Ager parce nutriendus, nempe solis jusculis aut dilutioribus panatellis: si a febre non vacet; ossis vero, vel quod præstat, lacte vaccino, si febre careat: 3. Inurendus unus aut alter fonticulus, ut pars peccantis limphæ abducatur: 4. Cæteraque omnia auxiliorum genera adhibenda, quæ ali-

me.

mentorum concoctioni, sanguinis integritati & animi corporisque quieti possunt conducere.

8. Cæterum, si caries in majoribus artuum ossibus ad medullam usque penetraverit, necesse est non modo affectam ossis partem terebra pluribus in locis perforari, ut extenuetur, sed etiam intermediam intercapedinem, quæ inter foramina interjicitur, scalpro ope mallei plumbei comminui & dissipari, ut facili expedita via possint tum emitti pus & sanies, quæ intus latebant; tum injectiones & unguenta immitti, quibus medullaris ossis cavitates eluatur, detergatur, mundetur. At vero simul curandum est, ut dum ossis medulla ad sanationem properat, exfoliatio promoveatur in toto ossis ambitu, ne quid curationem retardet, & ut consociatis carnibus, quæ undique succrescunt, possint, omnia ad cicatricem pari passu tendere, cujus firmitati consulendum erit iisdem cautionibus, quas modo recensuimus.

§. XI. SCORBUTUS.

XI. Scorbutus cum lue venerea conjungitur hydragryro si non debellatur.

XI. Scorbutus & Strumæ, quæ cum syphilide aliquando conjunguntur; hydragryroscos efficaciam non sentiunt, vel sentiunt parum; neque enim morbifica seminia, quibus inducuntur, Mercurio seu remedio alieno & minus idoneo cedere apta sunt. Permanent ergo post hydragryroscum ambæ illæ affectiones suis propriis remediis debellandæ, sed jam mitiores, deposito scilicet connubio, quod cum seminio venerco intercedebant.

Uterque morbus natura gravis est, & difficilem tum explicationem, tum curationem habet; ideoque consuli velim Auctores illos, qui de utroque argumento speciales Tractatus edidere: Neque enim permittit instituti operis ratio, ut a proposito longius divagemur, & satis futurum esse arbitramur, si ea paucis afferamus remedia, quæ ad curandos & debellandos morbos illos hæcenus maxime comprobantur.

Quibus remediis mitigandus sit, si sanari non possit?

1. Scorbutus affectus est plerumque indelebilis, remediis saltem quibus nunc valet medicina; quem proinde mitigari quidem, debellari vero nunquam perfecte videas, præsertim si diuturnitate invaluerit. Jam supra hujus Libri *Capite* 6. §. 3. n. 5. proposuimus therapeuticam methodum omnium quas novimus efficacissimam ad scorbutum reprimendum ante hydragryroscum, quando contigit ut cum lue venerea coniungatur. Hæc eadem perinde conducit leniendo & curando scorbuto; si qua post hydragryroscum sui præbeat indicia, atque adeo inde repetatur velim.

2. In summa tria sunt medicinarum genera quæ in præsentē casu cæteris præstant. Prima est pituitana hydrotica ex lignis radicibusque sudoricis decoctione, ut artis est, parata, sine senna vel cum senna paucis, quæ tamen a vulgari in eo differat, quod isti radix raphani rusticani incocta sit

fit ab ʒ β. ad ʒ j. pro libra qualibet decocti. Huic pisanæ, quæ bis in die mane scilicet & sero exhibetur, tanto diutius insistendum est, quod blande agat, nec ullam vel saltem levem catharsim moveat.

3. Altera est lac vaccinum succo depurato cochleariæ vel becabungæ alteratum, bis in die mane & sero exhibendum ab ʒ viij. ad lib. j. per plures menies, modo ventriculus lactis patiens sit.

4. Tertia est julepus e succis expressis & separatis foliorum scordii, alliaræ, scorodouræ &c. aut si succi desint, ex intenso earumdem plantarum decocto ab ʒ ij. à ʒ iv. aut vj. cum infuso cortice winterano vel cassia lignea, addito syrupo fumariz vel de quinque radicibus ad ʒ j. aromatizatus, & alternis diebus repetendus per dies bis septenos. Debent autem allata remedia, quanquam invicem subcontraria videantur, pluries alternare, donec scorbuticum seminium vel diaphoreticis attritum, & diapnoe, sudatione aut diuresi eliminatum; vel usu lactis irretitum & edulcatum fuerit.

§. XII. STRUMÆ, sive SCROFULÆ.

XII. Strumæ sive scrofulæ scorbuto difficultate vix cedunt, cedunt tamen. Pendent a tumore glandularum lymphaticarum sive conglobatarum skirrhode, vel saltem ad skirrhomem proximo, unde palam est. 1. A spissiore limpha & in glandularum anfractibus hærente induci; 2. Efficaciter impugnari non posse, nisi remediis diluentibus, liquefacientibus, attenuantibus, incidentibus, aperientibus &c. quæ crassiori lymphæ naturam fluxilitatem, & stagnanti pristinum motum restituant.

Inter illa locum habent, 1. Juscula ex plantis aperientibus, nempe radicibus cichorii silvestris, brusci, anonidis, eryogii, foliisque scrofulariæ, agrimoniz, nasturtii aquatici, cum sale admirabili Glauberiano, vel arcano duplicato ab ʒ j. ad ʒ β.

2. Serum lactis depuratum ad ʒ viij. cum tartaro chalybeato solubili a gr. xx. ad ʒ j. aut floribus Martis antimonialibus a gr. x. ad xv. cum infusis asellis sive millepedibus vivis, n. xxx. demum cum succo fumariz aut scrofulariæ ad ʒ ij. alteratum &c.

3. Aquæ minerales, tum chalybeatæ, ut *les eaux de Forges, de Pougues, de Passy, de Spa, de Caranfac &c.* tum etiam thermales sed sulfureæ, ut *d'Encausse, de Vicby, de la Motte, de Bourbonne, d'Aix-la-Chapelle &c.*

4. Præparata varia e mineralibus, quæ aperiendi & incidendi facultate pollent, ut sunt martialia, mercurialia, antimonialia &c. ex quibus, additis purgantibus, boli, tabellæ, pilulæ confici solent.

5. Laudantur quasi specifica, 1. A Gabriele Fallopio radix rusci pulverata, & ad dolim drachmæ unius in vino epota cum radice iridis pul-

Ff

ve.

XII. Strumæ hydrogastro si raro dissipantur, si cum lue venerea coincidunt. Sed suis propriis remediis.

veratæ granis x. per dies 40. 2. Ab Arnol'do Villanovano *Practice Medicinæ Lib. 2. cap. 5.* Radix scrofulariæ pulverata & ad dosim ℥j. exhibita: 3. A Roberto Boyle, *de utilitate Philosoph. experiment. Part. 1. sect. 2.* Paronychia folio rutaceo, seu sedum tridactylites, in cerevisia tenui infusa & per aliquot dies potanda: 4. A Zacuto Lusitano, *Præceps Medic. admirandæ Lib. 1. Observat. 101.* Unguentum ex radice bryoniæ, cujus formula prostat *Cap. xli. hujus Libri: 5.* A Medicorum turba decoctum spongiæ marinæ ad ℥iv. vel cinis ejusdem combustæ in olla clausa ad 3℔ vel lapis qui in spongia plerumque latet pulveratus & in vehiculo idoneo exhibitus ℥j. ad 3℔. per plures dies; sed horum omnium penes Auctores sit fides.

6. Non ita pridem in Gallis increbuit ad curandas strumas quædam antimonii præparatio, quæ ad antimonium diaphoreticum proxime accedit, & quæ ab Empirico nescio quo *Rotrou* dicto, a quo primum usurpatam fuisse narrant, *Pulvis de Rotrou* vulgo appellatur. Proferetur ejusdem parandi processus in extremo hocce Libro, cum recta administrandi ratione; sed præmonitum Lectorem velim hoc remedii genus, ut cætera pleraque quæ vulgi præconio temere celebrantur, fama magis quam successu valere, ut ipse non semel expertus sum.

C A P U T XI.

De Affectibus pene desperatis, qui post hydrargyrosim aliquando supersunt.

Morbi in
sanabiles,
in quos
lues vene-
rea ali-
quando
degene-
rat, desi-
dia vel te-
meritate
ægotant-
tium.

QUÆ recensuimus hætenus mala omnia, imo pessima, sed tamen medicabilia: Quæ mox tractaturi sumus multo pejora, cum sint pleraque immedicabilia. In confesso est ea quidem produci summa vi veneni venerei, unde prima mali labes, quippe quo solidæ corporis partes irreparabili damno labefactantur: At vero neque minus constat, quantacumque supponatur vis seminii morbifici, produci eadem numquam sine supina ægotantium culpa, qui socordia locum dant concepto contagio, ut vires acquirat eundo, ac in ossium medullas penetret, & intima viscera depalcatur. Ipsi proinde ægotantes infertuniorum suorum auctores sunt, ac calamitates maximas sibi pariunt desidia vel temeritate. *Desidia* quidem, si intempessive consentunt, neque Medicis aulculent, qui ut hydrargyrosi morbus ocysus profligetur urgent & instant tummo cum studio: *Temeritate* vero, quoties verbi & promissis magnificis delusi Circulatoribus, Agyrtis, Empiricis sese credunt, quorum remediis seminium morbosum retundi forsitan, debellari numquam potest.

§. I. TUMORES TESTIUM.

I. Tumo-
res testi-
um.

Inter infortunia hujuscemodi, quæ curationem non admittunt, numerantur I. Tumores testium, quicumque ad hernias humorales pertinent,

ut

ut spermatocele, sarcocoele, hydrocele, pneumatocele, kistocoele &c. de quibus supra *Capite III. §. V.*

Spermatocele, quæ cæterarum herniarum humoralium est veluti principium, causam habet geminam, nempe 1. Stagnationem seminis, quo spermatica testium vasa turgent, ut quoties fluxus gonorrhœæ injectione astringente, crapula, equitatione, coitione, febre &c. derepente supprimitur 2. Congestionem viscidioris seminis, quo vasa eadem offerciuntur, ut quoties a latente causa ventrea sanguinis inficitur, semenque spissitudinem vitiosam inde nanciscitur.

Prior spermatoceles species, quæ in gonorrhœa frequens, levior est cum a stagnatione sola fiat; & ubi primum restituitur gonorrhœæ effluxus, data stagnanti femini via, plerumque sponte resolvitur. Posterior vero, quæ a lue venerea ortum habet, curatu difficilior est, quia semen tarde congestum, mora magis indurescit atque ideo difficilius discutitur.

De utraque fere desperandum est, si hydrargyrosis spem frustrata sit, cum sit experientia compertum tum semen humorum omnium, qui conrescunt, difficillime resolvable esse; tum inveniri vix posse remedium alterum, quod ad inspissatos humores eliquandos ac nativæ fluxilitati restituendos magis valeat, quam Mercurius ipse, qui jam incalsum adhibitus fuit.

Tunc ergo spes quæ reliqua in eo tota sita est, 1. Ut diutissime repellantur inunctiones ex unguento mercuriali super scrotum, bis aut ter hebdomadaequalibet, ad dolim 3 j. quaque vice; vel si commodius forsan videatur, ut tumentis testiculo continenter admoveatur emplastrum de Vigo quadruplicato Mercurio, solum vel cum æqua parte diabolani subactum, quod mense quolibet vel etiam quinto decimo quoque die renovari necessum est; vel tandem ut apponatur cataplasma ex pulpis radicum costarum Bryoniæ, cucumeris silvestris, & ireos, addito gummi ammoniaco in aceto dissoluto.

Quibus remediis curandi sint, si curari possint?

2. Interim vero ne pondus testem aggravet, ac funiculum, ex quo dependet, nimium distrahat, unde tum doloris morsus, tum novum regressuris humoribus impedimentum, opus est ægrum uti subligaculo *suspensorio* dicto, cujus ope in appenso folle sive marsupio testis uterque sustineatur.

3. Porro sedulo cavendum, ne immoderato aut præpostero usu incidentium & resolventium interiorum aut exteriorum skirrhhodes testis in abscessum abeat, quod ex præsentibus suppurationis signis palam foret; aut quod pejus est, carcinomatodem naturam paulatim contrahat, de quo conjectura esset ex repetita doloris lincinatione & varicosa venarum circumrepentium dilatazione. Proinde satius est malum, quod quantumcumque sit, præsentis periculo caret, fortiter pati, quam impotenti sanationis desiderio ea experiri remedia, quibus morbus desperatus fiat.

¶ 2

4. Quod

4. Quod si nimia tumoris moles, aut durities quasi lapidea spem omnem præciant futuræ resolutionis, si testis pondere nimio gravissimam exhibeat molestiam, si periculum sit ne malum a teste ad funiculum spermaticum, & inde ad abdomen usque procurrat, de testiculo excindendo cogitandum est, præsertim si in suppuratum aut in carcinoma proxime degener sit.

5. Prius tamen caute attendendum est, utrum funiculus spermaticus, quem arteria venaque spermatica, vas deferens, limphaticæ venæ nonnullæ, nervus versus testem progrediens & suspensorius testis musculus componunt, mollis sit & naturalis status-retinens? Sin aliter enim ab operatione prorsus abstinendum esset, cum palam sit ex calloso funiculi tumore morbum in abdomen usque proripere, neque adeo rescisso teste posse ulla ratione penitus extirpari.

6. Numquam felicius succedit hæc operatio, quam si dorso amputandi testiculi prius apponantur frustula aliquot lapidis cauterialis ordinatim disposita, quibus tum scrotum, tum vaginalis tunica testis alte erodantur. Hinc enim edueto sero & pure, si qua forte lateant, & contracto testiculo, quidquid reliquum est licet expeditius prosequi. Adde ea ratione certius dignosci statum testiculi morbidum, quem nosse permulti refert, cum acciderit non semel in hydrocele, imo & in sarcocele, ut testiculus ipse sanus esset, totumque vitium ipsius tunicis adnatum foret, cui proinde mederi facile fuit citra castrationem.

7. Explorato testis morbo, si durus, skirrhoticus; tumidus, suppuratus, syderatus sit, quæ singula cunctationem non recipiunt, ligatura fili duplicati spermatici funiculo arte injicienda est, quam infra ad unum pollicem appensus testiculus excindendus est, lacinia exinaniti in scroto loculi resecandæ, vulnusque ex arte curandum vulgari methodo, nempe digestivo dum ligatura decidat, deinde balsamo Arcæi, ac demum cum plaga ad cicatricem tendit, epuloticis, de quibus sæpius dictum est.

§. II. PENIS DISTORTIO.

II. Penis
erecti di-
stortio.

II. Infortunium alterum est Penis, dum rigescit, distortio in diversas partes, sursum, deorsum aut ad latus alterutrum, quæ usum rei venereæ si non interdicat, ut certe difficilem & propagandæ speciei plerumque imparem efficit.

Id mali provenit a nodo sive ganglio in præputii fœno, in urethra parietibus, in ligamento penis suspensorio, vel in ipsis cavernosis corporibus ex causa venerea enato, unde fit ut penis, qui dum flaccidus est libere & recta propendet, versus partem affectam detorqueri necessum habeat, dum erigitur, quandoquidem obstat latens in illa parte ganglion, ne possit illa debitam adipisci longitudinem. Hinc penem sursum, si liga-

mentum penis suspensorium; deorsum si frænum præputii aut urethra; ad dextram sinistramve partem revolvi necesse est, si pars ulla dextri sinistrive corporis cavernosi male afficiantur.

Incurvati penis remedia eadem sunt cum remediis testis skirrhis, cum in utroque affectu perinde opus sit impactam materiem discutere & resolvere. Repetantur ergo ex præcedente paragrapho: Quæ si irrita sint, æquo animo feratur malum, immedicabile quidem, sed plane innoxium. Remedia & exempla.

Memorat Jacobus Hollerius, *Comm. ad Aphorism. 63. Lib. 5.* si non idem, certe haut abimile penis viciū peculiari artificio a se correctum. *Vidi, inquit, qui membro ita oborto non poterat gignere, quod semen semper resistaret in cervice uteri. Huic paratus est canaliculus plumbeus vel argenteus, accommodatus crassitudini ipsius penis, in quem immisso pene circumposita & alligata sunt cystella, ita ut tandem figuram membri rectam ac naturalem recuperari & genuerit. Quæ licet satis obscure proponantur, inde tamen colligi potest quali artificio usus sit ille, atque adeo si ex usu fuerit, primum est cuius suo periculo experiri.*

Non moror quæ Julius Cæsar Arantius, *Libr. de tumoribus præternaturalibus, Cap. 30.* refert de quadam penis incurvatione, quam censet deducendam esse a laxitate cellularum in alterutro corpore cavernoso, unde fiat ut quantum cellulæ illæ; quæ laxiores sunt, cæteris magis dilatantur tantundem in rigido membro decreseat longitudo cavernosi illius corporis, ad quam debuisset alioquin extendi, ex quo sequitur penem versus illam partem necessario detorquendum esse. At autem ille in hanc morbi speciem incidere, qui veneri nimis indulget, & qui frequenter & diu, ut mulierculis placeant, distento sunt genitali, utpote in quibus distractione nimia & diuturniore pars quædam in cavernoso alterutro corpore relaxetur; putatque illud malum non emollientibus, sed astringentibus curandum esse, quorum formulas aliquot recenset. Sed hæc si veritate nitantur, in quod non lubet nunc inquirere, saltem ab instituto nostro plane sunt aliena, cum ad luem veneream nullomodo pertineant.

§. III. IMPOTENTIA AD VENEREM.

III. Impotentia ad venerem morbis venereis frequenter induci solet: Nec sane admirari subit, si qui pugnant acris in veneris castris, ac frequentiora patiuntur vulnera, cæteris citius huic militiæ impares fiant. III. Impotentia ad venerem pendet a causa multiplici.

Species tres impotentiae istiusmodi observamus, *Primam*, in qua arrigitur quidem nec invalide, sed in qua nullum, vel paucum & serosum semen emittitur: Hanc puto pendere ab omnimoda constipatione ductuum emissariorum, quibus vesiculæ seminarie & prostata cum urethra communicant, ideoque præposterum nimiumque usum injectionum fortius astringen-

gentium sequi, quo nonnulli ad gonorrhææ curationem abuti solent.

Alteram, in qua e contrario sine volutaris sensu, vel saltem cum sensu paucio, solitoque celerius semen distillat, affecta tantum necdum perfecta erectione, unde præcept & involuntaria resolutio. Videtur ista oriri a nimia ductuum eorumdem amplitudine, per quæ semen e conceptaculis exprimitur facilius promptiusque, atque adeo antequam omnia ad opus comparata sint. Solet ea impotentia species gonorrhæis diuturnioribus succedere, si natura aut ægrotorum negligencia, contumaciores fuerint.

Tertiam demum, in qua penis flaccidus & vietus jacet, neque potest ulla exsuscitari. Et hæc multa variaque vitia supponit latentia, 1. Vel in ipsis seminis conceptaculis, ubi potissimum viget rei venereæ sensus, nempe in prostaticis; vesiculisque seminariis, ut si callis induruerint, aut fungosis carnibus oppleantur, ex quo efficiatur ut a collecto semine nullatenus, aut segnius afficiantur; 2. Vel in musculis erectilibus aut accelerantibus, quorum ministerio virga rigescit & tenditur, ut si laxi & inertes ad erectioni negotium inepti vel minus comparati sint: Quibus singulis noxis haud rarum est seminis conceptacula, musculosque erectioni famulantes a causa venerea patere.

Prima impotentia species nullam videtur curationem admittere; neque sane novi quo pacto emissaria arctissime constipata possint iterum referari. Per me tamen cuivis licet operam ludere, si lubitum fuerit, injectiones emollientes immittendo in urethram, balnea aut semicupia emollientia usurpando, cataplasmata malactica perinæo admovendo, aquas minerales, præsertim saponaceas exhibendo &c.

Quomodo mederi
dum sit
causis,
quæ curationi non
reputant.
Neque remediis facilius cessura est postrema impotentia species, præsertim si contra hydrargyrosim jam pervicax fuerit. Ne quid tamen reliqui fiat quod ad curationem pertinere possit, auctor sum ut ea tententur remedia, quæ ad callos resolvendos efficacia sunt, & quæ supra proposita sunt *paragraphe* 1. n. 1. ad skirrhum testium: Imo ut supra perinæum fiant aquarum thermalium stillicida seu embroches, quæ adversus musculorum erectorum & acceleratorum inertiam remedio esse possunt.

At vero licet plerumque secundæ impotentia species paulo efficacius medicari, si perfecte mederi non detur, usu scilicet remedium omnium, tum internorum, tum externorum, quæ adversus gonorrhæas inveteratas valere supra diximus *Capite precedente*, §. 1. quandoquidem hæc singula latioribus emissariis constipandis & coercendis aptissima sunt. Velim tamen, ne qua noxa possit inferri, ut a blandioribus remediis istiusmodi fiat ad fortiora progressus, & fortiora, si ex usu sint, caute & interjecto spatio repetantur.

§. IV. NODI, GANGLIA, TUBERCULA, GUMMATA.

IV. Nodi, ganglia, tubercula, gummata &c. medicinam omnem ple-
rumque vincunt, præsertim si hydrargyrolis jam frustra adhibita fuerit.
Neque enim valentiora reperire est remedia, quæ impactam lympham effi-
caciùs liquunt, aut liquefactam potentius resolvant.

Profiuit tamen aliquando diu & pertinaciter adhibuisse medicamina, quæ
supra præcedente Capite, §. 12. contra strumas facere dictum fuit, & empla-
strum de Vigone quadruplicato Mercurio, modo solum, modo cum diabò-
tano permistum; vel tenuem lamellam plumbeam hydrargyro quotidie illi-
tam appoluisse, maxime si nodi & ganglia molli sed iterata contrectatione
quotidie ita prius atterantur, ut subacta materies remediis solventibus faci-
lius obsequi possit.

Sed vix auctor esse velim. ut torturis istiusmodi quisquam utatur, nisi
cum nodi, ganglia, gummataque vel mole nocent artuum motui, vel fa-
cili manuūque venustatem deturpant. Cæterum quoties neque efficiunt
ullo modo, imo neque conspicua sunt, a remediis temperandum puto,
vel ideo maxime quod non semel observatum sit gummata gangliaque re-
mediis & præsertim fortioribus frictionibus male habita in carcinomata
degenerasse.

IV. No-
di, gan-
glia, tu-
bercula,
gumma-
ta.

Iisdem
remediis
curantur
quibus
herpetes.

§. V. EXOSTOSES.

V. Supra Cap. 3. §. 5. statuimus duo esse prima exostosium genera, alte-
rum spuriarum, quæ a periostio in durum ganglium sive tuberculum crasse-
facto; alterum legitimarum, quæ ab ipsa ossis substantia tumefacta depen-
deant: Hoc rursus in duas species secundo dividi, prout ossæ substan-
tia quæ in exostosim protuberat, vel in plures cellulas concameratione di-
stinguitur, quæ singulæ cartilaginea aut fungosa carne oppleantur, vel ex
toto solida est, imo reliquo ossis plerumque durior.

Prima exostosium species hydrargyrosi haud raro; postrema fere num-
quam discutitur. Secunda medium tenet, ut quæ discuti soleat, si parva &
recens fuerit, si spongiosa concameratione constet, si molliorem carnem
concludat; sin aliter, adversus ipsum Mercurii usum sit ut plurimum
contumax.

1. Si successerit ut exostosium ulla ullibi supersit post hydrargyrosim, Curatio
præstare puto quandiu indolens fuerit, omittit sine remediis, quam opero-
siores medicinas morbo immedicabili cum nullo vel cum minimo succes-
su adhiberi. Sin tamen ægrotanti aliter videatur, adversari nolim, quin
ea tentet remedia, fiducia tamen sua, quæ supra §. 1. & 4. allata sunt tan-
quam

V. Exo-
stoses &
earum
species.

Curatio
exo-
stosium.

quam efficacia contra testium skirrhos gummataque quarumvis partium.

2. At vero si exostosis, quæ adversus hydrargyrosim contumax fuit, sponte vel remediis nimium vexata acute doleat lancinetque cum manifestis cutis superjectæ calore & rubore, ita urget periculum ne in abscessum cum ossis carie conjunctum, vel quod pejus etiam est in carcinoma degeneret fiat, ut res cunctationem nullam recipiat. Igitur præmissis universalioribus, quæ viam cæteris præmunt, ad operationem quam ocysissime devenire necesse est, qua cutis in crucem incidenda; anguli quatuor qui propendent, forfice resecandi, derafoque periostio exostosis terebra variis in locis perforanda ut attenuetur; deinde serra vel scalpro penitus excindenda, basilque cui insisterat, pulveribus myrrhæ, aloes, euphorbii, tincturis ex iisdem extractis; vel si ita postulaverit cariei altitudo, ferro ignito ad exfoliationem deducenda; demum plaga, quæ superest, eadem plane methodo curanda, ac supra *Capite precedente*, §. 10. dictum est de ulceribus, quæ cum suppositi ossis carie conjuncta sunt.

§. VI. DOLOR OSTEOCOPUS.

VI. Dolor osteocopus ossis insidens cariem ossis aut medullæ abscessum indicat.

VI. Contingit nonnumquam post hydrargyrosim legitime administratam, ut dolor profundus, fixus, osteocopus, asper, perpetuus, & aliquando per intervalla lancinans certum in osse quodam locum occupet & infestet sine tumore ullo & cum levissima in cute caloris & coloris mutatione quod malignus, si contra emollientia, anodyna, paregorica & resolutentia remedia pervicax sit, haud inanis conjecturæ locus futurus est pendere vel a carie latente in osse partis dolentis, vel ab exostosi cum carie in interna ossis ejusdem facie, quæ ad medullam spectat, vel quod omnium pessimum est, ab abcessu medullaris substantiæ.

Quibus sola operatione mederi licet.

Itaque si conjectura in dies urgentior fiat, si nulla suppetat alia salutis ratio, durus & crudelis medendi modus superest, sed unicus, nempe cutem loco dolenti superextensam in crucem incidere, angulosa ejus labra circumrefecare, periostium deradere, demum os nudatum terebra perforare ad meditullium usque. Si nihil inde profluat præter paucas sanguinis stillas, res ulterius urgenda non est, nisi certiora latentis cariei aut abscessus indicia ostendantur. Sin vero purulenta aut saniosa materia inde profundatur, os novis foraminibus tum infra, tum supra pertundendum est, ut attenuetur, ac interjectæ intercapedines scalpro cum malleo plumbeo ita exsculpenda sunt, ut via libera fiat tum effluxuro puri, tum immitendis medicamentis. Reliqua omnia curanda sunt juxta methodum supra propositam *Cap. precedente*, §. 10. donec medullari substantia suppurata & deserta & carioli ossis facie *exfoliata* omnia ad cicatricem pro votis properent.

Cæterum, ut libere dicam, cum Medici naturam & causam morbi, qui

in

in osse medio later, tarde conjiciant; cum tardius audeant ex conjectura gravem & molestam ac periculi plenam operationem decernere; demum eum ægrotantes Medicis monentibus & instantibus auscultent tardissime, plerumque ante conclamatum est, quam operatio instituitur, ex quo efficitur, ut vix unquam de illa bene sperare liceat.

§ VII. CARCINOMATA.

VII. Compertum est carcinomata, quæ a causa venerea vel maxime VII. Carcinomata a causa venerea. ortum habent, hidrargyroseo usu ferinam naturam semper non deponere, nec in mitiora ulcera aut apostemata perpetuo commutari. Compertum pariter ganglia, tubercula, gummata, imo excrescentias quasque skirrhodes, & exostoses fornicatas, quæ cellulis cartilagineam carnem continent, si hydrargyrosi supersint, in cancos non raro degenerare abusu attenuantium & resolventium acriorum, quæ fortius atterant sine resolutione, vel ad summum cum resolutione imperfecta. Qua vero ratione aut quibus de causis hæc ita eveniant, non juvat hic inquirere, cum de hoc argumento abunde disputatum sit *Lib. III. Cap. 5. §. 3.*

In utroque casu præsens carcinoma, siue inveteratum, siue recens sit, manifestum est tum ex natura & indole tumoris superstitis, qui durus, renitens, skirrhodus est; tum ex morfu doloris atrocis, perpetui, per intervalla lancinantis, quo tota tumoris moles intime percellitur & fodicitur: Nam quoties ea duo concurrunt, certum est verum adesse carcinoma, malum scilicet difficile, mora cito ingravescens, contra quod celeri & efficaci medicina opus sit. Remedia quæ carcinomatosis istiusmodi possunt adhiberi:

1. Itaque 1. Præmissis universalibus & præparatoriis remediis, quæ dystrasiam sanguinis emendent, tumor carcinomatodes, si protuberet supra cutem quacum tenui vel lato pediculo adhærescat, novacula vel scalpello resecandus est, & si quid cancroso aut skirrhodis in basi subsit, summis forficibus exciendum vel cathæreticis absumendum: Tandem resolutionis crustis a vivo, plaga si mollis sit, si carne firma & granosa oppleatur, ad cicatricem deducenda est ut artis Chirurgicæ ratio postulat, eaque methodo de qua jam sæpe.

2. Quod si carcinomatodes tumor partibus circumjectis sepultus sit, ita tamen ut nec in vasis majoribus aut nervis, nec in osse aut cartilagine ulla sit adnatus, sed ab iisdem sejunctus ac libere mobilis, cautionibus iisdem parique celeritate extirpandus est; nempe hinc & inde lunata plaga alte circumcidendus, deinde sinistra arreptus suspensusque a vicinis subjectisque partibus scalpello vel forfice excindendus. & ut ita dicam, enucleandus: Demum vulnus, quod superest, primum linamento sicco, altera vero vel tertia die digestivo simplici, ac deinceps balsamo Arcæ ex arte curandum est.

3. Si

3. Si exostosis cellulosa in carcinoma ipsa quoque degener fiat, dissecta in cruce eute superjecta, relictis labris angulosis derosoque periosio, exostosis vel tenui serra subsecanda vel scalpro cum malleo plumbeo partitis ictibus minute concidenda ad ossis reliqui libellam; postea bateos exfoliatio vel tinctura myrrhae & aloes, vel pulvere euphorbii, vel solutione Mercurii in aqua stygia, vel tandem cauterio actuali, si efficaciore remedio opus fuerit, procuranda est; ac denique delapsa ossis exfoliati lamella, & succrescente ab ossis vivi facie carne granosa & firma, cicatrix inducenda est ex artis legibus, de quibus supra nec semel.

4. Quod si cancerosi tumoris situs vel connexio, aut deploratus agrotantis status difficilem & periculose plenam alicui operationem dissuadeant, tanquam non inutilem modo, sed & noxiam, palliatis medicinis tunc insistendum erit, quae morbum leniant quem curare non licet. De illis abunde dictum est supra *Lib. III. cap. 5. §. 3. artic. 2.* ideoque ne videatur actum agi, inde velim ut repetantur. Cæterum potissima praesentissimi levaminis spes in opiativis sita est, qualia sunt decoctum unius aut alterius capituli papaveris albi; syrupus diacodii vel syrupus de karabe ad ʒ. ʒ. laudatum ad gr. j. pilulae de cynoglossio ad gr. vj. tinctura anodyna ad gutt. xx. vel xxiv. quorum singulorum dosis per gradus paulatim augenda est, prout morbus ingravescit, vel remediorum virtus hebetatur assuetudine.

§. VIII. ULCUS UTERI.

VIII. Ulcera uteri genere multa sunt.

VIII. Ulcus uteri malum est in mulieribus quae lue venerea laboraverunt haud infrequens: Et profecto quidem debet uteri cavitas praeter totius corporis partibus & gravius & frequentius affici, cum semini corrupto, quod a viro infecto inter concumbendum emittitur, & primum & potissimum pateat.

Ulcus uteri venereum inducitur causa gemina, nempe 1. Latente erosione, quam interna uteri facies contrahit ab admissio viri semine, a menstribus extrillantibus, ab humore limphatico-lacteio, quo madet &c. si venereo contagio contaminentur; hæc ulceris species initio vix dignoscibilis est, ac principio quidem pus paucum & æquivocum suggerit, sed tacitis progressibus paulatim tandem invalescit. 2. Suppuratione, quam ganglion, gummatum, tuberculum, nodus, atheroma, steatoma, meliceris &c. in ipsa uteri substantia genita vel juxta adnata concipiunt, unde rupta in uterum vomica sive abscessu pus derepente & ubertim exundat e mulieribus.

Prius ulceris uterini genus post hydragryosim legitime administratam non advenit de novo, vel si adveniat forsan, saltem non a causa venerea, quandoquidem humores, qui in uterum affluunt, nullo peccant amplius contagio; sed si forte praextiterit, sæpissime eludit vim Mercurii, nempe quod

quod vitium hujuscemodi altis defixum radicibus pervicax esse soleat, præsertim in utero muliebri, qui totius corporis sentina est. Posterius vero ulceris genus potest adhibitam hydrargyrosim sine nova seminii veneriei accessione accidere, videlicet si ganglia, tubercula, gummata &c. quibus resolvendis Mercurii efficacia impar fuerit, in abicessum veniant vel sponte, vel præpostero resolventium usu.

Porro ulcus uteri ab utralibet causa pendeat, in duo genera perinde subdividendum est, alterum *simplex* in quo uterus & ipsæ ulceris oræ nativam molliem tuentur, nullo vel levi dolore tentantur, & pus album læve, spissum profundunt. Alterum *cancerosum*, in quo e contrario ulceris confinia, imo & ipsius uteri pars skirrhouea sunt, crebra & atroci laniatione fodicantur, ac demum pus emittunt paucum, ichorosum, saniosum, serosum. Prius ulceris genus raro, posterius vero nunquam sanari experientia compertum est.

At nihilominus tamen, cum natura morbi, qui in occulto est, perfecte non liqueat; cum etiamsi liqueret, liceat nunquam ægrotantem quasi depuratorat sine auxiliis ullis decerere, tentanda est remedium alea, quæ si non sanationem, at certe lenimen allatura sunt.

Idcirco 1. Adhibeantur quæcumque valeant sanguinis dyscrasiam falsam & muriaticam edulcare, atque adeo vitium lymphæ, quæ ad ulceratam partem confluit, emendare: Ut 1. Pitana ex radicibus althææ, consolidæ majoris, bistortæ &c. confecta & superaffuso plumbo liquefacto alterata. 2. Juscula cum pullo gallinaceo, cancris fluviatilibus, foliisque agrimonie, pimpinellæ, scolopendrii, cichorii silvestris, fumarie, nasturtii &c. 3. Aquæ minerales acidulæ, ut *les eaux de Forges, de Pougues de Spa*, vel Saponacæ, ut *les eaux de Peombieres*. Balnea aut semicupia & inleffus in aqua fluviatili repida. 5. Serum lactis chalybeatum infusus fumarie foliis alteratum; lac alinum aut caprillum semel vel bis inde die, vel quod præstabilius est, modo ventriculus lactis patiens sit, lac vaccinum pro omni alimento. 6. Denique si sanguis spissior sit, bochera leviora ex decoctis radicibus Chinæ & Sarsæ parille, quorum tres haustus in die exhibeantur.

2. Instituantur identidem blandæ purgationes cum cassiæ aut mannæ ʒj. aut ʒij. in cyatho pitane vel seri lactis, ad eum finem ut primarum viarum cachochylia, & biliosa sanguinis amurca everrantur. Mittatur pariter sanguis identidem e brachior. alterutro ad ʒ viij. vel x. ut fracto momento sanguinis, qui in uterum ruit, locus phlogosi vel nunquam vel rarius præbeatur.

3. Dum catamenia actu fluunt, si nondum morbo intercepta sint, alvus quotidie enematis subducatur, ex jusculo pingui, vel ex infuso semine lini, vel etiam ex levi decocto foliorum matricariæ & artemisii, & florum chamæmeli, si qui affuerint motus hysterici, addito aleo amygdalarum dul-

Quamvis
sint ple-
rumque
insanabi-
lia, ten-
tanda ta-
men re-
medio-
rum alea.

dulcium: Imo vero pisanæ quotidianæ tunc incoquatur caput unum aut alterum papaveris albi, ut eo pacto menstruorum eruptio sine phlogosi & nerethismo perficiatur.

4. Per intervallum, quod a menstruatione vacuum erit, injiciantur in uterum ope metrenchytes decocta pro natura aut gradu morbi varia; nimirum 1. Malaëtica & paregorica, si dolor & calor urgeant, ut emulsiones seminum frigidorum leviter coctæ, serum lactis caprilli cum infuso croco orientali, decocta foliorum plantaginis, summitatum malvæ, radices althææ, nymphææ, capicum papaveris albi &c. 2. Detergentia, si ulcus mundari possit sine periculo, ut decocta hordei integri, lentium, fabarum non excorticatarum, surfuris macri, foliorum agrimoniz, absintii, caprisolii, marrubii; radicum aristolochiz, ireos florentinæ, zedoariæ &c. quibus addi poterit aqua vulneraria, imo collyrium Lanfranci aut unguentum Egyptiacum, si ulcus sit valde sordidum. 3. Demum exsiccantia & epulotica, si ulcus detersum & mundificatum cicatrici non repugnet, ut decocta radicum consolidæ majoris, bistortæ, foliorum plantaginis, equinæ, bursæ pastoris, saniculæ, pilosellæ, millefolii; rosarum rubrarum &c. addendo cuilibet injectioni drachmam ꝑ. unguenti pompolygos vel de cerulsa, aut quod cæteris præstat terebinthinæ Venetæ vel balsami Copiavani ovi vitello soluti scrupulum j.

5. Quod si ulcus cancriforme esse videatur, de quo ex dolore lancinante conjectura fiet, infundantur in uterum succi depurati plantaginis, portulacæ, sempervivi, foliorum vel baccarum maturarum solani; cancrorum fluviatilium &c. in mortario plumbeo cum pistillo pariter plumbeo subacti & attriti donec nigrescant, addendo injectioni cuilibet, si ita e re esse videatur, syrupi diacodii ꝑ. ij. aut olei ex vitellis ovorum, aut mucilaginis seminum psyllii vel lini ꝑ. g. aut plumbi usti sæpius loti, tuthiæ præparatæ, cerulæ, sacchari Saturnini, aut camphoræ ꝑ. j.

6. Interim nec omitti debent interna remedia, quæ adversus internas suppurationes valent, inter quæ potissimum laudantur balsamica, ut terebinthina lota cum saccharo rosaceo ad ꝑ. g. balsamum de Copaii vel Canadense ad ꝑ. g. pilulæ de Bdellio ad ꝑ. j, quæ pluries repeti possunt cum regimine. Imo putaverim tuto etiam usurpari posse tum opiatam, tum aquam, quibus Zacutus Lusitanus testatur *Observat. 87. & 88. Lib. 2.* desperata uteri ulcera a se perfecte sanata fuisse, & quarum usum a Lazaro Riverio laudari novimus, *Præceps Medicæ Lib. 15. cap. 8. De ulcere uteri.* Sed nolim tamen dissimulavisse, ne quis imprudens ejusdem testimonio nimium confidat, Zacutum illum Aretalogum mihi videri maximum.

7. Si ulcus in vagina, seu ut olim loqui amabant, in collo uteri sedem habeat, præter injectiones modo propositas, quæ tamen magno usui semper futuræ sunt, poterunt ulceri, cum inaccessum non sit, unguenta balsamica.

samaque varia apponi, nempe primum digestiva, deinde balsama detergentia, ut balsama Arczi, ac demum varia epulotica, eadem plane methodo ac cæteris ulceribus omnibus quæ possunt oculis usurpari.

8. Miseris ægrotantibus, si noctes ducant irrequietas & infomnes, si dolore torqueantur atroci, si cætera remedia irrita fuerint, narcotica exhibenda sunt, de quibus supra, *paragrapho 7. n. 4.* quæ si non medelam, at saltem certissimum lenimen præbitura sunt donec ægræ dolore-febre, tabe confectæ miserissimam & calamitosam vitam cum meliore tandem commutent.

§. IX. PARALYSIS.

IX. Vidimus supra *Cap. 3. §. 9. n. 8.* Paralysim veneream gemina causa induci, 1. Obstructione nervorum ab hærente limpha, cui devehendæ inserviunt, & quæ spiritus animales constituit: 2. Compressione, quam nervi patiuntur a nodis, gangliis, tuberculis &c. in ipsis genitis vel juxta adnatis.

IX. Paralysis raro curatio-nem admittit, sed idoneis tamen remediis impugnanda est.

Si paralysis venerea solito contumacior hydrargyroseos vim eluserit, vix ostenditur spes ulla fore ut causæ, quibus fovetur, quæ jam usu Mercurii discuti non potuerunt, discutiatur unquam ab aliis remediis, quorum efficitas inferior est. Attamen minime committam ut quemquam ab eorum remedium usu dehorter, quæ ad paralysim solvendam valere creduntur, & quæ si non profutura sint, at certe nocere non possunt, qualia sunt.

1. Decocta vel bocheta diaphoretica ex lignis Guaiaci & Sassafras, radicibusque Sarsæ-parillæ & Chinæ parata cum antimonio crudo, quorum exhibendorum ratio jam sæpius exposita est.

2. Juscula ex decoctis in diploo viperis vel colubris cum gallo veteri additisque foliis nasturtii, fumarizæ &c. & rasura cornu cervi, quæ per dies viginti possunt usurpari cum regimine.

3. Balnea, embroches, stillicidia aquarum thermalium, sive quæ muriaticæ sunt, ut *les eaux de Bourbon, de Balaruc &c.* sive quæ sulfureæ, ut *les eaux de Bourbone, Baresges, Aix-la-Chapelle &c.*

4. Ammochosia, insesus in vinaceis fermentatione calentibus, aut si suppetat in facie tepente olivarum prelo suppositarum, unde tum calore tum partium tenuitate solent obices, qui nervis partibusve impacti spirituum influxui officiunt, satis feliciter plerumque resolvit.

5. Demum illitus variis & multiplices cum axungia anseris, serpentis, taxi, vulpis, humana adipe; oleo vulpino, lumbricorum, rutaceo, chamæmelino, laurino, lateritio sive philosophorum, balsamo Guidonis, cæterisque id genus, quæ usu receptissima sunt.

§. X. TREMOR ARTUUM.

X. Geminum tremorem artuum agnovimus supra *Cap. 3. §. 9. n. 9.* Alterum in quo pars tremoræ obnoxia debilis est: Alterum, in quo robore suo

X. Tremor artuum à causa venerea.

suo pollet. Utrumque hydrargyrosi superesse haud rarum est, sed rarum est ullum remediis unquam perfecte sanari.

Prior quidem, cum natura & causa ad paralysem proxime accedat, a qua solo gradu differt, & quacum & dum invadit, & dum desinit, plurimumque conjungi solet, iisdem remediis impugnandus est, quibus ipsam paralysem impugnari modo diximus.

Qua ratione curandus sit.

De posteriore vero, qui tum a vehementiore arteriarum pulsatione, tum ab immodica fibrillarum nervearum distensione dependent, magis ambigitur. Sane si audiat Praëtorum turba, nefas esse crederetur adversus hanc tremoris speciem alia usurpare remedia præter volatilia, spirituosæ, aromaticæ &c. quorum numerosæ formulæ nullibi non prostant. Sed cum hæc nervorum tonum & erethismum, arteriarumque pulsum magnopere intendant, consequens est noxam inde illatum iri, nedum levamen ullum, de quo ipsa quoque experientia nobiscum aperte consentit.

Quocirca satius est methodo plane contraria ea adhibere medicamina, quæ nervos arteriasque relaxent & emollient, ac circulatorium sanguinis motum promoveant diluendo & attenuando; atque adeo æquabiliorem efficiant & faciliorem, nempe jussula diluentia, balnea in aqua tepida, serum lactis calybeatum, aquas minerales acidulas, cæteraque istiusmodi, quæ cum blandioribus aperientibus & incidentibus ex Marte Mercurio, Antimonio præparatis maritanda sunt. Sic enim una eademque opera utriusque morbi causæ simul occurrunt, atque ea therapeia morbus, si non evincatur, quod sperare vix licet, ac saltem frangetur & imminuetur, ut mihi non semel feliciter experiri contigit.

§. XI. ALOPECIA.

XI. Alopecia & ejus causæ.

XI. Alopecia, si capillitium solum infestet, leve malum est, ex quo percubuit usus comæ adscititiæ, vulgo *Perruque*, qua calvitie absconditur: At si barbam, supercilia, maxime vero cilia adoriatur, non turpis modo & odiosa est, sed etiam probro verti solet.

Statuimus supra Cap. 3. §. 2. n. 4. alopeciam triplici causa induci, nempe 1. Si tennes fibrillæ, quibus capilli & pili constant, præcidantur in mediis glandulis sive capitulis, illæsis tamen primis radiculis. 2. Si primæ illæ radiculæ, unde pili & capilli pullulant, erosione extirpentur. 3. Si glandulæ seu capitula, in quibus radicanantur capilli & pili ab ulceribus cutem depalscentibus pefsundentur. Harumce causarum secunda & tertia irremediabiles sunt, siquidem partes organicas semel destructas remediis restitui inauditum est, ideoque prima sola est cui medicinam facere liceat.

Quo modo possit

Præcipuum omnium quæ noverim hujus alopeciæ remedium est, si prima renascentium pilorum aut capillorum lanugo identidem rasiretur; ut enim

enim sylva cædua opacior fit, cum sæpius cæditur, sic capillitium & barbam densiora fieri necesse est, si sæpe tondeantur, quoniam scilicet limpha nutritia, dum in ipsis capillorum pilorumve radiculis tota coercetur frequenti racione, capillos detentos & idcirco breviores magis nutrit, capillosque plurimos, qui lanuginosi sunt & vix conspicui, quia nutrimento defraudantur, explicat, & eo pacto una eademque opera capillos tum crassiores tum densiores efficit.

Possunt tamen, si ita lubeat, omnia remedium genera usurpari, quæ vulgo creduntur ad pilorum capillorumve regenerationem facere; ut quorum usus, si sine emolumento sit, at certissime sine damno futurus est; cuiusmodi sunt 1. Decocta foliorum marrubii, abrotani, verbenæ, centaurei, capillorum veneris, lupinorum, fabarum &c. quibus pars fovetur.

2. Lixivia e cineribus testarum nucum juglandium, vel nudeorum amygdalarum amararum, echini terrestris aut marini, apum, muris domesticis &c. quibus pars glabra abluatur.

3. Linimenta cum pinguedine ursi, cuniculi, talpæ, cervi &c. vel oleo laurino, juniperino &c. quibus pars illinitur.

§. XII. DE PRESSIO NASI.

XII. Tandem usu venit aliquando, ut malum ægrotantium incuria, aut imprudentia medentium altius sese insinuans organicas partes non paucas corrumpat & pessundet irreparabili labe: Sic modo spongiosis narium offibus carie exhis corrui tota nasi concameratio, & deprimitur acrorinium; modo dentes carioli alveolis excidunt; modo uvula sive columella ulcerata suppuratione absumitur; modo ossa palatina, quæ columellæ apposita sunt, in mali consortium veniunt & dilabuntur carie; modo tandem ossa palati fornix carie ad nares usque perforatur &c.

1. Si narium concameratio considerit ossum carie, quantumcumque offensionis inde accedat in deformitate faciei, forti animo ferendum est infortunium, cui mederi jam amplius non licet. Cavendum solummodo ne quid ulceris in occulto lateat, ideoque narium interiora identidem eluenda sunt aqua thermali quavis, ut Balæucana Baregiensi, Borbonicensi &c. quæ spiritu per nares in os adducenda, aut ex ore per nares foras educenda est. Quod si aquarum istiusmodi thermalium copia non suppetat, poterit substitui decoctum hordei, foliorum veronicæ, agrimonix, aut radicum Aristolochiæ, cum guttis aliquot aquæ vulnerariæ, quæ ex plantis vulnerariis cum vino albo infusus distillatur; aut etiam si morbi natura ita poscat, tincturæ myrrhæ vel aloes.

2. Ad dentes firmandos, si in alveolis male hæreant, ea valent remedia, quæ gingivarum putredini medentur, & quæ supra Cap. 6. §. 1. & 5. & Cap.

capillo-
rum rena-
scentium
regermi-
natio pro
moveti.

XII. De-
pressio
nasi, ca-
sus den-
tium, co-
lummellæ
amissio,
jactura
ossum pa-
latino-
rum:

Cap. 10. §. 11. ad Icorburum propofita funt. Præ cæteris autem præbo opiatam quandam, cujus formula *Capite fequente* proponetur. Hac enim fæpius expertus fum gingivas putrefcentes efficaciffime detergi, mundari, confanefcere, ita ut nativo tono redditz dentes labantes ftabiliant. Verum fi dentes jam fede moti fint, id unum reliquum eft, ut deterfis prius & fanatis gingivis, in deciduorum locum adulterini ex arte reftituantur, non ex ebore, quod nimis cito flavelcit, fed ex dentibus Hippopotami, qui candorem tuentur diutius.

3. Columellæ, quæ ulcere eroditur, iifdem remediis medendum eft, quibus cæteris oris ulceribus, qua de re vide præter alia loca, *Caput 8. §. 3. artic. 1.* Neque vero fi columella erosione jam abfumpta fuerit, de amiffione magnopere laborandum eft, modo femel cohibitus fit ulcus ne ferpat ulterius, fi quidem experientia compertum eft nec deglutitionem nec loquelam inde offendi.

4. Cum olfa palatina pefsum abiere, aut alterutrum offium maxillarium in media palati fornice ad nares ufque perforatur, non fatis eft ferpenti cariei occurriffe idoneis remediis, at vero fimul etiam oportet mederi vitio vocis, quæ tunc rauce, incondite, ex nafo ideo fonat, quod emiffus fpiritus in patentia narium penetralia ablorbeatur; quocirca necelfe eft partis defectum protheſi reparare. Solenne fuit olim in hunc finem obturando foramini tenuem & cameratam lamellam, auream vel argenteam apponere, & ope ſpongiolæ mollioris dorſo alligatz, quæ in apertum foramen intrudebatur, admotam detinere, qua de re conſule Ambroſium Paræum, *Lib. 33. cap. 4.* & Guillelmum Fabricium Hildanum, *Cent. 2. obſervat. 22.* Verum cum ſpongia illa muco corrupta fæto-rem brevi contrahat maximum, jam pridem placuit aptare laminæ elatrem parvum argenteum, qui foramini inſertus ſibique permiffus lamellam ſuſpendat, ut videre eft apud Cornelium Solingen, *Operation. Cbirurgicar. Lib. 1. cap. 43.* & Joannem Muys, *Praxeos Cbirurgic. rational. Decad. 7. Obſervat. 10.*

C A P U T XII.

Appendix de varioribus aliquot remediis, quæ ad morbos venereos præclare faciunt, vel creduntur facere.

Hic plura quidem refero quam approbo; quocirca velim ut de ſingulorum utilitate feratur iudicium non ex vanis Aretalogorum pollicitationibus, ſed ex nota rei veritate, vel, ſi ea forte in ambiguo fuerit, ex doctrina in hoc Opere tradita; nullumque ex proponendis remediis in uſum medicum a quoquam vocetur mea ſaltem fide & auctoritate, niſi quod ipſe

ipse disertis verbis dixerim proficuum vel saltem tutum esse: Siquidem
 arcanorum inventioribus, fautoribus, diribitoribus minime credendum,
 quorum plerosque palam est inexperienceiam & imperitiam summam
 curculare vaniloquentia, quosque putidissimorum mendaciorum nul-
 latenus pudet, dummodo remediis suis plerumque nullius pretii & valoris,
 non raro noxiis & veneno quasi delibutis, semper temere & imperite ad-
 hibitis auram captent popularem (a) *Famaque verbosis strepibus conentur*
acquirere; uno verbo dummodo malis artibus quid lucelli corradant, cui
 unice inhiant *Διγροχίρδεϊς*, ac quam (b) *recte non possunt, sibi quocumque*
modo rem faciant.

(a) Phzd.

Lib. 1.

Fab. 14.

(b) Horat.

1. Epistol.

Lib. 1.

(c) Phar-

macopœa

Medico-

Chimica

Friderici

Hoffman

ni. Lib. 3.

cap. 15.

§. 12.

I.

Panacea (c) de la Vigne Medici Regii Parisiensis, seu potius Mercurius
præcipitatus ruber Solaris & Lunaris.

Rec. & in amalgama coque ☉ & ☾ ana ꝑ j. ꝑ. ꝑ rii vivi ꝑ iij. idque
 indurescat in massam albam. Simul ac conteritur, ut ne granula duriuscu-
 la maneant, (hæc enim adhærent postea vitro & non excuti nec in pul-
 verem converti possunt) statim apparebit materia humidior, & expri-
 metur per linteam Mercurii currentis bona pars. Post probe conteratur
 amalgama, ut subigantur granula omnia, fietque materia subfusca &
 nigricans. Si sic relinquetur statim recandescet & obdurescet, ex tri-
 tura vero semper madorem & nigrorem contrahit. Affundatur rursus,
 Mercurius expressus & protinus a materia combibetur. Additur autem,
 semper aliquid novi Mercurii, ita ut cum initio dupla Mercurii pro sim-
 pla seu unica portione massæ Solaris & Lunaris sit, postremo cum sæpe
 conteritur & exprimitur Mercurius, decem partes Mercurii ad unam,
 partem massæ veniant.

Hæc omnia infunde phialæ, digerantur igne lampadis continuo, &
 per quinque vel sex hebdomadas Arbor Hermetica inde gignetur (tribus,
 chopinis Parisiensibus olei per mensem facile ignis alitur, ut ellychœ-
 nium unum concinnatum ex quatuor filis continuo ardeat) leviter mo-
 do claudatur phiala charta, arctius ut claudatur non opus est, quia Mer-
 curius non ultra quam ad medietatem ascendit, indeque decidit per
 blandas quasi sublimationes, idque circiter decies fit. Ad finem fit
 pulvis ruber ad omnis generis morbos vel desperatissimos creberrimæ ex-
 perientia probatus.

Tota operatio novem mensium spatio absolvitur adhibito continuo,
 lampadis igne. Dosis gr. j. vel ij. usque ad v. vel ꝑ ꝑ. in vehiculo ap-
 propriato. Usu illius panacæ N. de la Vigne in morbis desperatissimis,
 quasi miracula præstitit. *Hæftenus Hoffmannus.*

Peccat ea Mercurii præparatio deleteria acrimonia, sicut & cæteræ
 ejusdem generis, ideoque stomachum graviter subvertit cum syncope, &

G g

ali.

aliquando cum erosionis periculo. Quocirca Medici sibi caveant velim; ne illa temere utantur, vel si uti visum sit, exhibeant nunquam nisi robustis ægrotantibus, quibus latera firma sint, qui tolerando acriori medicamini pares esse videantur, & quibus non licet lubeatve tutiora sed tardiora remedia experiri.

I I.

(a) Traite de la maladie Venerienne 3. edition, pag. 90.
(b) Ubi supra.

Præcipitatus solaris (a) Gervassii Ucay Doct. Medici Tolosani.

℞ *Auri purificati* part. j.

℞ *Mercurii e cinnabari redivi* part. iij.

Fiat *amalgama*, quod in mortario luto diligenter obducto exponatur tres menses igni lampadis, primum quidem levi, mox per gradus intendendo, donec *amalgama* colorem pulveris obscure rubri adipiscatur.

Ea *Mercurii præparatio* miris effertur laudibus ab Auctore (b) laudato quasi omnium præstantissima. Attamen cum drastice purget *drogę* *ædros*, & deleteriæ acrimoniæ expers non sit, nemini auctor esse velim, ut id præparati genus facile adhibeat, cum tot alia suppetant mitiora medicamina, quæ periculo vacant. Si cui tamen secus facere visum fuerit, poterit præparatio illa exhiberi a gran. iij. ad xij. ad quam tamen dosim nunquam ascendendum, nisi in robustissimis; & permilceri cum pillulis polychrestis aut catholicis, quibus præcipitati vis inferiora versus ducatur.

III.

Æthiopes Minerales varii.

Mercurius cum pinguibus ac resinosis quibuscumque corporibus tritus convertitur seu ut vulgo loqui amant, extinguitur in nigros aut fuscios pulveres, quibus habita tum coloris tum originis ratione nomen *Æthiopum Mineralium* inditum fuit.

Ut varium est ac multiplex materiarum genus, quæ cum *Mercurio* tritu conjungi possunt, sic varia quoque ac multiplex *Æthiopum* species.

I. Si *Mercurius* cum balsamo Peruviano sicco aut cum balsamo Copai-vano vel Canadensi extinguitur, *Æthiops anti-ptysicus*:

II. Si cum gummate Guaiacino, *Æthiops anti-rheumaticus* sive *anti-scorbuticus*;

III. Si cum manna calabrina aut cum resina jalappii, *Æthiops pur-gans*;

IV. Si cum gummate juniperino, vel cum sale ammoniaco, *Æthiops diureticus*;

V. Demum si cum oculis vel pulvere cancerorum fluviatilium, aut testis ostreorum, *Æthiops alkalifatus* vel *absorbens* appellatur.

Possunt *Æthiopes* illi varii varie exhiberi debita congruaque dosi, prout diversis satisfaciendum est indicationibus, sed tamen Medicos monitos

ve-

velim; in præparationibus hujuscemodi Mercurii guttas solo tritu male coercitas, calore interaneorum facile denuo coire & reviviscere, atque ab ingressu in chylifera vasa præclusas tum mole, tum pondere, cum sæcibus ex toto ferme excludi, unde fit, ut præparata istiusmodi, quantificumque celebrentur laudibus, conceptam spem non raro frustentur, ac nullam vel minimam efficaciam plerumque præstent.

IV.

Panacea N... de la Brune, *qua uti solent in regio Veteranorum Infirmorum-ve Militum Hospitio, vulgo l'Hotel Royal des Invalides.*

R. *Mercurii ex cinnabari redivivi* q. v. *ex grat.* lib. j. superfunde in matratium quo continetur, spiritus nitri optimi æquale pondus. Digerantur una balneo arenæ, donec Mercurius dissolutus sit. Fiat tunc balneo eodem sed intensiore evaporatio ad siccitatem usque.

Massa, quæ residua est, misceatur cum vitrioli ad alborem calcinati & salis marini decrepitati ana lib. j. Omnia una conterantur in mortario vitreo cum vitreo pistillo, vel in mortario marmoreo cum pistillo ligneo, ac in matratium indita sublimentur ex arte balneo arenæ.

CrySTALLINA materies, quæ matratii lateribus adhæret sublimata, e diffracto matratio exempta & caute secreta tum a sæcibus, quæ infra, tum a volatiliore & farinaceo polline, quod est supra, denuo ut prius conteratur cum libra j. salis marini decrepitati, & vitrioli ad ruborem calcinati libra semisse, mixtaque materies in atterum matratium indatur igne arenæ iterum sublimanda.

Tunc fracto rursus matratio crySTALLINA materies a sæcibus & a polline utrumque secreta conteratur cum libra una salis marini decrepitati, sed sine additione ullius vitrioli, ac deinde fiat ex artis legibus sublimatio tertia, sic deinceps pari methodo quater reperendo, toties addito eodem salis marini decrepitati pondere, donec materies jam septies sublimata sola tandem conteratur & sublimetur sola octava vice, sine ullo sale marino.

Sublimatus Mercurius corrosivus, quæ ea ratione confectus fuerit, in partes duas æquales dividatur. Sit. v.g. pars una dimidia librarum duarum, quæ in pulverem contrita in mortario vitreo cum vitreo pistillo, mixtaque cum libra una reguli antimonialis pariter contriti, distilletur ex retorta igne reverberii gradatim intendendo, donec prodeat in recipiens aqua semi-plenum Mercurius ex sublimato redivivus, qui probe eluendus est & exsiccandus.

Parti alteri dimidiæ sublimati corrosivi, quæ seposita superest, & quæ libras duas sive uncias 24. æquat pondere, addantur partes duæ tertię Mercurii illius ex sublimato redivivi, nempe uncie 16. & omnia simul tam

Gg a accu-

accurate conterantur in mortario vitreo cum vitreo pistillo, ut Mercurii vivi ne mica quidem ulla superfit conspicua.

Inde massa illa, quæ ex Mercurii vivi & sublimati corrosivi connubio coalescit, sublimetur ex arte, sublimataque semel materies a sæcibus & a polline prius secreta ac in pulverem contrita sublimetur iterum iterumque novies repetendo.

Demum materiei ultimo sublimatæ & tenuissime contritæ superfundatur ad altitudinem trium digitorum spiritus vini aromaticus, hoc est quocum aromata, ut cinnamomum, macis, caryophylli &c. infusa fuerint, ac procurata per dies aliquod digestionem balneo arenæ abstrahatur & destilletur ex cucurbita spiritus vini, aut massa quæ in fundo cucurbitæ siccata superest & quæ panaceam mercurialem constituit, servetur in vase vitrea diligenter obturato.

Ex illa panacea tenuissime lævigata fiunt cum gummi Tragacanthæ in aqua rosarum soluto pilulæ, quarum gravissimæ grana quatuor pondere non superent. Hujusce panaceæ dosis est a gr. xij. ad xx. vel xxx. quotidie iterando, dum pyralismus cieatur, vel proxime instet.

Miris laudibus extollitur id panaceæ genus, quasi adversus morbos omnes venereos præstantissimum. At vero vix capio quo nomine præferendum sit panaceæ vulgari, quæ compendiosiore quidem processu præparatur & minus operoso, sed tamen haud ita dissimili. Quin potius vulgarem illam panaceam isti anteferendam esse censerem, ideo quod blandior sit, utpote in qua conficienda unciiis sex sublimati corrosivi permiscuantur unciz quatuor cum $\frac{1}{2}$ Mercurii vivi, cum e contra in ista præparanda unciiis sex sublimati corrosivi addantur tantum unciz quatuor Mercurii, unde acida & corrosiva sublimati spicula minus infringi manifestum est.

V.

Modus saturandi præparatis Mercurialibus pisanam sudorificam, aut aliam cujuscunque generis.

Licet Mercurius sublimatus dulcis seu Aquila alba, & panacea mercurialis vulgo credantur in aqueis fluidis indissolubiles, certa tamen experientia compertum est utramque illam Mercurii præparationem iterata ebullitione in pisanâ sudorifica ex decoctis lignis Cuaiaci & Sassafras, radicibusque Chinæ & Sarsæ-parillæ; vel in alia quavis sequenti artificio in totum dissolvi.

R. Sublimati dulcis vel panaceæ mercurialis 3 j. v. g. Lævigetur tenuissime supra porphyritem, deinde injiciatur in ollam in qua bulliant lib. ij. pisanæ sudorificæ, vel alius cujuscunque.

Postquam ebullierint per unum horæ quadrantem, olla ab igne removeatur, ut pisanâ tepescat, & pars sublimati dulcis aut panaceæ, quæ soluta

luta non est, fundum petat. Dein decantata pitfana sublimatus dulcis vel mercurialis panacea, quæ supersunt in fundo, exsiccentur, lævigentur denuo supra porphyritem, ac pitfanz iterum ebullienti dissolvenda committantur, par methodo deinceps ter quaterve repetendo, donec ne mica quidem præparatorum Mercurialium in fundo subsidat.

Possunt ea methodo pitfanz quævis, maxime vero hydroticæ, præparatis Mercurialibus ad certum usque gradum saturari, unde facile fururum est ut haustu solo pitfanz hujuscemodi pyralismus facile moveatur. Sed ea ratio medendi lui venereæ ad legitimum inunctionum mercurialium usum minime comparanda est, quem constat certiore, efficaciore, exploratioris esse, ac minoribus simul paucioribusque periculis obnoxium.

VI.

Mercurius violaceus diaphoreticus, sive Flores ammoniaco-mercuriales.

R. Æthiopis mineralis per deflagrationem parati q. v.

Adde aequale pondus salis ammoniaci, & una in pulverem contere.

Massa in matratium vitreum indatur, cujus duæ partes vacuæ sint. Fiat sublimatio ex arte balneo arenæ.

Pars violacea a facibus & a crystallis pellucidioribus quæ superiora occupant, caute separetur, & servetur in vase vitreo obturato.

Constat illa Mercurii præparatio ex partibus tenuioribus Æthiopis mineralis, quæ una cum integrantibus nonnullis salis ammoniaci atomis sublimatæ sunt, unde virtus illius antivenerea & diaphoretica.

Efficax est iste Mercurius, quoties virus venereum corrigendum est, liquefacienda limpha spissior, ac diaphoresis promovenda sine pyralismi periculo. Præscribitur a gr. x. ad gr. xx. in bolis vel pilulis, ut cætera Mercurialia.

VII.

Solutio Mercurii per deliquium, quæ cum pitfanis quibuslibet admisceri potest.

R. Sal. ammoniac. q. v. ex. caus. 3 ij. Conteratur in tenuissimum pollen in mortario marmoreo cum ligneo pistillo.

Contrito adice guttatim Mercurii crudi 3 j. tandiu una simul tere, donec Mercurius extinctus & cum sale ammoniaco intime subactus in pulverem subfuscum abierit.

Pulvis superimpositus marmoris declivi permittatur sensim colliquefcere in cella vinaria, subiectoque vase excipiat liquor in quem convertitur, in cujus fundo conspicuæ sunt nonnullæ Mercurii guttæ in pristinam formam reintegratæ.

Decantato liquore qui supernatat, Mercurius in fundo superstes cum novo sale ammoniaco denuo conteratur, pulvisque inde confectus deliquio denuo exponatur eadem methodo qua prius.

Deinde liquore in quem convertetur iterum decantato Mercurius, si quis etiam tum superfuerit, cum sale ammoniaco tertium conteratur ac tertium exponatur deliquio, eadem toties repetendo, donec tota adhibiti Mercurii uncia in liquorem pellucidum una cum adhibito sale ammoniaco abierit.

Potest ea Mercurii solutio ptisanis quibuslibet, v.g. ptisanæ sudorificæ affundi dosi idonea, atque ore exhiberi sine noxa, imo plerumque non sine emolumento, haud dispari methodo ac ptisana eadem præparato quovis Mercuriali per ebullitionem saturata, ut supra dictum est *Articulo V.* At vero pari quoque successu, hoc est numquam satis certo, & fere numquam satis efficaci, atque adeo qui legitimæ Mercurialium inunctionum administrationi plurimum concedat.

VIII.

Medicamina anti-charodica, quibus utebatur non ita pridem Empiricus quidam nomine Rotrou, & quæ ejusdem nomine etiamnum circumferuntur.

I.

TINCTURA AURIFICA.

*R. Nitri fixi lib. iij. solvendas in aq. bullientis lib. iv.
Antimonii optimi & purissimi lib. iij.*

Antimonio in pulverem contrito, ac in cucurbitam vitream immisso superaffundatur solutio nitri fixi: Cucurbita occludatur apposito vase vitreo quod occurrat. Digerantur omnia per octiduum balneo arenæ, cujus calor identidem eo usque intendatur, ut materia ebullitioni proxima fiat. Transacto octiduo reclusisque vasis filtretur tinctura charta emporetica, & servetur ad usum in vase vitreo.

Hæc tinctura, quæ a Rotrou *Aurifica* dicebatur, summe sætet, convenitque proxime cum decocto illo scoriarum, quæ in conficiendis regulis antimonialibus summa petunt, ex quo paratur affuso aceto *sulfur auratum antimoniale*.

Hujusce tincturæ aurificæ dosis est a gutt. x. ad xxx.

II.

ELIXIRIUM AURIFICUM.

Calci antimonii, quæ in cucurbita superest ex præcedente operatione, sed prius exsiccatæ affundatur spiritus vini rectificatissimus ad supereminentiam quinque vel sex digitorum. Inde opposito ad cucurbitam occulsionis vale, fiat circulatio balneo arenæ moderato per mensem unum. Posthinc reclusis vasis decantetur tinctura in vas vitreum probe obturandum.

Affun-

Affundatur iterum spiritus vini calci eidem antimonii ad supereminentiam quatuor digitorum, fiatque similis materierum digestio balneo arenæ, donec nova tinctura elicitæ fuerit, quæ cum priore pari methodo miscenda est.

Hinc distillatione ex cucurbita abstrahatur balneo arenæ pars dimidia vel partes duæ spiritus vini: Quod supererit in fundo cucurbitæ erit *Elixirium aurificum* quod queritur, minus fortens quidem quam tinctura, at vero minus quoque efficax. Hujus dosis est a guttis xx. ad lx. in vehiculo appropriato.

Hocce Elixirium mera est tinctura sulfuris aurati antimonii, spiritu vini prolecta.

III.

PULVIS LIQUANS.

R. Reguli antimonii optimè preparati & in pulverem triti,

Ac Nitri purificati & in pulverem seorsim redacti ana lib. j. ß.

Mixtis ambobus illis pulveribus fiant ex arte projectiones cochleatim in crucibulum igne candens, finitisque projectionibus materia sex horis calcinetur.

Postea educta materies in pulverem redigatur dum calet, & per setaceum trajecta contineantur in vase vitreo probe obturato, ne concepto humore colliquescat.

Libræ cuilibet hujusce pulveris supposito igne tepide calentis affundantur guttatim aquæ spirituosæ cinnamomi 3 vj. semper agitando dum aqua affusa penitus exhalaverit.

Præparatus ea ratione pulvis ab Antimonio diaphoretico non loto vix differt. Dicebatur a Rotrou *pulvis* suus *liquans*, quocum miscebat ille pulverem putaminum ovorum probe lævigatum, quem *pulverem alkalinum* appellabat.

Puerulis quidem primis diebus exhibebat pulverem liquantem ad grana iij. bis in die, & pulverem putaminum ovi ad gr. ij. Adultis vero priorem pulverem ad gr. vj. alterum ad gr. v. in utrisque dosim successive deinceps augendo.

IV.

PILULÆ ALEXITERIÆ SEU POTIUS PURGANTES.

R. Nucleorum Indicorum, sive granorum Tilli a putaminibus mundatorum lib. j. ß.

Conterantur in pastam tenuissimam in mortario marmoreo cum ligneo

Gg 4

pi-

pistillo, ex qua pasta densa linteo conclusa oleum quod inest fortiter exprimatur.

Deinde pasta conteratur iterum superaffusis guttis aliquot spiritus sulfuris per campanam distillati, iterumque ex contrita exprimatur superstes oleum, sic deinceps repetendo donec oleum omne expressum esse videatur.

Tunc pasta exsiccetur aere libero, exsiccata in pulverem extenuetur, ac per setaceum trajiciatur.

Trajecti pulveris \mathfrak{z} j. adjiciantur radices Viperinæ seu Contrayervæ virginianæ in pulverem redactæ \mathfrak{z} iv. Tartari albi in pulverem contriti \mathfrak{z} j: Omnia probe invicem commista in vase parum alto sed oris latioris, quod superextensa tenui tela obducatur, per unum aut alterum mensem exponantur aeri libero, in loco quo solares radii non attingant, omnia sæpius in die succutiendo. Quo diutius pulvis ille aeri exponitur, eo mitior fit.

Ex illo pulvere cum affusis guttis aliquot vini Hispanici diluto fiunt pilulæ sive boli exigui granorum ij. vel iij. qui in aere siccantur & in vase vitreo clauso servantur ad usum.

Vis cathartica granorum Tilli residet potissimum in oleosa parte; quam obrem oleo diligenter expresso amurca, quæ superest, multo minus acris est; caute tamen velim ut adhibeatur, & in illius remedii usu præ cæteris supra propositis summa requiritur in Medico prudentia.

Dosis est a gr. ij. ad gr. xvj. cum conserva qualibet aut sirupo quovis. Minima illa dosi, a qua semper incipiendum est, blande purgat, & quidem ita blande, ut remedii efficacia promovenda sit die eadem enema purgante, vel die insequente cathartico quodam ore exhibito.

Quacumque die remedium adhibetur, diætâ eadem servanda est, ac si catharticum assumptum fuisset: Scilicet post horam tertiam jusculum leve exorbendum est, totaque die tepide & largiter potandum est.

V.

PRÆCEDENTIUM REMEDIORUM ADMINISTRATIO.

I. Præmittitur præparatio temperamento ægrotantis idonea; nempe secta vena purgatoque corpore iterantur per dies aliquot apozemata temperantia & diluentia cum humectante diætâ.

II. Exhibentur pilulæ purgantes ad gr. j. ij. vel iij. mane jejuno ventriculo, cum solito purgantium regimine, ac si alvum satis copiose non moveant, enema purgans vespere injicitur.

III. Exhibitio pilularum iteratur initio quarto vel quinto quoque die; deinde octavo, decimo quinto, imo trigésimo tantum.

IV. Do-

IV. Dosis pilularum qualibet exhibitione augetur, sed caute & pro ratione effectus præcedentibus exhibitionis.

V. Si pilulæ alvum satis non subducant, opus erit die sequente potio- nem purgantem sed blandam propinare.

VI. Diebus ab exhibitione pilularum vacuis adhibebitur pulvis liquans ad grana iij. cum ij. granis putaminum ovorum pulveratorum in infanti- bus: Ad grana vj. cum granis v. eorumdem putaminum in pueris duode- cim annorum, quæ conserua aut syrupo quouis, vel pulpa pomi costî ex- cipiuntur & in boli formam componuntur.

VII. Pulvis ille usurpatur bis in die mane jejuno ventriculo, & quar- ta hora post prandium; imo etiam, si morbus urgeat, poterit exhiberi tertium tribus horis post cœnam.

VIII. Quoties iterabitur usus pilularum, de quibus supra, toties dosis pulveris liquantis & pulveris alkalini augenda granis aliquot pro gradu morbi, aut effectu quem jam præstiterint.

IX. Post devoratum pulverem liquantem exorbendus vice qualibet haustus prisanæ, vel levis decocti carnis vitulinæ, vel quod præstat, de- cocti radicis Chinæ.

X. Diebus iisdem exhibebitur quotidie bis in die, nempe post pran- dium & post cœnam tinctura aurifica ad gutt. xij. vel xv. aut elixirium aurificum ad gutt. xx. vel xxv. in cochleari vini vel levis decocti ra- dicis Chinæ.

XI. Licet remedia illa quocumque tempore intermittere, si ita e re esse videatur.

XII. Si sit remediorum cessatio, utile est pro nota ægrotantis tempera- tura vel aquas minerales chalybeatas, ut Forgeses aut Passiacas, vel lac asininum aut caprillum præscribi.

XIII. Quin imo si ita lubeat, poterit usus illorum remediorum cum usu aquarum mineralium aut lactis conjungi, modo eo die, quo pilulæ purgantes exhibentur, remediis aliis interdicitur: Cæteris vero diebus pulvis liquans pomeridianis & vespertinis tantum horis exhibeatur, ma- xime si lac usurpetur.

XIV. Quod si qua fuerit luis venereæ suspicio, nihil obstat quominus anti-venerea cum remediis propositis copulentur; nempe aquila alba cum pilulis, & panacea mercurialis cum pulvere liquante, ea, qua par erit, dosi.

XV. Pari modo, si opus esse videatur, possunt cum pilulis purgan- tibus, aut liquante pulvere remedia alia quævis tuto fociari, ut agaricum trochiscatum, trochisci alahandal, scammonium, jalappium, rhabarba- rum, hipeacacuanha &c. ea dosi, quæ ægrotantis ætati & viribus, morbi- que naturæ & intensiõni idonea sit.

XVI. Tan-

XVI. Tandem in glandulas strumofas si quæ sint ulceratæ vel fistuloſæ, debet tinctura urifica vel elixirium aurificum ſiphone injici aut linamento apponi, ut calli reſolvantur, fungoſæ carnes colliqueſcant, renovataque ulceris facies ad cicatricem deducatur.

IX.

Aqua Rabelii, ſic ab Empirico quodam dicta, cui Rabel nomen fuit.

℞ Olei vitrioli rite preparati p. j.

Spiritus vini rectificati p. ii j.

Oleo vitrioli in matratium infulo ſuperaffunde ſenſim ſpiritum vini. Inſere recipiens quod occurrat ad circulationem, quæ initio ſolo calore efferveſcentis olei vitrioli, deinde leniſſimo igne arenæ perficitur. Diſtilletur tandem materia igne arenæ, & ſic prolicietur aqua Rabelii.

Aqua illa conducit ad hæmorrhagias quæcumque ſiſtendas; etiam internas, modo ab inflammatione vacent: Utilis eſt quoque in febribus ardentibus. Inſtillatur guttatim vehiculo convenienti ad gratam aciditatem.

Admiſcetur etiam cum ſucceſſu ptisanis refrigerantibus, quæ initio gonorrhææ præſcribuntur, maxime ſi dyſuria nimis diſcruciet.

X.

Tinctura Ambre grifeæ cum aqua Rabelii, ſeu oleo vitrioli dulcificato.

℞ Ambre grifeæ in pollen redactæ q. v. v. g. 3 ij.

Immitte in matratium oblongioris colli, ſuperaffunde aquæ Rabelii ad ſupereminentiam unius digiti. Fiat digeſtio ſupra calidos cineres, donec liquor colore ſaturatus ſit.

Tunc decanta, novam affunde aquam Rabelii, affuſam digere cum ſuperſtite ambra, digeſtamque cum priore miſce, ac in vaſe vitreo obturato ad uſum ſerva.

Illa tinctura in gonorrhœa habituali & contumaci ore exhiberi poteſt bono ac felici exitu ad doſim quatuor, ſex, octo decemve guttarum in vehiculo quovis ſub forma hauſtus, vel cum pulvere liquiritiæ & conſerva roſarum ſicca ſub forma boli, ut mihi conſtat auctoritate & exemplo eruditi & cordati Viri.

Poſſunt arte ſimili, neque diſpari admodum ſucceſſu cum aqua eadem Rabelii elici tincturæ e myrrha, lacca &c. quæ ad eandem ſcopum utiles eſſe poſſunt ſimili methodo.

XI.

(a) Pharmacopœa Dogmaticorum reſtituta Joſephi Quercerani. cap. 7. De aquis.

Aqua Mentha (a) Quercetani ad gonorrhœam fatidam & virulentam, atque etiam inveteratam præſtantiſſima.

℞ Pulveris Menthe ſiccæ,

Diſſamni,

Radiciſ iſeos Florentinæ ana 3 j.

Pul-

Pulveris seminum Agni casti,

Rusæ,

Laduræ ana ʒj

Terebintinæ Venetæ ʒiv.

Vini albi ʒxx.

Hæc omnia injiciantur in alembicum & per balneum vaporosum distillentur

De hac aqua exhibe mane duo cochlearia per aliquot dies præmissa convenienti seu mercuriali aliqua purgatione. Hanc centies expertus sum, inquit *Quercetanus*; conducit etiam ad ulcera renum.

XII.

Lapis medicamentosus, vulgo Crollii dictus.

R. Aluminis rupei.

Lithargyri auri,

Boli armene,

Cerussæ ana ʒj.

Colcotharis vitrioli ʒiv.

In pulverem contrita bulliant in acet. q. s. ad consistentiam lapidis.

Hujus ʒij. liquecant in ʒ viij. decocti radicis althææ, vel infusi seminis lini, unde tepide f. injectio ad ʒj. quotidie in urethram vel in vaginam ad reliquias gonorrhœæ habitnalis exhauriendas. Cave tamen ne quid virulenti cohabeatur quod tragœdiam renovare possit, quocirca præstat fere semper a male tuto remedio abstinere.

Prostant in dispensariis aliæ lapidis illius præparandi formulæ non parum diversæ, sed quæ ideo videntur rejiciendæ dum lapidis solutio in urethram injicienda est, quod lapis iis metodus præparatus acrior sit.

XIII.

Pilule de (a) Creta Palmaris.

R. Aloes optime ʒj.

Cretæ albissimæ,

Succini albi,

Gentianæ,

Mirrhe,

Radic. Fraxinellæ ana ʒj

Mistridatii ʒiv.

Terebint. lotæ ʒij.

Syrupi de alaba q. s. ut fiat massa.

„ Sunt qui addunt Calomelanos ʒ ss. vel ʒvj. Dentur ad ʒij. vel ʒj.
„ hora somni omni nocte per dies 15. Ad gonorrhœam curandam nihil
„ æquale. Idem præstant in profluvio albo mulierum.

Pul.

(a) In
Pharmaco-
pœa Ba-
tana.

XIV.

Pulvis astringens, vulgo de Verny dictus, ab Empirico quodam nomine Verny.

*R. Aluminis rupei,
Cerussa,
Terra sigillata Blesensis,
Crete Brianconensis,*

Vitrioli tum viridis, tum cerulei ana partes æquales.

Cochleatim in crucibulum candens projiciantur, calcinentur usque dum ex ceruleo albescant. Massa in pulverem conteratur in mortario vitreo vel marmoreo & in vase vitreo bene obturato servetur ad usum.

Pulvis ille diluitur in vehiculo conveniente, v.g. in aqua stillatitia rosarum, plantaginis &c. vel in decocto radicis althææ, nymphææ &c. vel in sero lactis, aut in emulsione costæ &c. agr. xv. ad ℥j. pro unica injectione. Sed de illius usu dictum volo, quod modo de usu lapidis medicamentosi.

XV.

Balsamum, quod vulgo Chalybis dicitur.

R. Aquæ Fortis duplicis, ℥ iij.

Aciculas ex puro chalybe confectas, quas ex modo quo dissiliunt dignoscere facile est, aliquot injice, donec ebullitio minima fiat.

Adde tunc olei olivarum optimi ℥ iij. vel iv. Confundantur omnia donec in unguenti vel balsami speciem coeant. Ubi refrixerint aqua iterato elue, ut dulcescant.

Balsamum illud utile est ad carnes fungosas absumendas in conerosis ulceribus. Potest autem vis illius corrodens infringi si lubuerit, repetita pluries ablutione, qua acida spicula aquæ fortis exterguntur.

XVI.

Unguentum (a) ad Strumas.

(a) Zacutus Lusitanus, Prætor Medic. ad-
mirand.
Lib. 1. Observat.
101.

R. Radicis Bryonie bene nutritæ lib. β.

Seca in talleolas minutissimas, frige in lib. iij. olei olivarum, si fieri possit, insulsi.

Colatur. add. Terebintine lib. β.

Cera ℥ v.

Vase remoto ab igne f. unguentum in panno lineo strumis apponendum bis in die.

Laudatur in eundem finem unguentum Digitalis, cujus præparatio prostat in plerisque dispensariis.

[Opia

XVII

Opiata (a) ad dentes firmandos, ac gingivas detergendas.

R. Pulveris folior. Aquilegiæ,

Salviæ crispæ,

Et Menthæ anæ ʒij.

Nucis moschatæ,

Myrrhæ,

Et aluminis rupei anæ ʒij ʒ.

Mellis Narbonensis lib. ʒ.

(a) Daniel Sen-
nettus,
Oporum
Lib. III.
Part. 5.
Sect. 2.
Cap. 7.

Miscantur omnia simul cum melle igne leni calefacto atque una diu agitentur & subigantur, ut intime commisceantur.

Hæc opiata super vitram lineam diducta fungosis, ulceratis, putrescentibus gingivis admovenda, & admota per horas aliquot, imo tota die continenda, donec suppurata & detergæ gingivæ confanescant.



DE MORBIS
VENEREIS.

LIBER QUINTUS.

Index Chronologicus Auctorum, qui de Lue
venerea scripserunt ab ingressu morbi ad
exitum usque seculi decimi sexti, cum bre-
vi plerumque Operum Analyfi & Epicrisi.

(a) Vide
*Præfatio-
nem.*



EQUENTEM indicem Scriptorum, quæ de Morbis vene-
reis in hunc diem edita sunt, seu Chronologicam Biblio-
thecam Auctorum qui hanc materiam tractavere, utilem
fore duxi, ut (a) uno quasi intuitu inspicere liceat quid de
luis illius origine, natura, remediis varie senserint diver-
sis temporibus, quid in promovenda illius curatione a sin-
gulis præstitum sit, uno verbo ex quibus ambagibus, & quorum potissi-
mum opera hujus thesauri, qualis nunc usu viget, ad eum perfectionis
apicem pervenerit, quo nunc stare videtur.

Sed hæc omnia Lectorum judicio permitto. Id unum dumtaxat postulo
petoque, ut concedatur inde consuetaria aliquot erueri, quæ manifesta
rerum evidentia confirmari credo, & quæ a nemine, si ad rem ipsam
velit attendere, negari posse confido.

I. Luem veneream morbum novum esse, qui Europæ primum incu-
buerit circa annum 1494. cum ante de hoc argumento scripserit nemo,
ab eo tempore plurimi.

II. Luem

II. Luem veneream in Italia primum (*) apparuisse, saltem palam & aperte, cum Medicorum omnium primi, qui de lue venerea scripsere, Itali sint, vel saltem in Italia arte medica instituti: quibus verbis designari volo Germanos, aliquot Medicos, quorum extant Opuscula quædam antiquissima de Morbis venereis, ut Joannem Vveidmann, Simonem Pistorum, Martinum Polichium, Josephum Grundbeckium. Constat enim artis medicæ triocinium ab illis positum fuisse in Academiis Italiz ac præsertim in Patavina, unde primam hauserunt horumce morborum notitiam.

III. Deinde veneream luem in Hispanias Galliasque citius prorupisse, quam in ulla cæterarum Europæ regionum, cum Hispani Gallicque Medici post Italos antiquissimi sint Europæorum, qui de morbis venereis differverint.

IV. Videri luem eandem in Angliam, Germaniam, cæteraque Europæ Regna, quæ ad Septemtriones sita sunt, serius irrepsisse, cum ex illis regionibus Scriptores, a quibus hoc argumentum tractatum sit, tardius prodierint.

V. Demum, qui de Morbis venereis speciales Tractatus scripserint, numero plures esse, si Pestem & Febrem pestilentialem excipias, quam qui de ulla alia quavis ægritudine, etiam ab omni ævo cognita: Neque mirum videri cum a primo invasionis tempore nullus alter morbus extiterit, qui frequentior, gravior, difficiliorque fuerit, atque adeo dignior studii Medicorum materies. Epiphanius Ferdinandus jam ætate sua, (a) In hoc est circa annum 1620 octoginta Auctores recensebat qui de Morbis venereis differuissent. Ipse nunc plures novi quam centum septuaginta quique in sequentibus nominatim enumerandos; neque tamen confido omnium notitiam habuisse.

(a) In Historiis Medic. Hist. 17.

SECULUM DECIMUM QUINTUM.

VIDENTUR omnia primis luis venereæ temporibus, exeunte scilicet seculo decimo quinto & ineunte decimo sexto, novitatem tum morbi, tum methodi morbo medendi palam attestari, theoria nempe, quæ dubia erat, incerta, discors; therapeia, quæ infida, male tuta, temeraria; summa medentium titubatio, & ægrotantium diffidentia; demum Agyrtarum & Empiricorum celebritas & arrogantia, ut qui jactatione & favore populari numquam magis valeant, insolentius numquam

(*) Prius visa fuerat in Hispania post primum Columbi reditum ab Insula Hispaniola. Sed inter paucos. Vide supra. Lib. 1. Cap. 10.

quam superbiunt, de se magnificentius numquam sentiunt, quam ubi doctis, providis, cautis & uluperitis Medicis aqua hæret maxime.

I. Tunc sane ignorabatur morbi natura, quem censebant alii novum esse & veteribus Medicis incognitum; quem alii contra contendebant ab omni ævo & visum & observatum fuisse, sed in eo parum secum concordans, quod disputarent ad quodnam morbi genus, an ad lepram seu elephantiasim, impetiginem lichenasne referendus esset.

II. ignorabatur morbi causa, quam varii varie arcessebant ab influxu syderum, a pluviosa & humida aeris intemperie, a carne humana militibus in annonam præbita, ab elephantiacorum sanguine cum vino confuso, a meretrice quæ leproso cuidam sui copiam pretio fecerat; demum a contubernio, quod Hispani milites nautæque cum barbaris mulieribus insolenti ea lue infectis habuerant in Insula Hispaniola.

III. Ignorabatur propagationis modus, cum crederetur ab aliis quidem morbum sponte tantum corpori aeris intemperie, alimentorum vitio, diætæ errore &c. ab aliis vero contagione tantum diffundi ab ægris in sanos; demum ab aliis & sponte contrahi, & contagione simul propagari; quæ postrema opinio diu vixit.

IV. Ignorabatur tandem therapeia morbi, ut cui curando non adhibebantur nisi purgantia, diluentia, temperantia, ad summum balnea in aqua tepida, stussæ in furno, illitiones ex aromaticis, aliaque hujusce generis sexcenta, quæ therapeiam illorum methodicam complebant, & quæ morbo profligando plane imparia erant.

V. Sed cum dura necessitas remediorum inventrix & magistra esse soleant, contigit non multo post intervallo ut Empiricorum exemplo frequentaretur usus illitionum mercurialium, & exemplo Indigenarum Americæ increbrescerent decocta lignorum Guaiaci & Sassafras, radicumque Chinæ & Sarsæ-parillæ, ex quo tempore gemina salutis via Syphiliticis oblata est, nempe pyralisimum vel sudationem experiri. Ut autem neutra methodus sua carebat utilitate, sic etiam neutri sua deerat noxa: Altera periculosa erat, inefficax altera, unde acriter diuquæ disceptatum fuit utri præferenda esset.

VI. Per idem tempus usurpabantur ab Empiricis & Agyrtis plerisque duo alia remediorum genera, sed quæ apud cordatos probosque Medicos magnopere infamabantur; *suffumigia* nempe, quæ periculosa si ex cinabrio, quæ venenata erant si ex auripigmento parabantur; & *preparata quedam mercurialia* ore exhibenda, ut pulvis ruber Joannis de Vigo aut pulvis angelicus Nicolai Massæ, qui pulveres ambo deleteriarum virtutis sunt, qui cum Mercurio præcipitato rubro apprime conveniunt ambo, imo qui præcipitato illo rite præparato acriores sunt.

1495. MARCELLUS, Cumanus, videtur Cumis natus, in urbe Campaniæ

noq

non incelebri. Si vera conjicio, ignoratur ipsius nomen, nam *Marcellus* prænomen est, sed id in Auctõribus hujusce ætatis haud rarum fuit. Ut ut sit, constat illum Medici & Chirurgi Castrensis officio functum fuisse anno 1495. apud Duces exercitus Veneti, qui cum copiis aliis fœdere conjunctis non dubitavit Carolum VIII. Francorum Regem Neapoli in Galliam redeuntem ad Forum novum prælio laceßere sed infelici, die 6. Julii, anno quo supra; unde liquet hunc Auctorem oculatum atque adeo perquam idoneum testem fuisse eorum, quæ tunc temporis in primo nascentis luis ingressu contigere.

Medicas autem Mercelli illius observationes, quæ diu latuerant, ac ceptas debemus Georgio Hieronymo Velschio, Medico Augustano doctissimo, cujus studio Augustæ Vindelicorum editæ sunt in 4. anno 1668. cum Observationibus Jeremix Martii, Achillis Glasseri, Joannis Udalrici Rumleri. Hieronymi Reusneri, & ipsiusmet Velschii.

Prostat ibi observatio sequens, ordine quarta, qua veraci quidem sed rudiore stylo nascentis lues venerea graphice describitur.

Anno 1495. in Italia, ex uno influxu cœlesti, dum me recep i in Cast. Navarræ cum armigeris Dominorum Venetorum (Legendum No. varre, nam compertum est Historicorum testimoniis pariem copiarum Venetarum a Foronovana pugna suppetias ivisse Ludovico Sfortiæ Mediolanensium Duci Novariam obsidenti), Dominorum Mediolanensium plures armigeros & pedestres ex ebullitione humorum me vidisse at. testor pati plures pustulas in facie & per totum corpus, & incipientes communiter sub præputio vel extra præputium, sicut granum milii, aut super castaneam (*balanum*) cum aliquali pruritu patientis: Aliquando incipiebat pustula una in modum veliculæ parvæ sine dolore, sed cum pruritu; fricabant & inde ulcerabatur tanquam formica corrosiva, & post aliquot dies incurrebant in angustiiis propter dolores in brachiis curibus, pedibus cum pustulis magnis. Omnes Medici periti cum diffcultate curabant. Ego cum fiebotamia in saphena, aliquando in basilica procedebam cum digerentibus, purgantibus, tandem unctionibus in locis necessariis, & durabant pustulæ super personam tanquam leprosam, variolosam, per annum & plus sine medicinis.

Leguntur ibidem aliquot aliæ Observationes, quæ ad luem veneream perinde pertinent, ut cariei pudendorum seu ulcusculorum venereorum virgæ articulis 21. 70. 72. 73. 75. Phimoseos aut paraphimoseos, articulis 20. 24. Demum bubonum venereorum, articulis 7. 53. 54.

Equidem nullus dubito quin ea mentio bubonum venereorum, quos Marcellus Cumanus a se observatos refert, videatur prima fronte cum iis pugnare, quæ supra dicta sunt Lib. 1. Cap. 12. Bubones venereos scilicet non prius visos fuisse quam circa annum 1530. Sed advertatur velim (a)

[a] Velschius in Prefatione ad observationes Marcelli Cumanii.

H h

Ob.

Observationes Marcelli ad ovam Chirurgiæ Petri de Argelata, qua utebatur familiariter, adscriptas fuisse sine appposito anno & die, si quartam excipias quæ modo adducta est; & inde descriptas esse a Georgio Hioronymo Velfchio, in cujus manus liber ille ære suo pervenerat, editoque Augustæ Vindelicorum anno 1669. unde tum primum Marcellus innotuit Orbi literario, in quo antea planissime ingnorabatur: Quocirca cum nulla ratione liqueat quo anno scriptæ sint Auctoris illius Observationes, præsertim modo laudatæ, ubi de bubonibus venereis mentio fit, alienum non videri scriptas esse post annum 1530. cum repugnet nullomodo Marcellum, qui juvenis castra sequebatur anno 1495. inter vivos fuisse anno 1530. imo vero tardius: Ac proinde ex illis Marcelli Observationibus, ubi bubonum venereorum mentio facta est, nihil quidquam posse colligi, quod iis adverteretur quæ dicta sunt supra Lib. 1. Cap. 12.

Porro autem qualecumque judicium feratur de bubonibus venereis, ac certe constat saltem verbum ne unum quidem in illis Marcelli Observationibus extare de gonorrhœa venerea, unde videtur egregie confirmari quæ loco supra laudato de epocha gonorrhœæ veneræ primum nascentis propofita sunt.

1497. NICOLAUS LEONICEMUS, Vicentinus, natus (a) anno 1428.

(a) Mer. Medicinam Ferrariæ publice professus est 60. annos & amplius, pri-
cklinus in mulque varia Hippocratis & Galeni Opera Latine interpretatus Com-
Lindenio mentariis illustravit.

renovato. A (b) pueritia, imo a cunabulis ipsis ad 30. annum morbo Comitiali adeo
Balle, D. tentabatur, ut cum ad se redierat, pertæsus vitæ pene sibi manus afferre vellet.
Elion, Cri-
zique. Sed post trigesimum annum plane eo morbo defunctus est.

(b) Joseph Cibi & vini (c) maxime abstinens, somnique minimi, præsertim vero vo-
Scaliger, neris continentissimus: Ad extremam senectutem pervenit, omnibus mem-
in Episto- brorum ac sensuum officiis integer. Obiit anno 1524. ætatis 96.

la ad Franc. Præclare laudatur a Josepho Scaligero, (d) quod primus Philosophiam
Ventunia & Medicinam ipsam cum humanioribus Litteris conjunxerit, docuerisque
num, data bonines qui sine bonis Litteris Medicinam tractant, esse similes iis qui in aliena
an. 1575. (e) Petrus foro litigant.

Castella- Inter cætera, quæ multa sunt, Opera scripsit ad Joannem Franciscum
nus, in vi- Mirandulensem, Concordiæ Comitum, filium Galeoti Pici, qui frater
tis illu- erat celeberrimi Joannis Pici Mirandulensis, Libellum de Epidemia,
strum Me- quam Itali Morbum Gallicum, Galli vero Neapolitanum vocant, in quo, ut
dicorum. (d) Ubi ipse ait in Præfatione, inseruit summa capita disputationis, quæ Ferrariæ
supra. paulo ante habita fuerat de morbo Gallico.

(e) In Pra- Si Antonio (e) Scanarolo illius discipulo fides, ut ego quidem arbi-
tatione sui- tritor, adhibenda sit, Leonicenus primus Medicorum Italicorum fuit, adeoque
Operis. Europæorum omnium qui de morbo Gallico scripserit. Et sane constat

Li-

Libellum, cujus facta est mentio, typis Aldi Manutii editum esse Venetiis anno 1497. & a Natali Montefauo impugnatum fuisse anno eodem vel initio insequentis, cum Montefaurum Scanarolus refutaverit Opusculo typis excuso anno 1498.

In Libello suo Leonicens I. statuit; ut *novi Italia adveniant olim morbi prioribus seculis ignorati*, qua de re testem profert Cajum Plinium *Lib. 26. Histo. Naturalis*, sic simile quoddam suo *avo accidisse*. „ Jam enim, *inquit Ille*, insolitæ naturæ morbus Italiam & multas alias regiones invasit. Huic morbo nondum nostri temporis Medici verum nomen imposuerunt, sed vulgato nomine Morbum Gallicum vocant, quasi ejus contagio a Gallis in Italiam importato, aut eodem tempore & morbo ipso & Gallorum armis Italia infestata Cæterum, *pergit Ille*, cogor existimare (neque mihi potest in captum mentis aliter pervenire) natam hanc repente labem nostram ita infecisse ætatem, ut nullam superiorem. “

II. De natura quidem morbi fatetur ipse “ non defuisse, qui eodem cum illo putarint, quem Prisci elephantiasim nominaverunt; sicuti alii Morbum Gallicum esse (a) antiquis Lichenas, alii (b) Asaphati, alii (c) prunam sive Carbonem, alii ignem (d) persicum sive sacrum existimarunt. “ Sed hæc singula singulatim multis ipse confutat statuitque Morbum Gallicum inter epidemias, hoc est morbos populatim vagantes debere connumerari, quæ aut divina ira, ut Theologi sentiunt, aut vi astrorum, ut Astrologi opinantur, vel ex certa aeris intemperie, quemadmodum Medici arbitrantur, eveniunt. “

III. Missis prioribus opinionibus ultimam sequitur sententiam, quæ Medicorum est. “ Illud satis constat, *pergit Ille*, eo anno, quo Morbus Gallicus cœpit pullulare, magnam aquarum per universam Italiam fuisse exuberantiam. Testis est Roma, quæ prima id malum sensit, in qua Tybris ita intumuit, ut tota sit facta navigabilis.... Tantis denique imbris annus ille ubique maduit, ut terris exinde humentibus atque stagnantibus minus mirandum sit æstivum aerem ad illam venisse intemperiem, calidam scilicet & humidam, quam Medici atque Philosophi omnium putredinum matrem esse consentunt. „ In suæ opinionis confirmationem varia loca adducit ex Galeno & ex Hippocrate in *Lib. Epidemiorum*. “

IV. Denique ad Morbi Gallici curationem pauca proponit, nec alia præter venæ sectionem, purgationem, alterationem humorum salforum, dietam &c. Et ne unum quidem verbum de Mercurialibus addit.

CORADINUS GILINUS, Artium & Medicinæ Magister, scripsit ad 1597. Sigismundum Ducem Estensem Herculis filium, qui natus anno 1433. obiit anno 1504. *Opusculum de Morbo Gallico*, quod Epistolæ limites vix

excedit. Videtur autem scripsisse anno ipsomet 1497. ex principio Opusculi, ubi ait: "Cum anno elapso 1496. morbus quidam sævissimos mortales " quamplurimos invaserit tam in Italia, quam etiam ultra montes &c.

I. Testatur expressis verbis, morbum hunc apud Modernos incognitum fuisse, variasque de eo disceptationes inter Physicos, *hoc est Medicos* habitas fuisse (*Ferrariæ scilicet. Vid. quæ de Leonicensi modo dicta sunt*) & haberi, ideoque se decrevisse pro exiguis ingenio viribus aliquid de eo scribere quam brevissime, *eo scilicet sine quemadmodum ipse innuit*, ut ostenderet doctores Medicinæ hanc ægritudinem minime prætermisisse, eamque ab eisdem capitulatam fuisse ad laudem Omnipotentis Dei.

II. Morbi originem plane ignoravit, quem ideo arcessit vel a conjunctionibus Jovis & Martis, quæ anno 1494. & Saturni ac Martis, quæ anno 1496. obvenire; vel ab ira Dei in hominum scelera. "Videmus, inquit, summum Creatorem hoc tempore nobis iratum ob nefanda scelera nostra nos vexare cum morbo hoc truculentissimo, qui jam non per Italiam, sed etiam per omnem pene Christianam Religionem viget. Ubi que tubarum clangor sonat, armorum ubique strepitus auditur, ubi que bombardæ instrumenta bellorum conficiuntur & loco saxorum sphæricorum ferrea remanent, & hoc tempore inaudita fabricantur; Turcæ in Italiam vocantur. Quot jam incendia, quot deprædationes, quot miserorum mortalium strages jam vidimus, quot & quantas visuri sumus? Utinum mentiar!

III. Quod ad naturam morbi, credit Morbum Gallicum poni posse sub Capitulo ignis persici, quod probare conatur ex Galeno 14. de sanitatis ingenio, cap. 7. Avicenna Lib. 4. Fen. 3. cap. de igne persico, & Cornelio Cello, cap. de igne sacro seu persico; contra vero refellit eos qui arbitrabantur Morbum Gallicum cum lepra Arabum seu elephantiasi convenire.

IV. Licet Gilinus crediderit Luem Gallicam a causis universalibus oriari, attamen subodoratus est contagione ex impura venere contrahi. "Unum tamen, inquit, inter cætera dico, Morbum hunc contagiosum esse, unde iterum atque iterum moneo ne cum mulieribus hac perniciofa ægritudine laborantibus, aut eæ cum viris hac ægritudine infectis, se commiserint aliquo pacto, quia vidi multos hac de causa infectos cruciatus maximos passos fuisse.

V. Ægotantes dehortatur ne temere confidant istis imperitis, ut barbitonsoribus, susoribus ac cerdonibus, & maxime viatoribus qui nostrarum carnium sunt carnifices nec humorem facientem morbum evacuant, sed solum cum localibus, (ni ipse fallor cum emplastris aut unguentis mercurialibus) has passiones curare volunt.

VI. Juxta eum cura hujus ægritudinis tribus completur instrumentis. 1. Regimine & nutritiva hoc est dixta. 2. Phlebotomia & purgatione. 3. Bal-

nea-

neatione in decocto herbarum emollientium, & inunctione partium dolentium cum linimento attenuante & incidente.

VII. Prescribit ut ulcera & pustulæ ungantur *ad solem vel ignem* unguento ex detergentibus, mundificantibus, exsiccantibus & larcoticis; cujus formulam profert. Quod si hoc unguentum impar fuerit, alterum proponit ex iisdem fere constans, sed cui sublimatum ad partem vigesimam octavam & Mercurius fluens ad partem decimam quartam totius adduntur, quo suadet ut ulcera unica vice illiniantur, adhibito dein butyro ad escharæ delapsum.

VIII. Demum auctor est ut cauterium actuale vel potentiale super commissuram coronalem admoveatur, „ Et hoc, *inquit*, in pluribus “ expertus sum hanc ægritudinem in gula patientibus, & omnes curati “ sunt ad laudem Dei Omnipotentis, qui omnium superiorum & inferiorum causa existit. “

Extat hoc Gilini Opusculum *Tom. I. Collectionis Luisinæ*, sed antea typis jam editum fuerat; quandoquidem, si Jordanem Ziletum Tipographum audiamus, Tomus ille primus Collectionis illius Tractatus eos complectitur qui *impressi alias fuere*; prostantque tantum in Tomo altero hi qui *Manuscripti dumtaxat antebac fuere*.

JOANNES VVIDMAN, sive VVEIDMANN, dictus Meichinger.

Tractatus (a) de pustulis, quæ vulgato nomine dicuntur Mal de Franzos, 1497. in 4.

(a) Vanderlind. Mercklinus. Mangetus.

Jos. Simlerus in *Epist. Biblioth. Gesner.* mentionem quidem facit *Joannis Vvidman Medici*, sed Tractatum alium laudat nempe Libellum *De usu Thermarum Ferinarum*. Idem alibi nomine Joannis Saliceti profert Tractatum *De pestilentia & ejus fuga*.

Pari rationi Joannes Vvidman a Joanne Saliceto distinguitur, ab Israele Spachio in *Nomenclatore Scriptorum Medicorum*, & a Palchale Gallo in *Bibliotheca Medica*; & illi quidem Libellus *De usu Thermarum Ferinarum*: Huic vero Tractatus *De pestilentia & ejus fuga* adscribitur.

Sed Joannes Georgius Schenckius in *Bibliotheca Medica* utrumque confundit sub nomine *Joannis Saliceti dicti vulgo Vvidman & Meichinger*, cui tribuit cum Librum *De pestilentia & ejus fuga*, excusum Tubingæ 1501. tum Tractatum *De usu Thermarum Ferinarum & Cellensium*.

Demum a Vanderlinden *De Scriptis Medicis*, a Mercklino in *Lindenio renovato*, & a Joanne Jacobo Mangeto in *Bibliotheca Medica*, tres memorantur Auctores cognomines, *Joannes Salicetus* dictus *Vvidman*, ad quem Librum *De pestilentia & ejus fuga*, Tubingæ excusum anno 1501. in 4. Joannes *Vvidmannus* ad quem Epistolam *De Lumbrico lato*, & Tractatum *De Balneis Thermarum Ferinarum* in Ducatu Vvurtembergico; & Joannes *Vvidman* dictus *Meichinger*, ad quem referunt Tractatum *De*

Pustulis, quæ vulgato nomine dicuntur Mal de Franzos. 1497. in 4.

Quid in hac pugnantium sententiarum diversitate sentiendum sit vix liquere potest, nisi libri ipsi, qui laudantur, inspiciantur, quos mihi nondum contigit usurpasse. Interea tamen multa sunt, quæ suspicionem faciant unum & eundem Auctorem fuisse, quem Vanderliaden, Mercklinus & Mangerus in tres ex errore dividunt, modo tamen excipias Auctorem Epistolæ *De Lumbrico lato*, quæ prostat in undecimo *Libro Observationum & Epistolarum Medicinalium* Gregorii Horstii. Constat enim Epistolam illam scriptam fuisse anno 1623. a Joanne quodam Vvidemanno ordinario Ulmenſi Physico, qui nostro Joanne Vvidmann toto sæculo ad minus junior fuit.

Cæterum tres reliqui Tractatus antiqui sunt, nam 1. *Liber de Pestilentia & ejus fuga* Tubingæ excusus fuit anno 1501. 2. *Tractatus de usu Thermarum Ferinarum* in Ducatu Vvurtembergico, quæ vulgo *Vvilabad* dicuntur, laudatur a Jos. Simlero in *Epitome Biblioth. Gesner.* quæ primum edita est anno 1574. Imo insertus fuit a Joanne Rudolpho Camerario Collectione *Disputationum Medicarum, in illustri Academia Tubingenſi superiore quidem tempore habitatarum & ob exemplarium seorsim editorum paucitatem pene deperditarum*, quam edidit Tubingæ, anno 1611. & Joanni Vvidmanno dicto *Meibinger* tribuitur. 3. Tandem *Tractatus de Pustulis & morbo qui vulgo dicitur* Mal de Franzos, editus fuit anno 1497. atque adeo tres illi Tractatus ad eundem Auctorem pertinere videntur, sed Joanne illo altero Vvidemanno Ulmenſi Medico antiquiorem.

Postremus ille *Tractatus Joannis Vvidmann, disci Meibingeri, De pustulis & morbo qui vulgo dicitur* Mal de Franzos, latet manuscriptus alicubi in Bibliotheca Regia, quandoquidem indici intercriptus est cum adjecto numero, quo reperiundus sit, sed in apposito numero erratum fuit, neque liber adest. eo quo designatur loco. Si casu obvius fieret, inde forsitan facile futurum esset inspecto Libro Bibliographorum discrepantias componere: Sed vix est ut in incredibili Codicum omnigenorum multitudine Liber alieno loco repositus reperiri possit.

1498. NATALIS MONTESAVRUS, Veronenſis, impugnavit Opusculum Nicolai Leonicensi de Morbo Gallico, Libello quem intercripsit *De Epidemia, quam vulgares* Mal Franzolo *appellant*, & quem in *Capitula* 6. distribuit.

(a) Capitulo 3.

I. In eo contendit (a) Morbum Gallicum novum non esse, sed a Medicis olim descriptum sub nomine *Botbor, Asaphasi, & Tussi*, hoc est Tumorum, Tineæ, & Furfurum sive Porriginis, quod, licet ex se absurdum sit, multis tamen conatur confirmare, Leonicensem dure castigando quod aliter senserit.

(b) Capitulo 4.

II. Ipse tamen confitetur (b) *malas*, ut loquitur, *dispositiones anni* 1496. & pro

Et pro parte anni 1497. in quibus intensa caliditas tempeſtati plurimæ ſucceſſit, alias putredines in corporibus humanis cauſaſſe bis temporibus Et ideo alias puſtularum ſpecies, Et forte, ſubjungit ille, quod hæc diſpoſitio provenit ab influentia ſtellarum, quæ ſunt cauſæ quæ ad Medicum non attingunt: Dicunt enim Aſtologi quod cauſa harum puſtularum eſt conjunctio Saturni cum Capite Arietis.

III. Dicit, (a) quod in cura tres principales indicationes habendæ ſint, (a) Capita prima eſt humorum qualeſcumque fuerint evacuatio: ſecunda eſt debitum regimen in ſex rebus non naturalibus; tertia eſt debitum localium uſus. Liquet abunde quibuſnam remediis primis indicationibus ſatisfaciendum eſſe putet juxta Methodum therapeuticam illius ſæculi. Quod ad tertiam vero attinet, in uſum advocat unguenta ex detergentibus, mundificantibus, exſiccantibus &c. Sed cum quibus ne gutta quidem Mercurii admixta ſit. Libellus ille Montefauri edi debuit anno 1497. vel ut tardiſſime principio anni 1498. cum certum ſit Opus Antonii Scanaroli, quo impugnatur, ipſo anno 1498. typis excuſum fuiſſe.

ANTONIUS SCANAROLUS, Mutinenſis, Nicolai Leonici ſententiam de Morbo Gallico a Natali Montefauri impugnata defendendam ſuſcepit *Epistoſa ad Neſtorem Morandum Medicum Bononiensem* ſcripta cui titulus eſt: *Diſputatio utilis de Morbo Gallico, Et opinionis Nicolai Leonici confirmatio contra Natalem Montefaurum Veronenſem eandem opinionem oppugnantem*, & quæ Bononiæ typis edita (b) dicitur anno 1498. in 4. (b) Mercklinus in Linde. renovato.

Auctor iſte quæ a Leoniceno dicta erant repetit, multisque probat Morbum Gallicum & ab *Aſaphati* ſive Tinea, & a Lepra & a cæteris morbis ante cognitum omnino diſcrepare, & affectum eſſe vere novum, epidemicum, & inductum nimia aeris intemperies in caliditate Et humiditate. Cæterum de curatione ſilet.

SIMON PISTOR, Lipſienſis, primus Germanorum ſcripſit de Morbo Gallico ſequentia Opuscula.

1498.
1500.
1501.

I. *Positio de Malo Franco.* Lipſiæ 1498. in 4.

II. *Declaratio deſenſiva positionis de Malo Franco.* Lipſiæ 1500. in 4.

III. *Confutatio conſtatorum circa positionem quamdam extraneam Et puerilem Doctores Martini Mellerſtad de Malo Franco nuper ventilatam in Gymnaſio Lipſienſi.* Lipſiæ 1501. in 4.

Lucubrations illas Simonis Piſtoris hætenus obvias non habui, ſed eas arbitror nihil aliud eſſe præter meras Poſitiones ſive Theſes in diſputationis argumentum propoſitas. Et ſane vix poterat anno 1498. hoc eſt quarto anno poſt luis venereæ ingreſſum quidquam diligentius expectari a Medico Lipſienſi, qui videtur non in Saxonia ubi morbus ille nondum pervulgatus erat, ſed in Italia hujus noticiam hauſiſſe.

Ultimum recensitorum Opusculorum polemicum eſt adverſus Marti-

H 4 num

num Polichium Merlestadium, de quo infra ad annum 1502. Patet autem ex Epistola Joannis Manardi ad Martinum illum Polichium scripta, de qua infra ubi de Manardo, 1. Simonem in multis redarguisse Leoniceum. 2. Credidisse *Morbum Gallicum ab antiquis collocatum fuisse sub Capite pustularum, anthematum, aut ut (Simon dicit) albumere.* 3. *Ad commune Medicorum illius ætatis confugium se recepisse*, asserendo morbum hunc occultis fieri proprietate de cælestibus corporibus emanante; quæ singula Joannes Manardus docte confutat.

1498.

SEBASTIANUS AQUILANUS. Ignoratur hujus Medici nomen si vox, *Aquilanus*, patriam ut videtur designet, ac ille oriundus fuerit ex urbe Episcopali *Aquila*, quæ Metropoli Romanæ subest. In Epistola ad Ludovicum de Gonzaga, Episcopum Mantuanum scripta, se referre ait, *quæ diebus elapsis de agitudine, quam Morbum Gallicum vocant, apud Principes suos disputata erant*; quibus videtur subindicare disputationem Ferrariæ habitam, de qua plura vide in articulo *De Leoniceo*. Sane constat Ludovicum Gonzagam, qui Ludovici Mantuæ Marchionis quartogenitus erat, Sedem Mantuanam tenuisse ab anno 1483. ad annum ulque 1511. quo fato functus est. Potuit ergo ea Epistola ad illum facile scribi anno 1498. ut vel inde colligi posse videtur, quod Sebastianus neminem laudet, laudetur vero ipse a Jacobo Cataneo de Lacu Marcino una cum Leoniceo & Torella, hoc est cum primis & antiquissimis Scriptoribus de lue venerea.

Constat eam Aquilani Epistolam non modo editam fuisse anno 1517. Bononiæ in 8. apud Benedictum Heftorem cum Marco Gattinaria *De Curis agnitudinum particularium*; Gentili de Fulgineo, Blasio Astaris, & Cæsare Landulpho; sed Lugduni typis prius excusam fuisse anno 1506. apud Bevelaque, in 4. una cum Marco Gattinaria, Blasio Astaris & Blasio Cæsare Landulpho, ut videre est apud Mercklinum in verbo *Marcus Gattinaria*.

In ea Epistola *declatur primo, quo nomine debeat appellari hæc agnitus, & quod in Galeni Operibus memoria habeatur*; in cujus opinionis confirmationem loca non pauca e Galeno adducit *De Elephantiasi*, ut hanc cum Morbo Gallico eandem esse conetur asserere.

Secundo vero, an talis morbus sit unus vel plures? Et unum esse, nempe elephantiam solam Auctor pronuntiat.

Tertio venit in rationalem curam, quæ juxta cum perficitur Dieta, Pharmacia & Chirurgia; Dieta, qua præscribitur rectus usus rerum non naturalium; Pharmacia, quæ varia suppeditat remedia, purgantia, digerentia, alterantia, inter quæ plurimum laudat vinum viperarum: Demum Chirurgia, ope scilicet phlebotomiæ, & unguenti quo ulcera & pustulæ illinuntur.

Id unum notatu dignum videtur, quod in compositione unguenti Mercurium

curum admittat ad partem decimam quintam. At vero sequentia immedie subdit. „ Ab hac (a) tamen unctione caveant, qui sunt debilis complexionis; etenim potius sophistica invenitur quam vera: Nam videretur omnes recidivisse ut prius. Sed si quis hoc pati potest, curatur. „

GASPAR TORELLA, Hispanus, natus est Valentia in Hispania ex patre Medico celebri; „ Genitor meus, inquit ipse, in Praefatione praemissa Tractatibus De dolore & de ulceribus in pudendagra, Medicus fuit, cujus memoria ob hujus artis eximiam peritiam sempiterna erit. Insuper sumus hac tempestate tres germani ab eodem patre nati, in eadem Facultate Doctores, inter quos ipse minimus sum. „

Innotuit Cardinali Roderico de Borgia, qui & ipse ex eodem regno Valentino oriundus, & a summo Pontifice Calixto III. suo avunculo ad Archiepiscopatum Valentinum promptus erat anno 1455. & apud illum dignitate summi Pontificis potitum anno 1492. Medici domestici ministerium obivit. Ipse enim in antiquissimis suis Operibus anno 1497. scriptis se profiteretur Alexandri VI. Pontificis maximi Praelatum domesticum ac Medicum esse. Quod idem munus obtinuit etiam sub Julio II. ut liquet ex alio ejusdem Libro De Regimine seu praeservatione sanitatis, quem ad Julium II. scripsit anno 1506.

Ignoratur quo tempore ab Alexandro VI. Episcopus Sanctae Justinae renuntiatus sit. Sed constat Auctorem illo titulo gloriari in ipso Tractatu De pudendagra, qui omnium ipsius Operum antiquissimus est, & anno 1497. scriptus. Imo locus est conjecturae ad eam dignitatem anno 1487. proventum cum fuisse, quod ipse referat in laudati Tractatus prooemio, *agi tunc annum decimum, cum circa ecclesiastica occupatus arti Medicinae minime vacare potuit*; nisi id non de Episcopatu, sed de munere quodam Ecclesiastico apud summum Pontificem videatur intelligendum.

Episcopatus ille Sanctae Justinae, quem Gasparem Torellam obtinuisse certum est, in Sardinia situs suberat Metropoli Arborensi, vulgo Orisagni. Dicitur a Francisco de Vico, *Historia general de la Isla y Reino de Sardenia, parte 6. Cap. 80. & 81.* suppressus anno 1504. & unitus esse Ecclesiae Metropolitanae Arborensi. Constat (b) tamen Gasparem nostrum Sessioni secundae Concilii Lateranensis V. sub Julio II. interfuisse anno 1512. & subscripsisse cum titulo *Episcopi Sanctae Justinae*: Unde necesse est, si jure cesserit, titulum saltem retinuisse.

Extant hujus Auctoris Tractatus quatuor De Morbo Gallico.

I. Primus, qui inscribitur *De pudendagra*, (c) Romae scriptus est ad Reverendissimum & Illustrissimum in Christo Patrem & D. D. Caesarem de Borgia titulo Sanctae Mariae novae Diaconum Cardinalem Valentinum. Hinc abunde liquet ante annum 1498. scriptum fuisse, quo Caesar de Borgia notus filius Alexandri VI. fratre Joanne de Borgia Gandiae Duce an-

dolo,

(a) Cap. 3.

1499.
1506.

(b) Vid. ad illum annum Collect. Concilior. P. Labbe.

(c) In principio Dialogi De dolore in pudendagra.

dolo, an casu interfecto, Cardinalis dignitatem abdicavit. Imo vero constat Auctoris testimonio in fine Operis hunc Librum anno 1497. scriptum fuisse: Unde minime mirum est si ab Antonio Scanarolo laudetur in Opere, quod Bononiæ typis excusum est anno sequente 1498.

In illo Libro affirmat Torella, „ Malignam hanc ægritudinem incepisse anno 1493. in Francia (*hujus loco legitur in Collectione Veneta Aloisii Luisini, in Alvernia*) & sic per viam contagionis pervenisse in Hispaniam, ad Insulas (*Siciliam,*) in Italiam; & finaliter serpendo totam Europam peragravisse, & si fas dicere est, totum orbem.

„ Dicunt Astrologi, *pergit ille*, hunc morbum evenire a constellatione corporum superiorum: Nam dicunt quod effectus universalis in causas universales resolvi debet, & hoc propter Saturnum existentem in Ariete: Nam in Ariete & in Piscibus sunt quædam stellæ habentes virtutes generandi monstra.... Alii dicunt quod est flagellum Dei.

Refert inde eorum opiniones qui putabant Morbum Gallicum descriptum fuisse ab Avicenna 2. *Canone, cap. de Thure*, ab Hugone Senensi *Consilio 70. de infectione cutis & asaphati cum pustulis faciei*, imo ab Hippocrate *Apborismis 20. & 21. sectione 3. & a Galeno Commentario in eisdem Apborismos*.

Fatetur quidem morbum, „ Contagiosum esse sicut scabies, cujus species est; *sed licet* ut plurimum eveniat per viam contagionis, *causet* nihilominus aliter posse evenire, ut utendo malo regimine.... si utantur cibo & potu falso, acuto aut amaro, ut evenit Magistro Antonio Marci, Catalano, Artium & Medicinæ Doctore.... Si non utantur balneatione ut erant soliti; si non mutant pannos, si priventur exercitio, aut frictionibus; aut si utantur medicinis aut cibis adducentibus materiam ad cutim.

Credit *curam pudendagæ compleri dieta & potione*. Circa dietam multa proponit, sed vulgaria. Cura vero per potionem tres indicationes complectitur: *Primam ad evacuandum phlebotomia & purgatione, præmissa humoris peccantis digestionem: Secundam ad resolvendum & exsiccandum ope balnearum & remediorum localium, inter quæ laudat præsertim sudationem in furno calido, aut saltem infusa: Tertiam denique ad consumandum reliquias materię, si quæ remanserunt in cute*, ope unguentorum, quorum varia proponit genera ex detergentibus, mundificantibus, exsiccantibus, addito etiam in nonnullis Mercurio saliva humana extincto, sed ad minimam dosim.

II. Sequuntur ex ordine temporis *Consilia quinque Medica*, seu potius Historiæ ægrotantium quinque, quos curandos Auctor habuit eodem anno 1497.

Æger I. Morbum contraxerat quia „ De mense Augusti anni 1497.
rem

rem habuerat cum muliere habente pudendam. Illi aderat initio "ulcus in virga cum quadam duritie longa tendente versus inguina ad modum radii, cum forditie & virulentia. Post sex dies ulcere semicurato arreptus fuit ab intensissimis doloribus capitis, colli, spatularum, brachiorum, tibiaram & constarum. Elapsis postea 10. diebus apparuerunt multæ pustulæ in capite, facie & collo."

Alter æger, si Torellæ fides sit, sed credat Judæus Apella, ex immoderatis laboribus per mensem Augustum anni 1497. & pravo regimine infectus fuit pudendagra sanguinea cum ulcusculis in virga, maculis latis, rubeis, sive pustulis in universo corpore, quæ cortices instar fursuris emisserunt; ac demum doloribus intensis capitis, colli & spatulorum.

Tertius per viam contagionis fuit infectus pudendagra pblegmatica cum pustulis grossis, crustosis, ex quibus exibat sordities grossæ, albæ, ad fuscedinem tendens: cum doloribus. Curandum illum habuit mense Octobri anni 1497.

Quartus infectus erat pudendagra ab anno uno, & ut ipse retulit Torellæ, evenit ei dormiendo in eodem lecto cum fratre suo infecto. Aderant initio dolores, & deinde pustulæ grossæ, crustosæ, cineritiæ, quibus evanescentibus rediere dolores cum ulceribus in tibia. Curatus fuit anno eodem 1497.

Quintus morbum concepit sponte juxta Torellam ex prava sanguinis diathesi. Fuit autem arreptus pudendagra cum pustulis ac intensissimis doloribus brachiorum, spatularum, colli, pedum ac manuum, & præcipue in partibus anterioribus tibiaram, ubi ossa quasi a carnibus sunt denudata.

Præmissis alterantibus, digerentibus, purgantibus, stufarum usu, unde affatim sudaverunt, & inunctione ulcusculorum & pustularum cum unguento detergente, omnes dicuntur perfecte convaluisse.

III. Tractatus tertius, qui inscribitur *De dolore in pudendagra evenire solito* scriptus fuit anno 1499. in oppido Blesensi in Gallia, ut ipse ait in proœmio, ubi Auctor cum Cæsare de Borgia, qui Curiam Christianissimi Ludovici Francorum Regis sequebatur, moram traxit per totam quadragesimam propter aliquam aeris pestiferi suspicionem. Non mirum igitur, si in illo Tractatu laudet Torellæ Tractatum de pudendagra a se compositum superioribus annis, quando Roma erat, Cæsaremque de Borgia, ad quem scribit, non Cardinalem dicat ut in priore, quippe qui dignitate illa se jam abdicavit, sed Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Gonsalonarium ac generalem Capitaneum & Ducem Valentini. Siquidem Cæsar de Borgia illo Ducatu a Ludovico XII. Francorum Rege donatus fuit anno 1498. Gonsalonarius vero & Capitaneus generalis Sanctæ Ecclesiæ Romanæ ab Alexandro VI. patre suo renuntiatus est die 29. Martii anno 1500. ut liquet ex *Diario Alexandri VI. a Burchardo scripto* & a G. G. Leibnitio edito. Unde colligere est Librum hunc Torellæ, etsi Blesis scriptus fuerit anno 1499. publici juris factum non fuisse nisi anno 1500.

In

In Epistola nuncupatoria sæde putideque adulatur Cæsarem Borgiam hominum sceleratissimum, quem tamen aperte laudat, ceu „ unum qui „ seculum exornet suum, unum inter Principes doctum & litterarum „ cultorem, unum Litteratissimum, unum in armis peritissimum, unum „ qui domi bellicque magnus ævo illo videri possit, unum qui Ecclesiæ „ libertatem & auctoritatem dilucidet & augeat, a quo iustitia Bruti, „ constantia Mutii, continentia Scipionis, fidelitas Marci Reguli, ac „ magnanimitas Pauli Æmilii superetur. „

(a) Histoire Ge-
nealogique des
Grands
Officiers
de la Cour
ronne,
par le Pe-
re Simplicien.
T. 6.
V. Du Che-
valier de Valen-
tinois.

Inter adulatoria mendacia videretur quoque referenda nomenclatio Cæsari Borgiæ adscripta, quem *de Francia* dicit. Sed constat (a) a Ludovico XII. Cæsarem de Borgia ejusque posteros omnes authentico diplomate dato mense Majo anni 1499. in nomen ac scutariam tesseram Franciæ (*au nom & armes de France*) adoptatos fuisse. Inde est quod teste eodem Burchardo hoc Franciæ nomen & Alexander VI. Cæsari de Borgia tribuerit, dum eum Gonsalonerium creavit; & Cæsar ipse de Borgia sibi arrogaverit. Sed iis missis, quæ sunt alieni instituti, ad ea redeamus quæ de lue venerea afferuntur & quæ sunt nostri.

Itaque in hoc Libello, in quo duo introducuntur Collocuratores, *Vulgus*, quod de pudendagra multa quærit, & *Medicus*, qui Vulgi quæstionibus respondet, legere est.

„ 1. Gallis manu forti Italiam ingredientibus, & maxime Regno Parthenopæo occupato, & ibi commorantibus hunc morbum detectum fuisse. Idcirco ab Italis Morbum Gallicum cognominatum esse imaginantibus ipsum Gallis connaturalem esse: In Gallia vero, quia in reversione Regis Caroli cum suis in Galliam hic morbus apparere incepit, credentes Gallos cum ex Neapoli apportasse, hanc ob causam Morbum Neapolitanum vocavisse.

„ 2. Morbum Galicum extirpari posse, si præsidentes, ut summus Pontifex, Imperatores, Reges atque alii Domini ordinent matronas inquitores hujus morbi, & perquirant in primis publicas mulieres, & si eas infestæ invenerint, relegent ad locum a Communitate seu a Domino destinatum, ibique curentur a Medico seu Chirurgico deputato & salariato, & hoc pacto infallibiliter extirpabitur morbus iste non solum horrendus sed etiam contagiosus.

„ 3. Deceptores ac trufatores suis temporibus usos esse perniciosius unguentis cum quibus maximam auri copiam devorarent ... versus quos Protomedici nullam faciunt inquisitionem, & profecto impie agunt. „ Propositis dein tribus unguentorum speciebus, quæ singula Mercurialia sunt, & quorum præcipuum est unguentum Saracenicum, sic concludit: Supradicta unguenta tanquam a peste fugienda sunt, & contra Præficientes insurgant, si velint, Protomedici, aut ipsa natura humana clama-

mabit: Interficiuntur homines, non moriuntur; qui si non in hoc „ sæculo, in alio tamen reddent rationem & submergentur in puteo „ pœnitentiæ. „

4. Affirmant ea cura mercuriali extinctos esse *Alfonsum de Borgia*, qui Alexandri VI. ex fratre Petro Ludovico nepos erat, & *ejus* (Alfonſi) Fratrem, Joannem ſcilicet de Borgia; ut mihi quidem videtur, Archiepiſcopum Montis Regalis in Sicilia, ad Cardinalis dignitatem eveſtum ab Alexandro VI. anno 1492. quem conſtat (a) inter primos lue venerea occubiſſe; præſagiturque Cardinalem ipſum Segobricenſem, qui *(a) Viſ* *unguento iſtiusmodi curatus credebatur non diu viſſurum eſſe, quia maraſma-* *dre VI.* *& de Ce-* *ſar de* *Borgia.* *Par Ale-* *xandre* *Gordon.* *ſag. 34.* *ſtus eſt.* Et ſane recte de illo augurabatur Torella: Nam Cardinalis ille Segobricenſis, Bartholomæus ſcilicet Martinus, Valentinus apud Hiſpanos, Magiſter domus Papæ, Epicoſcop Segobricenſis, qui Prefbyter Cardinalis titulo ſanctæ Agathæ in Suburra creatus fuerat ab Alexandro VI. anno 1496. unde Cardinalis Segobricenſis dicebatur, ſato ſunctus eſt 8. Kalendas Februarii, anno 1500. hoc eſt 1501. ſi novæ computationis ratio habeatur juxta quam anni principium a prima die Januarii exordiri ſolenne eſt.

Porro notandum cenſeo Torellam, qui a Mercurialibus ita abhorret in hoc Dialogo, in priore Traſtatu pauculam Mercurii doſim cum unguentis ad ulcera miſcuiſſe, ſed forſan infortuniis, quæ imprudenti Mercurialium uſu eveniſſe viderat, ab ea methodo deterrius eſt.

IV. Quartus Traſtatus *De ulceribus in pudendagra*, qui una cum præcedente editus eſt, multa continet de natura & cauſis ulcerum, ſed ex Arabum doctrina deprompta, ut ea ſerebant tempora. Quod ad eorum curam attinet, ſuadet uſum multiplicem detergentium, mundificantium, incarnantium, conſolidantium &c. ſed cum quibus in iſto, ſicut in præcedente Traſtatu, ne guttam quidem Mercurii admiſtam reperire eſt.

Haud videtur ſilentio prætermittenda medicina, quam ad ulcera virgæ proponit. „ Inſectus, *inquit*, & ulceratus in virga, quanto citius „ poterit, faciat ſibi fugi locum ulceratum ab aliqua vili perſona, „ exterius ſemper exprimendo, aut parumper ſacrificetur, aut deſuper „ apponatur parum de ſapone molli cum calce, aut gallus ſive colum- „ bus in culo deplutamus & excoriatus, ſic vivus loco ulcerato ſæpius „ apponatur, aut apponatur rana per medium inciſa. „

Porro Lectorem monitum velim me ad prædicta excerpta antiqua Operum Gaſparis Torellæ editione uſum eſſe, quæ Romæ prodijt apud Joannem Bericken & Martinum de Amſterdam: Multa enim addita, omiſſa, interpolata ſunt in Collectione Veneta Aloiiſii Luſini.

SECULUM DECIMUM SEXTUM.

1500.

1501.

(a) Schen-

ckius, in

*Biblio-**theca Me-**dica.*

Linde-

nius, *De**scriptis**Medic.*

Paschalis

Gallus in

*Bibliothec.**Medic.*

Merckli-

nus in

Linden.

renov.

1503.

(f) In *Bi-**bliothec.**Medic.*(g) In *Bi-**bliothec.**Medicis.*

(e) In

Linden.

renov.

1503.

(f) In *Bi-**bliothec.**Medic.*(g) In *Bi-**bliothec.**Medic.*

(h) In no-

menclatio-

ne script.

(i) In *Bi-**bliothec.**Medic.*(k) In *Bi-**bliothec.**Medic.*(l) *De**scriptis**Medicis.*

(m) In

Lindenio

renov.

(n) In

*Biblioth.**Medic.*

CONRADUS SCHELLING, Heidelbergensis, scripsit (a) *Consilium ad pustulas malas, morbum quem Malum de Francia vulgus appellat, editum Heidelbergæ in 4.*

Auctor ille Medicus fuit *Philippi Electoris Palatini* teste (b) Joanne Georgio Schenckio. Cum autem Philippus ille Posthumus dictus, filiusque Ludovici III. Electoris Palatini, & Margaretæ filiae Amedæi VIII. Ducis Sabaudie, natus sit anno 1448. obieritque anno 1508. verisimile est Conradum Schelling, qui ejus Medicus fuit, scripsisse laudatam Dissertationem circa annum 1500. quod sane & ipsa inscriptio videatur satis innuere.

Hoc Opus Conradi Schelling videre nondum contigit, sed tantum *Consilium ad pestem germanice scriptum & editum Heidelbergæ in 4.*

MARTINUS POLLICHIUS, Mellerstadius, natus Mellerstadii in (b) Ubi Franconie oppido, Lipsiæ in Medicina Doctorem lauream assecutus & ibidem Professor publicus constitutus est. Fredericum III. dictum Sapientem, Ernesti filium, Electorem & Saxonie Ducem in Palæstinam religionis ergo anno 1493. peregrinanti secutus est tanquam Medicus. Cum Academia VVittebergenfis erecta fuit anno 1502. ipse primus Rector, primus matriculæ inscriptus, primus Theologiæ Doctor fuit. Obiit ibidem anno 1513. secundum (c) Gesnerum & (d) Vanderlindem, aut 1514. secundum (e) Mercklinum & (f) Mangetum.

Inter alia ejusdem Opera, quæ a Gesnero recensentur, extat libellus inscriptus *Responsio in superadditos errores Simonis Pistori de Malo Franco*, qui Lipsiæ editus fuit apud Marcum Brandt, anno 1501. in 4.

(g) In *Bi-* Extat Joannis Manardi Epistola ad Martinum illum Mellerstadium data *bliothec.* Mirandula anno 1500. quæ prima est *Lib. 2. Epistolarum ejusdem Medicinæ* *hium*, in qua ait Manardus se & defensionem Martini & Simonis Pistorii *accusationem* accepisse: Quæ intelligi non possunt nisi de alia quadam Po- *lichii defensione*, quæ ante annum 1500. edita fuerit, vel saltem de alia *editione Responsionis illius in superadditos errores Simonis Pistorii*, quæ sit *anno 1501. antiquior*, nisi erratum fuerit in anno Editionis appolito.

JOSEPHUS GRUNBECKIUS, natione Germanus, scripsit *Tractatum De mentulagra sive Morbo Gallico* (juxta alios *Regio*) editum Venetiis, 1503. in 4.

De Libri titulo summa inter Bibliographos discrepantia. Agitur secundum (g) Gesnerum, (b) Spachium & (i) Paschalem Gallum de *Mentulagra sive Morbo Gallico*. At vero juxta (k) Schenckium, (l) Lindenium (m) Mercklinum & (n) Mangetum agitur de *Mentulagra sive Morbo Regio*. Mirum sane, si a Grunbeckio *Mentulagra Morbus* Gal-

Gallicus, *Regius* dictus fuerit, quod supponendum est, ut Bibliographorum testimonia conveniant.

Mihi tamen in mentem venit a Zacharia summo Pontifice Morbi Regii mentionem factam esse circa annum 746. (a) in Epistola 12. ad Bonifacium, Archiepiscopum Moguntinum, qui ad ipsum de morbo illo in Germania tunc vulgari scripserat, eo consilio ut Disciplina erga ægrotantes istiusmodi observanda certior fieret. Liquet autem ex laudata illa Epistola Regium hunc morbum ipsissimam esse Arabum Lepram, quæ in Europa tunc temporis vulgo grassabatur. Potuit ergo eadem lepræ denominatio in Germania abhinc permanere ad ætatem usque Grunbeckii, æque inde effici ut ille affinitate adductus, quæ initio inter luem venerem & lepram interesse a nonnullis credebatur, syphilidem quam *Mentulagram* dicit, non modo *Morbi Gallici*, sed etiam lepræ, seu ut quotidianus erat in Germania sermonis usus, *Morbi Regii* vocabulo designandam esse arbitratus sit. Sed de his viderint illi, penes quos Grunbeckii Liber latet.

JOANNES DE VIGO, Genuensis, oriundus ex urbe *Rapallo*, quæ est in ditione Genuensi, unde *Rapalligenam* seipsum dicit initio *Lib. 7. suæ Chirurgiæ copiosæ, & in præmio Compendiosæ*, Chirurgus primarius fuit Julii II. Pontificis Maximi, qui electus die ultima Octobris anni 1503. obiit 21. Februarii anni 1514. Vixit in Curia Romana, ubi Julius II. eum (b) *summis honoribus, officiis & beneficiis honestavit, & Sixtus Gara de Ru-* (i) Vide vere, Julii II. ex sorore Luchina nepos, *S. P. ad vincula Cardinalis, ac Epistolam Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Vicecancellarius trecentis aureis pro Opere sin-* *Joan. An-* *racini D.* *M. Com-* *pend. præ-* *fixam.* *gulis annis donabat.* Composuit circa annum 1503. ut ipse ait in præmio, *Chirurgiam suam copiosam, quam nuncupavit Bandinello de Saulis, Cardinali Præsbytero tituli Sanctæ Sabinæ.*

Hoc Opus Libris 9. universam Chirurgiam complectitur. In 5. differtur satis fule de Morbo Gallico duobus, primis Capitibus, quæ eadem in Collectione Aloisii Luifini excerpta prostant.

Teste Auctore illo 1. Morbus apparuit in Italia anno 1494. mense Decembri, „ Et ista ægritudo erat incognita & numquam a Doctoribus visa prout tunc erat. „

„ 2. Contagiosus fuit, præsertim per coitum sive conjunctionem „ mulieris fœdæ cum viro & e contra. „

„ 3. Pro ejus curatione operæ pretium fuit nova auxilia & pharmaca „ indagare; & in rei veritate si quid salutis inventum fuerit in isto morbo, fuit potius ex novis experimentis, quam ex antiquis auxiliis.

4. Duplicem distinguebat statum morbi, *recentis & confirmati.* Censebat quidem recenti convenire posse curationem methodicam jam supra descriptam quæ obtinebatur usu diætæ legitimæ, alterantium, phlebo-

tomizæ, purgantium, balneorum, stusarum, & linimentorum, quibus cum argenteo vivum admiscebatur, „ Quando antedicta curatione iste morbus cum suis doloribus & pustulis removeri non poterat.

5. Ad confirmatum vero morbum Mercurio semper utebatur. „ Nul-
la inquit, melior medicina est (crede mihi) quam protinus patientem
„ illinire infra scripto linimento, aut loco linimenti ceratum imponere
„ in brachijs & tibijs semel aut bis in die, donec dentes dolere incepe-
„ rint, & cum dentes dolore inceperint, tunc cessatur ab inunctione,
„ & se calidum teneat donec fluxus phlegmatis cesset per gingivas.

6. Utrumque & linimentum & ceratum argenti vivi saliva extincti
partem decimam sextam circiter continet. Linimentum quidem jam pri-
dem obsolevit, quamvis prosteret ex parte in quibusdam Dispensariis sub
nomine *Unguenti Neapolitani*. Ceratum vero etiamnum in usu est nomine
Emplastri de ranis Vigonis. Ait autem Vigo linimentum quidem „ esse no-
„ bilissimæ operationis, & valere in quocumque tempore hujusmodi mor-
„ bi; sed asserit se ceratum millies expertum esse cum honore & utilitate
„ non parva. Unde liquet post Jacobum Berengarium Carpum, Joannem
de Vigo & antiquissimum & egregium hydrargyroseos promotorem fuisse.

Joannes de Vigo primus omnium externe adhibuit ad virgæ pustulas
(a) Lib. 5. Mercurium præcipitatum rubrum, quem vocat (a) pulverem suum car-
cap. 2. nis superflue remotionum, cujus præparationem ipse explicat *Antidotarii Lib.*
7. In vivis erat etiamnum anno 1517. ut liquet ex Epistola ipsius ad
Joannem Antracinum Maceratam, & Epistola ejusdem Antracini respon-
soria ad Joannem de Vigo, quæ Compendiosæ præfixæ sunt.

1507. ANTONIUS BENIVENIUS, Florentinus, claruit anno 1495. obiit
autem anno 1525. Scripsit Opus *De abdiis nonnullis ac mirandis morbo-
rum & sanationum causis* per Capita 110. editum Florentiæ, anno 1507.
in 4. in quo Cap. 1. pauca profert *De morbo, quem vulgo Gallicum vocant*,
sed pro illius temporis ratione egregia.

„ 1. Novum esse morbi genus, quod anno 1496. ab Hispanis inci-
„ piens per Italiam primum, tum Galliam, cæterasque Europæ Provin-
„ cias late diffusum mortales quamplurimos occupaverit.

2. Morbum accurate describit ut se ferebat eadem ætate.

3. Curationem methodicam paucis proponit; & unguentum quocum
Mercurius admixtus sit, indicat quidem, sed tanquam remedium quod ab
alijs adhibitum noverit, & quo inunctos ægros sudare cogant.

1514. VVENDELINUS HOCK DE BRACKENAVV, Artium & Medici-
næ Doctor in Gymnasio Bononiensi, scripsit anno 1514. ut ipse testatur
Cap. 1. Librum *De Morbo Gallico* cui titulum fecit *Mentagram, sive Trac-
tatum de causis, præservativis, regimine & cura Morbi Gallici, vulgo Mala*
Françoisæ, cujus sunt Capita sexdecim. Errant proinde (a) Bibliographi,
qui

(b) Mer-
cklinus
& Man-
getius.

qui Librum hunc Venetiis editum dicunt apud Octavianum, anno 1502. nisi id de priore quadam editione debeat intelligi.

In hoc Libro reperire est eadem, quæ in cæteris jam notavimus, Morbum primum apparuisse anno 1494. Novum esse; Præcedentibus sæculis incognitum; Ab antiquioribus morbis plane diversum; quod multis probat de Elephantiasi & Alafati; Non (a) *provenientem solum a contagio, sed* (a) *Cap. veram causam ejus & magis appropriatam fuisse aliquam influentiam stellarum erraticarum,*

Quod ad curationem multus est.

1. (b) In explicando legitimo usu rerum non-naturalium.

(b) *Cap.*

2. In (c) proponenda cura mentagræ per varia Medicinæ ingenia, puta per evacuationes, Phlebotomiam, Pharmaca, syrupos, lotiones, balnea, 9. & 10. *susas &c.*

5. 6. 7. 8.

9. & 10.

11.

(c) *Cap.*

11.

(d) *Cap.*

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

3. (d) Varia proponit unguenta quibus Mercurius inest, sed minima quantitate, qualia olim ad scabiem a Gordonio & a Gidone de Cauliaco proposita sunt: „ Nam, *inquit*, unguenta in quibus ingreditur argentum vivum extinctum cum saliva hominis jejuni mirabilem faciunt operationem in hoc morbo mentagræ & ejus accidentibus dolorosis. *Nihilominus tamen* non consulit usum unguentorum, in quibus ingreditur argentum vivum, nisi magna cum cautela fiant & in debita quantitate cum suis Bezoarticis; nam, *inquit*, nocumentum aliquando juvamento est majus. Concludit denique (e) quod in doloribus mentagræ & partium capitis conveniens auxilium cauterium dicitur. „

(e) *Infi-*

ne capitis

16.

Juxta Vvendelinum Hock inunctionibus utendum est non continenter sed per intervalla, interiectis identidem catharticis. (f) „ Talis, *inquit*, servetur ordo: Primo patiens accipiat medicinam minorativam. die sequenti patiens accipiat syrupum de fumo terræ tertia vero die facias inungi cum unguento & hoc quando patiens vadit dormitum, & de mane etiam accipiat suum syrupum, ita ut sexta die sint accepti sex syrupi, & sint factæ tres unctiones. Et tunc dabis medicinam solutivam, ut humores qui per os expelli deberent ad inferiora divertantur, & sic nocumentum in ore evitabitur. In diebus autem sequentibus simili modo utaris. „

(f) *Cap.*

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

Hic Auctor dicitur erronee Vvendelinus Hock de Brakeman in Bibliotheca Conradi Gesneri, & Vvendelinus Haak de Brabeman in Bibliotheca Medica paschalis Galli.

Extat juxta Bibliographos alterum Vvendelini Opus inscriptum De curandis ulceribus Morbum Gallicum us plurimum consequentibus, sed quod nondum videre mihi contigit.

JACOBUS CATANEUS DE LACU-MARCINO, Genuensis. Ignoratur quo tempore scripserit De Morbo Gallico; sed tamen certum

1516.

II

est

est scripsisse quidem post Nicolaum Leonicum, Sebastianum Aquilanum, & Gasparem Torellam, cum eosdem laudet; scripsisse vero ante annum 1518. cum de curatione per Guaiacum taceat, licet ceteroquin curatoriam morbi hujus methodum diligenter expendat.

(a) Cap. 1. Consentit autem cum precedentibus morbum primum (a) exortum esse in Italia anno 1494. monstrum fuisse, nullis ante seculis visum, totoque in orbe terrarum incognitum, & a (b) lepra seu Elephantiasi omnino diversum, in quo acriter castigat Sebastianum Aquilanum aliter sentientem.

[1.] Cap. 3. Multa profert (c) de morbi contagione, quæ ante illum nondum erant observata. 1. Morbum contagione contrahi multiplici ratione, concubitu, cubatione, lactatione, luctione. 2. Morbum tamen contagione semper non propagari ab infecto in sanum: Ait enim se vidisse complures concubitus immundarum non recusantes & in sordes venereas sese precipitantes, qui tamen nullam inde infectionem hauservunt.

(d) Cap. 7. Sed quod majore attentione dignum videtur, censet (d) ad curationem integram & perfectam novem esse necessaria. 1. Dietam. 2. Phlebotomiam. 3. Digestionem. 4. Evacuationem. 5. Administrationem viperarum. 6. Administrationem Balnei. 7. Administrationem Malagmatum. 8. Accidentium quæ unctionem subsequuntur, remotionem. 9. Accidentia quæ hunc morbum sequuntur, correctionem.

Sex priora Capita pertinent ad curationem methodicam, quæ jam fufe (e) exposita fuit. In septimo, ubi usus Malagmatum mercurialium proponitur, Gasparem Torellam Episcopum Sanctæ Justinæ redarguit, quod „ malagmaticam hanc curationem damnaverit, & talem curationem exercentes Sicarios appellaverit. Hæc, inquit, opinio quia contra- dicit sensui, non est bona cum hisce temporibus viderimus talia „ malagmata, in quæ magna vis argenti vivi subintrat, curasse tali morbo „ affectos, materiam per oris excrementa, & corruptos humores ex axillis in modum rivuli educendo.

Deinde multa ibidem profert de unguenti mercurialis administratione, quæ ab hodierno usu non ita multum abludunt; ac in fine Tractatus adducit formulam malagmatis mercurialis, simplicioris linimento Joannis de Vigo, & in quo major adest Mercurii quantitas, nempe ad octavam partem. Imo narrat ibidem quosdam in curatione horum languentium vice malagmatum suffusionibus ex cinnabari, ex argento vivo & sulfure constant, uti, & mirabilia quandoque operari, sed malagmata salubriora esse.

„ Proponit Capite 8. Accidentia quæ unctionem comitantur, nempe „ caloris extinctionem, debilitatem stomachi, oris fetorem & dentium „ commotionem: Et Capite 9. accidentia, quæ hunc sequuntur morbum, „ ut cutis defædationem; dolores in universo corpore, nodositates & ul- „ cera, „ & singulis mederi conatur ex artis regulis, adeo ut Tractatus ille,

(e) Supra
Lib. II.
cap. 6.

ille, etsi brevis, eximius haberi debeat, primusque in quo Mercurii administratio accurate proposita fuerit.

JOANNES ALMENAR, Hispanus, Artium & Medicinæ Doctor, 1516. primus est Hispanorum, qui de Morbo Gallico Libellum scripserit septem Capitibus absolutum. Satis temere promittit in Præfatione se mira præsticturum in præcavendo & curando morbo, neque enim in hoc Opere quidquam reperire est quod datam fidem liberet. Nempe (a) curationem hujus morbi per septem intentiones compleri arbitratur: Prima est ventris lenitio: Secunda minorativa evacuatio: Tertia materiz digestio: Quarta ipsius evacuatio: Quinta membrorum alteratio: Sexta, iplorum confortatio: Septima accidentium correctio. (a) Cap. 4.

Priores sex indicationes methodicam Morbi Gallici therapeiam constituunt. Ad ultimam varia proponit unguenta cum addito argento vivo, sed dosi minima, quibus tamen constat pyralisimum non raro inductum fuisse, cum ipse os ab usu argenti vivi fecere affirmet, & oris nocumendo quod inde accidit, conetur occurrere.

Hic Auctor, sicut & Vvendlinus Hock, censet illitiones mercuriales per intervalla administrandas esse, interpositis catharticiis, suamque sententiam iisdem verbis exprimit ac Vvendlinus, non sine plagii suspitione. „Talis ergo, inquit, (b) ordo servetur, ut prima & secunda die accipiat syrupum (alvarentem) patiens. Tertia autem die facias ungi cum unguento inferius describendo omnes partes domesticas (hoc est interiores) tibiarum & brachiorum, & plantas pedum, & palmas manuum, leniter tamen & parum apponendo de unguento, & hoc quando vadit patiens dormitum, & mane accipiat etiam suum syrupum, ita ut in sexta die sint accepti sex syrupi & sint factæ tres unctiones, & tunc dabis Medicinam solutivam, & humores qui per os expelli deberent, ad inferiora diverterentur, & sic evitabitur nocumentum in ore. In diebus autem sequentibus simili modo utaris. (b) Cap. 4.

Porro certum est hunc Auctorem scripsisse ante annum 1516. cum hoc anno Liber iste de quo agitur, Papiz excusus fuerit.

COLLECTIO PAPIENSIS, quæ omnium prima, prodit Papiz ex officina Bernardini de Garaldis, anno 1516. in folio, ubi collecti exstabant. 1516.

Nicolaus Leonicensus, Vicentinus, De Morbo Gallico;

Et Joannes Almenar, Hispanus, De Morbo quoque Gallico.

Accesserunt simul.

Angeli Bolognini, Bononiensis, De cura ulcerum exteriorum, & unguentis communibus in solutione continui Lib. 2.

Alexandri Benedicti, Veronensis, Liber de pestilenti Febre,

Dominici Massariæ, Vicentini, De Ponderibus & mensuris medicinalibus, Lib. 3.

1516. **GEORGIUS VELLA**, Brixienſis, ſcripſit conſilium medicum *Pro egregio Artium Doctore Aloyſio, Mantuano*, qui Morbo Gallico ægrotabat, in Capita ſeptem diviſum; ſed quo tempore ſcripſerit incertum eſt. Verum cum nullam Guaiaci mentionem faciat in curatione Morbi Gallici, videtur ſcripſiſſe antequam lignum illud in uſum advocatum fuiſſet, atque adeo ante annum 1518.

(a) *Caſ. 1.* In eo conſilio affirmat (a) *eos qui inſciuntur tali morbo, non inſci niſi fere propter ipſorum coitus cum mulieribus tali inſeſione inſeſtis; & ſi hoc, inquit, non ſit univerſaliter verum, at tamen pro majori parte.*

(b) *Cap. 7.* Ad curationem quinque intentiones admittit, (b) 1. *Materia peccantis minorationem*; 2. *Digeſtionem*, 3. *Evacuationem*, 4. *Accidentium correctionem*, 5. *Recidui humoris inſeſis reſtificationem*; quæ ſingula metho-

(c) *J. Freind. Hiſtor. Medicin. part. 3.* dicam curationem ſapiunt quidem, cui potiffimum inſiſtit, ſed ita tamen ut ulum quoque proponat unguenti mercurialis, quo cencet inungendum eſſe „ patientem a quatuor extremitatibus corporis uſque ad ſubſcellas „ & inguina excluſive per decem dies vel circa, ſecundum tolerantiam „ virtutis, non negligendo etiam aſſidua clyſteria diverſentia vapores a „ partibus ſuperioribus ulcerare ſolentibus.

1518. **PETRUS MAYNARDUS**, Veronenſis, ſcripſit (c) circa annum 1518. duos Tractatus *De Morbo Gallico*; alterum de morbi ætiologia qui *Capita quatuor*; alterum de therapeia, qui *Capita ſolidem* complectitur.

(d) *Prior Tractas. Cap. 1.* Circa prius ſtatuit quidem Morbum (d) primum apparuiſſe anno 1496. Epidemialem eſſe, & ortum ab inſtuentiis ſyderum malignorum coeuntium; (e) *Pædictum fuiſſe alias in prognſtico viginti annorum clariffimi Artium & Medicinæ Doctore Pauli de Medelburgo Zelandia Oceani* (qui Episcopos Forſempronienſis deinde electus eſt) anno *Virginie partus* 1487. Demum (f) *deſecturum eſſe anno 1584. contrariis aſtrorum inſtuentiis.*

(e) *Ibidem.* Circa poſteriori vero curationem tantum methodicam proponit, quæ *dieta, aliteratione humorum, purgatione, & membrorum confortatione* perſicitur, nec unguento mercuriali utitur ullo, niſi cum dolores urgent in juncturis, in quo caſu ſuadet ut (a) „ ungantur ſpatulæ, collum, nucha, omnes juncturæ coxarum & crurum cum infra ſcripto unguento. „

(f) *Posterior. Tr. Cap. 3.*

(g) *Ibid. Cap. 3.* *℞. Axungia porcinæ vetuſſimæ lib. ij.*
Cineris lignorum Vitæ ʒ ij.
Argentis viri mortificati cum medulla vituli ʒ ij.

Demum omnia bene commiſceantur, & fiat unguentum, & adminiſtretur ſuper dicta loca, & ligentur bene calida, & dimittantur per quatuor dies, & ſic unguantur dicta loca quaternis diebus in quaternos dies, donec ſanentur a doloribus.

LEO.

LEONARDVS SCHMAI, Salisburgensis, in *Lucubratiuncula* quatuor Capitibus comprehensa, quam Salisburgi in Germania scripsit *De Morbo Gallico & cura ejus noviter reperta cum ligno indico*, Augustæ typis edita anno 1518. in 4. de morbi quidem novitate eadem refert quæ cæteri, sed primus affirmat (a) indos Occidentales per plurimos annos hoc morbo graviter laborasse, medicinamque qua semper usi sunt contra hunc morbum nostris mercatoribus indicasse. Nihilominus tamen concludit hunc morbum in Europa ortum esse ex aeris intemperie calida & humida anno a Salustifera Incarnatione Christi 1494. quo fuit omnium totius Europæ aquarum inaudita inundatio.

Parvi pendit methodos curatoriarum omnes, quæ usque ad sua tempora adhibitæ fuerant. (b) „ Non fuit, inquit, hæstenus reperta medicina, quæ in hac ægitudine profuisset multum, nocuisset vero nihil sed modo, pergit ille, Deorum (ut mihi persuadeo) beneficio inventa est medicina simplex, qua maxime gaudet natura, & quæ simul omnes intentiones complectitur in suis qualitatibus. „

Ea autem Medicina est lignum *Guaiacum* seu Arboris *Guaiacana*, cujus mentionem facit primus & ejus usum & administrationem primus quoque describit. Refert se (c) „ cum mira, magnifica, & vix credibilia passim accepisset de ligno quodam in Occidentali India, in Insula Spagnuola noviter reperta, non cessasse vel dormientem somnari ligni hujus naturam, donec litteris patronorum suorum & suis decem & novem Doctrinas & Relationes ex India & Portugallia ad diversos Germaniæ Principes & Viros primarios transmissas accumulasset, ex quibus naturam, proprietatem, qualitatem, usum & operationem plane piscatus est. „

ULRICVS DE HUTTEN, Eques Germanus, natus est anno 1488. Steckelbergæ, (d) in castello Franconiæ cujus dominio ejus familia potiebatur, Litterarum studio dedit operam Fuldæ Coloniz & Francofurti ad Oderam. Inde meruit aliquandiu in Italia in castris Imperatoris Maximiliani I. unde redux versatus est in aula Alberti Brandenburgensis, Archiepiscopi Moguntini & Magdeburgensis, ac postea S. R. E. Presbyteri Cardinalis titulo Sanctis Chrylogoni, ab anno 1517. ad annum usque 1520. quo Lutheri partes amplexus sibi fuga consulendum esse duxit, cum audivisset se jussu Leonis X. summi Pontificis, in quem acerbius scriperat, comprehendendum esse. Toto Belgio peregrinatus profugit tandem in Helvetiam, venitque Basileam anno 1522. exeunte, sed ab Erasmo hospitio exclusus, urbe ipsa exire jussus est mense Januarii anni sequentis. Obiit paulopost in Insula quadam lacus Tigurini, ubi latitabat, die scilicet 29. (e) Augusti, anno 1523. ætatis anno 35. vel 36.

ad Contra-
ra l. Go-
stenium
data 6.
Calend.
Octobris
an. 1525.

Licet Huttenus Medicus non fuerit, scripsit tamen ad Albertum Brandeburgensem, Cardinalem & Archiepiscopum Moguntinum patronum suum, Libellum *De Morbi Gallici curatione per administrationem ligni Guaiaci*, Moguntiae editum in 4. 1419. qui Capita 27. complectitur, & ubi ea narrat quorum ipse *pars magna fuit*.

Liquet enim inde Huttenum jam ab anno 1509. vel 1510. luem veneream contraxisse, annos natum 21. vel 22. dum in Italia militabat, cum fateatur ipse in hoc Opusculo edito anno 1519. *(a) se per novem, annos cum hoc malo luctatum fuisse: & hoc temporis intervallo (b) undecies curationem mercurialem expertum fuisse*, ita ut vix credere liceat *(b) quas torturas, quos supplicia sub Chirurgicis exhauserit, quas cruces tulerit, quantum illi virium ex Medicorum insciis deperierit*.

(a) Lau-
dati libel-
licap. 4.
(b) in Epi-
stola De-
dicatoria
(c) Cap.
26.

Sed placet ipsum audire *(c) dicentem: ut affectus fuerit*. „ Primum, inquit, sinistro pede eram inutilis jam, hærente ibi octo plus annis morbo; & in media quidem tibia, qua parte tenuissima cruri obducitur caro, ulcera erant cum inflatione carnis inflammata, putrescentia ingenti cum dolore, & hujusmodi ut uno sanescente erumperet statim aliud. Erant enim complura sparsim, nec ope Medicorum fieri poterat, in unum omnia ut redigerentur. Supra ea tuber erat (*exostosis*) ut os crederetur ita induratum, & in eo suppungens citra intermissione dolor immensus, immodicus; fuit & supra dextrum proxime talum collectio, & ipsa in ossis modum dura, ex recentis olim morbi reliquiis vetustissima. Hanc mihi ferro, hanc igne & causticis omnibus adaperire cum molirentur Medici, nihil profecerunt. Illa autem modo vehementer intumescere ac summo cum dolore, modo residebat mitior, dolebatque minus igni admoto pede, nec sustinuit tamen multiplici velle contegi. Eo fluxus erat vehemens, & qui inextinguibilis plane videretur: ac quoties pedi insisterem, dolore afficiebar impetibiliter. Deinde superius coxa & genu penitus confriguerant, artenuato ibi ad summam usque macritudinem femore, atque ita immixta carne, ut præter cutem vix esse videretur quo se os contegeret. Præterea in tantum luxata utraque junctura fuit, ut diu ægerime liceret insistere, tandem non amplius etiam, evanida omnino ex clunibus altera. Dolebat item laevus humerus, ut levare jam brachium non posset. Debilitata extrema scapula occalluerat, & in medio musculo tuber ovi magnitudinis, imminuto aliis partibus ad miram tenuitatem brachio ad ipsam usque manum; & in dextro latere sub infima statim costa ulcus erat sine dolore quidem, sed sædum quoddam pus efferveps, & spurca manans sanie, fistulæ in morem angusto exterius ore, at ampla intus cavitate. Supraque ipsum aliud iterum tuber, quasi supernato costæ quodam ibi ossis. Denique a summo retro vertice fluxus ibat da omnia

omnia ista manifesto sensu. Qua incipiebat is ad lenissimum etiam tac-
tum, quasi pertuso craneo dolebat caput, nec verti in tergum, nisi
cum ipso una corpore potuit.

Profligandæ huic affectionum Iliadi impar fuit inunctionum mercuria-
lium usus vel undecies repetitus, forsitan medentium incititia vel negli-
gentia. „ His (a) auxiliis, *inquit ille*, sustinere morbum potui, extin-
guere non potui: Et cum lenire dolorem, non causam doloris excin-
dere, hoc esset differre perniciem, non auferre, præsentius remedium
habui ex Guaiaco, *cujus usu* (b) depulsa omni in valetudine ita vires
recepit, ut de novo factus ac renatus homo videar.

(a) Cap. 5.
(b) In Epis-
tola De-
dicatoria.
(c) Cap.
27.

(d) In
Præfat.
Præfixa
editioni
Lugduno-
Batave
Alojssii
Luissini.
(e) In Bi-
bliotheca.

1500.
1525.
1532.
1533.

(f) Vido
ipsius Ep.
6. Lib. 18.
(g) Petrus
Castella-
nus, in vi-
tis illu-
strium
Medico-
rum.

(b) Episto-
la 1. lib. 4.
(i) Epist.
2. Lib. 7.
Buda da-
ta 7. Id.
Septemb.
an. 1514.

(k) Epist.
3. Lib. 2.
(l) Epist.
1. Lib. 8.

(m) Castell-
anus. Ubi
supra.

Hæc autem de se tanto liberius fatebatur, quod sibi probro verti posse
non suspicaretur, cum ea ætate nondum exploratum esset luem scorta-
tione tantum contrahi, sed satis stolidè crederetur solo rerum non-natu-
ralium vitio, vel ad summum colloquio vel contubernio cum insectis con-
cipi posse. Inde sane est, quod Huttenum non pudeat in extremo Libro
Archiepiscopum & Cardinalem, ad quem scribit, sic alloqui. (c) „ Hæc
ita Celsitudini tuæ conscripsi, ut non vellem his quidem uti, (faxit hoc
enim servator Christus, ne unquam debeas) sed ut in tua hæc aula essent
omnium necessitati exposita.

In hoc Opere præmissis de morbi origine, natura, & causis, iisdem
quæ jam sæpius repetita sunt; ac enarratis torturis horrendis, quibus
ægrotautes hac ætate discruciabantur, ut a morbo Gallico convalesce-
rent, Huttenus aperte ac fortiter improbat mercuriales inunctiones, usum
decocti ex ligno Guaiaci mirabiliter approbat, rectam ejusdem admini-
strandi methodum summa diligentia persequitur: Quocirca Tractatus
ille vere dignus est qui legatur, Auctore (d) ipso Hermanno Boerhaave;
hac in re iudice maxime idoneo.

Cæterum, quod notari velim, quantumcumque sibi gratuletur Hutte-
nus de restituta valetudine usu Guaiaci, constat tamen ipsum neque hac
methodo perfecte convaluisse, cum ex rediviva lue venerea, quæ reme-
dio tantum sopita fuerat, miseram mortem obierit & ante diem, ut nar-
rat (e) Conradus Gesnerus.

JOANNES MANARDUS, Ferrariensis, natus (f) anno 1461. (g) Nicolaum Leonicum in Medicina audivit. Constat (b) ex ejus Episto-
lis Medicinam illum fecisse Ferrariæ ad annum usque 1513. Anno se-
quente 1514. in Hungariam a Rege Ladislao VI. advocatum fuisse, (i)
ut Archiatri munere fungeretur; eoque mortuo anno 1516. in Hungaria
vel Austria (k) moram tamen fecisse ad annum usque 1518. Unde in pa-
triam regressus (l) anno 1519. Medicinam Ferrariæ cum laude professus
est. „ Duxit (m) uxorem valde senex & articularum dolore distortus, ab
„ ætate formaque florentis juvenis thoro dignam, adeo levi iudicio & Ubi

„ lethali intemperantia, ut unus suum maturaverit. Obiit Ferrariæ anno 1536. ætatis 74.

Scæpsit inter alia *Epistolarum Medicinalium Lib. XX.* sub titulo *Curie Medice*, quorum pars jam edita fuerat Lutetiæ anno 1528. & Argentinz anno 1529. sed qui omnes una collecti primum Basileæ excusi sunt anno 1540. Prostant ibi Epistolæ duæ *De Morbo Gallico*, & duæ aliæ *De Ligno Indico*. Epistola prima scripta est Mirandula anno 1500. ad Martinum Mellerstadium, hoc est ad Martinum Polichium, Mellerstadiensem *Illustrissimi Ducis Saxonum* [Frederici III.] *Physicum*, estque prima Libri secundi.

In ea Simonem Pistoris acriter castigat, qui in Positiones quasdam Martini Polichii insurrexerat, qua de re vide supra articulos *De Simone Pistore & Martino Polichio*

Altera ad Michaelem Sanctannam Chirurgum scripta est Ferraria, anno 1525. & secunda est *Lib. VII.*

In ea reprehendit Nicolaum Leonicensem, quod existimaverit Morbum Gallicum esse *Epidemicum*, æstivum, a nimia aeris humiditate & caliditate ortum. Ipse contra statuit morbum esse novum, qui contagio tantum serpat & propagetur, qui ab Hispanis ex *Insula quadam Antiquis incognita*, ubi frequentissimus est, in Europam translatus fuerit, vel Valentiz in Hispaniæ genitus in scorto, quocum Elephantiosus quidam ex Equestri ordine rem habuit.

Tertia est Consilium Medicum pro Reverendissimo Cardinale Campegio, id est pro Laurentio Campegio, cive & Episcopo Bononiensi, postea Feltrensi, Presbytero Cardinali Tituli Sancti Thomæ in Parione, ac deinde Tituli Sanctæ Mariæ trans Tiberim, Episcopo Cardinale Sabino & Prænestino, qui a Leone X. creatus Cardinalis anno 1517. obiit Romæ anno 1539. Hæc Epistola, quæ quarta erat *Lib. xv.* scripta fuit anno 1533.

In ea præscribit qua methodo ligno Indico sive sancto utendum sit; cæterum non modo ut decoctum illius potetur consulit, sed etiam ut spuma decocti, vel quod illi præstabilius videtur, ut oleo ex ligno per descensum destillato loca dolentia illinantur.

Demum quarta Medicum quoque Consilium est pro Episcopo Cracoviensi in Polonia. Scripta fuit Ferraria, in *Vigilia sancti Matthæi*, anno 1532. & ordine tertia est *Lib. xxvii.*

In ea ait anno duodequagregesimo ab orto Morbo Gallico se scribere; unde facili ratione colligere est juxta eum morbum primum apparuisse anno 1494.

Extant aliæ duæ Epistolæ de eodem Episcopo Cracoviensi scriptæ: Altera, quæ ordine quarta est *Lib. xiv. anno eodem 1532. septimo Idus Februarii*: Altera, quæ quinta est *Lib. xvi.* scripta ad Academiam Cracoviensium Medicorum, 12. *Calendas Martias*, anno 1532. ex quibus liquet hunc

hunc Episcopum Imbecillitate ventriculi & omnium principalium membrorum, atque affectione vere hypochondriaca laborasse ex reliquiis subdoli & atro-
sis Morbi Gallici vocati, & hydrargyro per quod sanari visus est, derelicta.

BENEDICTUS RINIUS, Venetus, scripsit brevem De Morbo Gallico 1520
Tractatum Consultationis causa in gratiam illustrissimi cujusdam Antistitis, quem diu post mortem patris Fabricius Rinus ejus filius Antonio Cauco Archiepiscopo Corcyrensi dicavit, & excudendum permisit in Collectione Veneta De Morbo Gallico anno 1567.

In curando Morbo Gallico utitur Rinus linimentis variis mercurialibus, sed ad Operis callem, quædam adjicit de decocto ligni Guaiaci; quo ait novum esse sui sæculi inventum, & tanquam per Deorum manus traditum auxilium pro Morbi Gallici expugnatione, ac omnimoda illius evisione, unde videtur posse colligi Consilium illud Rinii circa annum 1520. scriptum fuisse.

JOANNES [a] LE MAIRE, Belga, lucem vidit Bagaci, in Han- (a) Dicitur sed
nonia gallice *Bavai*, unde se dicit gallice *de Belges*, ideo quod putet Ba-
gacum olim Belgidem dictum fuisse. Natus est anno [b] 1473. & ante
annum 1525. fato functus. Scripsit tum stricta, tum soluta oratione Opera
varia Gallice & Latine, non sine ingenii acumine ac doctrinæ laude ut ea
erant tempora, quibus vixit.

Extat inter cætera Carmen Allegoricum Gallice scriptum, & in tres
Fabulas distributum, quod typis excusum fuit anno 1525. apud Ga-
liottum du Prè, cum hac inscriptione.

*Les trois Comptes, initulez de Cupido & d'Atropos, dont le premier fut
inventé par Seraphijn, Poete Italien, le second & tiers de l'invention
de Maistre Jean le Maire.*

Fingitur ibi in Prima fabula Cupidinem ebrium cum Atropo mortis
Dea, commutatis casu arcubus munia quoque ita commutasse, ut ille qui-
dem imprudens neci daret adolescentes, quos quærebat amore faucios
efficere; hæc vero senes depontanos turpi amore dementaret, quos morti
destinabat.

Narratur in Altera lethiferum illum mortis arcum, quem Cupido in
palatium matris intulerat, jussu Veneris abjectum fuisse in palatii folsas,
unde factum ut aquæ hinc icaturientes veneno lethali pollutæ viris femi-
nisque Veneris assecilis, a quibus epotabantur, novum morbi genus intu-
lerint, seu ipsissimam luem veneream.

Demum refertur in Tertia Jovis edicto Comitia generalia-Turonibus
habita fuisse, ibique dissidium Cupidinis de arcus redintegratione cum
Atropo litigantis his conditionibus compositum esse, ut utrique novus ar-
cus restitueretur; at vero nullum a Jove remedium adversus luem vene-
ream inventum fuisse, quæ idcirco sibi permisa in miseros mortales laxa-
re pergit.

Cæ-

perperam.
Joannes
Marius a
Gerard.
Joann.
Volfio.
L. 63. De
Histor.
Lat. cap.
10.
1520.
(b) Vide
Prefatio-
nem Gal-
lice scri-
ptam quæ
præfati-
tur Libro
in scripto
Les Illu-
strations
des Gau-
les.

Cæterum Poeta veneream luem in fabula secunda ita describit, ut licet inde colligere, quid ætate sua de morbi origine, novitate, propagatione, atrocitate, vulgo crederetur. Ait nempe Aquas, quæ e fosis palatii Veneris decurrebant, a viris feminisque plurimis cum voluptate quidem perpotari, ac gratas videri, at vero varia & inaudita morborum monstra inde generari, quibus potores miserrime affligebantur.

Mais en la fin, quand le venin fut meur,
 Il leur naissoit de gros boutons sans fleur,
 Si tres hideulx, si laits & si énormes,
 Qu'on ne vit onc vifaignes si difformes,
 Ne onc ne receut si trespertuelle injure
 Nature humaine en sa belle figure:
 Au front, au col, au menton & au nez
 Onc on ne vit tant de gens boutonnez.
 Et qui pis est ce venin tant nuisible
 Par sa malice occulte & invisible
 Alloit chercher les veines & arteres,
 Et leur causoit si étranges [a] mysteres
 Dangier, douleur de passion & goutte
 Qu'on n'y sauroit remede, somme toute,
 Fors de crier, souppirer, lamenter,
 Plorer & plaindre & mort se souhaiter.
 Ne ne sceut onc lui bailler propre nom
 Nul Medecin, tant eut-il de renom.
 L'ung la voulut *Sabafasi* nommer.
 En Arabic; l'autre a peu estimer
 Que l'on doit dire en Latin *Mentagra*,
 Mais le commun quand il la rencontra,
 La nommoit *Gorre* ou la *Vérolle grosse*
 Qui n'espargnoit ne Couronne ne Crofse;
 [b] *Donques* l'ont dit les Flamens & Picquarts,
 Le mal *Francois* la nomment les Lombars,
 Si a encores d'autres noms plus de quatre,
 Les Allemans l'appellent [c] *Groite blatre*,
 Les Espagnols [d] les *Bouëls* l'ont nommée;
 Et dit-on plus que la puisante Armée
 Des fors *Francois* a grant peine & souffrance
 En Naples l'ont conquise & mise en France,
 Dont aucuns d'eulx [e] le *Souvenir* la nomment,
 Et plusieurs faits sur ce comptent & somment.
 Les Savoyiens [f] la *Clavela* la disent:
 Delà comment plusieurs gens en devisent,

Dela

(a) *Misere*.

(b) *Legge*
Pocken
Variola.

(c) *Gross*
Blatter.
Magna variola.

(d) *Las*
Buas.

(e) *Vide-*
tur ex il-
la menda-
sa esse.

(f) *La*
Clavela.

Dela comment Amour, le jeune yvrongne
 A fait aux gens grant dommage & vergongne
 Et ne fect-on peur les cloux desclouer
 Bien bonnement a quel Saint se vouer,
 Neantmoins aucuns par grace souveraine
 Ont imploré Madame Saintz Reine,
 Les autres ont eu recours a Saint Job,
 Peu de guéris, en sont de mors beaucop,
 Car regne a ce trez cruel tourment
 Par tout le mond universellement.

DESIDERIUS ERASMUS, Roterodamus, Vir maximi nominis & eruditionis multiscis natus est Roterodami die 27. Octobris, anno 1466. ut maxime probabile videtur. Basileæ mortuus est die 12. Julii anno 1536. jam septuagenarius. Cætera quæ ad ejus vitam spectant silemus, tum quod passim occurrant, tum quod non sint instituti nostri, cum Erasmus nec de lue venerea quidquam ex professo scripserit nec Medicinæ vacaverit unquam. 1524.

Nihilominus tamen, cum Erasmus suppar vixerit ingressui luis venereæ, haud pauca suis Operibus interspersa reliquit testimonia de morbi origine, scditate, contagione. Sic in *Epistola ad Christophorum a Schydlovietz, Palatinum & Capitaneum Cracoviensem, Regniq; Poloniae Cancellarium* Basileæ scripta anno 1525. postridie Idus Augusti, & Libro *De lingua, sive de linguae usu & abusu* præfixa, dum sui sæculi calamitates enumerat, in hæc verba erumpit. „ Jam si quis percontetur, inter corporum morbos, cûi debeat principatus; me judice facile tribuetur ei malo, quod incerta origine tot jam annos per omnes orbis plagas impune grassans nondum certum nomen invenit. Plerique vocant (a) *Poscas* (a) *Varicellæ*. Pocken enim Germanice & Belgice variolæ significat. „ Gallicas, nonnulli Hispanienses. Quæ lues unquam pari celeritate percurrit singulas Europæ, Africæ, Asiæque partes? Quæ penitus sese infert venis ac visceribus? Quæ tenacius hæret aut pervecacius repugnat arti curæq; Medicorum? Quæ faciliore contagio transilit in alterum? Quæ crudeliores habet cruciatus? Vitiligo præter cutis deformitatem nihil habet noxæ & curationem recipit. Lichenes sædo quidem fursure primum faciem, deinde reliquum corpus operiunt, sed citra curaciatum, nulloque vitæ discrimine, etiamsi remedium non admittunt, nisi cui mors sit antefenda. Hæc lues quicquid in aliis est horrendum una secum defert, scditatem, cruciatum, contagium, vitæ periculum, curationem difficillimam pariter ac scdissimam, & tamen utcumque cohibita subinde repullulat, non aliter quam podagra.

Nec dissimilia profert initio *Consultationis de Bello Turcico inferendo, quæ ad Joannem Rinckium Jurisprudentia celebrem scripta est apud Friburgum Bri.*

Novus pœnitentialis Quadragesima, necnon purgatorium in Morbum Gallicum sive venerum, una cum Dialogo Aquæ argenti ac Ligni Guaiaci colluctantium super dicti morbi curationis prælatura. Opus fructiferum. Parisiis, Nicol. Savetier, 1527. in 8.

Patet hujusce inscriptionis ratio ex Libri præmio. „ Nunc temporis, inquit *Auctor*, in dicti morbi curatione duæ præcipue prorumpunt hæreses, altera Guaiacum extollens lignum, altera aquam argenti non mediocriter effereus præconio. Illa pœnitentiali Quadragesima (nempe propter inediam) hæc vero quodam Purgatorio [propter pyralismi dolores] mederi videtur. „

Hoc Opusculum constat articulis sive Capitulis viginti, sed nullo distinctis numero.

I. Refert eodem anno, quo Galliarum Rex Carolus Octavus impetum Neapoli fecit, suorum aut perditum aut equitum quibusdam talem prorupisse morbum qui proinde abhinc triginta circiter annos visus est.

II. Tres morbi causas admittit, *Supercalensem*, quam Theologi dicunt esse iram Dei in fornicatores; *Calem*, quam Astrologi dicunt esse concursum planetarum; & *Physicam*, quam Medici dicunt esse corruptionem feminis a salacitate nimia, concurrente tamen maligno astrorum concursu.

III. Expendit naturam ligni Guaiaci, quod dicit a mercatoribus reperiri esse in *Insula quadam*, ac proponit methodum curandi luem veneream decocto illius ligni.

IV. Inquiri in naturam aquæ argenti, ut sua ferebant tempora, ac varia proponit linimenta, quæ adhibebantur suo tempore. Censet autem in hac curatoria methodo ægrum identidem purgandum, & inunctiones intermittendas esse. *Utile satis eris*, inquit, *si post sextum aut septimum diem sumat pateriens cassiam fistulam, & ad vires rescindendas duos aut tres dies quiescat.*

V. Describit gonorrhœam virulentam *Capite de Pustulis*; quæ sana descriptio gonorrhœæ prima omnium quas sciam, esse videtur. „ Vidi, inquit, juvenem quemdam, *cujus mentula* sesquiannum perpetuo saniorum ac virulentum vomebat succum, quod venero contraxerat certamine mentula dolorose arrigebatur major meiando accrescebat dolor. „

VI. Adest in fine *Dialogus aquæ argenti*, & ligni Guaiacicolluctantium super eorumdem prælatura; qua finita sic concludit in *Epilogo*: *His causis a rationibus æquo animo perpensis, aquæ argenti methodo quam Guaiaci methodo magis fidendum puto.* Fatetur tamen rem aliquando minus prospere succedere; Sed id totum in medentium impericiam refundit. „ Nimirum, inquit ille, si operati rarerent succedant eventus, quippe cerdones, scorta, mulierculæ, nonnullique Apostatici litterarum penitus ignari, nullis

„ vocatis Medicorum decretis, frequentius cum aqua argenti, ne dicam illius methode, omni vorato huic medentur morbo.”

Hic Auctor primus est Gallorum omnium, quos novi, qui de Lue Gallica scripserit. Anne ideo quod venerea lues Rothomagi & citius & crudelius sævierit quam in cæteris Galliarum urbibus? Certe lues Rothomagensis in Galliis vulgari circumfertur proverbio quasi curatu difficillima, quade re vide Rabelzium, *Panagruet, Litu. 5. chap. 21. Histoire de Erancion, Liv. 10. Et Menjotii Dissertation. de Lue venerea, pag. m. 39.*

1530.

1546.

HIERONYMUS FRACASTORIUS, Veropenſis, natus est Veronæ: Patavii operam dedit Medicinæ, inde Livianum copiarum Venotarum Ducem sequutus est pluribus bellis, sed eo mortuo ad Abduam anno 1515. in patriam se recepit. Medicus fuit Patrum Concilii Tridentini. Fato functus est septuagenario major in suis Caphis prope Veronam, 8. Idus Augusti anno 1553. apoplexia correptus in mensa.

Inter cætera illius Opera duo extant de Morbo Gallico.

Prius est eximium illud Poema, in quo eleganter hæsit tribus Libris *De Morbo Gallico*, sive ut ille ait, *De Syphilitide*, quam a Syphilo Pastore in Deos impio sic dictam fingit,

Syphilidemque ab eo labem dixere Coloni.

Dicatum est Petro Bembo Leonis X. Pontificis Maximi tunc a Secretis, ideoque scriptum ante annum 1521. quo Leo X. fato functus est, sed editum non novi ante annum 1530. quo Veronæ expositum est.

Posterius est Opus *De contagionibus & contagiosis morbis & eorum curatione*, in tres Libros distributum, quod primum editum est anno 1546. Venetiis. In illo *Capitibus 11. & 12. Lib. 2. Morbi Gallici naturam & causas; Capito vero 10. Lib. 3. ejuldem curationem* explicat.

(a) *Lib. 2. cap. 12.* In utroque Opere Fracastorius eadem docet 1. Circa naturam & causas morbi, [a] morbum novum esse, præcedentibus sæculis non visum; ab elephantia & ab Arabum sæsati plane diversum; in Insulis, quas Hispanæ navigationes adinvenerunt endemium; inde contagione devectum. At vero, ne quid dissimulem, asserit [b] ille tamen maxima quidem mortalium pars a contagione morbum hunc contraxerit, observatum tamen fuisse innumeros alios sine ulla contagione per se infectionem eam perpassos fuisse. Atque adeo, licet contagionem admittat, præjudicio ductus censet etiam admitterendam esse fœdidam aeris putrefactionem, quam tria superiora sydera, Saturnus, Jupiter & Mars coeuntia intulerint. 2. Quod ad curationem, proponit statim methodicam tharapeiam, quam censet ad incipientem morbum sufficere. Si vero inveteratus sit, auctor est ut æger utatur decocto ligni Guaiaci, cujus præparandi rationem explicat, aut decocto radicum cy-narum quæ paucos ante annos in Europam delatæ fuerant.

(c) *Lib. 3. cap. 10.*

Post hæc profert duo alia remedium genera, quibus ut ipse ait (c)

præ-

primis temporibus statim utebantur, ab Empiricis primum inventa, inunctionem scilicet & fuffitum. Ea primo quidem inunctionem mercuriale describit, neque illam damnat, licet incommoda exaggeret: [a] „ Os, in- (a) *ibid.*
quis, & palatum exulcerantur, ac sordities tanta per os concitatur per dies 15. & amplius, ut nihil fœdus, nihil intolerabilius videatur, cibus nullus mandi potest, etiam vix sorberi datur, dentes luxantur, somnus adimitur, & breviter per id tempus nihil gravius sentiri potest.

Inde vero fuffitum describit, „ Acerbissimum medicamentum, quo ille, numquam ausus est uti ad totum corpus, sed quod ad certas tantum partes, ut crura & brachia, cum vel iphaceli adsunt, vel feræ gummositates, vel dolores vel ulcera male morigerata, etiam præstantissimum arbitrat: Cæterum ab eo abstinendum suadet, nec Empiricis credendum, quibus nihil temerarium est magis, quando & per os etiam ausi sunt argentum vivum, & quod præcipitatum vocant, confectis ex iis, pilulis exhibere.

LAURENTIUS FRISIUS vel PHRISIUS, [b] Medicus Civitatis Metensis, [c] claruit in Germania, dicitur Argentinenſis [d] a Joanne Bernier D. M. 1532. (b) Schenckius, in Bibliotheca latr-ica.

Præter Opera alia scripsit *Epitomen Opusculi de Curandis Pusulis, ulceribus & doloribus Morbi Gallici*, mali Franzosi appellati, quæ Basileæ excusa est anno 1532. & Capitibus octo absolvitur. (c) Valerius Andreas, in Biblioth. Belgica. (d) Essais de Médecine, Par. 1. chap. 4.

In hoc Opere eadem reperire est, quæ a quod Auctores alios, de novitate, origine, natura, signis & causis hujus morbi; imo & de curatione, cum methodicam tantum therapeiam proponat, quæ, ut jam sæpius dictum est, obtinetur dicta, alterantium usu, purgatione, & unguentis detergentibus, exsiccantibus, cicatricem inducentibus.

Indicat quidem unguenta quinque mercurialia, sed eo tantum fine ne ignorasse videatur, & ut indicando eadem damnet. „ Iners [e] vulgus, inquis, nonnunquam peritissimos Medicos floccipendere non veretur, cum putet illos latere ea unguenta, quibus Medici carnifices corpora inungunt. Non sunt autem abscondita, sed propter nocumenta illorum eis uti nolunt. Describam igitur tibi, *pergit ille*, aliqua unguenta illorum Medicorum, ut sentias quod non sunt Medicis secreta, quemadmodum fatentur illi Empirici. (e) Cap. 6.

Cæterum videtur fide optima proferre quæcumque utilissima noverit. (f) Cap. 8. [f] Sic sub finem *Dissertationis* proponit secretum *churissimam ad ulcera virga*, cum amplius nulla spes est, cum quo, ut ait, *sæpius sanam & pecuniam acquisivis*. Secretum autem tale est:

R. Pulverum Barbe [g] sylvana ʒj.

Myrrhe & sturis ana ʒij.

Offis sepia ʒj.

(g) Barba sylvana est plantago aquatica Vid. Dodonæum.

Asper.

Aspergatur cum eo ulcus.

1534.

JOANNES PASCHALIS, Sueffanus, hoc est oriundus ex urbe Episcopali Sueffa, quæ Metropoleos Capuanæ Suffraganea est, scripsit Diatribam cui titulus est: *De morbo quodam composito, qui vulgo apud nos Gallicus appellatur, in Capita novem distributam, & editam Neapoli anno 1534. in 4.* in qua pauca præfatus de morbi epidemia, novitate, natura & causis, ad curationem cito properat; quam censet quidem methodica therapeia aggrediendam esse, sed ita tamen ut triplicem aliam methodum subjungat, *Primam* ope inunctionum, quarum tertia quælibet fiat cum unguento mercuriali: *Alteram* ope suffuram [g] „ *Ægrum scilicet* intra dolium vel commodam tinam bene coopertam intrare per „ mittendo, ubi duos vel tres vel plures lapides molares, vel pyrites sive „ focarios bene ignitos intromittas, supra quibus, dum sic igniti & ardentes servantur, cum petiis vel scopis aliqua de acerrimo aceto suffusa „ peraffundatur, adeo & tandiu quouique indifferenter totum corpus exquisitè sudaverit. „ *Tertiam* demum ope decocti [a] *cujusdam ligni, quod nominatur lignum Sautum sive Indiacum, quia inde ductum est recens;* „ cujus decocti administrationem multis explicat.

(a) Cap. 6.

(b) Ibid.

(c) Cap. 7.

(e) Renat.
Moreau,
in vita Jacobi Sy-
cobi Sy-
viii.

1525.
1535.

(-) Nicol.
Antonio,
in Biblio.
Scripse.
Hispan.

(f) Vid.
La Hist.
generaly
natural
de las In-
dijas Lib.
II. cap. 4.
(g) Ipse
Fernan-
dez, in
Præfat.
Histor. ge-
neral. &
naturalia
Indiarum

Cæterum affert remedia ad corrigendas læsiones, quæ singulas illas curationes sequi solent, v.g. (b) „ Gargarisma ad ulcera oris post inunctionem; (b) Pulverem ad dentes relaxatos ab inunctione; (b) Conditum, syrupum, unguentum &c. ad corrigendam calidam dyscrasiam, „ quam hepar & renes acquirunt, tum post suffuram prædictam, tum post assumptionem decoctorum ligni prædicti. „

AUGUSTINUS NIPHUS PHILOTHEUS, Sueffanus, hoc est ex eadem urbe Campaniæ, fuit suo tempore celeberrimus Medicus & Astrologus. Præter alia Opera satis multa scripsit *Librum De Morbo Gallico*, qui Neapoli editus est in 4. anno 1534.

Ipse (e) sibi Eutychi Philothei nomen adoptavit pro more ætate sua recepto.

GUNDISALVUS FERNANDEZ, Hispanice *Gonzalo Hernandez de Oviedo y Valdes, genere (d) Astur, natali Matritensis, natus est circa annum 1478.* in Aula Ferdinandi Regis Aragoniæ & Isabellæ Castiliarum Reginæ educatus fuit inter Ephebos aulicos, ac ipse præfens adfuit Barcinone anno 1493. quo Christophorus Columbus ab Insula *Haini* sive Hispaniola, quam detexerat, primum reversus est. Cum amicitia vel consuetudine junctus fuerit cum plerisque comitibus Columbi, cæterisque qui his sequentibus ab Antillis rediere, (e) ab isdem sæpius audivit quæcumque in primis illis navigationibus acciderant. Meruit inde in Neapolitano bello adversus Gallos, ac demum (f) anno 1513. a Ferdinando missus est in Hispaniolam, ut fusionibus auri, argenti & terre effossi & effo-

effodiendi præfess. Sic ipse præsens vidit & observavit quæcumque per id tempus in Hispaniis, in Regno Neapolitano & in Insula Hispaniola contigerunt.

Scriptis Hispanice Volumina duo de rebus Indicis, *Alterum* Toleti anno 1525. in Hispaniam negotiorum causa reversus, quod ad Carolum V. Imperatorem & Hispaniarum Regem dedit cum hac inscriptione,

Summario de la Historia general y natural de las Indias Occidentales.

Alterum, quod rerum copia duplo majus est, anno 1535. cum inscriptione sequente.

La Historia general y natural de las Indias Occidentales.

In utroque I. Multis probat luem veneream in Insula Haiti antiquitus familiarem fuisse & endemiam, ac inde in Hispaniam primum, & ab Hispania in Regnum Neapolitanum traductam fuisse, qua de re vide quæ supra dicta sunt, *Lib. 1. cap. 10.*

II. Multis describit arbores, quæ lignum Guaiacanum & lignum sanctum proferunt, modum quo ligna illa decoqui, methodumque qua decocta administrari debent, ac emolumenta quæ inde solent colligi.

III. Prostant in Collectione Luissinina quæ Venetiis prodiiit anno 1566. Tractatus duo brevissimi, quorum alter de ligno Guaiacano, alter de ligno sancto inscribitur. Prior quidem dicitur ibidem in Annotatione oræ libri adscripta excerptus ex *Cap. 2. Sect. 1. Lib. 10. Historiæ naturalis Indiarum Occidentalium* Consalvi Fernandez; posterior vero ex *Cap. 17. Lib. 16. ejusdem Historiæ*. Attamen si Nicolao Antonio, in *Biblioth. Scriptor. Hispaniæ* credimus, Tractatus ille uterque a Fernandez Hispanice scriptus seorsim in lucem prodiiit cum hac inscriptione, *Dos Tratados del Palo de Guayacan, y del Palo Santo*. Certe compertum habeo Tractatus illos ambos in tota Fernandez Historia extare nullibi verbis totidem, quantumvis illorum summa ibidem obvia sit.

COLLECTIO prima VENETA, quæ numero secunda est. Petrus Bonnet Bourdelot, Archiaterus Mariæ Adelaidis a Sabaudia uxoris Ludovici Ducis Burgundiæ, scripsit in annotationibus, quas (a) ad amplificandum Mercklini Opus *De scriptis medicis* destinabat & quæ manuscriptæ extant in Bibliotheca Regia, Venetiis in lucem prodiiisse anno 1535. Collectionem variorum Auctorum, qui de lue venerea scripserant, cui sequens inscriptio præfixa fuit.

1535.

(a) Vide Præfatio Joannis Jacobi Maegeri *Biblioth. Medic. præfixam.*

Liber de Morbo Gallico, in quo diversi celeberrimi in tali materia scribentes Medicinæ continentur Auctores, videlicet Nicolaus Leoniceus Vicentinus, Ulricus de Hutten, Petrus Andreas Mattbiolus, Laurentius Pbrsius, Joannes Almenar, Angelus Bologninus. Venetiis, in 8.

1535.

Hinc, si vere referat ille, colligere est proflare in ea Collectione.

Kk

INi

I Nicolai Leonicensi, Vicentini, *Librum de morbo Gallico*, qui jam pridem excusus fuerat Venetis typis Aldi Manutii, anno 1497.

II. Ulrici de Hurten, Germani, *Librum de Guaiaci Medicina & Morbo Gallico*, qui Moguntiz editus fuerat anno 1519.

III. Petri Andreæ Matthioli, Senensis, *Dialogum de Morbo Gallico*, quem tum primum in lucem emissum fuisse opinor.

IV. Laurentii Phrisii, Germani, *Epitomen Opusculi de curandis pustulis, ulceribus & doloribus Morbi Gallici Mali Frantzios appellati*, quæ Basileæ sub prælo sudaverat anno 1532.

V. Joannis Almenar, Hispani, *Librum de morbo Gallico*, qui jam typis mandatus fuerat Papiæ anno 1516. in Collectione Papiensi omnium prima, de qua supra ad illum annum.

VI. Angeli Bolognini, Bononienfis, *Libros II. de cura ulcerum exteriorum & de unguentis communibus in solutione consui*, qui præstabant quoque in Collectione Papiensi anni 1516.

1536. NICOLAUS POLL, Sacræ Cæsareæ Majestatis, hoc est Caroli V. Physicus, scripsit Opusculum seu potius Consilium Medicum *De cura Morbi Gallici per lignum Guaiacacum*, quod editum est Basileæ anno 1536. Notat in Præfatione, „ per dicti Gallici Morbi tabificam deturpationem „ omnes fere pro deploratis habitos fuisse, ubi in quibuidam nulla alia „ medicinarum, (et si innumeris utebantur) aliquid efficere potuerat: In „ aliis vero desperationis causa nihil medicinarum applicatum fuerat, quo- „ rum postea omnium per Guaiacacum lignum curatio quasi pro mira- „ culo ab omnibus habita fuit. Hæc enim, *inquit ille*, uno quasi & eo- „ dem tempore tria fere hominum millia ad bonam valetudinem redu- „ xit, qui post convalescentiam sibi ipsis renati videbantur. „

Novem Capitibus methodum utendi decocto ligni Guaiaci satis fuse explicat, censetque strictiori diætæ, quæ in usu hujusce decocti in India & Hispania præscribebatur, *aliquid laxamenti* dandum esse in *Alemannis tum propter operationes naturales, corporaque robustiora, tum etiam propter climata frigidiora, consuetudines, proprietates & similia.*

1536. NICOLAUS MASSA, Venetus, Medicus suo tempore celeberrimus, scripsit de Morbo Gallico, (a) *cum hæc Lues pullulare capiat, si non primus omnium, certe inter primos, qui quidem pauci admodum extiterunt & tercia editio mutila scripserunt.* Sane constat Massam (b) syphiliticorum corpora dissecuisse jam anno 1524. imo Librum ejus de Morbo Gallico Basileæ excusum fuisse anno 1536. in Collectione Basileensi, & non tantum ab (b) *Tract. Antonio Gallo laudari, qui scripsit anno 1540. sed ab ipso etiam Petro 1. cap. 4. Andrea Matthiolo redargui in Opere, quod Venetiis prodit anno 1535. unde liquet editionem anni 1563. quam Massa dedicavit Cardinali Carolo Borromæo, Archiepiscopo Mediolanensi, sanctitate conspicuo, haud pri-*

primam fuisse, sed tertiam, ut ipse in Præfatione testatur, & multis addi-
tamentis auctam.

Hic autem Nicolai Massæ Liber *De Morbo Gallico* eximius est & vere dignus qui legatur. Distribuitur in sex *Traçtatus*, quorum primus qui completitur *Capita septem* agit de natura, origine & causis Morbi Gallici. Ibi statuit Morbum esse ægritudinem novam, quæ multiplici contagionis via propagatur; sed (a) quæ causatur etiam ab alteratione intrinseca, (a) *Traçt. concurrentibus aliquibus dispositionibus corporis, & regimine in cibo & potu, 1. cap. 1. & aliis rebus non naturalibus.*

Secundus tractat *Capitibus 8.* de dicta, de alteratione, purgatione, phlebotomia & utilitate *ventosarum & sanguisugarum* in hac ægritudine.

In tertio agitur *Capitibus 14.* de *Medicina ligni Indici, salsæ-parille, atque radices Cbine*; modusque præparandi & administrandi varia ex singulis decocta fuscè explicatur.

In quarto proponuntur *Capitibus 6.* varia generè inunctionum vel ce-
ratorum mercurialium, cautiones quæ necessariæ sunt ut iis uti tuto liceat; demum, modi (b) succurendi oris, gingivarum, & aliarum partium gutturis alterationibus. „ Affirmat autem Massa (c) „ linimenta „ (d) *Traçt. 4. cap. 4.*
& inunctiones ex axungia & argento vivo & aliis factas, esse mirabile „ (c) *Ibid. cap. 1.*
præsidium & medicinam securitatis, cum qua, ut sæpissime visum est, „
omnes patientes Morbum Gallicum sanantur. „

Cæterum duo notari velim 1. Inunctiones a Nicolao Massa (d) quan- (d) *Ibid. cap. 2.*
doque per intervalla tantum adhibitas fuisse, cum ægri debiliores esse videbantur. 2. Ab eodem (e) „ laudari etiam multum si interungendo accipiat aliquæ evacuatio appropriata, quoniam non sunt materias „ (e) *Ibid. cap. 4.*
omnes currere per os, & ego, inquit, sæpe hoc pacto procedo, & mihi „
bene succedit. „

Quintus explicat *tribus Capitibus* qualitatem & administrationem suffumigiorum, „ & regimen observandum in ipsorum administratione; circa quod oportet (f), inquit, in primis medentes admonere, „ (f) *Traçt. 5. cap. 1.*
quod iste modus non est sine timore nocimenti membrorum principalium, imo sæpe recidivant, & ad malas ægritudines cum isto deveniunt. „

Demum in sexto differitur *Capitibus 7.* de curatione *accidentium*, quæ Morbo Gallico peculiariora sunt. Mira autem prædicat *De pulvere suo angelico*, seu Mercurio præcipitato rubro, cujus præparationem sic explicat. (g) „ Et quamvis, inquit, Joannes de Vigo vir doctissimus ipsum pulverem doceat componere sub nomine pulveris rubei, nihil ei debeo in hoc, quoniam antequam ipse scriberet, ego ipsum componebam, & habui a quodam viro Alchymista sene, qui erat mirabilis experimen- „

„rator, & multa alia ipse docuit me, cujus anima requiescat in pace,
„quoniam mortuus est.

Nicolaus Malsa erat etiamnum in vivis anno 1566. cum hoc ipso anno Aloysius Luifinus illi inscripserit primum suæ Collectionis Tomum.

1536.
(a) Man-
getus, in
Biblioth.
Medic.
(b) In Dia
logo, de
quo infra.

PETRUS ANDREAS MATTHIOLUS, Senensis, natus (a) anno 1500. Studuit Medicinæ Patavii, ubi Doctor renunciatus est. Accersitus in aulam Cæsaream, diu Imperatorum Archiater fuit. Inde Tridentum se recepit, ubi extremum clausit diem pestilentia e vivis ereptus anno 1577. ætatis suæ 77. Constat (b) ipsius testimonio eum Romæ commoratum fuisse sub Adriano VI. hoc est ab anno 1512. ad annum 1523.

Multa extant illius Opera, potissimum de Botanice, in qua maxime clauit. Habemus tamen præter cætera *De Morbo Gallico Librum unum*, ubi se inducit colloquentem cum Francisco Aligero, & qui Basileæ excusus est anno 1536.

In illo affirmat morbum novum esse, & ab elephantiasi diversum; negat ortum esse ab influxu syderum; castigat Nicolaum Malsam, quod dixerit nulla aliquando contagione fieri, sed evenire ex affectis humoribus; redarguit Laurentium Frisium tanquam penitus ingnorantia refertum, & a quo ne una tantum veritas elici possit, quod nempe crediderit syderum aspectibus morbum evenisse, & asserat se Gallicum Morbum fugare linimenti Mercurio carentibus, quibus quidem pene levis scabies curari posset.

Distinguit ipse Morbum Gallicum pro humoris prædominio & ægri temperamento in sanguineum, biliosum, pituitosum & melancolicum; unicuique idoneam curationem alterantem proponit, ac dein in unoquoque præscribit usum inunctionum mercurialium cum unguento mercuriali, cujus compositio varia sit pro varia humoris prædominantis natura. Affert inde sequentia signa, quibus licet scire ægrum illinitum satis, cum dentes dolent, os exulceratur, lingua intumescit, dolores medicamenti cedunt, diffensio nervorum deficit, & totum corpus lassatur. Quod si ex huiusmodi unionibus propter humorem, qui ex toto corpore ad os redundat, accidat ut fauces exasperentur, guttur exulceretur & gingivæ male habeant, multa affert gargarismatum genera, quibus malum corrigatur vel mitigetur.

Refert novos esse Medicos, qui arbitrentur ægros tutius curari usu lini Indici, unde arrepta occasione satis fuse describit hanc curationis methodum, sed fatetur exhibentium incuria, qui ægris dictam solitam non imperant, factum esse ut diebus istis, sicut jam prius, non videatur huiusmodi lignum male habentibus conferre, nam plerique ejus decoctum assumentes non sanantur.

Duo proponit remedia nova, tanquam utilia ad curationem Morbi Gallici, 1. Mercurium præcipitatum rubrum, cujus præparandi modum docet, & quem utilissimum esse censet, non modo ad curandum Morbum

bum Gallicum, sed etiam ad affectus alios non paucos. 2. Oleum seu potius spiritum sulphuris per campanam eductum, cujus præparandi rationem explicat, & quem laudat quasi valde proficuum, tum ad Morbum Gallicum, tum etiam ad morbos alios quamplurimos.

* Videtur merito castigandus, quod credulitate nimia censuerit posse Morbum Gallicum profligari remediis variis, quæ proponit, sed quæ plane inefficacia sunt. *Prima* est aqua distillata ex decoctis anguibus cum farragine herbarum alterantium aut vulnerariarum, cujus præparationem dicit in *intimo cordis sui hætenus delituisse*. *Alter* est potus ex decoctione remediorum multorum alterantium, temperantium, dâluentium, vulnerariorum, purgantium &c. quem *decreveras omnino nemini unquam aperire*. *Tertia* est aqua, quam *Philosophicam* dicit, alembico distillata ex simili similibus herbarum farragine; *quam alicui nunquam dicere voluerat*.

COLLECTIO tertia, sive BASILEENSIS. Hæc tertia Collectio sive συλλογή, prima Papiensi copiosior, alteri seu Venetæ Auctorum numero fere æqualis, edita fuit a Joanne Bebelio, in 4. Basileæ anno 1536. cum inscriptione sequente.

Morbi Gallici curandi ratio exquisitissima, a variis iisdemque peritissimis Medicis conscripta.

Ibi prostant

Petrus Andreas Matthiolus, Senensis. *Dialogus de Morbo Gallico.*

Joannes Almenar. Hispanus. *De Morbo Gallico.*

Nicolaus Massa, Venetus. *Liber de Morbo Gallico.*

Nicolaus Poll. *De cura Morbi Gallici per lignum Guaiacanam.*

Benedictus de Victoriis sive Victorius, Faventinus. *Liber de Morbo Gallico & ejus cura.*

His accessit

Angelus Bologninus, Bononiensis. *De ulcerum exteriorum medela Opusculum, & Ejusdem de unguentis ad cujusvis generis maligna ulcera conscribendis Lucubratio.*

Cæterum Tractatus de Morbo Gallico & ejus cura, quem in illa Collectione Basileensi diximus adscribi Benedicto de Victoriis, Faventino, idem ille est quem negat ipse Benedictus Victorius *esua officina erutum esse*, ut infra videbimus ad annum 1551.

AUREOLUS PHILIPPUS THEOPHRASTUS PARACELSUS BOMBAST ab Hohenheim, natus anno 1493. in viculo Pagi Sui-
tentis apud Helvetios, dicto *Einsidlem*, quod *Eremum* germanice sonat, unde (a) *Eremita* a Desiderio Erasmo dictus est, patrem habuit Guillel-
mum in Medicina Licentiatum, qui artem exercuit Villachii in Carinthia
ab anno 1504. ad annum usque 1534. quo mortuus est, & quem ferunt

nothum filium fuisse Equiti cujusdam ex nobili familia Bombastorum ab Hohenheim.

Paracellus ab ætate prima studio Chemiæ, quæ tunc in obscuro latebat, sedulo incubuit, primum apud Joannem Trithemium Abbatem Spanheimensem, Virum doctum; inde apud Sigismundum Fuggerum Virum

[a] *Chirurg. Lib. 2. Tract. 3. cap. 1.* (b) Ipse sic ait in *Præf. Chirurgiæ* ma-
nobilem, aliosque non paucos, quod ipse (a) recenset non sine ostentatione: Et arcana quotquot reperire potuit, corralit undique delectu nullo a Medicis, (b) Chirurgis, Tonforibus, Aniculis, Magis, Chymistis, Nobilibus ac Ignobilibus; imo etiam (c) a Zigeunis, Nigromanticis, Agyris, &

Vitam duxit inopem, vagam, errabundam, multum peregrinatus per Helventiam, Alsatiam, Carinthiam, Austriam, Moraviam, Sveciam, cæ-

(c) Ipse sic teratque Germaniæ Provincias plerasque, sed tamen non per Galliam, Italiam, Hispaniam, Portugalem, Angliam, Borussia, Lithuaniam, Poloniam, Pannoniam, Valachiam, Transylvaniam, Croatiam, Illiricum &c. ut ipse glo-

riatur in *Præfatione Chirurgiæ magnæ*; ac multo minus per Arabiam integro decennio, ut fingit Bickerus in *Hermete redivivo*, qua de re consule

(d) In *E. Sennertum, De Consensu & Dissensu Galenicorum & Peripateticorum cum Chymicis, cap. 4.*

Ubique versatus est, sive Fortuna sive animi levitate jactatus, Medicinam fascitavit suo modo, remedia sua thraconice venditans, aliena curiose expiscans. Si ejus affeclis audiamus, nullibi miracula non edidit, quod ab adversariis negatur. Eum tamen in curandis ulceribus etiam deploratissimis expertum fuisse constat testimonio Joannis Oporini, (d) qui

ejus amanuensis per biennium fuerat, sed hac de re tanto magis credendus, quod in cæteris illi minime aduletur. Utique facile crediderim Paracellum hanc Medicinæ partem paulo melius calluisse, quam per biennium, annis scilicet 1527. & 1528. Basileæ lingua vernacula hoc est germanica docuerat, *amplo Dominorum Basileensium stipendio inuitatus*, ut ipse

testatur in *Programmate*. Sane quod conjecturam firmare videtur, Paracellus ipse ait odiose sibi objici (e) *se Physice (Medicinæ) rudem & ignarum omnino existere, ac in Chirurgia Rabbini præstare; non, pergit ille, quod se-riore hanc laudem mihi conferant, sed ut per contemptum ac contumeliam me ex omni Medicorum ordine excludant.*

Certe prodigium hominis fuit, qui (f) ebrietati & crapulæ deditus, (g) Aurigæ similis Aurigarum sodalicio mirifice delectatus, litterarum ignarus, latine vix sciens, (h) Magiæ credens, (i) volens ipse Magus credi, (k) nomen Professoris sacre Theologiæ sibi falso assumens, (l)

(f) Oporinus, ubi supra. (g) Henricus Bullingerus, qui Paracellum Tiguri ipse no-

verat, apud *Erasmum, Diss. 2. contra Paracellum*.

(h) Bullingerus & Wetterus locis laudatis. (i) In libello *De Pestis* scripto ad civitatem Sterzingensem. (l) Passim in suis Operibus.

(b) Georgius Wetterus, qui Paracelli per biennium comes individuus fuerat, in *Epistola apud Erasum, in 2. parte Disputat. contra Paracellum*. (i) Paracellus ipse *Lib. 5. De Morbis invisibilibus*. Bullingerus & Wetterus locis laudatis. (k) In libello *De Pestis* scripto ad civitatem Sterzingensem. (l) Passim in suis Operibus.

(h) Bullingerus & Wetterus locis laudatis. (i) In libello *De Pestis* scripto ad civitatem Sterzingensem. (l) Passim in suis Operibus.

(h) Bullingerus & Wetterus locis laudatis. (i) In libello *De Pestis* scripto ad civitatem Sterzingensem. (l) Passim in suis Operibus.

(h) Bullingerus & Wetterus locis laudatis. (i) In libello *De Pestis* scripto ad civitatem Sterzingensem. (l) Passim in suis Operibus.

(h) Bullingerus & Wetterus locis laudatis. (i) In libello *De Pestis* scripto ad civitatem Sterzingensem. (l) Passim in suis Operibus.

(h) Bullingerus & Wetterus locis laudatis. (i) In libello *De Pestis* scripto ad civitatem Sterzingensem. (l) Passim in suis Operibus.

(h) Bullingerus & Wetterus locis laudatis. (i) In libello *De Pestis* scripto ad civitatem Sterzingensem. (l) Passim in suis Operibus.

(h) Bullingerus & Wetterus locis laudatis. (i) In libello *De Pestis* scripto ad civitatem Sterzingensem. (l) Passim in suis Operibus.

circæ religionem delirans, mente (a) parum consistens, Nugivendus, fabularum artifex egregius, opinionum portenta vocibus (b) novis, inauditis, barbaris, monstrosissimis (c) occultabat, nec plura unquam aut impudentius effutiebatur, quam ubi aqua hærebat maxime. Veterem Medicinam ceu fallacem & falsam abrogare, novamque ex inanibus veterum Chemicorum commentis depromptam, sed suis deliramentis auctam & locupletatam condere conatus est. Jure dubitatur utrum sana Satis mente id consilii ceperit, necdum proinde satis liquet deceptusne an deceptor habendus sit. Id tantum mirum est insulsis & anilibus hujuscemodi fabellis Medicos, nec numero paucos, nec gradu infimos, ita dementari aliquandiu potuisse, ut ipsos non puduerit in Paracelsi verba jurare, tanquam Magistri certissimi & ab omni errore tuti. Quæ vesania ut in Gallia nostra apud Medicos semper rarior fuit, sic ex illa jam pridem penitus exulat.

Obiit Paracelsus Salisburgi die 24. mensis Septembris, anno 1541. ætatis anno 47. ita ut qui aliis longævitatē pollicebatur, qui sibi solo Elixirio proprietatis annos Mathusalemi spondebat, ne virilem quidem ætatem excelsērit.

Liquet ex ejus tum operibus, tum testamento Paracelsum propriis nominibus dictum fuisse *Theophrastum Bombast ab Hohenheim*. Postrema duo nomina gentilitia erant, primum vero Baptismi tempore impositum: *Est natura & Baptismatis jure Theophrastus nominor*, inquit ipse, in *Præfatione Paragrano præfixa*. Cætera ergo nomina *Aureolus*, *Philippus*, *Paracelsus*, quibus videtur superbire, adscititia sunt. Ignoratur qua de causa duo prima assumpserit, nisi forsitan iis declarare voluerit & auream suam eloquentiam, & suum in equos studium, sed de tertio videtur posse conjici hoc *Paracelsi* Epitheto quo maxime gloriatur, se quasi maxime excelsum sive *Trismegistum* dicere voluisse, ut qui Latine Lingue parum gnarus putaret *Paracelsum* & *Peracelsum*, idem esse. Sic idem inscripsit unum ex suis Operibus *Paramirum*, quasi *Permirum*, hoc est maxime *Mirum*.

Inter cætera Paracelsi Opera numero multa existat *Chirurgia magna*, quam integram anno 1536. Ferdinando tunc Romanorum, Hungariz & Bohemiz Regi inscripsit. Hujus Chirurgiz pars quarta, quam jam anno 1528. scripserat, & quam dicaverat *Hieronymo Boneo urbis Colmar Distac-*

K k 4

tori,

(a) Paracelsus ipse fatetur in *Responsione ad quasdam accusationes & calumnias suorum emulorum & obrectatorum*, *Defensione* 6. sibi obijci quod capitis heteroclitii sit, & *mirri comatis*. (b) Ut sunt Chyrionium-Relollaceum, Iliadus, Ilech, Iliastrum, Archæus, Ens Pagoycum, Cagastrum, Cagastricum, Evester, Traramas, Nostoch, Scajolæ, Lessas, Neastron, Turban, Zoneni, Stannar, Perenda, Zenda, Dualech, Domor, & alia sexcenta ejusdem generis.

(c) Omnia enim stolidi magis admirantur amantque Inversis quæ sub verbis latentia cernunt. *Lucrer. lib. 1.*

tori, agit, *De tumoribus, pustulis ac ulceribus Morbi Gallici* & in decem libris distributa est. Ejusdem pars quinta idem Argumentum tractat, & in Libros 4. distribuitur, quorum primus, *De imposturis in Morbo Gallico*: Secundus, *De correctione imposturarum in curatione Luis Gallicæ*: Tertius, *De male curatis agris vestiendis*: Quartus, *De causis & origine Luis Gallicæ*, qui subdividit ipse in octo alios particulares Tractatus.

Ad sequentia referri potest summa Doctrinæ Paracelsi circa luem veneream, qualem ex lutulento sterquilinio gerrarum, inficetiarum, ineptiarum, battologiarum, convitiolorum sannarumque in Medicos, quibus ejus Libri scatent, non sine labore colligere licitum fuit.

(a) In *Prefatio-
ne prefati-
xæ Part.
4. Chirurgi-
æ ma-
gnæ.* I. Luem Gallicam morbum esse in orbe nostro (a) novum (b) anti-
quis Medicis incognitum, qui primum in Europa apparuerit circa annum
[c] 1478. vel [d] 1480.

II. (e) Joannem de Monte Regio, sive Regiomontanum celebrem secu-
li decimi quinti Astronomum, cujus Petrus Gassendus vitam scripsit, &
Chirurg. qui fato functus est Romæ anno 1476. insulsum Luis Gallicæ prædixisse ex a-
strologia. Sed iis, cum sine auctoritate proferantur, fides nulla habenda est.

III. Gallicam luem duabus causis inductam fuisse, scilicet (f) influ-
entia celesti Veneris, seu ut alibi ait, *Veneris exaltatione*, tanquam causa effi-
cientia Lib. ciente; & (g) terrestri luxuria, seu ut vulgo dixit, *luxu sive veneriarum*
4. cap. 3. *verum intemperantia, tanquam a causa sine qua non.*

IV. (b) Ab nulla unquam hominum memoria tantam fuisse in vene-
ris usu intemperantiam, quæ tantum malum excitare potis fuisset; [i] „
1. cap. 3. nec Veneris influentiam in majore exaltatione unquam fuisse....quam „
(c) Lib. 1. illo ipso seculo, quo pustulæ Gallicæ primum extiterunt. „

V. (k) „ Influentiæ hujus, (quæ luem hanc peperit) tantam viru-
lentiam fuisse, ut totum terrarum orbem pervagata omnes mortales vel
rurg. Par. „ lue hac, vel alio non minus gravi morbo affligeret.... Neque prius
5. Lib. 3. „ malum hoc desitutum esse sævire, donec omnes totius orbis regiones
cap. 6. „ pervagatum sit. Dicit alibi (l) sperandum non esse hunc morbum abo-
Et Lib. 4. „ litum iri, nisi qui infecti sunt actu venereo posthac omnino abstineant.
Tractat. „ Quocirca consilium esset ut lue venerea laborantes, perinde ut
1. cap. 6. „ elephantici, seorsim ab hominibus distincti viverent.

VI. (m) „ Sequentibus seculis non semper parem fuisse veneris actio-
nem ac influxum, sed ejus in locum alias duas successisse soboles seu fi-
4. Lib. 4. „ lias, quæ in omnem deinceps ætatem ac sexum dirum hoc malum pro-
cap. 3. „ pagarunt, nempe vel in sanguine vitium inherere, vel contagione qua
(b) Chirurg. dam communicari. „

4. Lib. 4. „ VII. (n) „ Morbum quidem in sanguine consistere, ubi materia,
c. 3. & 4. „ quæ-

(i) Chirurg. Part. 5. Lib. 4. Tractat. 1. cap. 2. (k) Chirurg. Part. 5. Lib. 3. Tractat. 1. cap. 4.
(l) Chirurg. Part. 5. Lib. 4. Tractat. 1. cap. 4. (m) Chirurg. Part. 5. Lib. 4. Tractat. 1. c. 4. (n) Ibidem

quædam luis Gallicæ spermæ commixti in ipsa conceptione vitium im-
plantaverit: ... Contagium vero variis modis contrahi, contactu, su-
dore, affectione, aliisque non paucis rationibus, quibus venenum con-
ceptum intro serpit [a] Cæterum venenum Gallicum aliud non
esse quam spiritum quendam substantiæ nostri corporis quadam pro-
prietate occulta advertantem, qui in frigido corpore calidus, in calido
frigidus sentiatur, „

VIII. Signa diagnostica luis venereæ non raro obscura esse & æqui-
voca, sed tunc [b] „ hoc catholicum esse debere, quod ubicumque ali-
quis affectus supra id quod talis est, aliquid amplius est, id est maligni-
or existit, statim ad Morbum Gallicum referri debeat. „

IX. [c] „ Usus guaiaci incertum, imo nocuum esse in curanda lue
Gallica, & de hoc omnibus constare eos, qui simul curam ligni subie-
runt, pristinæ sanitati nunquam penitus restitui posse; & etsi videatur
morbus curatus esse, nihilo tamen tutius vivere ægros, namque vel de
præpropere recidiva periclitantur, vel si diutius ea differatur, capitis
affectus, aliaque mala paulatim radices agunt ac ingravescent, morbus
que priore duplo pejor erumpit tandem. „

X. [d] *Uni Mercurio omnem luis Gallicæ curationem deberi, sed Mercu-
rium in istis morbis summum esse mysterium, scilicet [e] periculosa esse tum un-
guenta, tum suffumigia mercurialia, neque usurpanda, nisi prius Mercurius
rite præparatus fuerit; adeoque [f] „ Montispelsulanus & Salernæ Me-
dicos cinnabrio in suffumigiis adhibito, cum jam perfectam se curan-
di morbi curationem assecutos esse opinaretur, præpropere conce-
pro gaudio subsequente calamitatem graviolem reddidisse „*

XI. [g] „ Cavendum proinde ne Mercurius in substantia, id est
Mercurius corporalis usurpetur, ne quod cæteris evenit, tibi quoque
accidat; namque si Mercurii corpus nostrum corpus subeat, non potest
non gravis alicujus morbi causa esse (b) Mercurius enim, si alia ratione
quam instar cibi adhibeatur, nihil nisi venenum est. „

XII. (i) *Summum in arte Medica mysterium esse scire qua forma Mercu-
rius adhibendus sit, unde merito dicatur (k) remedium Morbi Gallici vere ar-
canum esse. Ideo Paracellus multos variosque processus præparatorum
mercurialium ænigmatice profert, potissimum 8. & 9. Libro Partis quar-
te Chirurgia magnæ, ubi agit de curatione Physicæ, id est Medicinalium,
& Chirurgicalium morborum luis venereæ: Sed Libros ipsos adeat Lector,
si plura desideret. Certe ex ea officina prodire arcana fere omnia, quæ
ad luis venereæ curationem oggeruntur passim quasi certissimæ & indu-
bitatæ virtutis, sed quorum tamen pleraque neque satis efficacia, neque
semper innoxia esse supra probavimus, Lib. II. cap. 9.*

XIII. His addenda puto quæ Paracellus dicebat de futuris periodis
luis

(a) *Lib. 2 De Morbis ex Tartaro oriundis Tract. 2. Commem. in cap. 2.* luis Gallicæ. (a) „ Morbus Gallicus, *ajebat ille*, incepit cum sal cor-
 „ rosum se separavit ab Yliado; & nunc quandiu ille morbus sèvit.
 „ est in secunda ætate, & non cessabit donec resolvatur & ad tertiam æ-
 „ tatem veniat. „
 „ Cæterum haud diffitetur Paracelsus Tractatum suum de morbis vene-
 „ reis sibi vitio datum fuisse; sic enim in Medicos invehitur. (b) „ Cur

(b) *In Fragmentis Medicis Tom. 2. pag. m. 335 edit. Genev.* „ vos saniores convitium mihi de lue Gallica scribenti dicitis? Et me
 „ aliud nihil scire nugamini? An vero id tenue & contemnendum est, si
 „ quis maximum, malignissimum ac late dispersissimum morbum, de
 „ quo * prior nemo commentatus est, describat? Ex hoc Opere mihi po-
 „ tius honorem collatum iri speraveram, quamquam ut a vobis laudarer „
 „ nunquam magnopere expetiverim. Laudarer enim saltem ab impo- „
 „ storibus, quorum laus cruce rependi debeat. „

Notari velim a Paracelso mentionem fieri in Chirurgia magna, quæ ut
 (c) *Chirurg. Par. 4. Lib. 5. cap. 9. (d) Ibid. Lib. 6. cap. 7. Et lib. 8. cap. 7.* tardissime circa annum 1536. scribi debuit tum (c) *bubonis*, tum (d)
gonorrhææ, quasi symptomatum, quæ in lue venerea rara non essent. De
 priore quidem parum miror, notum est enim bubonem in lue venerea
 observatum fuisse jam ab anno 1526. vel saltem 1530. Sed de poste-
 riore miror magis, nam vulgo creditur gonorrhæam in lue venerea pri-
 mum apparuisse circa annum 1540. Fortassè hæc addita fuere ab inter-
 pretibus vel ab Editoribus, neque enim Paracelsi Opera, quæ germani-
 ce scripta erant, in Latinam Linguam versa, typisve latine edita sunt an-
 te annum 1560. aut etiam 1570. Memini tamen gonorrhæam venere-
 am a Jacobo a Bethencourt descriptam fuisse in Opere, quod certe con-
 stat anno 1527. typis vulgatum esse, sed de his vide supra ad annum
 1527.

1537. JOANNES VOCHS, Colonienfis, scripsit *Opusculum præclarum de
 omni pestilentia, siue sit ab aere corrupto, siue ab aquis putridis, aut e cadaveri-
 bus; & De diuturna Peste Morbi Gallici, quæ non cessabis donec putredo ejus-
 dem morbi funditus eradictur*, per Joannem Dryandrum novissime repur-
 gatum. Coloniz 1537. in 8.

1537. JOANNES ANTONIUS ROVERELLUS, Bologninus, Artium
 & Medicinæ Doctor.

*Tractatus de Morbo Paturse, affectu qui vulgo Gallicus appellatur, Cypris
 impressus anno 1537. in 8.*

Duas urbes Italiæ *Cypras* dictas Ptolomæus in Piceno memorat, Ma-
 ritimam alteram, quæ creditur nunc esse *le Bourg de Grotte*: Alteram
 Mon-

* Hoc supinam Paracelsi ignorantiam palam arguit, cum ante annum 1527. quo ut quam-
 citissime Partem quartam Chirurgiæ suæ scribere potuit, plures jam essent quam 30 Aucto-
 res Medici, qui de lue venerea scripserant Tractatus typis editos.

Montanam, quæ nunc appellatur *Loretto*. Sed in utra Liber editus sit plane ignoro.

ALPHONSUS FERRUS vel FERRIUS, Neapolitanus, Artium & Medicinæ Doctor, publicus in patria Chirurgiæ Lector, primarius fuit (a) Chirurgus, vel ut alii volunt, (b) Medicus Pauli III. summi Pontificis, qui electus anno 1534. fato functus est anno 1549. Scripsit *Libros quatuor De Morbo Gallico & ligni sancti natura usque multiplici*, qui Basilææ primum editi sunt anno 1538. in 8.

In *Lib. I. agit Capitibus 30. de ligno sancto cognoscendo, eligendo, præparando & exhibendo.*

In *II. disserit Cap. 29. De Morbis a Morbo Gallico diversis*, qui „ curandi sunt per ligni sancti medicinam; Cephalea seu Hemicranea; vi- „ gilia immodica; perturbatione intellectus, defectus & amissione memo- „ riæ, melancholia, vertigine, epilepsia, paralyti, spasmo seu contractio- „ ne, fluxu nimio lachrimarum, auditu obtuso; nasi morbis, Polypo „ videlicet aliisque ulceribus; linguæ spasmo & ranula, gingivarum im- „ becillitate, defluxu humoris, ulceribus ac dentium commotione; asth- „ mate, phrysi, fastidio cibi, spiritu fœtido, stomachi apostematibus, „ apostemate carnosio & duro jecinoris, hydropse seu aqua inter cutem, „ ulceribus renum ac vesicæ, fluxu ex matrice, sterilitate, cancro in ma- „ trice, ulceribus matricis, hernia, elephantia & varicibus, podagra & „ ischiade, strumulis seu scrofulis puerorum. „

In *III. Capitibus 16. loquitur de Morbo Gallico, cujus naturam, causas, originem & curationem explicat*: Censet in recente curationem methodicam sufficere, at in inveterato adhibendum esse potum decocti ligni sancti, (c) „ nec variandum esse ad unctiones mercuriales, nisi ex Me- „ dicina ligni sancti bis terve sumpta cognitum fuerit ægrum non conva- „lescere. Nam, *inquit*, hæc ligni Medicina propria est ad Morbum Gal- „ licum curandum, ac præter cæteras maxime salutaris, nullæque remanent ex ea corporum offensiones, quod minime fit ex argenti vivi aut cinapri (cinnabarii) Medicina. „

Demum in *IV. quærit Cap. 6. an & quomodo vinum addendum sit in decoquendo ligno sancto.*

THOMAS RANGONUS, dictus Philologus Ravennas, Medicinæ (d) studio operam dedit in Academia Patavina, ubi lauream doctoralem retulit. Inde Ferrariæ & Venetiis Medicinam cum laude fecit summa, nec sine lucro, Anno 1496. obtinuit ius docendi in Lyceo Patavino: Deceffit anno 1537. prope nonagenarius.

Scripsit Rangonus Tractatum de Morbo Gallico cum inscriptione sequente.

Malum Gallicum, Depilativum, Unguivum, Dentativum Nodos, Ulcera, Vi.

1538.

(a) Vanden- den, De scriptis

Medicis.

[b] Nico-

laus Top-

pius, in

Biblioth.

Neapoli-

tana.

Mando-

sius, in Vi-

sio Archi-

at. Pon-

tificat.

(c) Lib. I.

cap. 6.

1538.

(d) Hist.

Gymnas.

Patavin.

Tom. I.

Vitia quæque, affectus & Rheumata usque ad contortos sanans. Ligni Indici, Aquæ, Vini, Sublimati, Cynæ, Spartæ-parillæ, Hyssan, Hetecken, Caravalgii Alter, Mechoacan, Antimonii, Unctionis Ceroti, Suffumigii, Præcipitati, Seminis Indi, ac additarum mundi novi & reliquorum modos omnes & facultates explicat. Venetiis 1538. in 4.

Hic Auctor designat luem veneream sive Gallicam præcipuis symptomatis, qualia suo tempore observabantur, scilicet pilorum, unguium, & dentium casu, eamque idcirco *Depilativam, Unguitivam, Dentativam* vocat. Varia autem remedia ad hunc morbum congerit, quorum pleraque ne nomine quidem jam nota sunt, ut enumeratione patet. 1. Quidem manifestum est ligno Indico Guaiacum & lignum sanctum intelligi. 2. Parum liquet quid significant voces illæ *aque, vini, sublimati*, nisi forsitan elisis virgulis *de aqua vini sublimati*, hoc est de spiritu vini distillati debeant accipi. 3. *Cyna & Sparta-parilla* notissimæ sunt nomine radicum Chinæ & sarsæ-parillæ. 3. *Hyssan* ne nomine quidem novi. 4. Censeo nomine

(a) Profl. per Bor-
garutius,
Method.
DeMorb.
Gall. cap. 14.
(b) Gabr.
Fallopium
Tract. De
Morb.
Gallie.
cap. 40.
(c) Bern-
nard. To-
mitanus,
Lib. 2. De
Morb.
Gallie.
cap. 16.
1540.

Hetecken indicari lignum illud (a) *Hestedeen*, (b) *Hestebdehen* (c) *Heddeen*, vel (c) *Hetecken*, de quo loquitur Avicennas *Lib. II. Tractat. 2. Can. 335.* & quod olim credidere nonnulli idem esse cum Guaiaco, sed nullo prorsus fundamento. 4. Nescio quid sit *Caravalgii Alter*. 5. *Cætera* notissima sunt, si *semen Indum* excipias.

JOSEPHUS STRUTHIUS, Polonus Posnaniensis, natus anno 1510. Medicinam Patavii didicit & docuit, ubi Librum suum De pulsibus scripsit anno 1540. Reversus in Poloniam Sigismundi Augusti Regis Polonæ Archiater fuit. Obiit anno 1568. ætatis 58.

Ars sphygmica, seu pulsuum doctrina supra 1200. annos perditæ & desideratæ, omnibus tamen Medicinam cum nominis celebritate, maximæque utilitate facere volentibus summe necessaria, Libris 5. conscripta. Basileæ 1540. in 8. In hoc opere agit Auctor ille *Lib. 4. Cap. De pulsibus Morbi Gallici inveterati*, quos ait parvos, tardiores, variores, languidos esse, sed si *sebricula* accedat, crebriores & celeriores.

Nomen *Struthius*, *Στρυδαιος*, quod Auctor ille sibi adoptavit pro more sua ætate recepto, Græcum est, ac passerem significat, seu potius id quodcumque ad passerem pertinet, unde fit ut non dubitem, quin polonice vocatus fuerit nomine, quod ad eandem significationem alluserit.

1540 DIONYSIUS FONTANONUS, Monspeulanus, florebat Monspelii anno 1526. Obiit post annum 1544. De eo plura in Historia nostra Scholæ Medicæ Monspelienfis brevi edenda. Notari velim hunc primum esse Medicorum Monspelienfium, & alterum Medicorum Gallorum, qui de lue venerea scripserit.

Practica Medica, sive de morborum internorum curatione Libri IV. in lucem dati a Joanne Renerio, Lugduni anno 1550. in 8.

Lib.

Libro primo hujus Operis Capite octavo, quæstio est de *Cephalalgia a Morbo Gallico*; ad cujus curationem Fontanonus proponit 1. Alterantia & purgantia multigena. 2. Decoctum ligni sancti potandum per aliquot dies. 3. Emplastrum ex multis constans remediis, sed præsertim ex emplastro nobili Joannis de Vigo, cui inest Mercurius, quo in alutam extenso fingitur pileolus capiti dolenti superponendus.

ANTONIUS GALLUS, Parisiensis,

1540.

De ligno sancto non permiscendo. Parisiis, anno 1540. in 8.

Videtur hoc Opus, quod Capita sex complectitur, ad hunc tantum finem scriptum fuisse, ut ostenderetur decoctum ligni sancti ad curandam luem veneream utilissimum esse, & ligno, dum decoquitur, nihil quidquam permiscendum esse, in quo utroque videtur Alphonsi Ferri opinio impugnari.

Palam est ex Henrico Garetio Antonium Gallum & Parisiis Medicinam fecisse & inter Parisienses Medicos celebrem fuisse. (a) Nar-
rat enim ille Petrum Bruhesium, Medicum Eleonoræ Christianissimæ Francorum Reginae, & Caroli V. Imperatoris sororis, in Belgio post obitum Francisci I. cui nupserat, degentis, Lutetiam ad Antonium Gallum, Jacobum Sylvium & Joannem Fernelium scribere jussum esse, ut eorum consilia exquireret de adversa valetudine Ludovici a Flandria. Patri Domini, arthritide vaga & anomala dudum laborantis.

(a) *Par-
astruc in
Epistolas
de Morb.
Articula-
ribus.*

Idem liquet ex Roberto Lyonnet, Aniciensi, qui in *Epistola nuncupa-
toria Dissertat. De Morbis hereditariis*, ubi celeberrimos omnis ævi Me-
dicos Parisienses enumerant, Antonii Galli mentionem facit, quasi Fernelio supparis. Constat autem ex Theodorico de Hery (b) Anto-
nium illum gallico nomine dictum fuisse *le Coq*, ut ille Paschalis
Gallus, qui Bibliothecam Medicam scripsit, nomen habuit *Paschal le
Coq*, qua de re vide (c) Citesium.

(b) *Me-
thode cu-
ratoire de
la Mala-
die vene-
rienne*,
pag. 17.
(c) *Ad
calcem
tractat.
De do-
lore coli-
co Picto-
nico*, pag.
234.

Hic autem Gallus idem ipse est, qui, ut ferunt, (d) in consilio
Medicorum de restituenda valetudine Francisci I. Galliarum Regis
Lue venerea infecti, cum Fernelius usum suaderet suæ opiatæ anti-
venereæ, cui plurimum, seu ut verius dicam, cui nimium fidebat,
contra tenuit inunctionem mercurialem præferendam esse in hæc ver-
ba erumpens, *Inungatur*, seu ut ipsissimam vocem usurpem, *Fro-
tetur*, ut vilissimus quisque e suo regno, cum nec dispari modo contami-
natus fuerit, quam tamen loquendi libertatem aiunt a Rege haud ini-
quo animo latam fuisse.

(d) *Lett-
res de
Gui
Patin.
Tom. 1.
Lett. 133.
1542.*

REMACLVS FUCHSIUS
reti, *Canonicus fuit ad sancti*
12. Calendas Januarii

urgu- rater (e) Gilberti Phila-
n ubi decessit anno 1587.

(e) *Vale-
rius An-
dreas, in
Biblioth.
Belgica.*

In-

Inter cetera Opera scripsit *Methodum curandi Morbi Hispanici sive Gallici per lignum Guaiaci decoctum. Parisiis, apud VVechel. 1541. in 8.*

1542. ANDREAS VESALIUS Bruxellenfis. Sic dictus a Vesalia Cliviz civitate, unde familia Andreæ oriunda fuit: Natus est Bruxellis anno 1514. patremque habuit cognominem qui Caroli V. Imperatoris medicamentarius fuit.

(a) Valerius Andreas, in Biblioth. Belgica. Juvenis (a) Lutetia Præceptorem habuit Jacobum Sylvium, eruditissimum & celeberrimum artis Medica Professore in Collegio Franciæ Regio. Ab illo institutus, ingenio duce & labore ad summa mox pertigit.

(b) Joann. Stipendia (b) meruit tanquam Chirurgus & Medicus in Bello a Carolo V. anno 1535. inchoato. Anno 1537. Patavii publicus fuit Anatomies Professor, quo munere præclare per septem fere annorum decursum functus est.

Medi. Meruit denuo in bello Geldrico, quod Imperator confecit anno 1543. abiensque Cæsar jussit ut maneret aliquandiu Noviomagi ad curandam valetudinem Bernardi Navagerii Venetorum Legati, qui difficili ac gravi morbo confistabatur, unde una cum ægrotante ad sanitatem jam perducto. Ratisbonam se contulit.

Mox adscitus inter medicos aulicos Imperatoris Caroli V. & ejus filii Philippi II. Hispaniarum Regis, egit reliquum vitæ tempus in aula ad annum usque 1564. quo subito conversa est magni viri fortuna.

(c) Ibi- dem. Hispanum (c) curabat nobilem, nec morbi causam satis intelligere se dolens, petiit ab amicis defuncti corpus aperire, ut morbi rationem & mortis scrutaretur causam. Quo concealso visum est cor in aperto jam pectore adhuc palpitans, cognati accusant homicidii apud Judices & impietatis ad Tribunal Inquisitionis Hispanicæ postremo datus est Regi, totique simul deprecanti Aulæ, eo omine ut peregrinatione religionis ergo suscepta Hierosolymas expiaret crimen. Ivit ergo Venetias Vesalius exul anno 1564. indeque in Cyprum, & a Cypro Hierosolymas navigavit, unde a Senatu Veneto largissimi stipendii oblatione vocatus Patavium, ut mortui pridem Fallopii in Anatomicis locum suppleret. Rediit ergo sed adversis ventis ejectus in Zacynthum Insulam, in loco solitario inops, omnique carens subsidio miserabiliter vitam finivit, mense Octobri anno eodem, vix natus ipse 50. annis, unde liquet errare (d) Valerium Andream, dum ait Vesalium anno ætatis 38. mortuum fuisse.

(d) In Biblioth. Belgica. Scripsit anno 1542. *Epistolam De Radice Chinae ad Joachimum Rotlantis, in qua inserta sunt & De Sparta-parilla sub finem nonnulla*, Ratisbona datam anno 1543. & in lucem editam a Francisco Vesalio fratre suo, Venetiis 1543. in 8.

Ibi narrat Vesalius quali successu radix Chinæ olim Venetiis adhibita fuerit, cum ipse sub Præceptoribus & præcipuis illic artem exercensibus agros

intra-

inviseret; quali fimitique successu in reliqua Italia, & in Burgundia adhibitam fuisse audiverit.

Deinde ait Carolum V. cum articularis sui morbi & mali habitus ratione Guaiaci decoctio usus esset, suo potius Marte quam consilio D. Cornelii, (cujus tunc potissimum opera a D. Cavalii discessu utebatur) China decoctum assumpsisse quindecim tantum diebus, & in varia victus ratione & mutato subinde propinandi modo, idque potissimum suo arbitrato. Inde tamen paulo melius habuisse, unde brevi tantum nomen remedio conciliatum est, ut vicini Germania Medici, & qui Comitibus in suorum Principum familia intererant, sedulo ac diligenter de ejus decocti apparatu percontarentur, neque prius molesti esse desinerent, aut exigendi orandique finem ponerent, quam formulam nacti fuissent, qua medicos Cesareos decoctum illud offerre sibi persuadebant. Inde arrepta occasione Vesalius paucis ad amicum Medicum describit Historiam Chinæ, decocti præparandi modum & usum, eumque monet China decoctum bibentes sentagine summa tentari, quæ virtus Aphrodisiaca hujusce radicis certissimis experimentis explorata est. Ad Epistolæ calcem nonnulla adjicit de sparta-parilla.

BARTHOLOMÆUS MONTAGNANA Junior, (a) Patavinus, 1542. Philosophus ac Medicus, scripsit Consilium Medicum ad Petrum Zenum (a) Ipse in consilio urbem Patavinam vocat suam. Venetum, pro Illustrissimo & Reverendissimo Episcopo & Ungariæ Prorege Morbo Gallico laborant, quod primum edictum est in secundo Tomo Collectionis Venetæ Aloysii Luifini, 1567.

I. Ibi docet Auctor circa Theoriam, 1. Morbum Gallicum Hippocrati, Galeno, Avicenna & aliis Medicis antiquis incognitum fuisse.

2. Aliquas ægritudines esse, quæ non accidunt nisi longis temporum interval-
lis, & quæ forte sequuntur stellarum conjunctiones, quæ non sunt nisi raro.

3. Sic Galenum, ut refert Avicenna 3. quarti, Cap. de Venâ Medene, nunquam vidisse illam ægritudinem, (scilicet venam Medene) neque vidisse febrem septenam aut novenam.

4. Sic eundem non vidisse lapidem egredientem ab intestinis, (ex kystide fellea) sicut ipse recitat in Libro de Interioribus; & tamen Gentilem vidisse eum bis.

5. Sic Gentilem vidisse quoque lapidem a stomacho egressum per vomitum post vehementes stomachi dolores, quod a prædecessoribus nostris non fuit visum.

6. Proinde pariter non videri inconueniens, quod Morbus Gallicus appareat temporibus nostris, qui tamen temporibus Hippocratis, Galeni & Principis non fuit.

7. Inde tamen non sequi Morbum Gallicum nunquam fuisse, quin imo necesse ipsum alias fuisse, si mundus est æternus, ut voluit Aristoteles 8. Physicorum & 1. Cœli. Eadem vero revolutiones & stellarum conjunctiones, & causæ ipsarum productivæ infusis fuerunt . . . Si vero mundus est factus de no-

de novo, (ut est rei veritas) credendum esse etiam talem morbum alias fuisse; non tamen tempore illustrium Auctorum prædicatorum, quorum Opera temporibus nostris vigent.

II. Circa Therapeiam vero jubet 1. Accuratum esse regimen sex rerum non naturalium quas singulatim persequitur. Inter cætera vero præscribit ut Coitus sit temperatus & ineundus celebrata jam prima & secunda digestionem, cum mediatur dispositio in digestionem tertiam. Egregium sane consilium, quod daretur Episcopo, & si vera conjicio, Episcopo tunc 60. annos jam nato!

2. Deinde multis proponit curationem methodicam ex alterantibus; temperantibus, & purgantibus variis, sed ne verbum quidem addit de Guaiaco, Sarsaparilla, China, Mercurio &c. quæ sane Auctorem incipienti luis venereæ cõtaneum sapere viderentur, nisi obflarent quæ nunc allaturi sumus.

Conjectura est, neque sane inanis, consilium hocce, de quo agitur scriptum fuisse in Gratiam Georgi Martinusii quippe nullum alium novi, qui ab ingressu luis venereæ & Episcopus & Hungariæ Prorex simul fuerit. Martinusius vero, qui jam ab aliquot annis Episcopus Varadiensis erat, Hungariæ Prorex non fuit, nisi post mortem Joannis Zapolihæ Regis Hungariæ & Transylvaniæ Principis, ac Postquam Solimanus Turcarum Imperator Isabellæ Reginæ dicti Joannis viduæ suppetias tulit adversus Ferdinandum Caroli V. Fratrem, quæ in annum 1541. incidunt. Proinde, si vera conjicio, consequens est consilium Medicum, de quo questio est, ante annum 1541. scriptum non fuisse.

Hinc ergo sequitur 1. Scriptum non esse a (a) Bartholomæo Montagnana seniore sive I. qui in Academia Patavina claruit circa annum 1440. cum ille vitam non produxerit ultra annum 1460.

2. Neque pariter scriptum fuisse a (b) Bartholomæo Montagnana altero, qui in eodem Gymnasio Medicinam professus est, cum ille fato functus sit anno 1525.

3. Sed fuisse scriptum a Bartholomæo Montagnana III. ab omnibus Bibliographis ignorato, qui Filius fuerit II. & nepos I. quem ideo quoque Auctor hujus consilii (c) avum suum Paternum vocat non semel.

4. Proinde Bartholomæum Montagnanam II. quem Auctor (d) Histriæ Gymnasii Patavini credit nepotem fuisse Bartholomæi Montagnanæ I. ex fratre vel ex filio, filium ejusdem fuisse.

(d) Loco laudato. LEONHARDUS FUCHSIUS, Rhætus, natus Vvemmingæ in Rhætia, anno 1501. ad Doctoratus gradum promotus est Ingolstadii anno 1521. ubi paulopost, nempe anno 1526. Professoris Medici munere functus est. 1542. Indignatus est Archiater Marchionis Brandenburgici Onoltzbachienfis anno 1528. Onoltzbachium concessit. Tandem Tubingam vocatus est anno

(a) Apud omnes Bibliographos.

(b) In Historia Gymnasii Patav. Tom. 1.

(c) In fine consilii.

(d) Loco laudato.

anno 1535. ubi Medicinam publice docuit ad annum 1566. qui vitæ ultimus fuit.

Exstat in Collectione Luisiniana *Caput unum de Morbo Gallico*, excerptum ex Appendice ad Librum V. *Traſtatus de curandi ratione, ſeu de ſanandis totius humani corporis, ejuſdemque partium, tam internis quam externis malis*, qui excuſum fuit Baſileæ in fol. anno 1542.

Fuchſius docet ibi Morbum Gallicum novum eſſe, omnique ævo priore incognitum; Si recens ſit, levioribus ſæpe tolli remediis, quæ paucis proponit: *Quod ſi vero is morbus jam longo tempore corpus inveſtarvit, ad ligni uſum quod barbara gens, quæ nobis illud traſmittit, vernacula Lingua Guaiacum appellat, confugendum eſſe*, cujus adminiſtrationem breviffime explicat.

MICHAEL ANGELUS BLONDUS, Italus, militavit (a) ut ipſe ait, plerique annis ſub diſciplina Auguſtini Niphi, hoc eſt eo Præceptore & Magiſtro diu uſus eſt.

1542.
(a) In Li-
bro de ori-
gine Mor-
bi Gallici,

Scriptiſt traſtatum de *Origine Morbi Gallici, deque ligni Indici ancipitiſ proprietate*, qui anno 1542. in 8. Venetiis excuſus fuit a Joanne Antonio & Petro de Nicolinis ad calcem *Traſtatus de Partibus iſtæ ſectis citiſſime ſanandis, & Medicamento aquæ nuper invento*. Proſtat uterque Traſtatus in Collectione Tigurina Scriptorum optimorum de Chirurgia Tiguri a Conrado Geſnero editorum anno 1555. in fol.

Liber ille de origine morbi Gallici brevis eſt, nullo ordine digeſtus, & ita obſcure ſcriptus, ut vix liceat interdum Auctoris ſenſum aſſequi.

I. Ait Morbum Gallicum antiquitus notum fuiſſe, quandoquidem Hippocrates & Galenus ſcripſerunt de omni ſpecie morborum, quibus humanum corpus ſubjicitur . . . Antiquum ergo ſymptoma hoc; quod omnes etiam aſſerunt, qui de Lepra, Serpigrine, Herpete, & ſimilibus ſcripſerunt, ut eſt Ægineta, aut etiam Cornelius [Celfus] qui de Elephantia . . . Non dicamus, inquit, Morbum ab Indis traſverſiſſe ad nos, quoniam fatuitatem proſite-
bimur dicentes.

Conſtitetur ſe uſum fuiſſe iuribus Indici Ligni (Guaiaci) in Syphyliticiſ . . . qui omnes præ tenui viſtu & in ſubſtantiali potu tenuiſſimi & exangues deveniebant; ſed cum arbitrabatur liberos eſſe . . . tamen priuſquam luna com-
plebat orbem ſuum, pleroſque comperiebat in graviorem recidiſſe morbum.

III. Proponit ad curationem 1. *Regimen vite in ſex rebus non-natura libus*. 2. Remedia quædam ex alterantibus vulgaribus, quæ mutuatur, ut ipſe refert, a Joanne Almenar, Doctore Hiſpano, vel ab Auguſtino Ni-
ppo. 3. Pilulas mercuriales quaſdam ex Mercurio crudo, moſcho, rheo & ſcammonio conſectas. Dicit id remediū genus fuiſſe præſtans medicamen-
Barbarorum, quo ipſe (b) Teucrorum Rex frequenter uſus ſit. Quem autem Rege
illo Teucrorum intelligat vix ſatis capio, niſi forſan eo nomine designet
Chairadinum Barbaroſſam Regem Algerii, de quo ſupra Lib. 2. cap. 7.

(b) Sic
Henricus
wolter in
Chronica.
Archie-
piſc. Bre-
menſ. cir-
ca ann.
1480.
ſcripto,
qui quod

extat in
Tom. II.
Henrici
Menbomii
aitTurcor
in Latino
dici Ten-
eros.
(a) Bi-
blioth.
Medic. in
voceAugu-
stinus
Niphus.

quis non iisdem, ac certe aut valde disparibus pilulis utebatur. 4. *Præsidium*, ut ille loquitur, quoddam familiare, seu celeste ex Pilulis de Hermonobomii dactylis majoribus cum parva portuncula præcipitati Mercurii rubri, cujus peculiarem, quemdam processum proponit. 3. Denique ad discutiendos dolores artuum, delendos tumores, exsiccandas pustulas cutaneas &c. innumera præfert unguentorum & ceratorum genera, inter quæ plurima Mercurium admittunt, sed nullo modo explicat, nec qua cautione adhiberi illa debeant, nec quid ab illorum usu metuendum sit.

1544.

Dicitur Blondus a Joanne Georgio Schenckio (a) in suum tractatum pleraque remedia transtulisse ex Tractatu Augustini Niphi in eodem morbo. An ea vera sint mihi non liquet, cui nondum contigit Tractatum Augustini Niphi usurpare. Sed certe si vera fuerint, in hoc culpandus videtur Blondus, cui cum posset Auctores alios melioris notæ exscribere, placuerit quisquilias istiusmodi suas furto facere.

ALOYSIUS LOBERA, Abulanus, hoc est ex civitate Abula, quæ nunc Avila in vetere Castilia, Medicus fuit Caroli V. Imperatoris & Regis Hispaniarum: Scripsit Hispanice circa annum 1544. Librum *De quatuor agritudinibus aulicis*, inter quas recenset Morbum Gallicum, ne-

(b) Deque sane mirum, cum (b) teste Caspate Torella morbus ille in ulteriori Hispania morbus Curialis vocetur, eo quia curiam insequitur.

dolore in
pudenda-
ria.
(c) Cap. 1.

Hæc est Libri illius inscriptio:

Libro de las quatro enfermedades cortesanas, que son Catbarro, Gotta, mal de Piedra, y mal de Buas, por el Doctor Luys Lobera de Avila en Toledo, 1544. quem italicum fecit, ediditque Venetiis Petrus Laurus, anno 1558. in 8.

Hinc excerptus est Tractatus *De Morbo Gallico* in Collectione Aloysii Luisini extans, qui capita septemdecim continet, ubi Auctor affirmat (c) Morbum ignotum fuisse veteribus, cum nulla eius indicia attulerint. Inde vero explicat morbi curationem triplicem, potu decocti ligni Guaiacani, usu unctionum mercurialium, & ope suffumigiorum; sed unicuique censet præmittendam esse præparationem cum purgantibus, alterantibus, temperantibus. Existimat potum decocti Guaiacani cæteris præstare; usum vero suffumigiorum plerumque gravioris esse periculi. Sub finem pauca addit de usu radicum Chinæ.

Id autem inprimis notatu dignum videtur quod Lobera velit unctiones aliquando per intervalla fieri. Si *agritudo*, inquit, *ingens fuerit, aegroto imbecillo existente, unctionem alternis diebus fieri probaverim, interposita etiam quiete absque unctione per biduum, interim alimenta optima offerendo.*

1548.

HIERONYMUS CARDANUS, Mediolanensis, natus anno 1501. Bononiæ Medicinam docuit. Fertur plura scripsisse quam legisse, pluraque

que docuisse quam didicisse. Dicitur etiam statuisse millesimo quoque anno vix unum perfectum & excellentem Medicum dari, & se eorum septimum fecisse. Hæc & alia non pauca, quæ ipse de se refert in Opusculo quod *De vita sua* inscripsit, probant de illo saltem verum esse, quod a Seneca dici meminimus, *nullum magnum ingenium fuisse sine mixtura dementiæ*. Obiit Romæ anno 1576. ætatis 75. eo ipso anno & die, quibus se moriturum prædixerat. Sed non desunt (a) qui asserant, ne fallâ vaticinatus videretur, mortem sibi inedia accersivisse.

Omnia illius Opera in 10. Tomos digesta sunt studio Caroli Sponii, & Lugduni edita in fol. anno 1663.

Jam olim, anno scilicet 1548. Lugduni editus fuerat in 4. Libellus ejusdem *De Cynæ radice seu de Decolliis*, qui prostat in Collectione Venetæ Aloysii Luifini.

Describit ibi Cardanus modum administrandi decocti radices Cynæ, quo quidem Morbum Gallicum curari posse ait, sed nihilominus non adeo bujus radices decocto favet, ut illud ligni sancti aut corticis decollo conferat.

Porro addit in fine Libelli, vim medicamenti bujus, si ad lignum sanctum conferre libeat, sic expedito. Advebitur ad nos hæc radix post biennium raro usus ante quinquennium: Unciæ tres in quindecim libras aquæ, ligni sancti uncia quindecim; proportio effectus ferme tripla, proportio ergo quindecupla; cui si adjiciatur moræ ratio, erit trigintupla. At lignum sanctum inter præcipua medicamenta habetur, & hydrargyrio ferme par, unde haud recte dictum videtur vulgare & inefficax fore medicamentum.

JONNES RODRIGUEZ DE CASTELLO-BIANCO, alias, AMATUS, Lusitanus, natus in oppido Lusitaniz, quod *Castel-Branco* dicitur in Provincia Beirensi, Medicinæ studuit Salmanticæ, ac eodem tempore Chirurgiam in Nosocomiis ejusdem urbis exercuit. Inde per celeberrimas Galliæ, Belgii & Italiæ Academiâs peregrinatus Ferrariæ Medicinam docuit, Anconæ diu substitit, sed sibi timens quod ad Judaicam superstitionem relapsus esset, hinc Pisaurum, & Pisauro Thesalonicam in Græcia confugit, ubi celebris est Hebræorum Synagoga, cui adhæsit. A temporæ ejuratæ religionis Christianæ, nomine pristino renuntiato, Amatum Lusitanum dici maluit.

Curationum Medicinalium Centuriæ septem, varia multiplicique rerum cognitione resectæ. Venetiis 1557. in 8.

Scorsim ante editæ fuerant duæ primæ Centuriæ: Altera cui commentatio *De introitu ad Ægrotos, & Criseon tractatio præmissa est*, Florentiæ anno 1551. in 8. Altera, in qua *Methodus & Canon propinandi Decoctum radices Cynæ locupletius describitur*. Venetiis. 1552. in 12.

Ex Centuria prima depromptæ sunt Epistolæ geminæ Collectioni Venetæ insertæ, quarum priore scribit gallicosum virum quinque in-

(a) Thuanus, *Histor. sui tempor. Lib. 62.*

(a) Lib. 2. De Morbis ex Tassaro oriundis Tract. 2. Commun. in cap. 2. luis Gallicæ. (a) „ Morbus Gallicus, *ajebat ille*, incepit cum sal cor-
 „ rosum se separavit ab Yliado; & nunc quandiu ille morbus sœvit.
 „ est in secunda ætate, & non cessabit donec resolvatur & ad tertiam æ-
 „ tatem veniat. „

Cæterum haud diffidetur Paracelsus Tractatum suum de morbis vene-
 reis sibi vitio datum fuisse; sic enim in Medicos invehitur. (b) „ Cur
 „ vos saniores convitium mihi de lue Gallica scribenti dicitis? Et me
 „ aliud nihil scire nugamini? An vero id tenue & contemnendum est, si
 „ quis maximum, malignissimum ac late dispersissimum morbum, de
 „ quo * prior nemo commentatus est, describat? Ex hoc Opere mihi po-
 „ tius honorem collatum iri speraveram, quamquam ut a vobis laudarer „
 „ 2. pag m. nunquam magnopere expetiverim. Laudarer enim saltem ab impo- „
 „ 335 edit. storibus, quorum laus cruce rependi debeat. „
 „ Genev.

Notari velim a Paracelso mentionem fieri in Chirurgia magna, quæ ut
 tardissime circa annum 1536. scribi debuit tum (c) *bubonis*, tum (d)
 (c) Chi- rur. Par. *gonorrhææ*, quasi symptomatum, quæ in lue venerea rara non essent. De
 4. Lib. 5. priore quidem parum miror, notum est enim bubonem in lue venerea
 cap. 9. observatum fuisse jam ab anno 1526. vel saltem 1530. Sed de poste-
 (d) Ibid. riore miror magis, nam vulgo creditur gonorrhœam in lue venerea pri-
 Lib. 6. mum apparuisse circa annum 1540, Fortasse hæc addita fuere ab inter-
 cap. 7. pretibus vel ab Editoribus, neque enim Paracelsi Opera, quæ germani-
 Et lib. 8. ce scripta erant, in Latinam Linguam versa, typisve latine edita sunt ante
 cap. 7. annum 1560. aut etiam 1570. Memini tamen gonorrhœam venerem
 a Jacobo a Bethencourt descriptam fuisse in Opere, quod certe con-
 stat anno 1527. typis vulgatum esse, sed de his vide supra ad annum
 1527.

1537. JOANNES VOCHS, Colonienfis, scripsit *Opusculum præclarum de omni pestilentia, sive sit ab aere corrupto, sive ab aquis putridis, aut e cadaveribus; & De diuturna Peste Morbi Gallici, quæ non cessabit donec putredo ejusdem morbi funditus eradicetur*, per Joannem Dryandrum novissime repurgatum. Coloniz 1537. in 8.

1537. JOANNES ANTONIUS ROVERELLUS, Bologninus, Artium & Medicinæ Doctor.

Tractatus de Morbo Paturfa, affectu qui vulgo Gallicus appellatur, Cyprus impressus anno 1537. in 8.

Duas urbes Italiæ *Cypras* dictas Ptolomæus in Piceno memorat, Maritimam alteram, quæ creditur nunc esse le Bourg de Grone: Alteram Mon-

* Hoc supinam Paracelsi ignorantiam palam arguit, cum ante annum 1527. quo ut quam-
 cissime Partem quartam Chirurgiæ suæ scribere posuit, plures jam essent quam 30. Aucto-
 res Medici, qui de lue venerea scripserant Tractatus typis editos.

Montanam, quæ nunc appellatur *Loreto*. Sed in utra Liber editus sic plane ignoro.

ALPHONSUS FERRUS vel FERRIUS, Neapolitanus, Artium & Medicinæ Doctor, publicus in patria Chirurgiæ Lector, primarius fuit (a) Chirurgus, vel ut alii volunt, (b) Medicus Pauli III. summi Pontificis, qui electus anno 1534. fato functus est anno 1549. Scripsit *Libros quatuor De Morbo Gallico & ligni sancti natura usque multiplici*, qui Basileæ primum editi sunt anno 1538. in 8. 1538.

In *Lib. I.* agit *Capitibus 30. de ligno sancto cognoscendo, eligendo, præparando & exhibendo.* (a) Vandenlin-
den, De
scriptis
Medicis.
[b] Nico-
laus Top-
pius, in
Biblioth.
Neapoli-
tana.
Mando-
sius, in Vi-
sir Archi-
at. Pon-
tificat.

In *II.* disserit *Cap. 29. De Morbis a Morbo Gallico diversis*, qui „ curandi sunt per ligni sancti medicinam; Cephalæ seu Hemicranæa; vi-
gilæ immodicæ; perturbatione intellectus, defectus & amissione memo-
riæ, melancholia, vertigine, epilepsia, paralyti, spasmo seu contractio-
ne, fluxu nimio lachrymarum, auditu obtuso; nasi morbis, Polypo
videlicet aliisque ulceribus; linguæ spasmo & ranula, gingivarum im-
becillitate, defluxu humoris, ulceribus ac dentium commotione; asth-
mate, phrysi, fastidio cibi, spiritu fætido, stomachi apostematibus,
apostemate carnosio & duro jecinoris, hydropse seu aqua inter cutem,
ulceribus renum ac vesicæ, fluxu ex matrice, sterilitate, cancro in ma-
trice, ulceribus matricis, hernia, elephantia & varicibus, podagra &
ischiaide, strumulis seu scrofulis puerorum. „

In *III. Capitibus 16.* loquitur de Morbo Gallico, cujus naturam, causas, originem & curationem explicat: Censet in recente curationem methodicam sufficere, at in inveterato adhibendum esse potum decocti ligni sancti, (c) „ nec vaniendum esse ad unctiones mercuriales, nisi ex Medicina ligni sancti bis terve sumpta cognitum fuerit ægrum non convalescere. Nam, *inquit*, hæc ligni Medicina propria est ad Morbum Gallicum curandum, ac præter cæteras maxime salutaris, nullæque remanent ex ea corporum offensiones, quod minime fit ex argenti vivi aut cinapri (cinnabarii) Medicina. „ (c) Lib. I.
cap. 6.

Demum in *IV.* querit *Cap. 6.* an & quomodo vinum addendum sit in decoquendo ligno sancto.

THOMAS RANGONUS, dictus Philologus Ravennas, Medicinæ studio operam dedit in Academia Patavina, ubi lauream doctoralem retulit. Inde Ferrariæ & Venetiis Medicinam cum laude fecit summa, nec sine lucro, Anno 1496. obtinuit jus docendi in Lyceo Patavino: Deceffit anno 1557. prope nonagenarius. 1538.
(d) Hist.
Gymnas.
Patavin.
Tom. I.

Scripsit Rangonus Tractatum de Morbo Gallico cum inscriptione sequente.

Malum Gallicum, Depilativum, Unguivum, Dentativum Nodos, Ulcera, Vi.

Vitia quaque, affectus & Rheumata usque ad consortios sanans. Ligni Indici, Aquæ, Vini, Sublimati, Cynæ, Sparte-parillæ, Hyssan, Hetecken, Caravalgii Alter, Mechoacan, Antimonii, Unctionis Ceroti, Suffumigii, Precipitati, Seminis Indi, ac additarum mundi novi & reliquorum modos omnes & facultates explicat. Venetiis 1538. in 4.

Hic Auctor designat lue[m] veneream sive Gallicam præcipuis symptomatis, qualia suo tempore observabantur, scilicet pilorum, unguium, & dentium casu, eamque idcirco *Depilativam, Unguitivam, Densativam* vocat. Varia autem remedia ad hunc morbum congerit, quorum pleraque ne nomine quidem jam nota sunt, ut enumeratione patet. 1. Quidem manifestum est ligno Indico Guaiacum & lignum sanctum intelligi. 2. Parum liquet quid significant voces illæ *aque, vini, sublimati*, nisi forsitan elisis virgulis *de aqua vini sublimati*, hoc est de spiritu vini distillati debeant accipi. 3. *Cynæ & Sparte-parilla* notissimæ sunt nomine radicem Chinæ & sarsæ-parillæ. 3. *Hyssan* ne nomine quidem novi. 4. Censeo nomine *Hetecken* indicari lignum illud (a) Hestedecken, (b) Hestebeden (b) Heddecken, vel (c) Hetecken, de quo loquitur Avicennas *Lib. II. Tractat. 2. Cap. 335.* & quod olim credidere nonnulli idem esse cum Guaiaco, sed nullo prorsus fundamento. 4. Nescio quid sit *Caravalgii Alter*. 5. Cætera notissima sunt, si semen Indum excipias.

(a) Prof. per Bor-
garutius,
Method.
De Morb.
Gall. cap.
14.
(b) Gabr.
Fallopium
Tract. De
Morb.
Gallie.
cap. 40.
(c) Bern-
nard. To-
mitanus,
Lib. 2. De
Morb.
Gallie.
cap. 16.
1540.

JOSEPHUS STRUTHIUS, Polonus Posnaniensis, natus anno 1510. Medicinam Patavii didicit & docuit, ubi Librum suum De pulsibus scripsit anno 1540. Reversus in Poloniam Sigismundi Augusti Regis Polonæ Archiater fuit. Obiit anno 1568. ætatis 58.

Arts sphygmica, seu pulsuum doctrina supra 1200. annos perditæ & desideratæ, omnibus tamen Medicinam cum nominis celebritate, maximæque utilitate facere volentibus summe necessaria, Libris 5. conscripta. Basileæ 1540. in 8.
In hoc opere agit Auctor ille *Lib. 4. Cap. De pulsibus Morbi Gallici inveterati*, quos ait *parvos, tardiores, rariores, languidos esse, sed si sebricula accedat, crebriores & celeriores.*

Nomen *Struthius*, *Στράθειος*, quod Auctor ille sibi adoptavit pro more sua ætate recepto, Græcum est, ac passerem significat, seu potius id quodcumque ad passerem pertinet, unde fit ut non dubitem, quin polonice vocatus fuerit nomine, quod ad eandem significationem alluserit.

DIONYSIUS FONTANONUS, Montepellulanus, florebat Montepelii anno 1526. Obiit post annum 1544. De eo plura in Historia nostra Scholæ Medicæ Montepelienensis brevi edenda. Notari velim hunc primum esse Medicorum Montepelienisum, & alterum Medicorum Gallorum, qui de lue venerea scripserit.

Practica Medica, sive de morborum internorum curatione Libri IV. in lucem dati a Joanne Renerio, Lugduni anno 1550. in 8.

Lib.

Libro primo hujus Operis Capite octavo, quæstio est de Cephalalgia a Morbo Gallico, ad cujus curationem Fontanonus proponit 1. Alterantia & purgantia multigena. 2. Decoctum ligni sancti potandum per aliquot dies. 3. Emplastrum ex multis constans remediis, sed præsertim ex emplastro nobili Joannis de Vigo, cui inest Mercurius, quo in alutam extenso fingitur pileolus capiti dolenti superponendus.

ANTONIUS GALLUS, Parisiensis,

1540.

De ligno sancto non permiscendo. Parisiis, anno 1540. in 8.

Videtur hoc Opus, quod Capita sex complectitur, ad hunc tantum finem scriptum fuisse, ut ostenderetur decoctum ligni sancti ad curandam luem veneream utilissimum esse, & ligno, dum decoquitur, nihil quidquam permiscendum esse, in quo utroque videtur Alphonsi Ferri opinio impugnari.

Palam est ex Henrico Garetio Antonium Gallum & Parisiis Medicinam fecisse & inter Parisienses Medicos celebrem fuisse. (a) Narrat enim ille Petrum Bruhesium, Medicum Eleonoræ Christianissimæ Francorum Reginz, & Caroli V. Imperatoris sororis, in Belgio post obitum Francisci I. cui nupserat, degentis, Lutetiam ad Antonium Gallum, Jacobum Sylvium & Joannem Fernelium scribere iussum esse, ut eorum consilia exquireret de adversa valetudine Ludovici a Flandria. Patri Domini, arthritide vaga & anomala dudum laborantis.

(a) *Parasceve in Epistolar de Morb. Articula. ribus.*

Idem liquet ex Roberto Lyonnet, Aniciensi, qui in *Epistola nuncupatoria Dissertat. De Morbis hereditariis*, ubi celeberrimos omnis ævi Medicos Parisienses enumerant, Antonii Galli mentionem facit, quasi Fernelio supparis. Constat autem ex Theodorico de Hery (b) Antonium illum gallico nomine dictum fuisse *le Cog*, ut ille Paschalis Gallus, qui Bibliothecam Medicam scripsit, nomen habuit *Paschal le Cog*, qua de re vide (c) Citesium.

(b) *Mode de curer la Maladie venereenne, pag. 17.*

Hic autem Gallus idem ipse est, qui, ut ferunt, (d) in consilio Medicorum de restituenda valetudine Francisci I. Galliarum Regis Lue venerea infecti, cum Fernelius usum suaderet suæ opiatæ antivenereæ, cui plurimum, seu ut verius dicam, cui nimium fidebat, contra tenuit inunctionem mercurialem præferendam esse in hæc verba erumpens, *Inungatur*, seu ut ipsissimam vocem usurpem, *Frottotur, ut vilissimus quisque e suo regno, cum nec dispari modo contaminatus fuerit, quam tamen loquendi libertatem aiunt a Rege haud iniquo animo latam fuisse.*

(c) *Ad calcem tractat. De dolore colico Pictonico, pag. 234.*
(d) *Lettres de Gui Patin. Tom. I. Let. 133. 1541.*

REMACLUS FUCHSIUS, Limburgus, Frater (e) Gilberti Philaretii, Canonici suis ad sanctum Paulum Leodici, ubi decessit anno 1587. 12. Calendas Januarii.

In- Belgica.

(e) *Valerius Andreas, in Biblioth. Belgica.*

Inter cætera Opera scripsit *Methodum curandi Morbi Hispanici sive Gallici per lignum Guaiaci decoctum. Parisiis, apud VVeebel. 1541. in 8.*

1542. ANDREAS VESALIUS Bruxellensis. Sic dictus a Vvesalia Clivæ civitate, unde familia Andreæ oriunda fuit: Natus est Bruxellis anno 1514. patremque habuit cognominem qui Caroli V. Imperatoris medicamentarius fuit.

(a) Valerius Andreas, in Biblioth. Belgica. Juvenis (a) Lutetia Præceptorem habuit Jacobum Sylvium, eruditissimum & celeberrimum artis Medicæ Professore in Collegio Franciæ Regio. Ab illo institutus, ingenio duce & labore ad summa mox pervenit.

(b) Joannes Jac. Mangetus, in Biblioth. Medica. Stipendia (b) meruit tanquam Chirurgus & Medicus in Bello a Carolo V. anno 1535. inchoato. Anno 1537. Patavii publicus fuit Anatomies Professor, quo munere præclare per septem fere annorum decursum functus est.

Meruit denuo in bello Geldrico, quod Imperator confecit anno 1543. abiensque Cæsar jussit ut maneret aliquandiu Noviomagi ad curandam valetudinem Bernardi Navagerii Venetorum Legati, qui difficili ac gravi morbo confictabatur, unde una cum ægrotante ad sanitatem jam perducto Ratisbonam se contulit.

Mox adscitus inter medicos aulicos Imperatoris Caroli V. & ejus filii Philippi II. Hispaniarum Regis, egit reliquum vitæ tempus in aula ad annum usque 1564. quo subito conversa est magni viri fortuna.

(c) Ibi demum. Hispanum (c) curabat nobilem, nec morbi causam satis intelligere se dolens, petiit ab amicis defuncti corpus aperire, ut morbi rationem & mortis scrutaretur causam. Quo concealso visum est cor in aperto jam pectore adhuc palpitans, cognati accusant homicidii apud Judices & impietatis ad Tribunal Inquisitionis Hispanicæ postremo datus est Regi, totique simul deprecanti Aulæ, eo omine ut peregrinatione religionis ergo suscepta Hierosolymas expiaret crimen. Ivit ergo Venetias Vesalius exul anno 1564. indeque in Cyprum, & a Cypro Hierosolymas navigavit, unde a Senatu Veneto largissimi stipendii oblatione vocatus, Patavium, ut mortui pridem Fallopii in Anatomicis locum suppleret. Rediit ergo sed adversis ventis ejectus in Zacynthus Insulam, in loco solitario inops, omniique carens subsidio miserabiliter vitam finivit, mense Octobri anno eodem, vix natus ipse 50. annis, unde liquet errare (d) Valerium Andreæ, dum ait Vesalium anno ætatis 58. mortuum fuisse.

Scripserat anno 1542. *Epistolam De Radice China ad Joachimum Roelants, in qua inserta sunt & De Sparta-parilla sub finem nonnulla.* Ratisbona datam anno 1543. & in lucem editam a Francisco Vesalio fratre suo, Venetiis 1543. in 8.

Ibi narrat Vesalius quali successu radix Chinæ olim Venetiis adhibita fuerit, cum ipse sub Præceptoribus & præcipuis illis artem exercentibus ægros in-

inviseretur; quali finitque successu in reliqua Italia, & in Burgundia adhibitam fuisse audiverit.

Deinde ait Carolum V. cum articularis sui morbi & moti habitus ratione Gnaiaei decoctio usus esset, suo potius Marte quam consilio D. Cornelii, (cujus tunc potissimum opera a D. Cavalii discessu utebatur) China decoctum assumpsisse quindecim tantum diebus, & in varia vitæ ratione & mutato subinde propinandi modo, idque potissimum suo arbitratu. Inde tamen paulo melius habuisse, unde brevi tantum nomen remedio conciliatum est, ut vicini Germania Medici, & qui Comitibus in suorum Principum familia intererant, sedulo ac diligenter de ejus decocti apparatu percunctarentur, neque prius molesti esse desinere, aut exigendi orandique finem ponerent, quam formulam nacti fuissent, qua medicos Casareos decoctum illud offerre sibi persuadebant. Inde arrepta occasione Vesalius paucis ad amicum Medicum describit Historiam Chinæ, decocti præparandi modum & usum, eumque monet China decoctum bibentes turgentie summa tentari, quæ virtus Aphrodisiaca hujusce radicis certissimis experimentis explorata est. Ad Epistolæ calcem nonnulla adjicit de sparta-parilla.

BARTHOLOMÆVS MONTAGNANA Junior, (a) Patavinus, 1542, Philosophus ac Medicus, scripsit Consilium Medicum ad Petrum Zenum (a) Ipse in consilio urbem Patavinam vocat suam. Venetum, pro Illustrissimo & Reverendissimo Episcopo & Ungariæ Prorege Morbo Gallico laborant, quod primum editum est in secundo Tomo Collectionis Venetæ Aloysii Luisini, 1567.

1. Ibi docet Auctor circa Theoriam, 1. Morbum Gallicum Hippocrati, Galeno, Avicenna & aliis Medicis antiquis incognitum fuisse.

2. Aliquas ægitudines esse, quæ non accidunt nisi longis temporum interval-
lis, & quæ forte sequuntur stellarum conjunctiones, quæ non sunt nisi raro.

3. Sic Galenum, ut refert Avicenna 3. quarti, Cap. de Venâ Medene, nunquam vidisse illam ægitudinem, (scilicet venam Medene) neque vidisse febrem septenam aut novenam.

4. Sic eundem non vidisse lapidem egredientem ab intestinis, (ex kystide fellea) sicut ipse recitat in Libro de Interioribus; & tamen Gentilem vidisse eum bis.

5. Sic Gentilem vidisse quoque lapidem a stomacho egressum per vomitum post vehementes stomachi dolores, quod a prædecessoribus nostris non fuit visum.

6. Proinde pariter non videri inconueniens, quod Morbus Gallicus appareat temporibus nostris, qui tamen temporibus Hippocratis, Galeni & Principis non fuit.

7. Inde tamen non sequi Morbum Gallicum numquam fuisse, quin imo necesse ipsum alias fuisse, si mundus est æternus, ut voluit Aristoteles 8. Phisicorum & 1. Cæli. Eadem vero revolutiones & stellarum conjunctiones, & causæ ipsarum productivæ infinitas fuere . . . Si vero mundus est factus
de no-

de novo, (ut est rei veritas) credendum esse etiam talem morbum alias fuisse; non tamen tempore illustrium Auctorum prædiorum, quorum Opera temporibus nostris vigent.

II. Circa Therapeiam vero jubet 1. Accuratum esse regimen sex rerum non naturalium quas singulatim persequitur. Inter cætera vero præscribit ut Coitus sit temperatus & ineundus celebrata jam prima & secunda digestionem, cum medietur dispositio in digestionem tertiam. Egregium sane consilium, quod daretur Episcopo, & si vera conjicio, Episcopo tunc 60. annos jam nato!

2. Deinde multis proponit curationem methodicam ex alterantibus; temperantibus, & purgantibus variis, sed ne verbum quidem addit de Guaiaco, Sarsaparilla, China, Mercurio &c. quæ sane Auctorem incipienti luis venereæ cõtaneum sapere viderentur, nisi obstarent quæ nunc allaturi sumus.

Conjectura est, neque sane inanis, consilium hocce, de quo agitur scriptum fuisse in Gratiam Georgi Martinusii quippe nullum alium novi, qui ab ingressu luis venereæ & Episcopus & Hungariæ Prorex simul fuerit. Martinusius vero, qui jam ab aliquot annis Episcopus Varadiensis erat, Hungariæ Prorex non fuit, nisi post mortem Joannis Zapoliæ Regis Hungariæ & Transylvaniæ Principis, ac Postquam Solimanus Turcarum Imperator Isabellæ Reginæ dicti Joannis viduæ suppetias tulit adversus Ferdinandum Caroli V. Fratrem, quæ in annum 1541. incidunt. Proinde, si vera conjicio, consequens est consilium Medicum, de quo quæstio est, ante annum 1541. scriptum non fuisse.

Hinc ergo sequitur 1. Scriptum non esse a (a) Bartholomæo Montagnana seniore sive I. qui in Academia Patavina claruit circa annum 1440. cum ille vitam non produxerit ultra annum 1460.

2. Neque pariter scriptum fuisse a (b) Bartholomæo Montagnana altero, qui in eodem Gymnasio Medicinam professus est, cum ille fato functus sit anno 1525.

3. Sed fuisse scriptum a Bartholomæo Montagnana III. ab omnibus Bibliographis ignorato, qui Filius fuerit II. & nepos I. quem ideo quoque Auctor hujus consilii (c) avum suum Paternum vocat non semel.

4. Proinde Bartholomæum Montagnanam II. quem Auctor [d] Histriæ Gymnasii Patavini credit nepotem fuisse Bartholomæi Montagnanæ I. ex fratre vel ex filio, filium ejusdem fuisse.

(d) Loco laudato. LEONHARDUS FUCHSIUS, Rhætus, natus Vvemmingæ in Rhætia, anno 1501. ad Doctoratus gradum promotus est Ingolstadii anno 1521. ubi paulopost, nempe anno 1526. Professoris Medici munere functus est. Inde lectus est Archiater Marchionis Brandenburgici Onoltzbachiensis anno 1528. Onoltzbachium concessit. Tandem Tubingam vocatus est anno

(a) Apud omnes Bibliographos.

(b) In Historia Gymnasii Patav. Tom. 1.

(c) In fine consilii.

1542.

anno 1535. ubi Medicinam publice docuit ad annum 1566. qui vitæ ultimus fuit.

Extat in Collectione Luissinina *Caput unum de Morbo Gallico*, excerptum ex Appendice ad Librum V. *Tractatus de curandi ratione, seu de sanandis totius humani corporis, ejusdemque partium, tam internis quam externis malis*, qui excusum fuit Basileæ in fol. anno 1542.

Fuchsius docet ibi Morbum Gallicum novum esse, omnique ævo priore incognitum; Si recens sit, levioribus sæpe tolli remediis, quæ paucis proponit: Quod si vero is morbus jam longo tempore corpus investavit, ad ligni usum quod barbara gens, quæ nobis illud transmittit, vernacula Lingua Guaiacum appellat, confugendum esse, cujus administrationem brevissime explicat.

MICHAEL ANGELUS BLONDUS, Italus, militavit (a) ut ipse ait, plerisque annis sub disciplina Augustini Niphi, hoc est eo Præceptore & Magistro diu usus est.

Scriptit tractatum de Origine Morbi Gallici, deque ligni Indici ancipiti proprietate, qui anno 1542. in 8. Venetiis excusus fuit a Joanne Antonio & Petro de Nicolinis ad calcem Tractatus de Partibus istius scilicet citissime sanandis, & Medicamento aquæ nuper invento. Prostat uterque Tractatus in Collectione Tigurina Scriptorum optimorum de Chirurgia Tiguri a Conrado Gesnero editorum anno 1555. in fol.

Liber ille de origine morbi Gallici brevis est, nullo ordine digestus, & ita obscure scriptus, ut vix liceat interdum Auctoris sensum assequi.

I. Ait Morbum Gallicum antiquitus notum fuisse, quandoquidem Hippocrates & Galenus scripserunt de omni specie morborum, quibus humanum corpus subicitur Antiquum ergo symptoma hoc; quod omnes etiam asserunt, qui de Lepra, Serpigne, Herpete, & similibus scripserunt, ut est Egineta, aus etiam Cornelius [Celsus] qui de Elephantia Non dicamus, inquit, Morbum ab Indis transfuisse ad nos, quoniam fatuitatem profitebimur dicentes.

Confitetur se usum fuisse iuribus Indici Ligni (Guaiaci) in Syphyliticis . . . qui omnes præ tenui victu & in substantiali potu tenuissimi & exangues deveniebant; sed cum arbitrabatur liberos esse tamen priusquam luna complebat orbem suum, plethoricus comperiebat in graviorem recidisse morbum.

III. Proponit ad curationem 1. Regimen vitæ in sex rebus non-naturalibus. 2. Remedia quædam ex alterantibus vulgaribus, quæ mutuatur, ut ipse refert, a Joanne Almenar, Doctore Hispano, vel ab Augustino Nipho. 3. Pilulas mercuriales quasdam ex Mercurio crudo, molcho, rheo & scammonio confectas. Dicit id remedium genus fuisse præstans medicamen Barbarorum, quo ipse (b) Teucrorum Rex frequenter usus sit. Quem autem Rege illo Teucrorum intelligat vix satis capio, nisi forsan eo nomine designet Chairadinum Barbarossam Regem Algerii, de quo supra Lib. 2. cap. 7.

L I

qui quod

1542.
(a) In Libro de origine Morbi Gallici,
(b) Sic Henricus Wolter in Chronica Archiepiscopi Bremensis circa annum 1480. scripto,

extat in
Tom. II.
Henrici
Membonii
ait Turcos
in Latino
dici Ten-
croz.
(a) Bi-
blioth.
Medic. in
voce Augu-
stinus
Niphus.

qui si non iisdem, at certe aut valde disparibus pilulis utebatur. 4. *Præ-
dium*, ut ille loquitur, quoddam familiare, seu caeleste ex Pilulis de Hermo-
Membonii dactylis majoribus cum parva poriruncula præcipitati Mercurii rubri, cujus
peculiarem, quemdam processum proponit. 3. Denique ad discutiendos
dolores artuum, delendos tumores, exsiccandas pustulas cutaneas &c.
innumera profert unguentorum & ceratorum genera, inter quæ plurima
Mercurium admittunt, sed nullo modo explicat, nec qua cautione adhi-
beri illa debeant, nec quid ab illorum usu metuendum sit.

Dicitur Blondus a Joanne Georgio Schenckio (a) in suum tractatum
pleraque remedia transtulisse ex Tractatu Augustini Niphi in eodem morbo. An
ea vera sint mihi non liquet, cui nondum contigit Tractatum Augustini
Niphi usurpare. Sed certe si vera fuerint, in hoc culpandus videtur Blon-
dus, cui cum posset Auctores alios melioris notæ describere, placuerit
quisquilias istiusmodi suas furto facere.

ALOYSIUS LOBERA, Abulani, hoc est ex civitate Abula, quæ
nunc Avila in vetere Castilia, Medicus fuit Caroli V. Imperatoris &
Regis Hispaniarum: Scripsit Hispanice circa annum 1544. Librum *De
quatuor agritudinibus aulicis*, inter quas recenset Morbum Gallicum, ne-

(b) Deque sane mirum, cum (b) teste Caspate Torella morbus ille in ulteriori
dolo in
pudenda-
ria.
(c) Cap. 1.

Hæc est Libri illius inscriptio:

*Libro de las quatro enfermedades cortesanas, que son Catbarro, Gotta,
mal de Piedra, y mal de Buas, por el Doctor Luys Lobera de Avi-
la en Toledo, 1544. quem italicum fecit, ediditque Venetiis
Petrus Laurus, anno 1558. in 8.*

Hinc excerptus est Tractatus *De Morbo Gallico* in Collectione Aloysii
Luisini extans, qui capita septemdecim continet, ubi Auctor affirmat (c)
Morbum ignotum fuisse veteribus, cum nulla eius indicia attulerint. Inde vero
explicat morbi curationem triplicem, potu decocti ligni Guaiacani, usu
unctionum mercurialium, & ope suffumigiorum; sed unicuique censet
præmittendam esse præparationem cum purgantibus, alterantibus, tem-
perantibus. Existimat potum decocti Guaiacani cæteris præstare; usum
vero suffumigiorum plerumque gravioris esse periculi. Sub finem pauca
addit de usu radicum Chinæ.

Id autem inprimis notatu dignum videtur quod Lobera velit unctiones aliquando per intervalla fieri. Si *agritudo*, inquit, *ingens fuerit*, *agrote imbecillo existente*, *unctionem alternis diebus fieri probaverim*, *interposita etiam quiete absque unctione per biduum*, *interim alimenta optima offerendo*.

1548. HIERONYMUS CARDANUS, Mediolanensis, natus anno 1501.
Bononiæ Medicinam docuit. Fertur plura scripsisse quam legisse, plura-
que

que docuisse quam didicisse. Dicitur etiam statuisse millesimo quoque anno vix unum perfectum & excellentem Medicum dari, & se eorum septimum fecisse. Hæc & alia non pauca, quæ ipse de se refert in Opusculo quod *De vita sua* inscripsit, probant de illo saltem verum esse, quod a Seneca dici meminimus, *nullum magnum ingenium fuisse sine mixtura dementiæ*. Obiit Romæ anno 1576. ætatis 75. eo ipso anno & die, quibus se moriturum prædixerat. Sed non desunt (a) qui asserant, ne fallâ vaticinatus videretur, mortem sibi inedia accersivisse.

Omnia illius Opera in 10. Tomos digesta sunt studio Caroli Sponii, & Lugduni edita in fol. anno 1663.

Jam olim, anno scilicet 1548. Lugduni editus fuerat in 4. Libellus ejusdem *De Cyna radice seu de Decoctionis*, qui prostat in Collectione Veneta Aloysii Luifini.

Describit ibi Cardanus modum administrandi decocti radices Cynæ, quo quidem Morbum Gallicum curari posse ait, sed *nihilominus non adeo bujus radicis decocto favet, ut illud ligni sancti aut corticis decocto conferat*.

Porro addit in fine Libelli, *vim medicamenti bujus, si ad lignum sanctum conferre libeat, sic expedito. Advebitur ad nos hæc radix post biennium raro usus ante quinquennium: Unciæ tres in quindecim libras aquæ, ligni sancti uncia quindecim; proportio effectus ferme tripla, proportio ergo quinquedupla; cui si adjiciatur mora ratio, erit trigintupla. At lignum sanctum inter præcipua medicamenta habetur, & hydrargyrio ferme par, unde haud recte dictum videtur vulgare & inefficax fore medicamentum*.

JONNES RODRIGUEZ DE CASTELLO-BIANCO, alias, AMATUS, Lusitanus, natus in oppido Lusitanicæ, quod *Castel-Branco* dicitur in Provincia Beirensi, Medicinæ studuit Salmanticæ, ac eodem tempore Chirurgiam in Nosocomiis ejusdem urbis exercuit. Inde per celeberrimas Galliarum, Belgii & Italici Academiæ peregrinatus Ferraricæ Medicinam docuit, Anconæ diu substitit, sed sibi timens quod ad Judaicam superstitionem relapsus esset, hinc Pisaurum, & Pisauo Thesalonicam in Græcia confugit, ubi celebris est Hebræorum Synagoga, cui adhæsit. A temporæ ejuratæ religionis Christianæ, nomine pristino renuntiato, Amatam Lusitanum dici maluit.

Curationum Medicinalium Centuriæ septem, varia multiplicique rerum cognitione refertæ. Venetiis 1557. in 8.

Scorsim ante editæ fuerant duæ primæ Centuriæ: Altera cui *commentatio De introitu ad Aegrotos, & Criseon tractatio præmissa est*, Florentiæ anno 1551. in 8. Altera, in qua *Methodus & Canon propinandi Decoctionum radices Cynæ locupletius describitur*. Venetiis. 1552. in 12.

Ex Centuria prima depromptæ sunt Epistolæ geminæ Collectioni Venetæ insertæ, quarum priore scribit gallicosum virum quinque in-

(a) Thuanus, *Histor. sui tempor. Lib. 62.*

unctionibus mercurialibus: Posteriore vero matronam gallica lue laborantem decocto Guaiaci quinquaginta dies exhibitio; nutricem & nutricis maritum unguentis mercurialibus a se perfecte sanatos fuisse.

Ex alterantia Centuria excerpta est Epistola tertia, de methodo propinandi Decoctum radices Cynarum, scripta ad Vincentium de Nobilibus qui Julii III. tunc Pontificis Maximi nepos erat ex sorore.

IOANNES-BAPTISTAMONTANUS, Veronensis, natus anno (a) Petr. 1498. Medicinam exercuit [a] Veronæ, Brixie, Neapoli, [b] Romæ Castellan & Patavii; & in hac ultima urbe etiam publice docuit ab anno 1540. annos 11. Lenta tunc confectus interiit anno 1551. ætatis suæ 63.

(b) Histor. Gymnas. Præter alia Opera numero permulta scripsit quæ ad rem præsentem faciunt. 1. *De Morbo Gallico Tractatum*. 2. *Consultationes Medicas do Patavini. variorum morborum Curationibus*, ubi prostant Epistolæ ad diversos datæ, sive consilia sex de Morbo Gallico.

(c) In Constans Auctoris doctrina est I. (c) Morbum Gallicum novum esse, ab Hispanis contractum contubernio cum barbaris mulieribus in Insula Sancti Dominici; & ab iisdem in Europam traductum.

II. Morbum præparato prius corpore curandum esse usu ligni sancti, cujus decoquendi & exhibendi methodum persequitur, damnatque eos qui in vino decoquunt.

III. Improbatur argentum vivum tanquam pessimum venenum & exterminandum a toto usu Medicinæ, quod licet videatur curare, non tamen curat sive per linimentum, sive per suffumigium adhibeatur.

IV. Statuit Gallicam hanc luem ex eo corpore, in quo semel egis radices, penitus tolli non posse, quamquam ita mitigari atque extinguere posse non neget, ut per longum temporis intervallum nullam molestiam faceat.

1550. BARTHOLOMÆUS MAGGIUS, Bononiensis, natus anno 1477. (d) fuit Archiatrus Julii III. summi Pontificis qui electus est anno 1550. Obiit in urbe patria anno 1552. ætatis 75.

Consilium Medicum in Capita 6. distinctum scripsit anno 1550. pro Galeotto Pico II. Comite Mirandulæ & Concordiæ Domino pro quo Montanus Consilium quoque scripserat. Laborabat ille Morbo Gallico jam ab annis novem, hoc est ab anno (e) 1541. contracto, qui semel

(e) In visus debellari usu decocti Guaiaci, ita recruderat, ut (f) æger laboraret tunc ulcere in ano skirrhone & Rbadagiofo, duritie hepatis cum ictero, casu pilorum barbae, cum maxima totius corporis demacratione & decoloratione faciei tendente ad fuscum (g) ulcusculis narium; demum cutis asperitate & maculis rubeis quæ assimilabantur Effare Arabum.

(b) Cap. 4. Refert Maggii (b) Galeottum quater assumpsisse Guaiaci ligni decoctum, & nunquam in totum potuisse liberari, quod fortasse fuit vel quia denuo infectus fueris, quod facile evenire potuit, cum alias mulieres & Venetis & Gal-

Gallie pertrahaverit..... aut quoniam nondum tota illa malignitas per medicamenta penitus discussa fuerit.

Fatetur Maggiius duo esse remedia alexipharmaca aut antidota in Morbo Gallico, lignum Guaiacum & argentum vivum, sed addit de argento vivo pro illustrissimi Domini curatione non esse loquendum, neque tamen rationem ullam affert hujus assumpti. Inde tantum concludit, quod quamvis ager decocta de ligno sepius assumpserit, & tali morbo non convalescerit, nihilominus a tali antidoto non sit desistendum, quia tutius est ceteris aliis in hoc morbo. Verum ut intendatur Guaiaci efficacia præscribit ut præmittatur vel conjungatur usus variorum purgantium & alterantium, in quibus proponendis multus est, sed quæ plane inefficacia sunt.

JOANNES BENEDICTUS, Germanus, scripsit Libellum de Morbo Gallico, qui Capita quatuor comprehendit, ubi loquendo de Rben Pontico, mentionem facit (a) de Rben Lithuanico, sive de Radice tempore invictissimi Sigismundi Regis Poloniæ in montibus Lithuania reperta, quæ solvit & evacuat citra molestiam, cholera & pblegma. Unde liquet hunc Auctorem scripsisse post annum 1548. cum illo tantum anno Sigismundus I. Poloniæ Rex interierit, de quo ea debent intelligi.

Auctor ille Medicinam diu fecit, ut (b) ipse ait, Romæ, Venetiis (b) Cap. Bononiæ & in aliis multis Italiæ urbibus.

In Tractatu de quo agitur, I. Consentit cum cæteris de natura & origine morbi, quem novum & Antiquis incognitum fuisse ait, & de modis morbi contrahendi contagione, nempe (c) coitu, tactu, osculis, lactis assumptione in pueris, conservatione cum insectis.

II. Ad curationem proponit (d) septem intentiones. 1. Lenitionem ventris. 2. Minorationem materie 3. Digestionem. 4. Evacuationem. 5. Alterationem membrorum. 6. Confortationem eorumdem. 7. Correctionem accidentium.

III. Laudat ad digestionem & evacuationem materiæ usum linimentorum mercurialium, quem dicit inventionem novam esse (e) „ Clamant bunt forsam, inquit, periisse pudorem, si dixero quod Morbus Gallicus (e) Ibidem „ habet canonice curari unctionibus, præmissis universalibus digestivis & „ evacuativis prius: Clament dummodo habeam pro me auctoritates & „ rationes.... Et si interdum malus effectus præfatas unctiones mercuriales sequatur, hoc fit errore Empiricorum, & præsertim Alchimistarum.

IV. Damnat (f) Empiricorum suffimigia, in quibus ponitur cinabrium tanquam præsentissima venena, ex ejus fumo vidit periisse quemdam nobilissimum Picctorem Bononiæ, & mulierem devenisse ad apoplexiam.

V. Non improbat sudatoria aut stufas, neque esum serpentum coctorum in olla; imo neque anguillarum, sed quod nimis credulum animum sapit, ait se syrupo de pomis composito Mesuz (g) rem mirabiliorem non vidisse; libe-

vas enim, inquit, a pustulis & scabie, & a doloribus in paucis; & ideo in eo, quia non me fallit, plurimum confido, & multos perfecta non modo Romæ verum etiam Venetiis curavi etiam a gummis absque unctionibus.

- (a) *Ibide.* VI. Cæterum ait (a) non esse ludendum cum pustulis virgæ post coitum; quia facile pervenitur ad virgæ & testium totalem amissionem; quemadmodum accidit Venetiis cuidam Impressori dicto Hærezob. Nec, pergit ille, verecundia est habenda, cum boni Medici sint ut boni Confessores, qui non revelant oculis eis commissæ; Et ideo max. peracto coitu optime absterges pudibunda cum tunc amissa aut panno lineo, deinde lava cum vino albo aut cum aqua calida, non autem cum frigida, quia compingeres materiam in loco.

1551.

ANTONIUS MUSA BRASSAVOLUS, Ferrariensis. Hactenus Schedulas, Epistolas, Consilia Medica, vel brevissimas Dissertationes de Morbo Galileo vidimus. Primus Tractatus, qui justæ magnitudinis fuerit ille est quem Antonius Musa Brassavolus conscripsit anno 1551. ut ipse testatur. Constat tamen totum excerptum esse ex Opere ampliore, scripto De examine omnium Loob, hoc est Linctuum Suffus id est pulverum, aquarum, oleorum & decoctionum, quorum apud Ferrarienses Pharmacopolas usus, est, quod Venetiis typis excusum fuit in 8. anno 1553. apud Iuntas.

Ibi Lib. 6 in quo de decoctis a proposito digressus de Morbo Gallico multa diserit egregie.

I. De Morbi natura, origine, novitate affert eadem quæ jam sæpius in præcedentibus retulimus.

II. Distinguit 234. species diversas Morbi Gallici pro diverso diversorum symptomatum plurium pauciorumve concursu, sed hæc ostentationis ergo magis quam utilitatis.

III. Probat cum Leonicensi, quem laudat, Morbum Gallicum alium esse & Ab Elephantiasi, Lepra, Lichenibus Pruna, Igne persico & Asaphati.

IV. In Curando morbo Gallico, qui recens est, utitur tantum alterantibus & evacuantibus, sed ad affectiones singulas locales, quæ in pudendis eveniunt, ulcuscula cancrrosa, pustulas, gonorrhœam, phimo-sin, bubonem & præscribit usum topicorum.

V. Si vero morbus inveteratus sit, post debitam præparationem quatuor proponit remediorum genera, Suffumigium, Inunctionem, Decoctum ligni Indici, & quartum nuper additum, quod est Decoctum radices Chinæ.

VI. Suffumigium semel tantum in die per octo vel ad summum per decem dies exercendum esse dicit: Et „ Ne dentes, inquit doleant, vel ne tam cito singulo mane scrupulus unus pilularum Alexandrini exhibendus est, „ quibus alvus solvatur. Ager suffumigandus est exerto è conopeo capite, „ alioquin periculosissimum est. Hoc remedio plerumque gingivæ ulcerantur, lingua & fauces; & tum gargarismatis uti oportet. Porro notat ille „ se rarissimos vidisse qui fuerint per suffumigium ab affectu Gallico peni-

tus

zuz obſoluiſi, licet aliqui plus temporis intermiſerint, alii minus a recidivatione; ſed pro majori parte in recidivam incidere. „

VII. Utramque methodum utendi Mercurio vel in ceratis vel in linimentis, deſcribit. Cerata mutanda cenſet *tertio quoque die per novem dies*; linimenta vero admovenda *ſemel quo libet die per dies novem vel decem*; ſed ſingulo mane ſcrapulum unum pilularum Alexandri exhibendum eſſe, ne gingivæ, palatum & fauces exculcentur: Cæterum multum non probus ejusmodi cerata quoniam fallacia ſunt; nam caſi unum quandoque in ſanitatē reſtituant, decem erunt qui ſanitati minime reſtituemur.

VIII. Multis explicat & modos varios componendi linimenta mercurialia, & cautiones ſecundum quas debent illini; ac demum concludit ſe rariffimos vidiffe qui per unctionem non ſint ſanitati reſtituti, vel pro parte ſaltem ab agritudine abſoluti, quamvis nonnulli ſint qui inunctiones reprobant.

IX. Multa proſert de electione & præparatione ligni Indici & adminiſtratione ejuldem decocti per dies fere quadraginta exhibendi, quo tempore tenuiſſimo viſtu eger nutriendus eſt, ut jam alibi docuimus. Porro aſſerit Braſſavolus inunctionem & decocti Guaiaci potionem illa eſſe, quæ poſſimum & vere in ſanitatē deducunt.

In Tractatu altero, qui *De radici China uſu* inferibitur, Braſſavolus proſert modum utendi decocto radicis Chinæ, quam in Italiam non ita diu advectum eſſe ait.

Adeſt & Tractatus tertius in quo Braſſavolus reſpondet *Queſtionibus Alexandri Fontanæ, Medici Mutinenſis, de Morbo Gallico & Ligno Indico*, ſed in quo vix quidquam eſt quod ſit notatum.

Joſephus Scaliger de Braſſavolo peſſime ſentiebat, eum (a) ſcriberet ad Franciſcum Vertunianum 4. Nonas Februarii anno 1575. jam dudum ſibi perſuaſiſſe & ex Braſſavolæ Scriptis comperiſſe, *nihil aliud eum virum fore, fuiſſe quam Cymbalum ineptæ Medicorum Plebis*. In quo videtur quidem Scaliger iniquior eſſe, ſed unde liquet Braſſavalum jam tum fato functum fuiſſe. (a) In Epistolis ad dñer 1551. (b) Mercklinus in Linden. renovato. (c) Ipſe in ſine Operis De Morbo Gallico. (d) Cap. 10. (e) Apud Bebelium, anno 1536.

BENEDICTUS VICTORIUS, Faventinus, nepos (b) Leonelli Victorii Bononiæ Medicorum principis, fuit ipſe Philoſophus & Medicus ac Theoricæ Medicinæ Profeſſor Bononiæ.

Scriptit (c) anno ætatis ſeptuageſimo *Librum de Morbo Gallico & ejus cura* in 10. Capita diſtributum, qui Florentinæ, editus eſt anno 1531. apud Laurent. Torrentium. Negat (d) autem *Tractatulum quendam alium De Gallico Morbo Baſileæ* (e) impreſſum ex ſua officina erutum eſſe; atque errore ſibi adſcriptum fuiſſe, niſi forte fortuna id contigerit, ut per modum empiricum præſidia quædam morbo convenientia Gallico, quibusdam ſuis olim diſcipulis, qui ad hoc illum impulerunt, condonavertit.

(a)Cap.1. Censet Auctor in illo Opere I. Morbum (a) *epidemicalem* esse; (b) *causam* illius *procatartiam* esse contagionem concubitu vel solo afflatu conceptam: Huic addi posse alteram, nempe *cali Statum*, unde nemo *surpari* debet, ubi quispiam *asseverat* hominem Gallico Morbo aliquando corripi posse, nulla cum *infecta* muliere *habita* coitione, nulloque commercio. Sane, pergit ille, (c) *occurrerunt* mihi quandoque *honestæ & sanctæ* Moniales, fortissimis *Clausuris* *observata*, sub ardua quippe & inviolabili custodia, quæ ex præsentis *cali* statu atque ex statu *humorum* in eis *putrescentium*, cum statu *imbecillium membrorum*, malo *fata*, in Gallicum *cedere* Morbum.

(d)Cap.3. II. Ait accidentia Morbi Gallici præcipua esse [d] 1. Dolorem *capitis* 2. *Tubercula gummosa* in capite & *membranis ossa regentibus*. 3. *Ulcera* per corporis *habitum*. 4. *Fædum ulcus* in pene, aut *profluvium* ex eo *superfluitatis putrescentis* (Gonorrhæam virulentam) aut *tumorum & inflammationem* in *inguinibus* (Bubonem) 5. *Alopeciam*, quam ait ille suis temporibus contigisse. 6. *Tubercula callosa plantis pedum* *contingentia*. 7. *Quasdam corrosiones & scissuras* in *palmis manuum* *ortas*.

(e)Cap.4. III. Curationem obtinendam esse [e] *primo per vietus rationem*: *postea per medicinarum oblationem*; *deinceps per manuum opera*, quæ *chirurgia* perficit. Prima duo Capita ad *therapeiam methodicam* pertinent, de qua jam *suse* Ad tertium duo *revocantur* *remediorum genera*, *inunctiones mercuriales & suffitus ex cinnabari*. Utrumque parum quidem tutum Auctori

(f)Cap.7. videtur. „ Sed (f) *etsi*, *inquit*, *uterque* hic *modus curæ* Gallici Morbi „ *fallax* atque *periculosus* sit, *minoris* tamen *periculi* is est, qui *unguentis* „ *to ex Mercurio confecto* *molitur*, eo qui per *suffumigia* *exercetur*. „

(g)Cap.8. IV. (g) *Cæteris omnibus Gallici Morbi curativis intentionibus* *expeditior* esse atque *securiorem* & *minus periculosam* illam, quæ *potu decocti ligni Guaiaci* *efficitur*, quapropter eandem pluribus describit.

(h)Cap.9. V. Medicum (h) *nullo* *criminari* posse *errore*, ubi ad *thermas calidas*, non quippe *valentis caliditatis*, *gallica corpora* *conduces*, & in *hoc indubitatum* ipse facit *fidem* se *examinata* *agrotantis temperie*, *pariterque* & *thermarum Italiae*, ad *thermas* *moderate calidas gallica misisse corpora* *thermas autem multum excedentis caliditatis* *prohibuisse*.

Exstat præterea *Consilium Medicum* Auctoris ejusdem pro Reverendo D. Bartholomæo, *Vicentino*, in quo ad Morbum Galicum proponit tantum *dietam*, & *usum medicinarum alterantium & purgantium*. Ubi vero, subdit ille, *forte fortuna* *his* non *sanesceret* *Reverentia sua*, *consulo* ut non *submittatur inunctioni* ex *Mercurio* *propter nocumenta quæ suæ Dominationi facile contingere possent*; *eam autem* *devenire* ad *potum decoctionis aquæ ligni Guaiacani* *cum convenienti ordine & rectis modis* *dieta* non *possum* *vinuperare*, *sed summe laudare* Ubi vero *hæc* non in *totum* *patientem* *sana-* *rent*, *consulo* ut *fiant* *duo vel unum saltem cauterium* in *crutibus*.

Hoc

Hoc autem Consilium excerptum est ex *medicinalibus* Auctoris *Consiliis*, quæ primum excusa sunt Venetiis apud Vincentium Valgrisi-
anno 1551. Eodem quoque anno primum typis editus fuit Liber *De Morbo Gallico & cura ejus*, de quo supra, unde colligere est Benedictum Victorium, qui tum septuagenarius erat, natum esse circa annum 1481.

THEODERICUS DE HERY, Parisinus, studuit Chirurgiæ Lutetiæ, ubi gloriatur se Professoribus (a) usum esse Jacobo Hollerio & Antonio Soillard, celebribus Medicis Facultatis Parisiensis. Inde castra [b] secutus in Italiam se contulit, ubi regnante Francisco I. diu & ancipiti belli fortuna a Gallis & Hispanis dimicatum est. Inde Romæ, quo digressus erat, curandis Syphiliticis aliquandiu ministravit [c] in Nolocomio Sancti Jacobi Incurabilem, ad quod ægrotantium lue venerea infectorum confluxus maximus olim fuit, ut (d) & nunc. Demum in patriam redux curando eidem morbo sedulo vacavit, neque sine successu, cum inde & famam & opes non mediocres sibi comparaverit.

Atiunt (e) illum, cum in Ecclesia Sancti Dionysii ad pedes statuæ Caroli VIII. provolutus oranti similis esset, a Monachorum quodam monitum se non adstare ad Divi statuam, respondisse id a se non necesse, sed velle gratum animum testari erga Regem illum, a quo lues venerea in Gallias primum infecta fuerat, unde haud pœnitenda fortunæ accessio sibi fuisset; Sed eadem fabula jam ante (f) de alio quodam Chirurgo nomine Magistro Joanne narrata fuerat, nec tamen, ut videtur, meliore fide, qua de re vide (g) *Menagiana* a D. de la Monnoie aucta.

Dicitur Theodericus senex (h) obiisse anno 1599. sed falso, cum ex Præfatione præmissa *Lib. 19. Operum Ambrosii Paræi, Edition. 4.* certum sit Theodericum de Hery fato functum fuisse longe ante annum 1585.

Edidit Lutetiæ anno 1552. Librum de Lue venerea gallice scriptum, cui titulum sequentem fecit:

La Methode curatoire de la Maladie venerienne, vulgairement appellee

Grosse Vairolle, & de la Diversite de ses symptomes. in 12.

In quo cum tanta judicii laude collegit quæcumque ab Italis Medicis de hoc argumento vel prudenter dicta vel sapienter inventa erant hac ætate, ut Ambrosius Paræus Theoderico fere suppar, & Chirurgicis nemini secundus, non modo Auctoris illius doctrinam & methodum sequi, sed Tractatum fere totum exscribere non dubitaverit, quod ipse ingenue agnoscit in præfatione *Libro 19. suorum operum præfixa*.

Theodericus præmissis in eo Tractatu non paucis de morbi origine, natura, diagnosi, & prognosi in quibus cum cæteris Scriptoribus consentit, ad curationem progreditur, quam ait triplici methodo obtineri posse; usu scilicet, 1. Decoctorum Guaiaci; 2. Unguentorum vel emplastro-
rum mercurialium; 3. Suffimentorum cum Mercurio. Usam vero un-
guen-

1552.
(a) Methode curatoire de la maladie Venerienne, p. 129.
(b) ibidem, pag. 141.
(c) Ibidem, pag. 185.
(d) Ibidem, pag. 121.
(e) Vercellonius, in Præfatione præfixa Tract. De pudentior. morbis.
(f) Moyeu de parvenit, pag. 578. 579.
(g) Et Index funereus Chirurg. Parisien. sum.

(h) Con-tes d'Eu-trapel, par Noel du Fail, cap. 28.
(i) Tom. 4. pag. 317.
(j) Index funereus Chirurgo.

guentorum solum esse, qui certus, tutus, efficax sit, adeoque duabus methodis multum præferendus, passim affirmat, sed præsertim *pagg. 73. & 90.*

Præter hæc quæ cum cæteris fere omnibus suæ ætatis Auctoribus communia habet, singularia non pauca ac notatione digna memini in hoc Opusculo legi.

(a) *Pag. 69.* I. Posse (a) luem veneream declinari, etiam cum proxime instat, ope aquæ cujusdam ex rasura Guaiaci, aliisque multis materiis distillatæ balneo Mariæ, sed cujus usum plane inefficacem esse certum est.

(b) *Pag. 339.* II. Salivationem (b) aliquando æque copiosam cieri usu decocti Guaiaci, ac usu Mercurii.

(c) *Pag. 154. & furvan- 101.* III. Inunctiones (c) ægrotis debilioribus adhibendas non esse continuas & quotidianas, sed discretas & intermissas, uno, duobus, tribusve diebus intercalariis.

(d) *Pag. 157.* IV. Ptyalismum (d) inunctionibus mercurialibus non adesse perpetuo, sed aliquando deficere: Deficere vero sine damno si inunctiones rite fuerint administratæ, morbumque perinde curari diaphoresi, diuresi, vel alvi fluxu sponte oborto vel arte proritato.

(e) *Pag. 140.* V. Mercurium a nonnullis sua ætate etiamnum infamatum fuisse, sed temere, ut contigit non semel optima & tutissima remedia damnata fuisse; in cuius rei testimonium (e) exemplum affert Rhaharbari, remedii quidem benigni, & Auctoris ætate ab annis circiter viginti usu receptissimi, sed quod paulo ante vulgo suspectum erat, nec a plerisque Medicis ægrotanti ulli exhibebatur, nisi jam deplorato, quasi Rhaharbaro usi nunquam licitum esset, nisi in evidenti mortis periculo.

(f) *in Lindeno renovato.* JOANNES LANGIUS, Lembergius, natus (f) Leobergæ Silesiorum anno 1485. Medicinæ studuit Pils in Hetruria, ubi Doctoralem Lauream adeptus est. Inde Heidelbergæ Medicinam fecit, fuitque successively Archiater quatuor Electorum Palatinorum, inter quos Fridericum II. triginta septem amplius annos comitatus Hispaniam, Italiam, Galliam & maximam Europæ partem peragravit. Interiit Heidelbergæ anno 1565. ætatis anno 80.

(g) *in Collectio- ne Veneta Aloysii Lusini. Et apud Gerard Joann. Vossium, De Philo- sophia, cap. 8. §. 10.* Medicinalium Epistolarum Miscellanea, varia ac rara cum eruditione sum rerum scitu dignissimarum explicatione referta. Basileæ 1554.

(b) *In Lindeno renovato. Merckli- ni.* in 4. Hinc desumpta est Epistola Joannis Langii, quæ prostat in Collectio- ne Aloysii Lusini, Tom. I. In illa agitur paucissimis lineis Tuberibus Mor- bi Gallici, sed nullum remedium proponitur.

(g) *Et apud Val. An- dream, in Biblioth. Belgicæ,* PETRUS (g) HASCHARDUS, Insulanus, vel (b) HASSAR- DUS, Armentorius, Flander. Se Medicum Cbirurgum dicit in titulo *Tractatus de Morbo Gallico*, qui Lovanii excusus est anno 1554. & qui extat in

in *Appendice ad Tom. I. Collectionis Venetæ de morbo Gallico.*

In Tractatu illo, qui brevissimus est, electio, præparatio, administratio ligni indicii explicatur *Capitibus* 11. nec ullum aliud præsidium proponitur adversus Luem Gallicam.

Hic ille Petrus Hassardus Astrologiæ maxime addictus fuit, ut liquet ex sequente Historia. Ediderat anno 1551. Antverpiæ Franciscus Rapardus Brugensis Medicus Opus, cui titulum fecerat, *Magnum & perpetuum Almanach, a consuetis nugis liberum eoque vere Medicum, de Phlebotomia, de Balneis, de purgationibus certiora præcepta continens, ut merito dici possit vulgarium pronosticon Medicorum, Empiricorum & Medicastrorum flagellum.* „ Huic Petrus Hassardus respondit (a) Libro, quem inscripsit *Clypeum Astrologicum.* Extendit vero hanc observationem syderum etiam ad consurgere tempus ac memorat quomodo Bruggensium Magistratus Decreta sanxerit, ut tonsores omnes se componerent juxta Almanach * Petri Bruhezii. Hoc edictum riserat Rapardus. At Hassardus recte factum ait, atque addit: *Usinam & in aliis id omnibus civitatibus observaretur.* „

NICOLAUS MACCHELLUS, Mutinensis.

1555.

Tractatus methodicus & omnibus numeris absolutus de Morbo Gallico, ejusque natura & causis, & que eum sequuntur symptomatis, necnon singulorum curatione. [b] Venetiis 1555. in 8. apud Andream Arrivabenum.

(b) Israel Spachius in nomenclatore. Scripsit. Medicor.

Auctor ille existimat morbum novum non esse, sed ab Antiquis cognitum fuisse; quod ut probet, singula expendit symptomata, ut hæc a Veteribus observata fuisse demonstraret. Sed futilissima est ea argumentandi ratio, cum non agatur de symptomatis seorsim sumptis, sed de morbo, cui ea symptomatum syndrome essentialis sit, quem certum est nunquam visum fuisse ante annum 1494.

Ad curationem vero nulla adhibet remedia quæ efficacia sint, præter decoctum ligni Indicii, cujus præparationem & administrationem satis perfunctorie explicat.

1555.

RODERICUS DIAZ DE ISLA, hoc est Rodericus Jacobus de Isla, Medicus Hispalensis, scripsit Hispanice.

Tratado contra las Bubas. Hispali apud Dominic. Roberti, in 4.

Tractatus ille cum scriptus sit ad Joannem III. Lusitanæ Regem, qui fato functus est anno 1557. 11. mensis Junii; paulo ante scribi debuit, adeoque circiter anno 1555.

JOAN-

* Petrus ille Bruhezius Medicus fuit Eleonoræ Austriacæ, Caroli V. Sororis, uxoris Francisci I. Galliarum Regis, quæ conjugis obitum in Belgio degebat. Vide supra pag. 463. ad annum 1540. ubi de Antonio Gallo.

1556.

JOANNES FERNELIUS, Ambianus, natus est anno 1486. Clarononi Bellovacorum, quod a Lutetia viginti duntaxat leucis distat, sed Ambianum in Operibus idcirco se prædicat, quod patrem ex ambiano oriundum habuerit. Scriptis & praxi celeberrimus fuit: Ab Henrico II. in Archiatrum electus munus illud gloriose sustinuit. Obiit Lutetiæ anno 1557. ætatis suæ 72. Proinde erravit Thuanus dum (a) ait Fernelium anno ætatis 52. defunctum fuisse.

(a) Hist.
Lib. 21.

Inter cætera illius Opera sequentia sunt quæ ad præsentem tractationem faciunt.

I. *De Abditis rerum causis Libri duo*, Parisiis 1560. Ibi Cap. 14. Lib. 2. agitur de morbis contagiosis, & proinde de lue venerea; ideo Caput illud Collectioni Veneræ insertum est.

II. *Pathologiæ Libri VII.* ubi agitur etiam de lue venerea Capite ultimo Libri 7. quod ideo eidem quoque Collectioni insertum est.

III. *De Luis venereæ curatione perfectissima Liber* in Capita 15. distributus, cum cæteris Fernelii Operibus primum excusus Parisiis anno 1567.

Fernelius docet indubitanter 1. Luem veneream morbum esse novum. Ab India devectum, (b) Quo nemo labefactatur inquinati aeris inspiratione nec alimenterum impuritate aut vitio. Qui proinde in contagiosis haberi tantum debet.

(b) De
abditis
rerum
causis,
Lib. 2.
cap. 14.

2. (c) *Hydragryum non esse antidotum, sed Empiricorum inventum, quod tanquam fucum malo adhibent, neque a Viris bonis & Reipublice studiosis tam fallacem, incertam, atque adeo Crudelem curationem unquam tentari debere.*

(c) Lib.
de Luis
venereæ
curatione,
cap. 15.
(d) Ibid.
c. 10. 11.
12. & 13.
(e) Ibid.
cap. 15.

Decoctum ligni Guaiaci utiliore esse & efficaciorē Medicinam, ideoque illius præparandi & exhibendi methodum (d) accurate describit; cujus ut fidem faciat adducit (e) exemplum Domini de Mesteres, Prioris sancti Dionysii a Carcere, qui 40. annos natus lue correptus venerea duodecies duobus annis incassum inunctus fuit, unde siccum adeo & exangue corpus evasit, ut in eo nihil præter aridam cutim & ossa superesset, cum topbis super ossa brachiorum, crurum, tibiærum & capitis, divisque cruciatibus, qui impediabant quo minus integro biennio somnum inire potuerit: Quem tamen ipse methodo, quam describit, sed potissimum ulu Guaiaci & ope æstuarii post exactos mentes aliquot pristinæ Valetudini tandem restituit.

4. Demum, quod iudicium in tanto Viro vix probem, perfectissimum curationis modum eum esse, qui fiat [f] opiata ex remediis vulnerariis composita, cujus formulam profert, & aquam *Antidotum Alexipharmacum* vocat; vel [f] aqua, quam mirificam dicit, & quæ ex remediis ejusdem generis distillando prolicitur, in cujus rei confirmationem duos refert a se restitutos, quorum imitatione ait cæteros curari posse.

(f) Ibid.
cap. 15.

Cæte-

Cæterum constat *Librum de Luis veneræ curatione perfectissima* anno 1557. tantum conscriptum fuisse, cum mentionem faciat *Capite 7.* tum *Pistoris cujusdam Andegavensis*, qui cinabrio casu degustato anno 1557. tum *Fabri cujusdam aurarii*, qui solius *hydrargyri* vapore anno 1556. gravissima senserunt incommoda.

PETRUS DE BAYRO, Taurinensis natus circa annum 1468. Protophyfici nomen adeptus in patrio Gymnasio Medicinam per plures annos docuit. Archiaterus fuit Caroli III. Sabaudie Ducis. Obiit Taurini nonagenarius anno 1558. 1557.
1561.

De medendis humani corporis morbis Enchiridion, quod vulgo Veni mecum vocant, cum adjuncto *Tractatu de Peste*. Lugduni anno 1561. in 12.

Hinc excerptum est Caput unum *De doloribus musculorum ex Morbo Gallico genitis*, quod insertum est *Collectioni Venetæ De Morbo Gallico*.

Ibi legere est doloribus istiusmodi sedandis conducere unguentum mercuriale: Laudat ibidem ad Morbum Gallicum decoctum Guaiaci, vel pilulas quibus utuntur Moderni contra Morbum Gallicum, quæ in aliquibus mirabilem fecerunt operationem. Harum autem formulam refert, quæ cum formula pilularum Barbarossæ eadem est; hæcquæ *Recepta*, inquit, ex Turchia apportata fuit, & qui primus inter Christianos bis usus est pilulis, cecidit repente mortuus super pontem Avenionis, dum ibidem profugi essemus propter prælia anno 1537. nempe cum Franciscus I. Gallorum Rex, exacto Carolo III. quocum bellum erat, Sabaudiam & Pedemontium occupabat.

JOANNES SYLVIUS, Insulensis seu Insulanus in Flandria, Medicinam primum Valencenis scitavit, postea eandem Duaci professus est. Habuit anno 1557. Lovanii declamationem *De Morbo Gallico*, quæ edita fuit eodem anno Antverpiæ apud Plantinum, ad calcem *Tractatus De curatione morbi articularis* in 7. 1557.

Ea declamatio exstat in Tomo II. *Collectionis Venetæ*; sed nescio quem ad finem, cum in ea nec novum, nec utile quidquam sit.

PETRUS LAURUS, Italus, italice vertit *Librum Aloysii Lobera*, Abulani, *De quatuor egritudinibus aulicis*, & excudendum curavit Venetiis, anno 1558. in 8. apud Joannem Baptistam Sessam. 1558.
1558.

FRANCISCUS FRIZIMELICA, vel FRICIMELICA, Patavinus, natus anno 1491. in Academia Potavina Medicinæ Theoreticæ Professor publicus fuit. (a) *Pervagata ejus fama Julius III. Pontifex Maximus Romam eum vocavit ad Medici Pontificii munus obeundum, cui numeri optime satisfecit.* Mortuo Julio anno 1555. Patavium regressus est, ubi decessit anno 1559. ætatis 68. Narrat Hieronymus Capivaccius (b) *excellentissimum Frisimelicam, qui solam aquam potabat, dolori colico obnoxium & aliquando gravissime afflictum ano excrevisse calculum ad magnitudinem ovi gallinæ, qui* (a) Mandolius, in vitis Archiatri. Pontific. (b) Pratic. Medic. Lib. 3. Cap. 13. De dolore intestinum.

qui a vesica fellea per ductum cysticum admodum dilatatum prodierat, sed quem Capivaccius in intestinis genitum fuisse erronee existimat. Laudatur in *Sylvio ocreato* Ludovici Arrivabeni (*Henrici Stephani*;) &

(a) Disputat. De scopis mittendi sanguinem. Part. 2. ab Alexandro Massaria (a) suus dicitur præceptor nunquam satis laudandus. Scripsit *Trattatum de Morbo Gallico, & lucubratiunculam adversus defluviu pisorum*, ubi adhibitis prius phlebotomia & usu purgantium atque alterantium, proponit 1. Suffumigia, quæ tamen ipse damnat *sanguinem periculosa*: 2. Inunctiones mercuriales, quas nec ipse multum probat: 3. Decoctum ligni Indi, hoc est Guaiaci. De cæteris vero silet.

1558.

HIERONYMUS MONTUUS, dicitur Archiater Henrici II. Galliarum Regis in *Glossario medicæ & infimæ Latinitatis*, in verbo *Archiateros*, & in *Bibliotheca Medica Joannis Georgii Schenckii*: Sed an satis recte dubito. Sane ipse anno 1558. idibusque mensis Decembris, hoc est sex mensibus ante Henrici II. decessum Lugduno, ubi videtur vitam degisse, scribebat ad Franciscum a Lotharingia Guisiz Ducem Epistolam nuncupatoriam, quæ Operi præfixa est, de quo infra; Ac in ipsa Operis ejusdem fronte se quidem dicit Christianissimi Galliarum Regis Consiliarium, Medicum vero aut Archiatrum minime.

(b) Ab Israele Spachio. Joanne Georgio Schenckio. Joanne Vanderlinden. Georgio Abrahamo Mercklino.

Huic adscribitur a Bibliographis plerisque (b) Liber *De Morbo Gallico, Lugduni editus anno 1558. in 4. apud Tornesium & Gazeium*, qui mihi nondum venit in manus, nisi forte idem sit cum sequente; sed quid Auctor ille de luis veneræ ætiologia & therapeia senserit, abunde notum habui ex ipso Libello, cui sequentem inscriptionem fecit.

Chirurgica Auxilia ad aliquot affectus qui repentinam exigunt curationem; morbi item veneri, ac eorum qui huic vicini sunt, curationes. Lugduni apud Joan. Tornesium & Guillelmum Gazeium, in 4. 1558.

Ibi enim differit Capite 29. *De Lue Indica sive venerea*, paucis quidem sed quæ curatorias methodos sua ætate usu receptas complectantur.

Scilicet propositis remediis præparatoriis Therapeiam triplicem indicat, Nempe I. Usus decoctorum hagioxyli sive ligni Guaiaci; radicum Sinarum, vel si ea deficient, Cannarum nostratium, Calami aromatici, Radicis Personatæ &c. Quod ad Spartam-parillam, radicem hanc a se flocciferi facetur.

II. Usus Enchristerum sive unguentorum ex hydrargyro, quæ illi mira videntur; nam, inquit totus morbus ad os repercutitur, & qui deplorati fere sunt sanantur, modo is qui medetur, hujusmodi remedium parare faciat ad temperaturam & ætatem ægrotantis & morbi magnitudinem.

III. Usus emplastrorum vel suffimentorum mercurialium, si tolerati non possint illitiones.

Demum topica nonnulla præscribit remedia, 1. *Ad oris ulcera*. 2. *Ad*

ARTU-

artuum dolores, duritiesque. 3. Ad ulcera cava & purrida. 4. Ad scabiem feram in palma manus. 5. Ad vestigia pustularum delenda. 6. Ad ulcuscula pudendorum; ac tandem 7. Ad præcautionem, ad quam conferre putat inter cætera, si mox post coitum penis immittatur in disscissam & ad huc calensem columbam, quæ venena omnia rapit, siue a proprietate, siue a carnis nuper mactata caliditate virus trabatur & bebefcat.

GABRIEL FALLOPIUS, Mutinensis, natus [a] anno 1490. Discipulus (b) Antonii Musæ Brassavoli & Joannis Baptistæ Montani, primum in Pisano Gymnasio Anatomiam docuit, deinde in Patavino, ubi quoque ab anno 1551. ad obitum usque Botanices Professor fuit. Inter celeberrimos sui sæculi Anatomicos recensetur. Mortem obiit Patavii anno 1563. non 1562. ut ajunt (c) Thuanus & (d) Castellanus, ætatis suæ anno 73. non vero 39. ut iidem referunt.

De Morbo Gallico Tractatus, Patavii 1564. cum Petri Angeli Agathi, Matheratis, Scholiis Marginalibus, & Annotationibus orationis contextui insertis, sed quæ hæc nota [d] distinguuntur.

Opus quidem eximium non stilo sed re, in quo Fallopius Capitibus 102. quidquid ætate sua de Morbo Gallico notum erat accuratissime explicat.

I. De natura, origine, novitate, causis & symptomatis hujus ægritudinis disserit; ac cum cæteris statuit Morbum novum esse: Ab Hispanis ex India Occidentali delatum: Plane diversum (e) a Lepra Arabum, a (f) Sabafato Avicennæ, ab [g] Albotim ejusdem sive Termintho Græcorum, demum [h] a variolis & spora.

II. Methodos curatorias Morbi Gallici in Regias sive Methodicas, & non Regias sive Empiricas distinguit.

Prima Regiarum ea est, quæ obtinetur diætâ, alterantibus, purgantibus, exercitatione; quam credit incipienti morbo sufficere.

In altera usus est ligni Guaiaci, cujus eligendi, decoquendi, administrandi methodum multis explicat. Hanc viam dicit (i) Regiam, certam & salutem, qua Gallicus sanatur, & hæc consultat ut omnes utantur in suis ægrotis.

In Tertia adhibetur decoctum radicis Chinæ, cujus historiam & præparationem docet, & cujus usum Gallis, Germanis & Flandris familiarem esse dicit; at vero simul monet in curando Morbo Gallico parum efficacem esse. Expertus sum (k), inquit, ter, & quater, & numquam (l) Cap. aliquid potui assequi. Et alibi: Ego, (l) inquit, usus sum isto medicamento in infirmitatibus viscerum, in canceris exulceratis, in lippitudinibus felici successu, sed non in Morbo Gallico.

Quarta superest (m) via Regia, quæ fit per salsam-parillam, cujus electionem & præparationem proponit. Censet autem salsam-parillam eamdem esse cum smilace aspera, atque (n) se ad hoc medicamentum confugere, cum

1560.

(a) Thomæsius in Elog.

(b) Ipse ait Tract. De Morbo Gallico, cap.

47.

(c) Historiar. Lib.

(d) In vitis illust. Medicor.

(e) Cap. 3.

(f) Cap. 4.

(g) Cap. 5.

(h) Cap. 6.

(i) Cap.

(k) Cap.

(l) Cap.

(m) Ibid.

(n) Ibid.

(m) Cap.

(n) Ibid.

(m) Ibid.

(n) Ibid.

(m) Ibid.

(n) Ibid.

cum in Gallico adsunt ulcera, tanquam ad certissimum & tutissimum auxilium, & si non facit prima diata, facere saltem secundam vel tertiam.

III. Inter methodos, quæ non sunt Regiæ, prima est methodus suffragiorum, quam Auctor describit; fatetur tamen, (a) *Sæpe ac sæpius gravissima succedere incommoda, nec ita tuto procedere illam curationem. Quare, inquit, semper probavi, ut talem [quantum fieri potest] fugiamus; aliquibus enim pessima & letalis est.*

Via altera, quæ non Regia est, ea est quæ utitur inunctionibus mercurialibus, (b) *Quarum, inquit, ita viget auctoritas, ut iis tota Gal- lia utatur. Tamen, inquit ille, non probo usum earum; superant quidem morbum, sed si habemus Regias rationes curandi, quæ ut plurimum & certius sanant, sine corporis incommodo, & si non sanant, leniunt sine noxa, non proritant affectum, cur utemur hydrargyro, ex quo non ita certa, non ita tuta succedit sanitas? Iis tamen, subdit Idem, utor aliquando, quando non potui via Regia assequi intentionem. Ego vidi adolescentem laborantem Gallico, in quo omnia Regia infelicititer experta sunt; Empiricus hydrargyro curavit.*

IV. Scitis [c] autem, inquit Fallopius, quod non solum Empirici sanant inunctione ista, sed exhibitio argento vivo per os, non quale est, sed præscriptio; & sunt Chymistæ, qui profitetur invenisse secreta, & facere præscriptum præstantissimum pro Morbo Gallico. Deinde proponit ille processum conficiendi præcipitatum Mercurium rubrum, quem exhiberi ait ad pondus 7. granorum; ad summum 10. sed raro. At hujus usum damnat. *Incommoda, inquit, subsequi solent non pauca ex assumptione talium; solvitur enim alvus copiose, vomitus movetur violentissimus, dysenteria inducitur, rumpitur in pectore vena. Medicina hæc pro asinis & rusticis servetur, atque a thalamo virulentium hominum excludatur.*

V. Fallopius postea singula expendit symptomata morbi ex ordine, ac remedia topica proponit, quæ singulis medeantur.

Porro notandum est hunc Fallopii Tractatum post Auctoris mortem editum fuisse Patavii in 4. anno 1564. opera Petri Angeli Agathi, Matheratis, qui de suo addidit non modo Scholia marginalia, sed etiam textui inseruit annotationes varias uncinis distinctas, quibus sane lucem aliquam Fallopio præfert in nonnullis locis, sed quibus etiam acriter eundem identidem redarguit. Sic v.g. cum dixisset Fallopius Cap. 23. *Hispanos induxisse tyrannidem in Italiam, Gallicum, & barbæ longæ usum*, Agathus ita reponit in adnotatione margini adjecta: *Imo Rex Philippus, atque pater Carolus veram conati sunt inducere Monarchiam: O lepida sane animadversio!*

2560. GUILIELMUS RONDELETIUS, Monspeulanus, natus est anno 1507

In

anno 1545. Cancellarius fuit anno 1556. Obiit anno 1566. ætatis suæ 59. in *Regali monte*, quo nomine non (a) *Montreal*, ut a multis video, sed *Realmont* in Diœcesi Albigenſi intelligi debet, qua de re vide Petrum Borellum, *Antiquitez de Caſtres*, Liv. 2. Chap. 21. ſed de eo plura in Hiſtoria Scholz Medicæ Monſiepsulanæ mœdenda.

De Morbo Italico Liber unus.

Proſtat ille Liber in Colleſtione Veneta, ſed Edituri placuit Lucem vendeream, non *Italicum*, ut ab ipſo Rondeletio dicebatur, ſed *Gallicum* Morbum mutato nomine appellare.

Ad curationem luiſ veneræ Rondeletius laudat inunctiones varias mercuriales; decocta varia ligni ſancti ſeu Guaiaci, Chinæ, Sarſæ-pa-
rillæ; ſyrupum Sancti Ambroſii ex decocto milio; pilulas Barbaroſ-
ſæ; imo ipſa quoque ſuffumigia ex cinabrio. Sponte tamen conſtitetur
(b) argentum vivum eſſe antidotum & maxime accommodatum remedium
ad Morbum Italicum, quia quocumque modo adminiſtretur, morbum cu-
rat.

Porro notandum eſt a Rondeletio purgationem laudari in ipſa lini-
mentorum adminiſtratione. „ (c) Iſtis omnibus, inquit, utile erit ſi non
„ fluat alvus, ſyrupum laxativum præſcribere, vel Apozema (purgans)
„ quo initio uſi ſumus. Hæc enim evacuatio impedit effumationem ad
„ os, a qua ulcera oris & dentium ſordes proveniunt; ab effumatio-
ne & ſorde ulcus; ab ulcere pituitæ fluxus. Raro autem ejuſmodi effu-
matio ſine ulcere accidit; quare ad hæc vel majora vitanda, uti erit
purgare.

DOMINICUS LEO, Lunenſis de Zuccano.

*Metodus curandi febres, tumoreſque præter naturam ex Græcorum pla-
ciſis deprompta. Bononiæ 1562. in 40.*

Inde excerptum eſt Caput unum, in quo agitur *De Morbo Gallico*, quod
proſtat in Colleſtione Veneta.

Si huic Auſtori fides adhibeatur, nihil deterius eſt Morbo Gallico affe-
ctis, quam adhibere ſive interius ſive exterius ſub forma unguenti vel ſuffumigii
ipſum argentum vivum. Itaque illius loco laudat decoctum ligni ſancti.

ANTONIUS FRACANTIANUS, Vicentinus. *Vir præclara eru-
ditione ac ſingulari iudicio* dicitur ab Alexandro Maſſaria, *Diſput. de pur-
gatione principio morborum*, qui eo præceptore ſe uſum eſſe gloriatur. In
Scholis Patavina & Bononiænſi [d] multos annos artem Medicam pro-
feſſus eſt honorificentiſſime. Deceſſit Patavii anno 1569. ac [e] ſucceſſorem
habuit Hieronymum Mercurialem.

Excudendum curavit Patavii anno 1564. in 4. Librum *De Morbo
Gallico*, in quo docet,

1. Morbum Gallicum novum eſſe, & ab Indiis Occidentalibus de-

(a) An-
toine
Teiſſier.
Addi-
tions
aux Elo-
ges Hom-
mes Illu-
ſtres de
M. de
Thou.

(b) In
ſine Li-
bri.

(c) Cap.
De un-
guentiſ.

1562.

1564.
(d) Alex.
Maſſa-
rias,
ibid.
(e) Dic-
tionnai-
re de
Moreti.
in voce
Mercuri-
al.

vectum; qui contagio tantum propagetur: *Neque enim, inquit, visus est unquam apud nos aliquis, qui aliter ipsum inciderit.*

II. Morbum Gallicum curari diversis modis. 1. *Per evacuationem, quæ fit & venæ sectione & expurgantibus pharmacis, & per alterationem.* 2. *Per continuata exercitia & vebementiora.* 3. *Per suffumigia.* 4. *Per inunctiones hydragryrum recipientes vel per cerata Mercurialia.* 5. *Per decoctum Chinæ, sed quod non est multi juvamenti, ut experimento cognoscitur.* 6. *Per decoctum Sparsæ seu Salsæ-parillæ.* *Per decoctum ligni Guaiaci, quod præstantissimum est auxilium ad hunc Morbum Gallicum sanandum.*

III. Post has methodos diversas singulatim explicatas, remedia proferret topica, quæ singulis symptomatis Morbi Gallici medeantur, in quibus Fallopii & Ant. Musæ Brasavoli vestigia premit.

1564. ANTONIUS CHALMETEUS, (a) Vergefacus apud Anicienses, Ghirurgus fuit suo tempore celeber, quem *Guillelmus Rondeletius* (b) uni-ce amavit, & a quo habemus sequentem Tractatum.

Enchiridion Chirurgicum externorum morborum remedia tum universalialia, tum particularia brevissime complectens. Quibus Morbi Veneri curandi methodus probatissima accessit. Parisiis anno 1564. in 8.

Ea diatriba *De curatione Morbi Veneri*, quæ Capita 10. continet, profat in Collectione Veneta. Paucis Auctor docet lucem veneriam curari posse, 1. Therapeia methodica, quæ obtinetur purgantibus & alterantibus. 2. Ufu ligni Indici, cui si curando morbo non sufficiat, inunctiones aliquot addit sub finem. 3. Decocto radicis Chinæ. 4. Inunctionibus vel ceratis Mercurialibus, quæ laudat tanquam præstantissima remedia. (c) „ Affirmare ausim, inquit, eos qui tantopere Mercurii usum-

„ improbant, aut numquam aut non ut decet, illius periculum fecisse. „ Sed, ut sit, ego tamen confirmo illius usum me nunquam sefellisse, qui „ quamplurimos ab hac detestanda lue etiam inveterata Dei beneficio liberaverim. „ Demum proposita curatione per pilulas Mercuriales & per suffumigia, quam ultimam curandi rationem parum probat, properat ad curationem morborum sive symptomatum venereorum localium.

AUGERIUS FERRERIUS, Tosolas, natus anno 1513. Doctoratus gradum assecutus est in Academia Monspelienfi anno 1539. Deinde innotuit (d) Cardinali Joanni Bertrandi, Gallæ Cancellario, quem in Italiam proficiscentem sequutus est, & cujus patrocinio Medicus ordinarius Catharinæ Medicæ, Gallæ Reginæ electus fuit.

In patria obiit anno 1588. ætatis lxx 57. Fuit intimus Julio Cæsari Scaligero, qui Aginni Medicinam faciebat.

Exstat præter alia Opera Tractatus ab illo scriptus & Collectioni Venetæ insertus, cui titulus *De pudendagra, gravi lue Hispanica, Libri duo; Antverpiæ anno 1564. in 8.*

Horum

(a) Bibliotheca Schenckiana, in voce Antonius Chalmeteus.
(b) Joubertus, in vita Rondeletii.
(c) Cap. 5.
(d) Thuanus, Histor. sui temporis. Lib. 89.

Horum quidem Librorum priore ad curationem generalem proponit Dietam, Purgantia, Alterantia, inunctiones Mercuriales, Cerata & emplastra, Suffumigio ex Cinnabari, decocta ligni Indici, Chinæ, Spartæ, vel Sarzæ-parillæ &c. Laudat autem usum inunctionum Mercurialium, tanquam efficacem, sed credit (a) *reprimendam esse multorum remeritatem & lasciviam, qui iis utuntur inconsiderantissime.* (a) Cap. 11.

Posteriore vero paucis expendit symptomata localia pudendagræ, assertiveque methodos, quibus singulis mederi liceat quam efficacissime. Ceterum in illo Tractatu vix reperias quicquam quod novum sit.

LEONARDUS BOTALLUS, Astensis, Henrici III. Medicus ordinarius, famosus venæ sectionis frequentioris promotor, Tractatum scripsit, cui titulus est *Luis veneræ curandæ ratio*, qui Lugduni excusus fuit anno 1565. & in Capita 31. distribuitur. 1565.

Haud opus esse videtur ea annotare, quæ Botallus in Montanum dicit de natura & subiecto luis veneræ; Hæc enim pertinent ad Galenicam Pathologiam, quæ jam pridem obsolevit. Observasse sufficit, tria curationis genera ab Auctore admitti, decoctum nempe ligni Guaiaci, illitiones aut emplastra, spleniave Mercurialia, & suffitus cinnabarum recipientes. Hæc autem duo postrema remedia miris extollit laudibus, utpote (b) *quæ curent mirifice corpora humana hac lue infecta; multisque invenitur in Montanum, quod Mercurium damnaverit tanquam venenum, cum ipse e contrario diserte asserat hydrargyrum (c) venenum non esse, neque corporibus humanis nocuum, nisi ubi perperam fueris admotum Medici culpa, vel negligenter receptum ægotantis incuria.* (b) Cap. 17. (c) Cap. 25.

ALEXANDER TRAJANUS PETRONIUS, Citta castellanus, hoc est ex urbe quæ dicitur *Civita vel Citta Castellana* aut *di Castello* sub Metropoli Romana, Medicus fuit (d) Gregorii XIII. summi Pontificis, qui electus anno 1572. mortem obiit anno 1585. 1565. (d) Petrus Castellus in Antidotario Romano, in Eleuvario Alexandrino.

Scripsit [e] anno 1565. Tractatum de Morbo Gallico, Collectioni Venetæ insertum & Libros septem complexum.

Primum; in quo Auctor probare conatur [f] *Morbi Gallici, sicut & Elephantiasis, morbillorum & variolarum, causam esse alimentum, quod in matris utero, non sine quadam putredine humanus fœtus necessario trahit.* (e) Ipse sic refert Lib. 6. cap. 1.

Secundum, in quo Auctor, postquam docuit vitium quod connaturale est, solo contagio excitari posse, signa diagnostica & prognostica explicat. (f) Lib. 2. cap. 1.

Tertium, in quo agitur de præparatione ægotantium ad remedia efficaciora, qualis obtinetur venæ sectione, purgantibus & alterantibus mul-tigenis. (g) Lib. 5. cap. 1.

Quartum, in quo quæstio est de electione, præparatione & administratione ligni Indici sive Guaiaci.

Quintum, in quo (g) *Sarzæ-parillæ atque radices Chinarum decocta exa-*

minantur per easdem rationes quibus ad Guaiaci proxime Auctor usus est.
 (a) Lib. Sextum, in quo disseritur, [a] de unguento ex argento vivo & suffimento
 6. c. 1. exciunabari; qui ait ille, hæc quidem curans Morbum Gallicum, non minus
 quam singula prædicta, sed sæpe cum tanta fæditate, tantoque cum periculo, ut
 ægri dum curantur malis sese non incepisse, quam curatos esse.

Demum Septimum, ubi Auctor singula Morbi Gallici symptomata, si-
 ve morbos venereos locales sigillatim prosequitur, proposita particulari
 singulorum therapeia.

1566. Auctor ille in scribendo nimius est & ita verbosus, ut nauseam moveat.
 PETRUS TRAPOLINUS, Patavinus, fuit ordinarius Theoricæ
 Medicinæ Professor in Academia Patavina, & sane Tractatus De Morbo
 Gallico quem scripsit, & quem in Collectione Veneta reperire est, agit
 tantum de Theoria Morbi Gallici, multaque continet quæstiones plane
 futiles & nugatorias, quales forsitan inter disputandum in Academia Pata-
 vina tunc temporis agitabantur. Nempe (b) 1. An Morbus Gallicus sit Epi-
 demialis? Concludit affirmative. 2. Quo nomine a veteribus Medicis fuerit no-
 minatus? Fatetur illis ignotum fuisse. 3. Utrum comprehendatur inter morbos
 nominatos ab Hippocrate Aphor. 21. Sectione 3. ubi æstivales morbos enumerat?
 Hæret dubius, sed neganti propior. 4. Utrum ab humore melancholico solum,
 an etiam ab aliis possit causari humoribus? Respondet, ab aliis etiam causari
 posse. Cæterum Opus imperfectum est, & multis interspersis lacunis mutil-
 um, ita ut ex Codice Scholastici Trapolinum audientis exscriptus videatur.
 De curatione luis venereæ ne unum quidem verbum additur.

1566. MARINUS BROCARDUS, Venetus. Ignoratur quo tempore scrip-
 serit brevem Dissertatiunculam De Morbo Gallico, quæ sub ejus nomine
 exstat in Collectione Veneta. Constat tamen scriptam fuisse ad minus ante
 annum 1567. cum eo anno illa Collectio prodierit.

In hac diatriba nec novum nec utile quidquam observare est. Censet
 Brocardus meliorem morbi causam afferri non posse, quam illam trium lumina-
 rium [Saturni, Jovis, & Martis] conjunctionem quæ adhuc durat, ac etiam per
 aliquos annos perseverabit. Ad curationem vero proponit diætam, alteran-
 tia & evacuantia universalia & particularia: Quæ methoda affirmat se pro-
 cul dubio sanavisse multos patientes talem morbum. Fatetur tamen, his non
 conferentibus, necesse esse devenire ad extrinsecus applicanda, in quem finem
 proponit unctionem mercurialem, quæ, inquit, & Crustas & Bothor & Apo-
 stemata, ac in primis dolores omnino aufert: Est enim mirabilis. Profert de-
 inde gargarismata quibus os eluatur, si tempore unctionis ex vaporibus ele-
 vatis ad os appareant ulcera in ore. Demum laudat stuphas, sed nullam suf-
 fumigiorum mentionem facit.

Cum hic Auctor luem veneream ad syderum influxum referat, ut vul-
 gare fuit sub primo morbi ingressu, & cum de decocto ligni Indici nihil
 quid-

quidquam dicat, cujus usu ab anno 1518, increbuerat, videtur utroque nomine antiquior esse quam vulgo creditur, & inter primos qui de lue venerea scripserint forsan numerandus.

BERNARDINVS TOMITANVS, Patavinus, ad Medicinam [a] 1566. accessit, postquam docuisset Patavii Dialecticam annos 25, unde minime mirum esse debet, si Tractatus, quem de Morbo Gallico scripsit, tot furilibus ac nugatoriis quæstionibus plenus sit, quæ otiosum Dialecticum sapiunt. Decessit [b] anno 1576. fere leptuagenarius.

Tractatus ille duos Libros complectitur; Priore Capitibus 29. differitur de origine, natura, & causis Morbi Gallici, non medice quidem, sed vere dialectice; quærendo scilicet, (c) *An Morbus Gallicus sit, necne? An gallica infectio morbus proprie dici debeat? Sub quo genere morbi contineatur gallica infectio? Quales sint bujus differentie?*

Posteriore vero, post propositam dietam & ægrotantium præparationem, agitur de curatione Morbi Gallici, quam Tomitanus in universum quadruplicem esse statuit, (d) nempe *Exercitatione corporis, Suffumigio. Unctione, aut His quæ per os ingeruntur.*

1. Ait [e] multos sanitati fuisse restitutos sola exercitatione perpetuis moribus comparata.

2. Curationem per suffumigia mercurialia (f) utcumque se habeat passim damnari, uti incertam primum, deinde & gravem periculosamque.

3. Inunctionem mercurialem (g) damnari posse per easdem rationes, quibus suffusius improbantur. Accedit, inquit, quod nemo visus est exacte sanatus hoc genere auxilii, aut saltem diuturno tempore, tum morbus recrudescat.

4. Ea quæ per os ingeruntur esse triplicis generis, (h) alia certa & opportuna, ut *Palus Guaiaci & salse-pariliæ*; alia incerta nec periculo vacantia, ut *præcipitatum vulgo appellatum*; alia media, uti *haustus decocti, quod ex ligno Hætechen (si modo id haberi possit) conficitur, aut radice Cbyne, aut olivastro & junipero, & alio domestico ligno ad hunc usum addibito.*

Denique præter universalem curationem morbi Gallici profert Cap. ultimo curationes particulares, quæ singulis morbis venereis localibus adhibentur.

Laudat passim Fracastorii tum *Poema de Syphilide*, tum *Librum 3. de Contagione & Morbis contagiosis.*

MICHAEL JOANNES PASCHALIS, Valentinus (i) Castellonenfis in Hispania, Doctor Medicinæ, quam sub Joanne Falcone Monspeffulanz, & Ludovico Collado Valentini Hispanorum Academiarum Professoribus didicit, scripsit Tractatum *De morbo Gallico*, qui exstat in Collectione Veneta Aloysii Luisiani, in quo de morbi ætiologia paucissima, de therapeia vero pauca.

Præmissis dieta legitima, venæ sectione, usu purgantium & alteran-

tium, proponit ad morbi curationem 1. Syrupum ex decocto Guajaci, cujus formulam affert. 2. Aquam sive decoctum Guaiaci. 3. Aquam sive decoctum smilacis asperæ sive farzæ-parillæ. 4. Aquam sive decoctum radicis Chynæ. 5. Vinum sanctum sive vinum cum decocto Guaiaci comixtum.

Quod si morbus fuerit antiquus & curatu difficilis, fortioresque poscat curationem, censet tunc potentioribus opus esse, inter quæ laudat medicamenta ex Mercurio; neque putat facultatem argenti vivi esse pertimescendam, cum olim sæpe multis morbis levioribus admotum sit, ut scabiei.

Hinc ordine proponit unguenta & suffumigia multa mercurialia, imo præcipitatum ipsum rubrum seu pulverem Joannis de Vigo, sed quem ideo profert ut damnet. „Nonnulli, inquit, in curatione hujus morbi anti-
 „ quissimi & fortissimi, præter jam dicta utuntur pilulis, addendo grana
 „ aliquot pulveris Joannis de-Vigo. Ego non auderem uti illo pulvere,
 „ ne in parva quidem quantitate & correcto, quia est corrosivum medi-
 „ camentum.”

PROSPER BORGARUTIUS Patavii anno 1567. scripsit *Capitulum 14. Methodum de Morbo Gallico ad Illustrissimum & Colendissimum DD. Franciscum Mariam de Marchionibus Montis, Abbatem Sanctæ Crucis*, quem sic alloquitur in Epistola: „Jam vero nihil opus est a me diffusius commentari
 „ quanta dignitas, quantusque sit splendor, non dicam illustrissimi, sed
 „ plane Regii stemmatis tui; cum illud nihil aliud foret, quam solem,
 „ quod aiunt, facibus velle illustrare: Quis enim hac tempestate ignorat
 „ heroicam Marchionum Montis familiam ex Regia Borbonum stirpe or-
 „ tam, originemque habuisse. „ Nempe (a) serunt bujus familia Histori-
 „ ci Marchiones illos Montis ab antiquiore Regione Borbonio sanguine originem
 „ duxisse, & ab Uguccione Borbonio Collis Marchione anno Christi 917. clero descen-
 „ disse. Sed hæc (b) gerræ germanæ, atque a depol λῆρος λῆρος; quasi vero, ut
 „ cæteris jam parcam, sanguis Borbonius Regius fuisset anno 917.

(b) Plautus in *Penulo*. Act. 1. Scen. 1. pagari existimat. Dissertatio Borgarutii nec inelegans nec insulsa videtur. In principio differit de origine, natura, causis, & symptomatibus Morbi Gallici, quem novum & ab India Occidentali traductum esse, atque contagione sola propagari existimat.

(c) Cap. 12. Deinde ad curationem progreditur, ad quam 1. Adhibet [c] varia Medicinæ instrumenta, videlicet Evacuationes, Phlebotomiam, Pharmaca, Symplicia, Lotiones, Balnea &c. 2. Inunctiones [d] mercuriales, sed quæ discretis vicibus paulatim admoveantur. 3. (e) Decoctum ligni Guaiaci debita methodo administratum.

(f) Cap. 13. Circa inunctiones mercuriales diserte asserit (f) „nihil ob stare cur inun-
 „ ctionibus ex hydrargyro minime uti debeamus in Morbo Gallico,
 „ tum

„ tum præcipue cum reliquis Medicamentorum auxiis prodesse non pos-
 „ sunt; sed tamen hæc ulterius ab aliis omnibus Auct. oribus non perspecta
 „ considerata venire, quod si immodice lue Gallica laborantes inungan-
 „ tur, præter maxima quæ succedunt accidentia, ita testes & reliquæ
 „ omnes partes, per quas sagax natura semen humanum administrat, su-
 „ blæduntur, ut ulterius non generent amplius, ut ego, *inquit*, innume-
 „ meros pene novi & homines & mulieres, qui post indebitas unctiones,
 „ filios numquam habuerunt. „ Quam tamen observationem ab uno tan-
 „ tum Borgarutio relataam novi, & falsam esse certus scio.

Circa decoctum vero ligni Guaiaci, putat [a], „ cæteris omnibus Morbi
 „ Gallici curativis intentionibus expeditiorem esse atque securiorem & ^{(a) Cap.}
 „ minus periculofam illam, quæ potu decocti ligni Guaiaci efficitur, „ ^{14.}
 „ cujus præparationem & administrationem satis accurate describit.

Mentionem nullam facit neque sarsæ parillæ, neque radicis Chinæ,
 quas tamen constat in usu fuisse tempore quo scribebat. Cæterum reperio
 (b) apud Borgarutium, qui scripsit anno 1566. eadem de *nebulonibus se*
Medicos mentientibus & in asinum strigosum raptis, ut ex urbe cum scommatis ^{(b) Cap.}
educantur, quæ totidem verbis legere est in Epistola Joannis Liebauii, Pa- ^{2.}
 risiensis Medici, ad Marcum Mironem Henrici III. Archiatrum data an-
 no 1582. & præfixa Commentariis Jacobi Hollerii in Aphorismos Hippo-
 cratis, unde consequens est Borgarutium a Liebauiio expulsum videri.

COLLECTIO quarta, sive VENETA secunda. Aloysius Luifinus,
 Medicus Utinensis, in unum corpus coegit Auctores quocunque ad suam us-
 que ætatem *De Morbis Venereis* scripsisse noverat, ac edendos curavit Ve-
 netiis apud Jordanum Zilettum. Ea Collectio in duos Tomos *in folio* di-
 visa est, quorum prior, qui Opera complectitur ante impressa, anno 1566
 Posterior vero, quo Opera illa continentur, quorum pleraque ante edita
 non fuerant, anno 1567. prodit.

Prestant in priore Tomo Auctores sequentes, sed promiscue confusi, nec ^{1566.}
 ordine ullo digesti sive Chronologico, sive Alphabetico. ^{1567.}

A

Joannes Almenar, *Hispanus.*
 Amatus, *Lusitanus.*

Sebastianus Aquilanus.

B

Petrus Bayrus, *Taurinensis.*

Joannes Benedictus, *Germanus.*

Antonius Benivenius, *Florentinus.*

Anton. Musa Brassavolus, *Ferrariensis.*

C

Hieronymus Cardanus, *Mediolanensis.*

Jacobus Caraneus de Lacu Marcino, *Genuensis*.
F

Joannes Fernelius, *Ambianus*.
Consalvus Fernandez de Oviedo, *Matritensis*.
Alphonfus Ferrius, *Neapolitanus*.
Hieronymus Fracastorius, *Veronensis*.
Leonardus Fuchius, *Rhatus*.

G

Antonius Gallus, *Parifinus*.
Coradinus Gilinus.

H

VVendelinus Hock de Brackenau.
Ulricus de Hutten, *Eques Germanus*.

L

Nicolaus Leonicens, *Vicentinus*.
Aloyfius Lobera, *Abulanus*.

M

Nicolaus Macchellus, *Mutinenfis*.
Joannes Manardus, *Ferrariensis*.
Nicolaus Malsa, *Venetus*.
Petr. Andreas Matthiolus, *Senensis*.
Petrus Maynardus, *Veronensis*.
Joan. Baptista Montanus, *Veronensis*.
Natalis Montefaurus, *Veronensis*.

P

Joannes Paschalis, *Suessanus*.
Laurentius Phrifius, *Germanus*.
Nicolaus Poll.

S

Antonius Scanarolus, *Mutinenfis*.
Leonardus Schmai, *Salisburgensis*.

T

Gaspar Torella, *Valentinus apud Hispanos*.

V

Georgius Vella, *Brixienfis*.
Andreas Vesalius, *Bruxellenfis*.
Benedictus Victorius, *Faventinus*.
Joannes de Vigo, *Genuensis*.

Prostant vero in altero Tomo, sed neque meliore ordine distributi.

B

Prosperus Borgarutius.
Leonardus Botallus, *Astensis*.

Ma-

Marinus	Brocardus, <i>Venetus</i> .
	C
Antonius	Chalmeteus, <i>Vergesacus apud Aniciensis</i> .
	F
Gabriel	Fallopius, <i>Musinenfis</i> .
Augerius	Ferrerius, <i>Tolesas</i> .
Dionysius	Fontanus, <i>Monspessulanus</i> .
Antonius	Fracantianus, <i>Vicentinus</i> .
Franciscus	Frizimelica, <i>Patavinus</i> .
	H
Petrus	Hafchardus, <i>Insulanus</i> .
	L
Joannes	Langius, <i>Lembergius</i> .
Dominicus	Leo, <i>Lunenfis</i> .
	M
Bartholomæus	Maggius, <i>Bononienfis</i> .
Bartholomæus	Montagnana, <i>Patavinus</i> .
	P
Mich. Joannes	Paschalis, <i>Valentinus Castellonenfis</i> .
Alex. Trajanus	Petronius, <i>Cittacastellanus</i> .
	R
Benedictus	Rinius, <i>Venetus</i> .
Guillelmus	Rondeletius, <i>Monspessulanus</i> .
	S
Josephus	Struthius, <i>Polonus Pofnanienfis</i> .
Joannes	Sylvius, <i>Insulanus</i> .
	T
Bernardinus	Tomitanus, <i>Patavinus</i> .
Petrus	Trapolinus, <i>Patavinus</i> .

Huic autem Collectioni, licet Editor in ea concinnanda multa peccaverit, ut infra videbimus ad annum 1728. acceptum referendum est, quod temporis diuturnitate non interciderint Opuscula variorum Auctorum, qui de lue venerea primi scripsere; qui morbi nascentis origini cœtanei vixere; & ex quibus licet certo cognoscere, quid olim de morbi origine Medici senserint, quæ fuerit varia diversarum methodorum curatoriarum successio, quid etiamnum de prima morbi causa, & tutissima therapeia sentiendum sit.

VICTOR TRINCAVELLIUS, Venetus, natus (a) anno 1496. Doctoris gradum adeptus est in Academia Patavina; ac Medicinam aliquandiu fecit in Murano, Insula Venetiis vicina; unde in Collegium Medicorum Venetorum adscitus est. Anno 1551. successit Joanni Baptiste Mon-

1568.
(a) Nicolaus
Comnenus
Padop.
Historie
Gymnasii
Patavini,
Tom. I.
Petrus
Castellanus,
in
vitis
il-
lustr.
Medicor
1568.

Montano, primusque Medicinæ practicæ Professor electus est in Academia Patavina, ubi decessit anno 1568. ætatis 72.

Auctor Historiæ Gymnasii Patavini adscribit illi *Traëctatum De Morbo Gallico*, a Bibliographorum nullo memoratum, ne quidem a Petro Castellano, qui vitam Trincavellii scriptis mandavit.

1568. GEORGIUS DORDONUS, Placentinus.

De Morbi Gallici Curatione Traëctatus quatuor. Papie apud Hieronymum Bartholum. 1568. in 8.

Testatur hic Auctor *Traëctat. 1. Cap. 6. se Lauream Coronam sumpsisse Placentiæ annos 23. natum; & tunc legere incapisse in Gymnasio Ticinensi sub Francisco Rege Francorum; unde liquet hæc ad annum 1522. ineuntem ad minus referenda esse, cum Franciscus I. Ducatu Mediolanensi cedere coactus fuerit anno 1522. mense Julio. Certe constat ex Cap. 7. Traëctatus ejusdem, Dordonum jam ab aliquot annis Papie habitasse, cum Rex Franciscus Gallorum captus fuit a militibus Casaris in anno 1525.*

Scriptit ille Ticini, dum Chirurgiam publice profiteretur, Librum de quo agitur, in quatuor partes sive Traëctatus divisum, in quorum, *Primo* de modum curandi morbum hunc per purgationes & evacuationes. *Secundo*, Per unctiones. *Tertio*, Per suffumigia seu suffitus. *Quarto & ultimo*, Per ligni Indici decoctum, necnon & per radicem Chinam seu Cynam, & Salsam-pariliam.

I. In Traëctatu primo Therapeia illa methodica proponitur, quæ ad præparandos, alterandos, evacuandos humores noxios olim adhibebatur, & quæ plurimam parum utilium remediorum farraginem admittebat. His itaque omisissis, notari tantum velim ab Auctore statui *Cap. 1. venereum morbum semper viguisse apud Indos Maurosqve* (hos enim cum Indis Auctor confundit errore maximo) *ex quorum regionibus vebitur lignum Indicum.... Cum ergo morbus iste a Mauris* (ab Indis) *originem contraxerit, ob loci distantiam, regionisque ignotionem non facile cognitus fuit, adeo ut non mirandum est si ab antiquioribus Medicis nulla facta sit ipsius mentio.*

II. In altero Traëctatu variis variorum linimentorum formulis, methodoque hydragryseos quæ suo ævo usu valebat, explicatis, addit: „ Si alibi „ qua ex causa oris exulceratio evitanda, & per alias vias & regiones materia ducenda sit cum materia ascendit ad superna, tunc propinandum esse pharmacum forte evacuativum, ut materia quæ deberet ad fauces ascendere transmittatur, & ducatur ad inferna. Hoc, inquit, observatum est a nobis in multis viris mulieribusque, qui pati non poterant oris fauciumque exulcerationem.,,

III. Tertio Traëctatu paucis exponitur tum suffumigiorum materia, tum modus suffumigia adhibendi; sed Auctor pluribus in locis indicat methodum luis curandæ tum unctionibus, tum suffumigiis a peritis Medicis non multum probari.

IV. In Tractatu quarto traditur multis electio, præparatio, administratio ligni Indici sive Guaiaci, cuius usum Mercurii usui Auctor præferendum esse censet.

Demum ad Operis calcem peculiaribus Capitibus exponit modum decoquendi Guaiaci in vino, ac rationem utendi radice tum Chinæ, tum Salsæ-parillæ, quam posteriorem non ita pridem notam esse dicit.

Hic Auctor dicitur per errorem *Dardanus* ab *Israele Spachio*, in *Nomenclatore Script. Med. Paschali Gallo*, in *Biblioth. Medic. & Zacuto Lusitano*, *Histor. Medic. princip. Histor. 73. Observ. 52.*

ANTONIUS SAPORTA, Monspelienfis, patrem habuit Ludovicum Saportam, Doctorem Medicum Monspellulanum. Ipse in Academia patria professorio munere fungi cæpit anno 1530. ad demum Cancellarius electus est anno 1566. post obitum Guillelmi Rondeletii. Denatus est anno 1573. Sed de illo fufius in *Historia Facultatis Medicæ Monspelienfi*.

De Tumoribus præter naturam Libri quinque, editi studio Henrici Gras Doctoris Medici Monspelienfis, & Practici Lugdunensis. in 12. Lugdun. 1642.

Constat hunc Tractatum ab Auctore scriptum fuisse post annum 1566. cum Rondeletii, cenjam defuncti, mentio ibidem fiat *Lib. 3. Cap. 49. Guillelmus Rondeletius*, inquit Saporta, *Collega olim meus*, &c. Sed tamen ante annum 1573. quo certum est Auctorem fato functum esse. Videtur ergo circiter ad annum 1570. referendus.

Prostant in illo Tractatu quædam *de Bubone venereo, & de Bubonis veneris Curatione*, *Cap. 18. & 19. Lib. 1.* Sed *Libro 3.* fufius agitur de *Lue venerea*, seu, ut Auctor dicit, *Morbo Parthenopæo sive Hispanica Lue*.

Itaque *Cap. 49.* Morbus definitur *contagiosus affectus ex vitiosi hominis aut mulieris contactu contractus, primum hepar, deinde reliquas corporis partes multifariam labefactans.*

Cap. 50. afferuntur morbi causæ, quales ab omnibus admitti solent, nempe usus rei veneræ, oscula, lactatio, suctio; quibus ille addit *inspiratum aerem a pessima illa qualitate conspurcatum*. Ibidem false irridet eos qui *carnosum panniculum in universo corpore diffusum, illudque regentem constituunt, a quo perniciosæ bujus labis scaturiginem emanare somniant.*

Deinde signis luis veneræ propositis sequente Capite, Curationem explicat *Cap. 52.* asseritque post decentem usum rerum non-naturalium, debitaque noxii humoris concoctionem sudores movendos esse linimentis, emplastris, ceratis, suffitibus mercurialibus, aut instituta victus ratione ex *Guaiacini Ligni decocto, Sarzæ-parillæ vel Cbinæ.*

Præfert usum Mercurii usui Guaiaci, statuitque eos *cæcutire & ballucimari, qui hunc pessimum morbum sine bydragyro depellere scribunt . . . cum experientia omnium rerum magistra compertum sit hunc morbum sine bydragryri soda.*

1570.
1624.

sodolitis curari non posse, quamvis ex illius mala administratione multa corpori incommoda suboriantur.

Si qui vero morosi unguentorum aut suffusum usum respuunt.... tunc instituendam esse suadet eam victus rationem, quæ ex lignorum decocto paratur; quæ quamvis in longius tempus curationem protrahat, a tam nefanda perniciæ (si recens sit) nihilominus plerisque liberare quotidiana experientia docet.

1570.

LUDOVICUS ISLA, Medicus Lusitanus.

Traſſatus De Morbo Gallico.

Laudatur a Zacuto Lusitano, *De Med. princip. Histor. quest. 37. & a Nicolao Antonio in Biblioth. Hispana.*

1575.

ANDREAS ALCACAR, sive ALCAZAR, Guadalaxarensis in nova Castilia, Medicus ac Chirurgus, & in Academia Salmanticensi primus Chirurgiæ Professor, edidit in fol. Salmantice anno 1575. *Libros sex de Chirurgia, quorum Primo, De Vulneribus capitis; Secundo, De Vulneribus nervorum, aliisque ipsorum affectibus; Tertio, De Vulneribus thoracis; Quarto, De Vulneribus ventris inferioris; Quinto, De Pudendagra vel Mentagra vel Lichenis, vulgo Morbo Gallico; Sexto demum, De valetudine tuenda tempore pestis.*

Liber quintus qui *De Morbo Gallico* inscribitur Capita 28. complectitur, sed breviter & quæ in summa paginis 50. comprehenduntur.

Horum *Primo* affirmat morbum hunc antiquum esse in Orbe olim cognito, ac testes profert 1. Plinium *Cap. 1. Lib. 26. Historiæ Naturalis*, ubi de Mentagra, quæ in Italiam olim adventavit *Tiberii Claudii Cæsaris principatu*. 2. Hugonem Senensem *Consilio 70. ubi de juvene quodam viginti annos nato, qui ostreacas testaceasque pustulas totum corpus ambientes patiebatur, cum intensis doloribus noctu magis molestantibus, diuque lentescensibus*. 3. Avicennam (a) *Capite 2. Canonis*, ubi legitur; *Tbus illitum cum aceto conferre dolori qui nominatur compositus, ex quo proveniunt in corpore sicuti verrucæ, cum quadam re quæ est sicut ambulatio formicæ*. 4. Demum ipsum Hippocratem *Aphor. Sect. 3. Aphor. 20. ubi de Lichenibus*. At inde liquet non quidem luem veneream olim notam fuisse, sed luem illam ab Auctore cum herpetibus ac Lichenibus, affectibus olim notis perperam confundi.

(a) Locus ille ex Avicenna mendose adducitur.

Secundo vero contendit novam morbi illius in Europa, ut ipse credit, recrudescens invasionem deducendam esse non a navigationibus in Insulas Indiæ Occidentalis institutis Christophoro Columbo ante annum 1493. sed ab usu humanarum carniarum quæ militibus clam exhibitæ fuerunt circa annum 1556. cum Joannes filius Renati Andegavensium Ducis belaret cum Alphonsi Neapolis Rege; ac in testimonium assert Historiam seu potius fabulam a Leonardo Fioravanti scriptam, de qua vide supra L. 1. c. 8.

Deinde *Cap. 5.* quatuor distinguit morbi species, Primam, cum ipsi ægritanti pustula in pudendo vel sede, vel excoriatio in gutture apparere cæperint,

perint, vel itidem pustula in fronte & capite pullulare: Alteram, cum adest articulatorum dolor, quem interdum tubercula comitantur, interdum vero alopecia: Tertiam, cum non solum pustulis atque articulatorum doloribus, sed etiam ulceribus corpus afficitur, skirrhusive tuberculis, modo dolorificis, modo doloris expertibus: Quartam demum, cum corpus non solum ulceribus, aliisque affectionibus dictis affligitur, sed etiam ossium corrosione & carie atque febricula corpus extenuante.

I. Credit Cap. 7. primam speciem curari posse dicta, levi decocto ligni sancti, exercitio, usu syrapi sancti Ambrosii ex milio decocto in aqua pluviali, addito vino sub decoctionis finem; topicisque nonnullis medicamentis ad pustulas extirpandas.

II. Ad secundæ speciei curationem proponit Cap. 9. & 10. 1. Decoctum legitimum Guaiaci sive ligni sancti, cujus defectum supplere possunt carca-parilla, vel radix Chinæ. 2. Topica varia caustica, in primis pulverem Joannis de Vigo sive præcipitatum rubrum, quem ait Leonardo de Bertapallia notum fuisse.

III. Ad curationem tertiæ speciei fatetur Cap. 11. & seqq. adhibendas esse inunctiones mercuriales, cum topicis aliis medicamentis. Multa itaque præfatus de natura, temperatura & usu Mercurii, tandem illitionis methodum explicat Cap. 19. Nempe 1. Jubet partes ante illitionem speri calide decocto aromatico florum rorismarini, cbamæmeli, meliloti, foliorumque lauri, stachados lavendula &c. 2. Unguentum adhiberi duos aut tres menses ante confectum, ut ipsius argenti viri malitia aliquatenus corrigatur. 3. Vetat eo inungi ventriculum emunctoria, spinalem medullam, atque articulos. 4. Cenlet ab illitione abstinendum esse, si quod symptoma accidat, ut animi deliquium, vel alvi profluvium, sed facta aliqua interpolatione, & natura confortata, ad linitionem redeundum esse. 5. Damnat quasi infestissimum quorundam Medicorum usum, qui diebus illitionis jam fluxis catharticum solutivum ægrotis extemplo exhibebant; hinc enim, inquit ille, materies morbi, quæ oris expuitione præsertim evacuat, per pharmaco exhibitum ad interiora resbabitur. 6. Dicit, præstare a linitionis initio ad finem usque expuitionis, calamus vel annulus auri vel argenti ipsum ægrotum inter dentes retinere.... ut exhalationes argenti viri aliquatenus venenosa intra os minime retineantur sed foras evadant.

IV. Ait demum Cap. 23. ad curandam quartam morbi speciem opus esse post universaliora remedia, Mercurii unktionibus, suffitibus & vomitoriis; Unktionibus quidem fortioribus, quæ plus argenti viri contineant; suffitibus, qui cinnabarum præcipitatumque Mercurium recipiant; vomitoriis cum cataputia minore ad 3j. & pulvere Joannis de Vigo seu præcipitato rubro ad dosim gr. iv. vel cum Stibii seu antimonii optime præparati gr. iv. quod devoratum vomitionem & alvum ciendo miro modo prodesse dicit; sed
quo

quo præsidio nonnisi in robustis habitudinibus vel asrabiliſſa pituitofave temperatura utendum eſſe cenſet.

Tandem poſtrema Operis Capita antidotarium continent, in quo, ut ait Auctor, varia medicamenta admodum huic morbo utilia atque experta inſcribuntur.

1575. AMEROSIUS PAREUS, Lavallensis Cenomanus, natus anno 1510 Chirurgiæ Lutetiæ operam dedit, artiſque tyrocinia poſuit in Noſocomio Pariſienſi. Inde ab anno 1536. caſtra ſequutus Chirurgiam rara felicitate & dexteritate mira exercuit. Chirurgus fuit quatuor Regum Galliarum, Henrici II. Franciſci II. Caroli IX. & Henrici III.

Reſertur a Mezerai, *Abbrégé Chronologique ad an. 1560.* Pareum ve- niſſe apud aliquos in ſuſpicionem veneni inſtillati in aurem Franciſci II. quæ ſiſtuloſo ulcere male habebat, unde de medio ſublatus ille fuerit. Sed liquet ſuſpicionem & falſam & temerariam fuiſſe, quandoquidem Pareus primarii Chirurgi munere functus eſt apud Carolum IX. & Henricum III. Franciſci II. fratres germanos.

Exſtant Parei Opera Gallice primum edita in ſol. Pariſiis anno 1575. Latine dein a Jacobo Guillelmeau reddita & ibidem typis mandata anno 1582. Quarta editione Gallica, quæ prodiit anno 1585. Lutetiæ apud Gabrielem Buon Libri continentur viginti octo, quorum decimus nonus, in quo agitur de *Lue venerea*, complectitur Capita 40.

Ibi primum expoſita morbi natura & ætiologia Capitis quinque, novem ſequentibus curationes generales ſingulatim explicat, *Primam*, quæ Guaiaci decocto; *Alteram*, quæ inunctionibus mercurialibus; *Tertiam*, quæ ceratis & emplaſtris; *Ultimam* demum, quæ ſuffumigiis obtinetur. Inde proponit ſequentibus capitibus curationes particulares gonorrhœarum virulentarum; hyperſarcosium ſive caruncularum, quæ in urethra excreſcunt; bubonum venereorum, exoſtoſium, herpetum, ſurditatis &c. quæ a latente ſeminio venereo induci ſolent.

Utro ſatetur ipſe Pareus in Præſatione huic Libro præfixa, ſe non modo ſequutum eſſe methodum curatoriam luis veneræ jam ante propoſitam a Theodorico de Hery Chirurgo Pariſienſi, cujus doctrinam laudat impenſe, & de quo ſupra ad annum 1552. ſed integrum ſere illius Traſtatum a ſe deſcriptum eſſe, ut a quo, ſi ab ullo unquam alio, morborum venereorum ætiologia & therapeia accuratiſſime expoſitæ fuiſſent.

Deceſſit Pareus Lutetiæ anno (a) 1592. ætatis proinde 82.
 1577.
 1581.
 (b) In *Præſat. 8.* & non 1539. ut per errorem dicitur (b) a Petro Caſtellano, inter Philiatros nomen dedit in Monſpelienſi Academia anno 1550. & Guillelmum Rondeletium Magiſtrum habuit. Ad Doctorem gra- dum.

(a) Index
 junereus
 Chirur-
 gorum
 Pariſien-
 ſium.

(b) In *Præ-
 ſat. Illu-
 ſtr. Me-
 dicorum.*

dum eveetus est anno 1558. Docendi munus ibidem adiit circa annum 1559. Cancellarius post obitum Antonii Saportæ electus est anno 1574. Obiit anno 1582. ætatis 53. Lumbariis, non quidem Convenatium, ut (a) vulgo dicitur, quæ Lombæ, sed Albigenfium, quæ Lombers dicuntur, qua de re vide Petrum Borellum, *Antiquitez de la Ville de Castres*, Liv. 2. Chap. 21. De eo multa in Historia Facultatis Medicæ Montepellulanæ.

Circiter anno 1577 (b) in Schola Montepelienfi publice discavit magno cum Medicina studioforum applausu, Tractatum de *Vairola magna sive Crassa Gallicis dicta*, qui anno 1581. a Marco de la Croix, Segusiano, Doctore Medico Montepelienfi & Jouberti discipulo editus est. Hoc Opus imperfectum est, deestque Liber secundus de *curatione Vairolæ magnæ*. Liber qui superest *Capita sex* complectitur, quibus de nomine, causis, contagione & signis luis venereæ, tam vulgaris ac ordine tam vulgari exponuntur, ut Liber ille Jouberti nomine parum dignus esse videatur.

I. Afferit Cap. 3. *luem hanc ex India primum ad nos venisse, Lusitanis, qui illuc patrum nostrorum memoria primi navigarunt, communicatam*. Sed fallitur dum Lusitanis acceptum refert, quod ad Hispanos vere pertinet.

II. Gravius ibidem hallucinatur dum putat luem veneream sobolem esse *Vairolæ parvæ* [variolarum] quæ apud Indos in calo fervidiore sævior sit nostra vulgari; unde cum Lusitani forte ab Indicis mulieribus eo morbo nuper defunctis vel mox ægrotaturis non abstinuissent, gravissimum inde malum istud reperturunt. Contra enim liquet certissimis testimoniis ab Europæis variolas in Indiam utramque inventas fuisse, ubi prius ignorabantur.

III. Rectius videtur sentire, dum ibidem prælagit *Vairolam hanc magnam seu grossam* (ut loquuntur Galli) *ab Indis acceptam, finem aliquando habituram esse, Deo volente, etsi contradicat Fernelius, quum per varia corpora transmissu facto exoticus affectus jam multo mitior evaserit, ut tandem inclinans & consensescens simplicis scabiei (quæ similiter est contagiosa) speciem sit adepturus; quæ eadem totidem fere verbis jam ante dixerat De Erroribus popularibus Lib. 2. Cap. 12.*

JULIUS PALMARIUS, Constantienfis Normannus, discipulus Joannis Fernelii, quocum sedecennium familiarissime vixisse [a] testatur, Doctor Medicus Facultatis Parisiensis, scripsit *Libros septem de Morbis contagiosis*, non sine ingenii & doctrinæ laude; quorum Primo & Secundo, de *Lue venerea*; Tertio, de *Hydrargyro*; Quarto, de *Elephantiasi*; Quinto de *Hydrophobia*; Sexto Septimoque, de *Febre pestilenti*. Primum editi sunt Lutetie Parisiorum anno 1578.

In tribus illis Libris, quibus agitur de lue venerea, multa exstant egregia de natura, causa, origine morbi; methodisque curatoriiis, 1. Ufu Guaiaci, Salsæ-parillæ, Chinæ; 2. Suffumigiis; 3. Inunctionibus, &

4. Præ-

(a) Teissier, *Eloges des Hommes Savans*.

(b) In Epistola nuncupatoria Marci de la Croix.

(c) In Præf. præfixa libris de lue venerea.

4. Præparatis mercurialibus, quæ ipse vel invitus cogitur laudare: Cæteroquin Fernelii Præceptoris sui vestigiis insistent in eo fere totus est, ut elevet Mercurii & Mercurialium utilitatem, quærum usum *crudelem* (a) *periculosam*, ac *nihilominus inconstantem* & *prorsus incertum* esse ait, cum e contra curatio luis venereæ, quæ per Guaiacum & Alexipharmacum fit, (b) *(certissima, tutissima ac facillima sit)*. Alexipharmacum autem sive Amuletum vocat opiatam, quam ipse concinnabat ex famosa utraque Fernelii opiata, *majori nempe & minore*, quarum ope Fernelius ab hydrargyri usu alienissimus olim ausus est perfectam luis venereæ curationem polliceri sine Mercurio, sed quarum inefficacia jam pridem ita explorata fuit, ut dudum a nemine adhibeantur.

(a) Lib.
2. De lue
venereæ
cap. 4.
(b) Ibid.

Videtur quidem paulo rectius sentire de Mercurii usu (Lib. de Hydrargyro, Cap. 7. & ultimo) ubi proponit *novam ac securam luis venereæ per hydrargyrum & alexipharmacum curationem*. At vero suæ opinionis nimium retinens hoc ipsum Caput concludit asserendo *curationem, quæ per Guaiacum & amuletum fit, brevior, tutior ac faciliorem existere; quæ vero per argentum vivum, longior, periculosior, & difficiliorem; ideoque consultius semper esse, si per ægri facultates licuerit, illo potius quam hoc modo, curari*.

In hoc tamen Palmarium laude dignum censemus, quod ingenue & vere proponat, quæcumque ad luis venereæ curationem efficacissima credit. Sane ipse sancte omnibus pollicetur in Præfatione *nullum a se remedium describi ac commendari, cujus ipse ante annos viginti in ægris multis periculum non fecerit; nihilque se polliceri, quod re & eventis non comprobetur, si quis descripta remedio laborantium corporum naturis prudenter accommodet*.

Id adnotatione dignum videtur, nempe juxta Palmarium. I. Inunctiones mercuriales (a), „ Duobus tribusve diluculis repetendas esse, deinde „ quatrimum saltem ab inunctione superlegendum, ne ea quotidie mane „ repetita, maxima humorum fusio ac partium colliquatio sequatur, quæ „ sputationem aut alvi tormina non facile cohibenda, forte etiam repentinam mortem accersat.

(c) Lib.
de hy-
drargy-
ro, c. 7.

II. „ In ipso vero tridui vel quatruidi intervallo convenire alternis diluculis simplici decocto Guaiaci sudores ciere; alternis alio decocto purgatorio alvum ducere, ut quidquid hydrargyrosis resolverit, vel in sudores digeratur, vel in alvum id depulsum expurgetur.

III. „ Qui facile in sputationem prolapsi putantur, per bidduum tantum inungendos esse; dein facto quatruidi intervallo ad unctionem remitti debere, ne continuata unctione in molestissimam illam sputationem præcipites ruant.

IV. „ Itaque eo modo inunctionem, sudorum profusionem & purgationem per alvum vicissim iteratas continuandas esse, dum morbus radicitus abactus sit.

JOANNES SCHENCKIUS A GRAFFENBERG., Friburgensis ^{1580.} apud Brisgoios, natus (b) anno 1530. & Doctoratus gradum Tubingæ ^{(a) Merc- klinus, in Linden. renovato.} adeptus anno 1554. Medicinam felicissime exercuit Friburgi in Brisgavia, ubi mortuus est anno 1598. ætatis 68. relicto filio Johanne Georgio Schenckio Bibliothecz Medicæ Auctore.

Observationum Medicorum & Chirurgicarum, rararum, novarum, admirabilium & monstrarum Libri VII. ab Auctore conscripti circa annum 1580. & paulo post Friburgi Brisgaviæ ab ipso editi in 8. post ejus mortem denuo excusi sunt Francofurti anno 1600. studio Joannis Georgii Schenckii ejus filii.

In hoc Opere sive hac Observationum Collectione, Lib. VII. *quo agitur de febris, morbis epidemicis, pestilentibus & contagiosis*, Schenckius exscripsit ex variis Auctoribus, quos apposito nomine laudat, Observationes 36. *de Morbo Gallico*; quarum multæ quidem utiles & indubiz sunt; nonnullæ vero pejoris notæ, quæ merito dubiæ, imo falsæ videntur.

JOANNES CRATO A CRAFTHEIM, Uratislaviensis Silesius, ^{1580.} natus (a) anno 1519. per sexennium VVittebergæ sub Martino Luthero ^{(b) Merc- klinus, in Linden. renovato.} Theologiæ operam dedit. Inde ad Medicinæ studium conversus, Doctoris gradum Lipsiæ affectus est. Medicinam fecit Uratislaviæ & Augustæ Vindelicorum; unde Vindobonam evocatus Archiater fuit per annos 26. ^{Et Melchior Adamus, in Viz. Medicor. Germanor.} trium Imperatorum Ferdinandi I. Maximiliani II. cui ipse facie similis erat, & Rodolphi II. Obiit Uratislaviæ anno 1585. ætatis suæ 66.

De Morbo Gallico Commentarius, studio & opera Laurentii Scholzii, Silesii, in lucem editus Francofurti 1594. in 8.

JOANNES ZECCHIUS, Bononiensis, natus anno 1533. in Gymnasio Bononiensi primus Professor Theoricus, florebat anno 1596. Medicus intimus fuit (b) tum Sixti V. tum Clementis VIII. summorum Pontificum. Patrualem habuit Hieronymum Bovium Episcopum Camerti, qui fuit Legatus summi Pontificis ad Poloniarum Regem, ut patet ex *Epistola nunciatoria* Scipionis ex Mercuriis, Romani Medici, ad Stephanum Battorum Poloniæ Regem, præfixa Tomo primo Operum Joannis Zecchii Bononiæ edito in 4. anno 1586. Obiit Joannes Zecchius anno 1601. (c) ætatis suæ 68.

Prostat autem ad calcem Tomi primi *Liber Joannis Zecchii De Morbo Gallico, a Scipione Mercurio, Romano Philosopho & Medico exceptus, & in Capita divisus, cum additis ejusdem Mercurii Scholiis.*

In illo Tractatu, qui *Capita 34.* continet, disseritur de Morbis venereis in genere & in particulari, circa quos eadem proferuntur quæ in Auctoribus illius ævi passim leguntur.

I. Indicat Auctor *Cap. 1.* luem veneream *Scabiem Hispanicam* dictam fuisse, quoniam duce *Christophoro Columbo* ex Indiis Hispani eam detulerint.

N n

Asse-

(c) Mangetus, in Bibliothec. Medic.

1586. (e) Mandosius, in viis Medicor. Pohri scior.

Afferit autem Cap. 4. cœpisse anno 1494. sub Carolo octavo F. rancorum Rege Regnum Neapolitanum invadente, sedenteque Alexandro VI. Pontifice maximo.

II. Proponit Cap. 6. & seqq. signa diagnostica & prognostica Morbi Gallici incipientis, confirmati, inveterati; ac deinde ad Luis veneræ therapeiam progressus primas defert decoctis sudorificis Guaiaeci, Chinæ, Salsæ-parillæ, quorum præparandorum methodum multis explicat Cap. 13. & seqq.

III. Quoniam tamen Morbus Gallicus adeo contumax est, ut æstio medicamentis seu decoctis nullo pacto cedat, fatetur Cap. 18. aliqua ab Empiricis adinventum fuisse præsidia, quæ tuta admodum licet non sint, correctæ tamen & morbo quadam tradita feliciter succedunt Inter quæ primum locum suffusus sive suffumigium obtinet. Cæterum admittit ibidem suffumigia duorum generum; alia ex materia benigna, quæ thus, loen, myrrham, cinnamomum, nucem Molchatum, lignum aloes, styracem, succinum &c. at vero Mercurium nullum; Alia vero ex venenosa, quæ non modo cinnabarium & præcipitatum Mercurium, sed etiam auripigmentum sive Græcorum, sandarcham recipiunt.

IV. Addit Cap. 20. superesse modo duo efficacissima præsidia etiam ex bydrargyrio confecta, sed admodum periculosa Inunctionem ex argenteo-virgo, & usum Præcipitati per os; Inunctio administrari debet juxta illum, tribus diebus continuus, & interpositis aliis tribus diebus repetatur denuo, quousque novem vicibus inungatur æger Usus vero Præcipitati per os assumpti a quibusdam summis laudibus extollitur in eradicando Morbo Gallico. Sed cum hoc medicamentum sit valde venenosum, & inter alia incommoda venas thoracis vel pulmonum frequenter disrumpat, nequaquam illud probat, imo ab ejus usu summo opere dissuadet quoscunque.

(a) Id refert Mercurialis ipse in Epist. nuncup. ad Maximilianum II. præfixa editionis. Librorum de Arte Gymnasica. 1587. (b) Castellanus, in vitis illustrium Medicorum,

Porro de Editore duo notari velim. 1. Ab illo asserti in Scholio ad Cap. 4. Morbum Gallicum suo tempore in manifesta declinatione positum esse. 2. Nomen Gallicum ab eo unica Inscripsum fuisse toto Libello, ut ipse monet in Præfatione; sed egregiam rationem mirare! Nempe ut inter hoc nomen Gallicum & adjectivam Gallicum discrimen statueretur, propterea quod, ut ipse ait, lues venerea imperite a Gallis denominationem traxerit, nec magis in Gallos sæviat, quam in Hispanos & Italos ..

HIERONYMUS MERCURIALIS, Foroliviensis, natus anno

1530. Jam ab anno 1562. (a) Romæ Medicum agebat Alexandri Farnesii Cardinalis, qui filius erat Petri Ludovici Farnesii, Ducis Parmensis, neposque Pauli III. summi Pontificis; (b) quousque. Senatus Veneti. Decreto anno 1569. munus ei delatum est, ut in Academia Patavina principem interpretandæ Medicinæ practicæ locum obtineret, quem Antonii Fracantiani obitus vacuum fecerat. Hunc Imperator Maximilianus II. ancipiti morbo impli-

implicatus * anno 1573. ob famæ celebritatem ad se accersivit. Redux eodem anno publicum Professoris munus in Patavino Gymnasio repetiit, donec anno 1587. in Bononiense, & anno 1599. e Bononiensi in Pisanum evocatus: est majoribus stipendiis. Forolivii in patria, in quam secesserat, obiit calculi dolore victus (a) anno 1604. vel (b) 1606. vel (c) 1607. ætatis proinde suæ 74. vel 76. vel 77.

Mercurialis Libri quatuor de Morbo Gallico.

Laudatur turris Joanne Colle, Bellunensi, *Cosmitoris Mediceæ Lib. 2. ubi de Chyæ va. dice*, tum a Zacuto Lusitano *de Medic. Princip. Historiæ, Lib. 1. Questione 43.* de quo tamen Opere mentio nulla est apud Bibliographos; si unum Joannem Georgium Schenckium excipias, qui in *Bibliotheca Medica*, inter cætera Mercurialis Opera, *Traçtatum De Morbo Gallico* videtur recensere.

LUCAS GHINUS, Bononiensis.

Morbi Neapolitani curandi ratio perbrevis. Spira Nemetum, anno 1589. in 8.

Ghinus in hac perbrevis Dissertatione, *omissis quæ de appellatione hujus morbi ejusque origine scribunt Auctores, rem ipsam aggreditur. Et primum Morbi Neapolitani naturam seu essentiam explicat, deinde causas, postea signa, denique curationem.*

Multus, imo vero nimius est in tradenda morbi curatione methodica, ad quam proponit remediorum farraginem; quæ singula, ut nullius prius utilitatis, jam pridem obsoleta sunt. Fatetur ipse, *si bis decenter peractis, æger nondum sanitati fuerit restitutus, ad fortiora remedia confugiendum esse, qualia varia a Medicis sunt excogitata & experientia comprobata...* Novo, inquit, & in doloroso morbo smilacis asperæ decoctum competere experientia constat..... Similiter & radicis Chinæ decoctum.... In morbo verò antiquato, Guaiaci decocto utendum esse censet, propter majorem ipsius caliditatem, quæ calor hepatis jam exolutus indiget, & quæ in crassiss humoribus incidendis & abstergendis opus est.... At si morbus intensissimos dolores copulatos habeat, inungendus erit æger argento vivo: Nam nihil æque ac tam cito, ait ille, dolores mitigat; quibus mitigatis, deinceps aliquo prædictorum auxilio erit curandus æger.

Circa inunctionem usum præcipit 1. Ut æger inungatur Luna decrescen- te, ut scilicet minor fiat affluxus humorum ad os; quasi vero Lunæ influxus, qui tot aliis rebus præesse creditur, salivationem quoque reget.... 2. Ut quotidie quidem semel inungatur, si vires consent; aliqui per intervalla, permittendo ut æger identidem quiescat, & rursus inungatur, idque tandiu donec

N n 2. sym-

* Non vero anno 1583. ut referunt Castellanus in *viis Medicorum*, & Commenus Papadop in *Histor. Gymnasii Patavini*: Siquidem constat omnium Historicorum testimonio Maximilianum II. Imperatorem die 12. Octobr. anni 1576. decessisse.

(a) Thuanus, in *Histor. sui temporis* ad anno 1604.
(b) Georg. Abrahams-Merklinus, in *Lindenio renov.*

1589.
(c) Nicolaus Comnenus Papadop, in *Histor. Gymnasii Patavini*

symptomata cessent . . . 3. Ut alvus ; si non respondeat , clyster elumatur , aut ager bora dimidia ante cenam 3 ij. storum cassia assumat ; Ea enim materias acres a sancibus avertit . . . Talibus inunctionibus curari credit non solum Gallicum , sed multos alios morbos difficiles , si opportunus earum situs .

Demum juxta Ghinum suffusus mercuriales longe efficaciores sunt inunctionibus , ideoque difficillimo & inveterato admodum morbo , talique qui alius praesidiis non cedit , competunt : Minime tamen , si ager sit biliosus , aut resolubilis , aut ex Morbo Gallico tabidus , aut asthmaticus , aut si virtus sit debilis .

1599.

HIERONYMUS CAPIVACCIIUS seu CAPO DI VACCA , seu

(a) *Israhel Spachius , in nomenclatura Scriporum Medicorum .* (a) CAPITAURUS , Patavinus , Medicinam (b) practicam Patavii docere cepit anno 1552. Anno vero 1561. ad Medicinam theoreticam extraordinariam secundo loco traductus est . Anno 1587. a Magno Etruriae Duce Francisco Mediceo per litteras invitatus ad principem in Gymnasio Pisano locum Medicinæ practicæ interpretandæ maximo proposito premio , annuere recusavit . Mortuus est anno 1589. Ingentes divitias arte sua consecutus erat , adeo ut cum magnificentissimas aedes extruxisset , insana substructione mantes quoque muro circumdederit .

(b) *Petr. Castellanus , in vitis illustrium Medicorum .* (b) Petr. Castellanus , in vitis illustrium Medicorum . Habitus est summus artifex Morbi Gallici curandi , ita ut ipse (c) citra jactantiam dicat , se lucratum fuisse ultra octodecim millia coronatorum ex hoc morbo . Creditus (d) est in curationibus ejusmodi arcano aliquo uti . Verum hoc ipse constanter inficiatus , Polono cuidam discipulo suo ut arcanum ipsum sibi proderet impense roganti respondit : *Lege methodum meam & habebis mea secreta .*

(c) *In fine section. 3. Lib. 5. methodi Pract. Medicin. .* Hieronymi Capivacii Academia Patavinæ Professoris ordinarii de Lue Venerea Acroasæ opera Philippi Schoppii edita Spira Nemetum in 8. 1590.

(d) *In Historia Gymnasii Patavini Tom. I. .* Auctor in illo Tractatu de morbis Venereis sigillatim differit sed eo ordine & eo rerum delectu quem in erudito Viro vix probes . Circa Theoriam inutilia multa tractat , ex Peripateticorum commentis : Circa Therapiam vero remedia quidem multa , sed parum probata , nec cum recta methodo curatoria satis convenientia congerit .

I. Capivacius parum satagit primæ originis Luis Venereæ ; „ Neque „ est , inquit , ut quis ita furiose perscrutetur , quisnam primus auctor „ fuerit illius primæ luis , quia dubio procul nova est hæc materia . „ Hæc causa quomodocumque fuerit genita , perinde esset ac si quis „ quæreret quodnam prius genitum esset , ovum an gallina .

II. Distinguit Luem veneream in hæreditariam & adventitiam . Hæreditaria potest a patre vel a matre produci . Credit vero adventitiam contrahi concubitu , lactatione , suctione lactis , osculo & dormitione cum infectis , si lintheamina sint sordida sudore vel sanie .

III. Quadruplicem admittit curatorium methodum 1. Ufu decocto-
rum

rum Guaiaci, Chinæ, Sarsæ-parillæ, Sassafras. 2. Inunctionibus mercurialibus. 3. Suffumigiis. 4. Ope Antimonii.

IV. Multis quidem describit & modum & tempus exhibendi decocta sudorifica; sed in quibus tamen ne lato quidem ungue discedit a vulgari methodo. Hanc curatoriam methodum cæteris credit præferendam esse, ceu minus periculosa.

V. Fatur tamen *hydrargyrum* efficacius esse ad debellandam luem veneream; ideoque quotiescumque lues venerea ad summum est contumax, & corporis conditio seu virtus permittit, non improbat si quis *hydrargyro* utatur. Cæterum Auctor est ut inunctio mercurialis fiat fricando Cbirsotecis, non nudis manibus, a partibus inferioribus ad superiores, non a superioribus ad inferiores, ut vis unguenti per poros melius ingrediatur. & ut non repetatur ultra septem vires, quia si ager non expuit in septem vicibus, nulla spes.

VI. Circa usum suffumigiorum asserit tutius esse & minus periculosum uti inunctione, quam suffumigio: Nam, inquit ille, suffumigium petis partes spiritales. Si tamen patiens sit robustus secundum thoracem & pulmonem, credit licere ad suffumigium etiam ascendere, ea ratione quia suffumigium, ut putat, efficacius est inunctione.

VII. Quod Antimonium, ait hoc in se habere, ut vehementer solvat per vomitum & secessum; sed quantum ipse experientia potuit colligere ac deprehendere, rarissime luem superare; ita ut Auctoris ea sit sententia in lue venerea desistendum esse ab Antimonio, & in reliquis fidendum.

Cæterum Tractatus illius summa prostat in sectione posteriore Lib. 5. *Methodi Practicæ Medicinæ* Hieronymi Capivaccii, quæ primum edita est a Joanne Hartmanno Beyero, Francofurti, anno 1594.

FELICIANUS BETERA, Brixianus.

1591.

De cunctis humani corporis affectibus: Magna scilicet & deleteria qualitate. De febribus malignis & pestilentibus, De Morbo Gallico, Venefico, Malignitate, Feritate, Cacurgia, Veneno, Corruptione, Putredine; Fermentatione. De putredinis pestilentis forma, morbisque fulminantibus, & vulgaribus pro tertii Libri Apborismorum ordine præfagiendis, desumpta occasione ex Peste Brixiana anni 1577. exactissima Tractatio, quæ in duodecim Libris resolvitur. Ubi tota sere ars Medica ad summum causarum, signorum, curationumque maximo cum ejusdem quotidianiano fructu, per divinum veluti quoddam sublimata est. Brixiz 1591. in fol.

1596.

PETRUS FORESTUS, Alcmarianus, natus (a) anno 1522. Doctorem Lauream Bononiz adeptus est. Parisiis, Pythureis, Alcmariæ, Delphis Medicinam fecit. Anno 1575. Lugduni Batavorum in Academia primum condita Medicinam profiteri cæpit. Mortuus est Alcmariæ anno 1597. ætatis suæ 75.

(a) Joan. Meurhus in Asten. Batav. Lib. 2.

N n 3

Obfer.

Observationum & Curationum Medicinalium & Chirurgicarum Libri xxxi 1. qui singuli diverſis annis ſucceſſive excuſi ſunt Lugduni Batavorum in 8. ab anno 1591. ad annum uſque 1606,

Liber ultimus, excuſus anno 1606. Obſervationes continet xxvi. de Lue venerea, cum Scholiis pro ea ætate nequaquam inficetis. Obſervationes videntur inſtitutz ab anno 1548. ad annum 1570. Ad curationem nullo diſcrimine adhibentur inunctiones mercuriales; decocta ligni Guaiaci, Salſæ-parillæ, Radicis Chynæ; quæ eo tempore uſu perinde vigeabant.

1596. VVILHELMUS CLOVVES, Anglus, Chirurgus Regius, ſcripſit Anglice anno 1596. & omnium Anglorum, quos noverim, primus Tractatum de Lue venerea cum Inſcriptione ſequenti.

A Brief and neceſſary Treatiſe touching the cure of the diſeaſe now uſually called Lues venerea, qui tertium Londini edebatur anno 1637. in 4.

Ibi Auctor ille *Capitibus* 13. diſſerit de origine, contagione, ſignis Luis veneræ, ſed brevi; multo fuſius vero de curatione, quam ait obtineri poſſe quadruplici via. 1. Suffumigiis. 2. Unctionibus mercurialibus. 3. Decoctis ſudorificis. 4. Præparatis mercurialibus interne adhibitis, inter quæ laudat Turpethum minerale. & Mercurjum quemdam, quem diaphoreticum dicit, & cujus proceſſum ipſe reſert.

Notatu dignum videtur hunc Chirurgum ægrotantibus Auctorem eſſe in ſingulis fere Tractatus Capitibus, ut peritos Medicos de morbis veneris conſulant, ſi quis nodus inciderit difficilior; quam modeltiam in pleriſque Chirurgis nunc merito requiras.

1596. AURELIUS MINADOUS, Rhodiginus, patrem habuit Joannem Baptiſtam, Philoſophum & Medicum præſtantiffimum; fratrem vero Joannem Thomam Minadous, qui apud Ducem Mantuæ Medici officio functus aliquot annos, poſtea anno 1596. primarius fuit Medicinæ Profeſſor in Academia Patavina.

Aurelius Medicinæ ſtudiuit Patavii, ubi Hieronymo Capivaccio Profeſſore uſus eſt, ut ipſe (a) teſtatur. Deinde Medicinam Venetiis fecit, ac ibi edidit *Tractatum de Virulentia veneræ anno 1596. in 4.* ad Laurentium Priolum S. R. E. Cardinalem & Patriarcam Venetiarum ſcriptum, & *Capitibus* 47. comprehenſum.

(a) Cap. 43. Libri ſui de virulentia veneræ.

Primis 29. *Capitibus* & ad naſeam diſſerit de definitione luis veneræ, ac expendit ſigillatim reſutatque definitiones ab aliis propoſitas.

Incipit in morbi originem inquirere *Capite* 30. cenſetque „ ortum hu-
„ jus virulentiz fuiſſe ex corruptione diverſorum ſeminum in utero im-
„ pudicarum mulierum adjuvante ſorditie, per quas ſæminas ſolum Indi-

„ cas

cas intelligit. Illæ enim mediantibus cœlo, aere, aquis & locis illis ex peculiari victus forma & actionum suarum sordida atque impura materie contrahunt, vel rectius sibi adgenerant hoc venenum, quod deinde ad nos delatum est tempore Columbi, & mediantibus exercitiis Hispanis & Gallis per contagium serpsit.

Expositis in sequentibus Capitibus contagionis viis; ac differentiis signisque diagnosticis & prognosticis luis venereæ, ad curationem progreditur, circa quam

I. „ *Afferis* (a) Experimento probatum esse fonticulorum usum Gallica lue vexatis opportunissimum esse..... Unde fere neminem reperire licet ab hac lue detentum, qui cauteria maximo beneficio & juvamento expertus non fuerit..... Tamen pro comperto haberi non tantum posse cauteria, ut ipsa sola valeant integre corpora infecta ab omni labe expurgare, nisi pariter tantum præsidium aut præcesserint, aut concomitentur, aut etiam subsequenter idoneæ Antidotum ad ministraciones. „ (a) Cap. 38.

II. *Statuit* (b) rationem curandi per suffumigia omnino debilem & inefficacem ac prorsus vanam esse, cum morbum integre demoliri & vincere pollicentur; sed in uno casu maxime probari cum nimium alicujus partis suffumigabilis dolores lenire decrevimus, cujus utilitatis exempla multa ipse vidit. „ (b) Cap. 40.

III. *Damnat* (c) externum hydrargyri usum, quo observavit ipse non paucos pejora symptomata expertos esse..... & ita exagritos, ut ferme numquam priorem corporis statum, nedum integrum sanitatis habitum, recuperaverint Neque internum hydrargyri usum magis probat; licet enim ipse periculum nunquam fecerit, testatur a se visos fuisse nonnullos, qui licet per multos dies devoraverint quosdam bolos, qui argentum vivum receperant, nec sanati ab ipsa lue, nec in meliorem statum permutati fuerunt. „ (c) Cap. 41.

IV. Universam (d) morbi curationem a sudatione expectandam esse credit, quam movet ope æstuarii & decoctorum sudorificorum ex Guaiaco, quod *Regem*; falsa-parilla, quam *Reginam* (e) dicit; ex China & ex falsasfras, vel ut ille scribit, *Saxifras* &c. quorum administrandorum methodum multis describit *Capp.* 43. & 44. „ (d) Cap. 42. (e) Cap. 41.

V. Inter (f) Antidota luis venereæ recenset *Tberiasam Andromachi*, confessionem *Cyproidem* ejusdem a Galeno descriptam *Lib. 8 De compositione Medicamentorum secundum locos. Cap. 7. Uvas passas, bepar lupi, mechoacanum*, & alia hujus generis, quæ tanquam plane inefficacia dudum ab omnibus explosa sunt. „ (f) Cap. 43. & 44.

VI. Mirari subit probandum suscipi a Minadoo (g) *Gallicum Morbum* non esse *Cbimericum* aut *fictitium* sed *verum atque reale*. Aderant „ (g) Cap. 47.

nempe ejus ætate, qui objicerent hanc luis venereæ opinionem inventam esse a Medicis, qui *lucri cupidi aut ægritudinis ignari* antiquo, sed male cognito Morbo Gallico nomen imponent, ut tegerent ignorantiam vel pecuniam ab ægris extorquerent. Et quidem facile crediderim olim non defuisse Medicos, qui luem veneream satis temere aliquando causarentur quasi fomitem morborum difficiliorum quorum causa latebat, quamquam a lue venerea non dependerent, qua sane culpa nec ætas nostra satis vacat. Sed hæc qualicumque supponantur, non opinionem de luis venereæ existentia, sed Medicorum quorundam fidem elevant.

1597 HERCULES SAXONIA, Patavinus, natus anno 1551. (a) patrem habuit Ludovicum, avum Hieronymum, & patrum Victorem Medicos aut artis medicæ Professores eximios. Doctor in patria renunciatus Medicinam per annum publice docuit; sed (b) professione, quaungebatur, *Senatus Veneti Decreto sublata, Venetias se recepit, ibique Medicinam facit, tando ad summam famæ gloriam grassatus est. Per hæc absumptis octo annis, successor Hieronymo Caprivaccio designatur anno 1590. in Academia Patavina. Anno 1573. Hieronymum quidem Mercurialem, quem Maximilianus II. Imperator ancipiti morbo implicitus ad se accersebat, in Germaniam comitatus est; sed in errore versantur (c) qui Saxoniam ipsum a Maximiliano accitum fuisse narrat; cum enim tunc annum vix attigisset vicissimum secundum, nondum eam adipisci potuerat famam, quæ Maximiliano sui desiderium moveret. Decessit Saxoniam anno 1607. ætatis 56.*

(a) Petrus Castellanus, in vitis illustrium Medicorum.

(b) Ibid.

(c) Ut Merklinus, in Linden. renov.

Luis venereæ perfectissimus Tractatus ex ore Herculis Saxonie, Patavini, Medici clarissimi, in Academia Patavina ordinario loco Professoris exceptus &c. &c. luci datus opera Andreghetti Andreghetti Medici & Philosophi Patavini. Patavii in 4. 1597.

Quæcumque ad luem veneream pertinent, in illo Tractatu Capitis 41. enucleate explicantur, ut ferebat temporum illorum ratio.

I. Censet Cap. 2. primam morbi originem non repetendam esse ab influu syderum, aut Saturni, Martis & Veneris conjunctione, sed ab Indicarum congressu mulierum, quæ ex Indiis primum in Hispaniam, mox Neapolim navigarunt, & Caroli VIII. Gallorum Regis exercitum infecerunt. In hoc tamen videtur errare, cum mulieres nullas ab Indiis in Hispaniam decessas esse noverim.

II. Contagionem admittit multiplicem Cap. 2. nempe usu veneris, lustratione, simplici vulvæ fricatione, profuso osculo ex muliere circa oris partes laborante, dormitione in stragulis vel lintheaminibus venefico hoc sudore repletiis. Cæterum subdubitat an lues contagiosa esse possit 1. Dormitione

cum infecto, absque ullo contactu, si lintheamina munda fuerint. 2. Usu eorundem poculorum, & accubitu ad eandem mensam, ut voluit Rondeletius. 3. Obstetricationis ministerio, ut existimavit Fernelius. Jure quidem de duobus primis, ac de tertio contagionis modo ambigit immerito.

III. Statuit Cap. 5. luem veneream suo tempore multo seviorem esse quam ab initio: Nam, pergit ille, tria tantum observarunt priores Medici, qui de hac lue scripserunt, Aquilanus, Leonicens, Natalis Montesaurus &c. Affectus scilicet cutaneos sub forma impetiginis & pustularum, Dolores & Tumores contingere. Paucis post annis alia quinque his tribus connexa sunt, defluvium capillorum, unguium, dentium, oculorum; & gonorrhoea ... Hoc tempore lues venerea est omnium malorum principium, ut ideo potius innumera quam innumerabiles sint differentiae. Sed de his vid. supra Lib. 1. Capp. 12. & 13. ex quibus liquet luem veneream, etsi paucioribus symptomatis forsan stiparetur, initio crudeliorem fuisse quam aliquanto post intervalla.

IV. Tres admittit methodos curatorias, nempe Unam usu decoctionum sudorificorum ex Guajaco, China & Salsa-parilla; Alteram inunctione mercuriali; Tertiam ope suffumigiorum. Quamvis ad usum decoctionum plurimum propendeat, fatetur tamen Cap. 39. affectus venereos esse usque adeo contumaces, qui decocto ligni Indici usque ad dies etiam quinquaginta semel, bis, & ter rite administrato numquam cessarunt, in deterius lapsi sunt In his credit satius esse medicamento uti alioquin periculoso, quam insanabile malum relinquere. Porro Mercurii usum tam parum periculosum esse putat, ut ibidem Leonardi Boralli lubens sequatur consilium, statuaturque cum eodem, pueros ac mulieres blando linimento inungi posse, addatque se hac aestate mense Julio mulierem inunxisse, quae integre est curata, Videtur tamen Auctor ille credidisse hydrargyrum non esse luis Alexipharmacon, sed copiam tantum humorum viscidorum expurgare; quibus expurgatis, Alexipharmacon prompte & fortiter operatur.

V. Usus preparatorum Mercurialium interne exhibendorum parum probat, excepto praecipitato quodam rubro cum auro, cujus processum ipse explicat, cujus processum jam ante ab Antonio Gallo Cap. 2. & Gabriele Fallopio Cap. 79. explicatum fuisse fatetur; cujus processus, sed in nonnullis emendatus, nunc nullibi non prostat.

VI. Observationes duas refert Cap. 37. de gonorrhoea, certe falsas; Usque adeo de Medicis etiam verum est, quod de Philosophis Cicero olim dixit; nihil scilicet tam absurde dictum, quod a Philosophorum quodam dictum non sit. Sciendum est, inquit Saxonia, quod habui a quibusdam expertis Venetis. Dicunt se a gonorrhoea statim curatos usu veneris cum muliere Aethiope. Experimentum est verum Haec quoque scio, si tamen litteris con-

consignare licet, antiqua gonorrhœa plures fuisse liberatos, qui cum uxore virgine rem habuerunt; sed tunc mulier infectur.

Cæterum Tractatus ille ab Andreghetto Andreghetto editus anno 1697. constituit Lib. 9. *Pansbei Medicinæ Selecti Herculis Saxonis*, a Petro Uffenbachio ejus discipulo editi anno 1603. qui Liber totus est *de Lue venerea seu Morbo Gallico*.

1598. FRANCISCUS DE VILLALOBOS, Hispanus, „ Doctor (a) Medicus, Caroli Cæsaris Aulæ domesticus, ac Philippi Principis, scriptor patrio sermone, si D. Thomæ Tamajo fides habenda sit. „
 Antonio, in Bibliothec. Scrip. prov. Hispan.
Tratado de la Enfermedad de las Bubas, quem Salmanticæ produisse ait in folio, anno 1598. sed quem nec ipse usurpavi, nec ab ullis Bibliographis memorari memini.

1599. EDITIO altera VENETA COLLECTIONIS LUISININÆ. Refert Petrus Bonnet Bourdelot, de quo supra pag. 454. in Annotationibus destinatis ad amplificandum Mercklini Opus *De Scriptis Medicis* & in Bibliotheca Regia exstantibus Collectionem Venetam posteriorem, quæ studio & opera Aloysii Luisini, Utinensis Medici, Venetiis prodierat annis 1566. & 1567. ex Officina Ziletti, ibidem iterum recusam fuisse anno 1599. apud Baretium, cum sequente inscriptione.

Apbrodisiacus sive de Lue venerea in duo volumina bipartitus, continens omnia quæcumque hactenus de hac re sunt ab omnibus Medicis conscripta, ubi de ligno Indico, Salsa-parillia, Radice China, Mercurio, cæterisque rebus omnibus ad hujus Luisi profligationem inventis diffusissime tractatio habetur, ab excellenti Aloysio Luisino Utinensi Medico celeberrimo novissime collectus, in fol. 2. volum. Venetiis, apud Baretium 1559.

De hac altera Collectionis Luisininx Editione intelligendus est procul dubio Vir clarissimus Hermannus Boerhaave, dum in Præfatione Editioni Lugduno-Batavæ ejuldem Operis præfixa, de Editionibus Italicis hujusce Collectionis verba facit plurali numero, unde manifeste arguitur Collectionem illam Luisiniam in Italia semel atque iterum recusam fuisse.





DE MORBIS VENEREIS.



LIBER SEXTUS.

Index Chronologicus Auctorum, qui de Lue
venerea scripserunt ineunte seculo deci-
mo septimo ad hanc usque diem, cum bre-
vi plerumque Operum Analyfi & Epicrisi.



PROGREDIMUR sensim ad nostra tempora, ideoque quæ-
cumque ad Luem veneream spectant, longo rerum usu cer-
tiora fiunt, & ad Theoriam, atque Therapejam, quales
nunc vulgo receptæ sunt, paulatim comparari videntur.

I. Vix amplius ambigitur de prima morbi origine ex insu-
lis Americanis, nisi forsitan apud illos quibus Medica mor-
borum historia plane inaudita est, & qui anno ipso 1701. *censebam ante se
neminem extitisse, qui venereorum morborum causas, differentias, signa, &
curationem tradidisset.*

II. Una omnium confessio est morbum ex se & solo rerum non-natura-
lium vitio numquam generari, sed contagione tantum contrahi aut hære-
ditate venire: Quin imo, etsi constet a parentibus syphiliticis plures mor-
bos a lue venerea degeneres jure quasi hæreditario in liberos manare, ut
Strumas, Rachitidem, Tineam, Lichenes, Impetiginem &c. negant
tamen Medicorum non pauci luem veneream legitimam ea ratione traduci
unquam posse.

III. Liquet ipsæ rei evidentia venenum, seu ut vulgo dicunt, virus
venereum coagulatorium, corrosivum, phlogisticum esse, seu coagulandi,
corro-

corrodendi & inflammandi facultate pollere, quod medicinæ morbofaciendæ sufficit. Quæcumque visum est superiore seculo Medicis Cartesianis, Gassendistis, Chemicis & Hypotheticis, quibus *quidlibet audendi semper fuit æqua potestas*, ultra comminisci de indole arlenicali, de acida aut salso-acida natura, de acuminata aut hispida figura primigeniarum molecularum illius veneni, hæc omnia dies jam pridem delevit: Quo exemplo moniti velim ut Medici tandem discant non tam causarum sagitare, quæ plerumque inaccessible sint, quam effectuum, qui sunt conspiciui, & quos nosse Medicorum potissimum interest.

IV. Obsolevit sensim, seu inefficax, hidrotica sive sudatoria luis venereæ curandæ therapeja ex decoctis lignorum Guaiaci & Sassafras, radicumque Chinæ & Sarsæ-parillæ; ac in locum successit omnium suffragio usus Mercurii, qui jam a cunctis habetur certissimum luis venereæ Rhizotomum & unicum alexicacum.

V. Rarius in dies usurpantur ac in desuetudinem paulatim abeunt præparata Mercurialia, non quod ea quæ nunc in honore habentur, nocua sint, sed quod omnia perinde vana & irrita frustra sint in curanda lue venerea, præsertim si confirmata fuerit. Quamobrem usu receptum est uti tantum illitionibus mercurialibus, quæ si legitime administrantur, neque ægrotorum, neque medentium spem unquam fallunt.

VI. Tandem abrogatis largioribus & quotidianis illitionibus, quæ si a periculo forte, ab infortunio saltem nunquam tutæ erant, jam solemne est, quod olim fuit in votis plerorumque Medicorum, unguentum mercuriale & parciore dosi & longiore intervallo ægris illinere, unde tutissima medendi ratio. Utinam liceat aliquando unguenti dosibus, & illitionum intervallis ita modum adhibere, ut ea medendi methodus, non cæco casu, ut plerumque solet, sed certo consilio regatur, & cum jam tutissima sit, efficacissima quoque tandem fiat.

SECULUM DECIMUM SEPTIMUM.

1600.

JOANNES SAPORTA, Monspelienſis, Antonii filius, in Academia Mospessulana professorium munus adiit anno 1597. In locum absentis Andreæ Laurentii Cancellarii Vicecancellarius electus est anno 1603. mortemque obiit anno 1605. Plura de illo in Historia Facultatis Medicæ Mospessulanæ.

Tractatus de Lue venerea ab Henrico Gras Doctore Medico Monspelienſi editus ad calcem Librorum Antonii Saporæ de Tumoribus præter naturam.

Breviſ

Brevis ille *Tractatus Capita quindecim* complectitur, quorum primo statuit Auctor *luem ex India* * *Calicut in Europam fuisse advectam anno 1494.* *Carolo V. imperante* (ut ille, sed manifesto anachronismo credit) *Mox fædo militum Gallorum & Italorum concubitu cum Scortis ab iudis & Hispanis corruptis totam Galliam & Italiam pervasisse.* ... *Prioribus annis immitem apud nos & feracissimam fuisse, nunc posteriorioribus hisce* [scilicet desinente sæculo decimo sexto] *faciliorem tolerantia & curatione evasisse.*

Explicatis in sequentibus Capitibus natura, caulis signisque morbi, ex legibus Peripateticæ & Galenicæ Theoriæ, qualis tunc temporis vigeat in Scholis, ad curationem demum accedit *Capite 12.* Præmittenda censet venæ sectionem, purgationem, alterantium¹ usum multiplicem, quibus leviozem luem profligari posse putat. *Quod si lues altiores infixit radices tunc puris utendum esse alexipharmacis censet.* ... *Talia sunt Guaiacum, ejus cortex*, Sassa-parilla, Sassafras & Cbinna*, quorum administrandorum methodum describit.

Verum si lues venerea, ut non raro contigit, tantæ sit activitatis, ut iis non superetur, experientia compertum est ad usum hydrargyri recurrendum esse. Ipse enim, inquit ille, animadverti in praxi plurimos diuturniori tempore Guaiaci decocto frustra fuisse usos, qui statim hydrargyro suero saturati. Quare ut gravia afferat symptomata prave administratum, sic post universales purgationes plurimum mihi commendatur in lue venerea contumaci.

Tribus autem modis administratur, in unctione, in suffumigio, & in pilulis. Duos primos sigillatim explicat, ut suo tempore solebant administrari. Circa tertium vero refert frequentissimum apud Nostrates (Monspelienfes) exhibendi hydrargyrum modum esse per os in pilulis, quæ ipsum vel præcipitatum recipiunt, quibus etiam aliqua purgantia miscentur. Quod consilium, addit ille, si methodice fiat, plurimum mihi probatur.

Demum tribus postremis Capitibus agitur paucis de *Therapeia particulari symptomatum venereorum*, de congrua sex rerum non-naturalium administratione in lue venerea, & de prophylaxi a lue venerea. Sed in illis nec novum, nec singulare quidquam occurrit.

PETRUS DE TORREZ, Darocensis in Aragonia, Medicus fuit & ^{1600.} Chirurgus Mariæ Austriacæ Imperatricis, scripsitque Hispanice sequentem Tractatum.

Libro, que trata de la enfermedad de las bubas. En Madrid. Anno 1600.
in 4.

Auctor Capitibus 33. sigillatim agit de luis venereæ origine, differentiis, signis, ulcusculis venereis, phimoli & paraphimosi, porris, gonorrhœa, abscess.

* Ignarus ille Geographiæ Orientales Indias cum Occidentalibus turpi errore confundit.

abfcessibus veneris, stiopecia, gummatibus, pustulis, doloribus veneris, ac demum de morbi curatione, ad quam proponit triplicem therapeiam, nempe unctiones mercuriales, suffumigia ex Mercurialibus præparatis, & usum decoctionum Guaiaci, Chinæ & Sarsæ-parillæ. Adjectum est ad Operis calcem Antidotarium, ubi proferuntur syrupi, apozemata, unguenta, emplastra, pulveres, conservæ & vina varia, quæ Auctoris ætate in usu habebantur in Hispania; sed quæ jam pridem obsoleta sunt.

Asserit autem inunctiones mercuriales cæteris methodis curatorii plurimum præstare; singulo tantum die adhibendas esse, imo in debilibus non nisi tertio quoque die; demum dosim unguenti ad frictiones singulas adhibendi esse posse in robustioribus duarum vel trium unciarum, sed in debilioribus unius tantum uncie cum semisse: circa quod advertatur velim, unguentis quæ ab illo ad hydrargyrosim proponuntur, aliis vix sextam, fortissimis quintam tantum Mercurii partem contineri; unde liquet quanta cum prudentia inunctiones ab illo adhibitæ fuerint.

1598.

1601.

(a) Petrus

Castella-

nus, in

vitis illu-

strum

Medico-

rum.

ALEXANDER MASSARIAS, Vicentinus, „ in (a) patria an-
nos viginti quinque artem feliciter exercuit.... Anno 1578. Vene-
tias se contulit, ubi spatio novem annorum tantum famæ consecutus
est..... ut Senatus Venetus Mercuriali non visa fuisse, ut ait Castella-
nus parum memor eorum quæ ipse dixerat in vita Hieronymi Mercurialis,
sed Bononiam maioribus stipendiis evocato, eum aptissimum esse cen-
suerit, quem in principem profitendi locum illi successorem daret anno
1587. Decessit Patavii senio confectus, anno 1598.

*Practica Medica seu Prælectiones Academicæ continentes methodum ac ra-
tionem cognoscendi ac curandi totius humani corporis morbos, ad nati-
vam genuinamque Hippocratis & Galeni mentem vere optimeque institu-
tam, in antiquissimo & celeberrimo Patavino Gymnasio habitæ. Cum
Libro de Morbo Gallico. Francofurti in 4. 1601.*

1602.

ANDREAS LAURENTIUS, Arelatensis, Doctoralem Lauream
adeptus in Academia Monspeffulana anno 1583. professorium munus
ibidem suscepit anno 1590. Cancellarius electus est anno 1603. Fuit
Archiatros Mariæ Medicæ anno 1603. & ipsius Henrici IV. anno 1606.
Mortem obiit anno 1609. Plura de eo in Historia Scholæ Monspeffu-
lanæ.

*Operum Tomus alter continens Scripta therapeutica, ubi agitur Libro
singulari in Capita 20. distributo de lue venerea. Francofurti 1621.
in fol.*

Auctor ille nihil quidquam affert quod sit notatu dignum. Docet qui-
(b) Capp. dem [b] luem veneream esse morbum novum, Veteribus ignotum, ab
1. & 2. elephantiasi sive lepra, mentagra Plinii, lichenibus seu imperigine Anti-
quorum, albitim Avicennæ, demum a Græcorum psora diversum; ex

Amo

America in Europam ab Hispanis delatum; eurari vero (a) therapeia methodica, quæ dicta, pharmacia & Chirurgia perficitur, sed raro perfecte eradicari nisi antidotis specificis, qualia sunt decocta ligni Guajaci, salz-parillæ, radice Chinæ; inunctiones & suffumigia ex Mercurio.

Cæterum miris laudibus (b) extollit Guajacum quasi certissimus luis venereæ antidotum. Ait [c] vero radices salz-parillæ & Chinæ utilitate sua non destitui, sed Guajaco virtute inferiores esse. Censet [d] Mercurium, licet a multis reprobetur, (unum laudat Fernelium) posse tamen, modo prius axungiis temperetur, & corrigatur oleis quæ cerebrum & nervos corroborent, extus adhiberi, si opus fuerit, morbusque cæteris auxiliis repugnaverit, sed tamen caute. Denique [e] statuit ulum suffutium mercurialium summe periculosum esse.

Constat Tractatum de lue venerea a Laurentio scriptum fuisse anno 1602. cum alserat (f) luem veneream in Europa primum apparuisse anno 1495. referatque ibidem eandem jam ab annis 107. per totam Europam sævire.

JOSEPHUS QUERCETANUS, Armeniacus, id est DU CHE-
SNE d'Armagnac, in Germania diu commoratus est, ubi Chemiæ operam dedit sedulam, ac plurimum celeberrimorum Medicorum amicitiam sibi comparavit, ut ipse testatur *Hermetica Medicina defensionis* Cap. 1. Ad Lauream Medicinalem promotus fuit in Academia Basileensi circa annum 1573. cum in *Consilio* 30. typis edito anno 1603. ipse referat, se jam per triginta annos remedia, quæ adversus Luem veneream efficacissime valent, comprobasse. Lutetiam deinde venit, & inter Medicos Regios ordinarios Henrici IV. cooptatus est, ac Medicinam in hac urbe fecit non sine aliquo nomine, sed cum summa Medicorum Parisiensium invidia, a quibus male habitus est, tanquam Chemicus, Aretalogus, Circulator. Obiit ibidem (g) anno 1609. ætatis jam provectæ, ut liquet ex ipsius *Consilio de Arcbritide & calculo*, ubi se senem dicit.

Inter alia non pauca Auctoris illius Opera extat *Liber de priscorum Philosophorum veræ Medicinæ materia, præparationis modo, atque in curandis morbis præstantia*, Genevæ primum editus in 8. anno 1603. ad cujus calcem adjuncta sunt Consilia Medica quatuor, quorum tertium agit de *Lue venerea*.

Docet ibi Quercetanus I. Luem veneream morbum in Europa novum esse; ex India ab Hispanis importatum; qui in Gallia primum apparuerit post reditum Caroli VIII. ab expeditione Neapolitana.

II. Huic morbo Medicinam plerumque fieri usu hidroticorum, decocti scilicet Guajacini, cujus administrandi methodum satis fuscè descri-

(a) Capp.
8. 9. &
seqq.

(b) Cap.
11.
(c) Cap.
13.
(d) Cap.
14.

(e) Cap.
15.
(f) Cap.
16.

1603.

(g) Gui
Patin.
Lettre 31.

describit. Attamen libere fatetur quod res est, nempe remedium illud solum a se insufficiens esse deprebensum in lue inveterata.

III. „Primas ergo in hoc morbo tribuendas esse Mercurio, qui unicum, verum, solum specificum sit luis remedium etiam inveteratæ & deploratæ, quidquid in contrarium scripserit Fernellius, quo remedium mediis genere in Gallia ditissimi, delicatissimi, magnæque existimationis homines hac lue infecti feliciter tractari solent; unde fit ut Auctor fat multis agat de Mercurii electione, probatione, præparatione, mixtione & administratione.

IV. Demum non paucas esse tum Guajaci, tum Mercurii præparationes, quas Auctor ad morbum utiliter valere censet ex præjudicio quod apud Chemicos novum non est; Guajaci quidem aquam subacidam, spiritum acidum, oleum &c. ex Guajaci scobe affusa aqua destillata ex arte; Mercurii vero præcipitata varia, Turpethum minerale, Mercurium vitæ &c. quæ singula jam ante 25. annos in pharmacopœa sua spagyrica a se propolita fuisse gloriatur.

(a) De Scriptis Medicis. 1604. EUSTACHIUS RUDIUS, Bellunenſis, & non Utinenſis, ut a (a) Lindenio & (b) Mercklino dicitur, Amicus & Concivis Joannis Colle, ut testantur ipsius Colle Opera, fuit (c) in Gymnasio Patavino primarius practicæ Medicinæ Professor ab anno 1599. ad annum 1611. quo mortuus est. Succelserat Alexandro Malsariæ.

(c) Hist. via Gymnasii Patavini, Tom. I. 1604. 1608. De Morbo Gallico Libri quinque a Mundino Mundinio e privatis domi legentis ore excepti, atque ita divisi, in Capitaque distributi, Venetiis 1604.

FABIUS PACIUS, Vicetinus, Alexandri Malsariæ concivis, neposque ex conjugē, ut ipse Malsarias refert, *Dissertationis de Scopis mittendi sanguinis*, parte 2. natus anno 1547. Doctoralem Lauream accepit anno 1575. sed jam antè cœperat Medicinam Vicetiz facitare ab anno 1568. cum ipse in *Appendice ad Lib. 7. methodi Medendi*, quam constat ex præfixa Præfatione ante annum 1608. scriptam fuisse, referat, se quadraginta jam annos in Medicina faciendâ in civitate numerosissima cum optimis Medicis non otiose versari. Denatus dicitur anno 1614. ætatis 67.

Vicetiz excudi curaverat in folio anno 1598. *Commentarium in sex priores Libros Galeni Methodi medendi*. Anno 1608. edidit ibidem eadem forma *Commentarium in septimum Galeni Librum*, cum adjecto ad calcem *Traſtatu de Morbo Gallico per Methodum curando*, quem circa annum 1604. scriptum fuisse ex eo palam est, quod Fabius referat Morbum Gallicum 110. ante annis in Italia, Gallica expeditione ad Neapolim se exeruisse.

Postquam multis disputavit in illo Traſtatu juxta Peripateticorum dogma-

dogmata, de natura, definitione, subjecto & contagione Morbi Gallici, ac de putredine, a qua ortum habeat; inquit in ejusdem originem, ac contra vulgarem opinionem contendit morbum illum novum non esse; quod ut evincat 1. Ait nullum symptoma in Morbo Gallico evenire, quod antiquam appellationem & naturam non habeat. Quasi vero ex eo quod singula symptomata seorsim olim nota fuerint, liceret inde colligere peculiarem eorundem symptomatum syndromen a contagione venerea oriundam, quæ nunc *Lues venerea* appellatur & de qua quæstio est, antiquitus cognitam fuisse. 2. Adducit aliquot Martialis loca, ut *Epigram. 66. Lib. 2. de Cæciliani ficis*, & 70. *Lib. 7. de familia ficosa*. 3. Profert locum illum Juvenalis in *Satyra 2.* ubi Poeta acriter insectatur vanum probitatis simulatorem, qui cum hispidis membris & atroci anima o muliebria pati solebat, unde *Mariscas* contraxerat. Sed hæc argumenta plane futilia sunt, neque opinioni de antiquitate luis venereæ dare pondus idonea, ut supra probatum est *Lib. 1. Cap. 2.*

Quod ad curationem, tres distinguit Morbi Gallici species, *Incipientis, confirmati, & inveterati*. 1. Ad incipientem adhibet tantum dietam, universalialia medicamenta, ac topica multigena, quæ levioribus morbis venereis, ulcusculis pudendorum, gonorrhææ, bubonibus &c. medeantur.

2. Ad confirmatum, præter remedia eadem, laudat usum Guaiaci, Salsæ-parillæ, Radicis Chinæ, imo ligni Juniperini, quo *Franciscum Anzolellum* avum suum maternum, & *Victorem Trincavellium* feliciter olim usos esse refert.

3. Jubeat ad curandum Morbum Gallicum inveteratum decocta sudorifica intendi, victumque siccantiorem adbiberi. Suffumigia quidem tunc non reprobant, si ex aromatis componantur; Damnat vero quæcumque ex metallicis parantur, cinnabri præsertim, adjectis aromatis, quæ usque adeo suspecta illi sunt, ut miretur fuisse aliquem, qui vel ea præscribere, vel præscriptis uti ausus sit.

Circa inunctionem ex hydrargyro, fatetur eam nescio quid habere securius ac probabilius quam suffumigia, & se tamen nemini unquam suaserit, aliquibus tamen qui eam usurpandam deliberassent, præsto fuisse componendi rationem edixisse Chirurgo, inungenti adstisse, ægrum debita purgatione paravisse, membra principalia antidotis præmuniuisse, symptomata supervenientia correxisse, mitigavisse, reliquias veneni bebetavisse atque discussisse.

De eventu quoddicam hoc habeo, *pergit ille*; ex decem inunctis, hominibus vix unum sanitatem, incertam tamen ac veluti fucatam esse, consecutum; reliquos partim nihil profecisse, partim & deterius habuisse, ut qui appendicem malorum reportaverint, dolorem articulo-

O o

,, rum,

rum, oris ulcera, fœtorem, perpetuum salivæ fluxum, tinnitum aurium, visus obscuritatem, & alia fortasse.

Confitetur tamen, qui *gummatibus tophisque scaterent*, iis magno inunctionem subsidio fuisse, ut quæ duritiem ac tumorem omnem aut prorsus abolevisset, aut magna ex parte mollesceret ac minueret.

Cæterum videtur Auctor ille potius Cathedrarius Professor fuisse, 1605. quam Medicus Practicus.

LUDOVICUS MERCATUS, sive DE MERCADO, Hispanus, ex urbe Pincia, hoc est urbe Vallejoletana in Vetere Castilia, vulgo *Valledolid*. patriam Academiam [a] plurium annorum professione nobilitavit. Inde accersitus ad Regiam a Philippo II. totos viginti annos ejus valetudinem felicissime rexit; quo defuncto eidem officio vacavit apud Philippum III. ejusdem filium. Demum (b) annum agens 86. suppressa ex calculo urina per dies 18. in acerbissimis cruciatibus obivit.

(a) Nicolaus Antiochus, in Bibliotheca Hispana (b) Petrus Castellanus in *visis illustrum Medicorum*. Opera omnia quinque Tomis comprehensa, & in viginti Tractatus divisæ, quorum *septimus*, qui prostat in Tomo 2. agit de Morbo Gallico. Tomus autem ille secundus primum prodit Vallejoleti in sol. anno 1605. Deinde cum cæteris Tomis simul editus est Francofurti anno 1620.

Hujusce Tractatus de Morbo Gallico Libri duo sunt, quorum *Primus continet omnia quæ ad ejus naturam, & curationem generalem pertinent; Secundus peculiarem quorumcunque accidentium medelam.*

(c) In primo Libro legere est 1. [c] Morbum Gallicum novum esse & ortum non multis annis Monstra proinde fingi ab iis qui asserunt non esse novum affectum, sed reducibilem ad veteres.

(d) Cap. 2. Morbum illum (d) contagione contrahi, congressu, basiatione, adhesionem cutis ad cutem, communione lecti, indumentis, vasibus.

(e) Cap. 4. 5. 6. 7. 3. Hunc morbum (e) præmissa præparatione methodica curari posse [f] 1. Decoctis Guaiaci, spartæ-pavellæ, & radicis Cbina. 2. Inunctionibus mercurialibus, quibus ait (g) Medicos omnes sua ætate frequentius uti, quantumvis tinnidi aut cautiore sint, quia experimento didicerunt fere omnibus profuisse, etiam illis quibus nullum aliud auxilium præstiterat. Eas tamen inunctiones cæteris tutiores esse docet, quæ parum argenti recipiant, modo ad 15. aut 20. dies continuentur, ne quæ supersunt fermenti veteris vestigia reversionem morbi iterum efficiant. 3. (b) Suffumigius, quæ dicit aliquando plurimum invaluisse, sed suo tempore sponte ab usu recessisse.... quia tam seva & periculo plena existunt, ut vix prudens & cordatus Medicus eis uti tuto possit.

(b) Cap. 12. 4. Demum Cap. 13. proponit pro conterendis morbi reliquiis varia auxilia, quæ sibi ratione & experimento probata esse asserit, ut apozemata, syrupos, aquas stillatitias, pilulas, pulveres, condita &c. sed quæ singula plane inefficacia sunt.

In secundo Libro sigillatim explicat *Capitibus* 10. methodum medendi variis affectibus venereis, ut *maciei*, *doloribus*, *buboni*, *tumoribus*, *ulceribus*, *pustulis* & *gonorrhœæ*; ac multa proponit medicamentorum genera, quæ sua ætate usû recepta erant, sed pleraqueque ex Galenica Pharmacia deprompta.

ANDREAS DE LEON. *Dubium* (a) *est an Granatæ ortus fuerit, an incola?* Certe Medicam & Chirurgicam artem Granatæ exercuit, imo & in ipsa Aula Regis Hispaniarum Philippi II. expeditionis Lusitanæ tempore, anno scilicet 1580.

1605.
[a] Nicol. Antonio, *Bibliotheca Hispanica*.

Exstat Tractatus hispanice scriptus, cujus titulus est.

Practica de Morbo Gallico, en el qual se contiene el origien, y conoscimientoto desta enfermedad, y el mejor modo de curarla. Pincie 1605. in 4.

BARTHOLOMÆVS PERDULCIS, Helvius seu Vilvarienensis, natus (b) Bovilleuci, in Oppidulo Pagi Helviorum anno 1545. Doctorem Lauream Lutetiæ obtinuit anno 1572. Ibid. Medicinam majori celebritate docuit quam fecit. Fato functus est ex apoplexia anno 1611. ætatis suæ 66.

1605.
[b] Ejus vita a Renato Moreau scripta & Operibus Barth. Perducci præfixa.

Universa Medicina ex Medicorum principum sententiis consiliisque collecta.

Opus editum a Renato Charterio Parisiensi Medico, Parisiis anno 1630. in 4.

Perdulcis duodecimo hujus Operis Libro, qui de contagiosis & cutaneis affectibus inscribitur, agit *Capite IX.* de lue venerea, ac quæ jam millies dicta erant repetit, morbum novum esse, & ab India Occidentali in Europam deductum; curari, si recens sit, decocto ligni sancti, radicis Chynæ, sarzæ-parillæ; si difficilior fuerit, opus esse inunctionibus, suffitibus, cataportis ex Mercurio.

JOANNES VARANDÆVS, Nemausensis, ad Doctoralem gradum promotus anno 1587. in Academia Monspessulana, Professor Regius ibidem renuntiatus est anno 1597. Ad Decanatum pervenit anno 1609. Obiit anno 1617. Plura de eo in Historia Scholæ Monspeliensis.

Tractatus de Elephantiasi seu Lepra; item de Lue Venerea & hepatiide seu hepatitis atonia. Genevæ 1620. in 8. qui Tractatus prostat pag. 294. in Collectione Operum omnium Varandæi, studio Henrici Gras typis edita Lugduni anno 1658. sub inscriptione *De Morbis hepatitis & lienis.*

Ibi differit Varandæus de lue venerea *Capite unico*, nec quidquam affert quod ante vulgatum non fuerit. Morbi originem ab India arcessit, & luem illam ab elephantiasi diversam esse statuit probatque.

Putat morbum eo magis sævire, quo frigidior est Regio in quam irrepit, unde frigida & crassa magis retinentur; ideoque apud Lutetiam Parisiorum & [c] Rothomagum & similes urbes ferociorem esse hunc affectum, quam in Occitania aut Hispania.

(c) Vid. quæ de de lue venerea Rothomagensi diximus supra pag. 451.

Quod ad curationem præmissis præparantibus remedijs, quæ sunt ex purgantium & alterantium familia, deinde refert *allata esse ad vos duo ligna & totidem radices ex Indiis, quæ ad hoc peculiarem habent energiam, lignum scilicet Guaiacum & lignum Sassafras, radicem Sassa-parille & radicem Chinæ.*

Esse princeps & veluti regium medicamentum in hoc affectu Guaiacum seu lignum Sanctum, ita ut merito verum istius luis Alexipharmacum seu Bezoaricum appellari debeat, quia ad certam, citam & tutam luis venereæ curationem omnibus alijs præpollet.

Sassafras, Salliam-parillam & Chinam virtute cedere Guaiaco, sed Sassafras valde esse commodum omnibus iis, qui ex lue venerea diutius sæviente in apæstians, cacexiam, aquam intercutem & alias passiones hydropicas inciderunt, aut qui tumores frigidiore patiuntur. Salliam-parillam habere proprietatem quandam ad dolores artuum sedandos. Radicem Chinæ credi atrophie ex morbo isto comparatæ, fluxionibus acerbis & asthmatis convenire.

Hydrargyrum medicamentum esse malignum & deleterium, si per se spectetur attamen non esse rejiciendum in hoc affectu, cum & in scabie & lepra jam olim feliciter fuerit usurpatum; sed eo utendum in rebeli constitutione, aut malignorum ulcerum & dolorum feritate, quæ alii remedia prius commemoratis cedere non potuit: Summa tamen cautione, ut neque puerulis, neque senioribus, nec gravidis mulieribus, aut paralyti, nervorum imbecillitati vel anginæ obnoxii exhibeatur, neque febricitantibus, aut valde macilentis.

Demum balnea naturalia aquarum thermalium magis nocere quam professe, ut compertum est ex balneis Belilucanis (de Baleruc) quamvis generosissimis, ex quorum usu lue venereæ affecti gravius se se habere consueverunt.

Explicata generalli luis curatione, proponit deinde therapeiam particularem singulorum affectuum, qui lucem veneream velut affecta præcedunt, vel comitantur; sed de his jam latius.

1610. HENNINGUS ARNISAEUS, Halberstadiensis, in Academia Helmstadiensi fuit Medicinæ Professor, unde in Daniam advocatus est ad Archiatri munus. Sane eo fungebatur officio apud Christiernum IV. Regem Daniæ anno 1630. quo Antonius Guntherus Billichius Epistolam dedicatariam ad illum scripsit, quæ præfixa est Libris duobus *Observationum ac Paradoxorum Chimiaticorum*. Fato functus est anno 1635.

Scripta Disputationem de Lue venereæ cognoscenda & curanda, editam Oppenheimii 1610. in 4.

1611. TANEQUINUS GUILLAUMET, Chirurgus Nemaufensis.

Traité de la Maladie nouvellement apellée Chyalline, par T. Guillaumet, Chirurgien du Roi, Docteur & Maître Juré en la Cite de Nismes.

Lyon 1611. in 12.

Hic

Hic Auctor videtur non semel in hoc libello *CrySTALLINE* nomine Inflammatorios vel Oedematodes tumores Præputii aut Balani in viris, Cadurcorum aut Nympharum in mulieribus intelligere. Ut plurimum tamen CrySTALLINAM cum Lue venerea perfectissime confundit.

Capitibus decem fatis brevibus, quibus Liber absolvitur, multa effutit de Luis venereæ natura, causa, symptomatis, signisque diagnosticis atque diagnosticis, sed nullo ordine atque judicio. Ad therapeiam, prout sua ferebant tempora, proponit decocta e Guaiaco, suffumigia & cerata Mercurialia, vel varia Mercurii præparata interne exhibenda.

HORATIUS GUARGANTUS, Soncinenſis.

1613.

Responsa varia ad varias ægritudines, & in primis tres Tractatus, unus de Dysenteria, alter de Morbo Gallico, tertius de Febre pestilentiali & de Peste. Venetiis 1613. in 4.

JOANNES MACOLLO, Scotus, typis mandavit Florentiæ in 12. anno 1616. dum Professor erat Medicinæ Chymicæ in Universitate Pisana, 1612.

Theoriam Chymicam luis venereæ, quæ Hermetica Medicina Elementa pandit.

Ac deinde in 8. Londini anno 1622. dum inter Medicos ordinarios Jacobi I. Magnæ Britanniæ Regis adscriptus erat,

Latriam Chymicam exemplo Therapiæ Luis venereæ illustratam.

Uterque libellus ejusdem plane farinæ est, & filo putido, infuslo & metaphorico kriptus, qualis Chymicorum esse solet, ut vel ex luis venereæ definitione patet, quam *Theoriæ Chymicæ Cap. 3.* proponit. „Lues venerea, inquit, impuritas est salis & Mercurii specifica & contagiosa, prognata e feminibus, quæ prius in superiore orbe delitescencia, po- steaque germinantia, quædam corpora humana parata ad ea suscipienda primo invadere & ad alios contage vel hereditario jure propagata sunt. „

In priore Tractatu *Capitibus quinque*, quæ Theorica sunt ita generice tractantur, ut nihil fere sit quod ad luis venereæ Theoriam pertineat. Nee dispari methodo in posteriore, qui *Capita sex* continet, post ineptias multas ita succincte agitur de Therapeia luis venereæ sex postremis Libri paginis, ut nomine tantum proferantur sequentia remedia, nempe Mercurius Vitæ ex Butyro antimoniali; Pulvis ex solutione ejusdem Butyri in spiritu nitri, & solutione duodecimæ partis auri in aqua Regia, quæ igne lente primum exsiccante, deinde violento in pulverem calcinantur; Extracta, Olea, Salia Guaiaci, Salsæ-parillæ, Chinæ &c. Mercurius sublimatus dulcis; Inunctiones mercuriales; Emplastra & Suffumigia mercurialia. Iis autem cursim indicatis Auctor sequenti Epiphonemate Librum audacter concludit: *Interim Vos, o summi Chymici,*

Antiquarii Hippocratista, Nugigeri Galenibiles, Barbari Avicennates, in medicis agrorum plantibus utimur foro. Valete & Plaudite.

1166. EITEL JOACHIMUS KRUPPELIUS.

De Morbo Gallico 1616. in 8.

1605. FRANCISCUS RANCHINUS. Monspelienſis, Medicinæ nomen dedit in Facultate patria anno 1587. Doctoris gradum consecutus est anno 1592. Professorium munus adiit anno 1603, successitque mortuo Joanni Saportæ. Cancellarius electus est anno 1612. in locum Andræ Laurentii jam a tribus annis fato functi, ac demum mortem obiit anno 1641. Plura de illo in Historia Facultatis Medicæ Monspeſſulanæ prædiciem edenda.

Ranchinus, cum professorium munus nondum adeptus Andræ Laurentii absentis nomine Medicinam doceret, Chirurgis publice prælegit Quæſtiones Chirurgicas, ut in Facultate Monspeſſulana tunc ex ulu fuit, quas ante annum 1605. publici juris fecit cum inscriptione sequente.

Quæſtions Francoiſes ſur toute la Chirurgie de Gui de Chauliac, diviſees en trois Parties.

Ibi Paris 2. Sectione 3. Lib. 7. ex occasione Leproz nonnulla quærit de Lue venerea.

Nempe I. *An lues illa ſit morbus novus, & qui Antiquis ignotus fuerit?* Respondet affirmative ac opposita argumenta paucis diluit, sed satis erudite.

II. *An lues eadem morbus calidus ſit frigidusve?* Respondet natura frigidum, ex accidente calidum eſſe.

III. *An hepar ſit in lue venerea pars vitio affecta?* Respondet affirmative ex præjudicio, quod ipſius ætate adhuc valebat.

IV. *An lues venerea contactu contagioſa ſit?* Respondet affirmative.

V. *An Guaiacum ad curandam luem veneream faciat?* Respondet affirmative.

VI. *An liceat argentum vivum adhibere ad luis curationem?* Respondet argentum vivum adhiberi poſſe, ſi cætera remedia blandiora prius adhibita fruſtra fuerint.

Scriptit idem de eodem argumento Tractatum alterum ex præcedente quidem concinnatum, ut ipſe conſitetur in Præſatione, sed duplo auctiorem & in duas partes diſtributum, *Alteram* de Morbi Ætiologia, quæ Capita 10. *Alteram* de ejuſdem Therapeia, quæ Capita 32. continet. Huic autem ſequentem inſcriptionem præfixit,

Traite de l'origine, nature, cauſes, ſignes, curation & preſervation de la Verole, qui Tractatus proſtat inter illius Auctoris Opuſcula, Lugduni edita in 8. anno 1640.

Docet ibi ut in priore Tractatu, sed paulo fuſius.

I. Luem

I. Luem veneream (a) morbum esse novum, Veteribus ignotum, qui in Europa sæviat circiter ab annis 120. unde colligere facile est Tractatum hunc circa annum 1620. scriptum fuisse. (a) Partie 1.
Chapp. 1
& 2.

II. Luem veneream [b] a lepra diversam esse natura, causa, symptomatis, curatione. (b) Ibid.
Chap. 7.
Et Traite de la
Lepre, Chap. 8.

III. Therapeiam sudorificam, [c] qualem præstant decocta Guaiaci, Sassafras, Chinæ, Salsæ-parillæ, utilem esse ad recentiorem & levio-rem luem. (c) Part. 2. Chap. 7. 8. 9. 10
& 11.

IV. Sed Mercurio (d) utendum esse ad curandam luem veneream, quæ confirmata & difficilis est, & quæ sudorificorum efficaciam frustrata fuit. (d) Ibid.
Chap. 16
& 17

V. Usum quidem [e] inunctionum mercurialium, & ceratorum vel emplastrorum, quæ Mercurium recipiunt tutum esse: Suffumigiorum vero Mercurialium periculi plenum. (e) Ibid.
Chap. 18

VI. Argentum vivum (f) crudum sed terebinthina extinctum ore tuto exhiberi posse in pilulis; at vero non ita Mercurium præcipitatum rubrum, ut qui acrimonia seu potius deleteria vi damna ciat aliquando gravissima. (f) Ibid.
Chap. 18

VII. Symptomatis variis, (g) quæ illitionibus, emplastris vel suffumi- giis Mercurialibus inducuntur, arte varia medendum esse, quam ipse explicat. (g) Ibid.
Chap. 19

VIII. Cætera luis venereæ (h) symptomata, gonorrhæam, tumores testium, urethræ carunculas, bubones, virgæ ulcera, crystallinas, verrucas, pustulas, alopeciam, venereos dolores, ossium cariem, gumma- ta nodosque peculiaribus remediis curanda esse, qualia ille recenset. (h) Ibid.
Chap. 20
& sui v.

IX. Denique (i) nulla certa methodo posse quemquam, qui venere vulgivaga uratur, a lue venerea tutum se præstare. Censet tamen ad hunc finem profutura esse remedia a Fallopio olim proposita, aliaque nun- nulla, quæ ipse proponit, quæ tamen ambo remediorum genera constat nul- lius efficacitatis esse. (i) Ibid.
Chap. 32

Cæterum illi duo Ranchini Tractatus, tum re, tum stilo inter medio- cres numerandi sunt, ut & pleraque alia ejusdem Auctoris Opera. (k) Ora-
tio Pa-
negyric.
Daniel.
Sennerti
ab Augu-
sto Buch-
nero di-
cta in
Acade-
mia Vit-
teberg.
anno
1638.

DANIEL SENNERTUS, Uratisaviensis in Silesia, natus anno 1572. patrem [k] habuit Nicolaum Sennertum Calcearium. Doctoris gradum VVittebergæ assecutus est anno 1601. Ibidem professorium munus suscepit anno sequente 1602. In numerum Medicorum cubiculariorum a Joanne Georgio I. Electore Saxoniz adscitus anno 1628. Obiit VVittebergæ anno 1637. ætatis anno 65.

Opera omnia in tres Tomos divisa, in fol. Ibi Libro 6. De Morbis ocul- zarum qualitatibus, Parte 4. Sennertus disserit de lue venerea. Nihil qui- dem in ea diatriba neque novum, neque rarum est, sed omnia ita ad

nitorem, ordinem, elegantiam, perspicuitatem concinnata, ut in hac sola lucubratione paucis contracta & digesta videas, quæ in immensis Voluminibus nullo ordine sparsa sunt: Quod de cæteris omnibus Sennetti Tractatibus dictum volo.

1622. VICTOR MANGGUS, (a) Schattenchalenſis, (b) vel Schrattenchalenſis.

(a) Manggeus, in Bibl. Med. die. De Lue venerea Disputatio. Exstat Decade IV. Disputationum, quas collegit & edidit Basileæ Joannes Jacobus Genathius 1620. in 4.

1620. MATTHIAS UNTZERUS, Hallenſis in Saxonia; natus est (c) anno 1581. Medicinæ operam dedit Lipsiæ, Tubingæ, Patavii, ac demum Basileæ; ubi Doctoris titulo insignitus est. Medicinam fecit in urbe patria, ubi mortem ex acuto morbo oppetiit anno 1624. ætatis 43.

(c) Ex illius Epitaphio commentationi ejusdem De Sale præfixo. Anatomia Mercurii Spagirica, seu de hydrargyri natura, proprietate, viribus & usu, Libri duo. Hallæ Saxonum 1620. in 4.

In priore quidem Libro continentur Capita 23. quibus Untzerus multa refert de natura, indole & usu Mercurii, tum Chimico, tum Medico, tum Mechanico; & quod ad institutum nostrum propius spectat, sedulo inquirat Capite 18. num hydrargyri in unctio conveniat in lue venerea, ac penſitatis rationum momentis in utramque partem, affirmative concludit, sed restrictæ: *Hydrargyrosin perite circumſpecteque a prudenti Chirurgo institutam, aliis tamen non neglectis convenientibus remediis, non esse semper rejiciendam, aut tanquam pestiferum aliquod Medicamentum angue caneqque pejus fugiendam, sed potius pro summo veneni Gallici alexicaco habendam, quod multis probat argumentis, & quod iterum affirmat Cap. 22. ubi de usu Mercurii in Morbi Gallici curatione.*

In Libro posteriore differit Capitibus 17. De variis Mercurii præparationibus cum Medicum, tum Chemicum usum concernentibus, ubi reperire est præparationes mercuriales fere omnes, quas tanquam arcana seu mysteria maxima nunc silentio a quibusdam tegi videmus.

Cæterum fatendum quidem est potissima, quæ ab Untzero profertur, ex variis Auctoribus excerpta & corrala esse; at vero fatendum simul pleraque non sine judicio delecta fuisse.

1627. 1628. JOANNES COLLE, Bellunenſis, natus anno 1558. Doctoris titulum Patavii impetravit anno 1584. ubi Professores auditivit Hieronymum Capivaccium, Albertum Bottonum, & Emiliū Campolongum, quos passim suos Præceptores vocat. Venetiis Medicinam fecit annos 15. Electus fuit anno 1600. Archiatros Francisci Matæ II. Ducis Urbini, & eo munere functus est usque ad annum 1623. quo tempore Patavium ad primariam Cathedram Medicinæ vocatus fuit morte Roderici Fonsææ vacuam, ibique obiit anno 1631. ætatis suæ 72.

In

In lucem emisit anno 1621. in folio Venetiis Opus Medicum in tres Libros distributum, cui titulum sequentem fecit, ut ad nomen Cosmi II: Mediczi, Magni Etruriæ Ducis, cui nuncupabatur, satis frigide alluderet.

Cosmior (hoc est Græce *Ordinator*) *Medicæ* triplex, in quo exercitatio totius artis Medicæ, loca dilucidata, & quæstia varia decisa, ac Consultationes medicinales, quæstiones practicæ enucleatæ proponuntur.

Hujus Operis Libro secundo exstat brevis Dissertatio de radice Chinæ, ubi ait, radicem illam a Lusitanis primum delatam anno 1535. & tunc varie appellatam fuisse, Cbinam, Cinam, Ecbinam & Arlinam, a * Cbinensibus vero Lampatam. Cætera quæ de temperamento, colore, figura, dosi & usu radice illius assert, nihil habent singulare & ubique obvia sunt.

Exstat ejusdem Liber alter Venetiis excusus in 4. anno 1628. cum sequenti inscriptione: *Methodus facile parandi jucunda, nova & nova Medicamenta, & ejus applicatio adversus Chymicos; ubi de antiqua Morbi Gallici natura, ejusque symptomatibus, notitia & medela singulari; sed quem nondum usurpare mihi contigit.*

DAVID DE PLANIS CAMPY, Chirurgus Galenicus & Spargy. 1623. ricus, Tractatum Gallice scripsit de lue venerea cum inscriptione sequente,

La Verole reconnue, combattue, & abbatue sans suer & sans tenir chambre, avec tous ses accidens,

quem Lutetiæ Parisiorum excudendum curavit in 8. anno 1623. & quo octo tantum Capita continentur, cum adjecto ad calcem *Antidotario venereo.*

Capitibus 1. & 2. affirmat luem veneream in orbe nostro perpetuam fuisse; sed ideo magis viguisse circa annum 1493. tempore belli Neapolitani, tum quod Hispani admisso leprosum sanguine vina infecissent, quæ Gallis derelicta permittebant; tum quod Præbiteros annonarii humanam carnem exercitibus in cibum ministrassent; quæ duo commenta jam supra refutavimus *Lib. 1. Cap. 8.*

Sequentibus Capitibus disserit pro ingenii modo, seu potius deblaterat de natura, causa, effectis, diagnosi & prognosi luis venereæ; ac demum *Cap. 6. & 8.* multa proponit remedia, multaque præparata Mercurialia, quibus interne adhibitis luem profligatum iri pollicetur.

In

* Radix quidem Chinæ in Sinensi Imperio copiose colligitur: Verum non *Lampatam*, sed *Tou fou* in ibidem appellatur. *Description de l'Empire de la Chine.* Par le P. du Halde, Tom. III. pag. 521.

Inadjecto Antidotario, ubi prostat remediorum farrago, duo præteris notatione digna visa sunt.

I. Usus Arsenici præparati ad luum veneream ab Auctore laudari, tum externum, tum internum; externum quidem, si Arsenico cum aqua vitæ confuso plantæ pedum manuumque palmæ confricentur, quo sudores moveri; internum vero, si Arsenicum pulveratum interne exhibeatur ad grana v. vj. vel vij. quo alvum blande solvi ait: Sed nemini auctor esse velim ut alterutri therapeiæ, sed præsertim posteriori umquam confidat.

II. Miris laudibus ab eodem extolli Mercurium fixum & diephoreticum sequenti methodo præparatum, qui cum præcipitato solari ferme convenit.

R. Mercurii crudi probe depurati lib. j.

Reguli Antimonii 3j.

Auri purificati 3j.

Solvantur singula seorsim menstruis propriis ut artis est. Solutiones misce in cucurbita vitrea: Distilla ad siccitatem: Cohoba septies: Demum pulverem residuum lava tepida & exsicca donec rubescat.

Tunc *R. Pblegmat. alumin. & Vitriol. ana lib. j.*

Aceti distillati lib. iij.

Albuminum ovorum coctorum ad duritiem lib. viij.

F. ex arte distillatio ex cucurbita & iterata cohabitatio.

Hæc aqua supra dictum pulverem bis vel ter distilletur.

1623. **PETRUS ROSTINIUS**, Doctor Medicus.

Trattato di mal Francese, nel quale si discorre di ducento e trenta quattro sorti de esso male; & a quanti modi si può prendere e causare e guarire: In Vicenza 1623. in 8.

Fatetur quidem Auctor ille Dissertationem suam ex antiquioribus Medicis, qui de morbis venereis scripsere, potissimum vero ex Antonio Musa Brasavolo exceptam esse: Sed verius dixisset, si ingenue falsus fuisset Dissertationem suam ipsummet esse Antonii Musæ Brasavoli Tractatum de Morbo Gallico, Italice versum cum Responsis a Brasavolo datis questionibus Alexandri Fontanæ Mutinensis, & Tractatu de Radicis Chinæ usu.

1624. **TOBIAS KNOBLOCHIUS**, Marcobretanus, Philosophiæ & Medicinæ Doctor, Physicus Onolsbaccensis scripsit *Tractatum de Lue venerea*, quem memini laudari a Joanne Rodolpho Camerario in *Memorabilibus Medicina & naturæ Arcanis*, sed quem nondum usurpavi. Constat Tractatum illum ante annum 1614. scriptum fuisse, cum laudetur in Opere edito

edito hoc anno: Auctor autem florebat hoc eodem tempore, cum carmina in laudem Camerarii scripserit, quæ in fronte Operis laudati leguntur.

ZACUTUS, Lusitanus, natus (a) Ulyssipone anno 1575. Philosophiæ ac Medicinæ studuit in Academicis Salmanticensi & Conimbricensi, ac anno 1594. Doctoratus gradum assecutus est Saguntia, quæ celebrissima est apud Hispanos Academia.

Inde per annos triginta continuos Medicinam cum laude fecit Ulyssipone; at circa annum 1624. (b) cum Regis (c) Edicto, qui tunc Lusitaniam ditissime premebat, Hebræorum quotquot aderant stirpes incolatu regni fuerint interdicta, Zacutus, qui Iudæus erat, in Belgium concedere coactus fuit, ubi Praxim Medicam exercuit, maxime Amstelædami & Hagæ Comitum.

Obiit Amstelædami anno 1642. ætatis 67. Scripsit Opus minime contemnendum *De Medicorum Principum Historia*, duobus Voluminibus in folio comprehensum, & in Libros XI. distributum, qui diversis annis in lucem prodire.

Hujus Operis *Libro primo*, qui Amstelædami primum editus est anno 1629. agitur *Historia 73. de Morbo Gallico*, dum explicatur locus Galeni depromptus ex *Lib. 3. Epidemior. Section. 3. Comment. 25.* ubi quæstio est *de menti, & capitis glabritie*.

Ibi Zacutus data occasione probare contendit. I. *Quæstione 35. Quod Morbus Gallicus vetustissimum sit morbi genus*. Sed in probationem nihil adducit præter quædam testimonia ex Hippocrate, Galeno, Saliceto, Gordonio, Valescio &c. quæ supra abunde discussa sunt & enucleata *Lib. I. Cap. 5.*

II. *Quæstione 36. Quod Morbus Gallicus ab immodico veneris usu ori vi possit*. Sed probat tantum, & egregie quidem ab immoderata venere noxas graves inferri; neutiquam vero luem veneream inde generari.

III. *Quæstione 37. Quod ante auxilia sudorifica calor nativus sit attemperandus*.

IV. *Quæstione 38. Quod bubo Gallicus non solum in inguinibus, sed retro aures aut sub alis apparere possit*: quod observationibus confirmat.

V. *Quæstione 39. Quod initio bubonis Gallici non solum e talo, sed e brachio mittendus sit sanguis*; in quo totus Medicorum chorus cum Zacuto nunc consentit.

VI. *Quæstione 40. Quod unguenta mercurialia pro Morbi Gallici curatione sint admittenda*.

VII. *Quæstione 41. Quod hydrargyrium in potum sit assumendum*.

VIII. *Quæstione 42. Quod unguenta mercurialia recentem confecta sint applicanda*.

De.

1619:
(a) Ludovicus Le-
mosius,
in vita
Zacuti,
ejusdem
Operibus
prefixa.
[b] Idem
ibidem.
(c) Philippi IV.
Regis
Hispaniarum.

Denique *Questione 43. Quod Morbus Gallicus sit contagiosus ad distans*, sed id nullo videtur evincere.

Cæterum quæcumque hætenus indicavimus, Theoretice tantum a Zacuto ponuntur, vel potius perstringuntur. Cætera, ut ipse ait, *que de curatione hujus morbi ab Auctoribus fæse dicta sunt, ea omnia incompendium redacta inveniuntur Lib. 2. Praxis Historiarum, Cap. 1.*

Ibi docet Morbum Gallicum curari 1. *Via Regia*, hoc est usu lignorum sudorificorum Guaiaci & Sassafras, radicumque falsæ-parillæ & Chinæ.

2. *Per vomitum*, ad quem excitandum adhibet pulverem Vigonis, sive præcipitatum rubrum ad gr. iv. vel v. Stibium sive Antimonium præparatum ad gr. iij. vel iv. Infusum 3 s. seminis cataputiz minoris in aqua rosarum &c.

3. *Per unguenta ex argento vivo parata*, quæ ab eo habentur *saluberriima*, atque pro hac extirpanda lue præsentissima, fremant licet plures, ut ille ait & non infima notæ Medici.

4. Per suffumigia parata ex sulfure, cinabrio, auripigmento, sublimato, pulvere Joannis Vigonis &c. Fatetur quidem ipse ea remedia suspecta esse & in actuali eorum applicatione plures esse mortuos, sed iis tamen utendum esse censet, cum cætera non prosunt, quoniam in conclamato morbo melius est uti aliquo remedio, quam nullo.

5. Demum per mississima medicamenta alexipharmaca, quæ parari ait ex lignis aut radicibus sudorificis.

1630. JOANNES ANTONIDES VANDER LINDEN, Enchusanus.

Centuria inauguralis positionum Medico practicarum de virulentia venerea, in illustri Frisiorum Academia proposita & defensa ad diem 18. Octobris 1630. Franckerz 1630. in 4.

Vander Linden natus anno 1609. has Theses pro Doctoratu Franckerz propugnavit anno 1630. Inde anno 1639. Professorium munus Franckerz, & anno 1651. Lugduni Batavorum obtinuit, ubi fato functus est anno 1694. ætatis suæ 55.

1630. JOANNES HARTMANNUS, Ambergensis. (a), Marpurgi in
(a) Mer- „ Hassia, anno 1591. Philosophiz & mox Matheseos Professor declaratus,
klinius, „ tus, tandem etiam anno 1606. ibidem Medicinæ Doctor renunciatus,
inLinden. „ Chymiam vix nomine tenus antehac illic locorum notam primum in ea Academia publice docere cœpit *tamquam Chymiatricæ Professor*. Factus postremo simul Archiater in Aula Castellana. „ Constat illum fato functum fuisse ante annum 1633. cum prodierit hoc anno Lipsiæ in 4. ejuldem *Praxis Chymiatrica*, a Joanne Michaelæ & Georgio Everhardo ejuldem filijs.

Ibi

Ibi primo refert Hartmannus Luem veneream * a Fratre Basilio Valentino qui vixit tempore Maximiliani, appellatam esse die neue Krieger Kranckheit, hoc est Novus militum morbus, in quo tamen hallucinatus est multis modis.

1. Quod existimaverit fratrem Basilium Valentinum revera existisse, cum non desint (a) eruditi Viri, quibus Auctor ille adumbratus, nomenque utrumque, quo appellatur, fictum ex Græco & Latino videtur. (a) Hermann, Bärhaver, Elem. Chem. Part. I.

3. Quod crediderit Fratrem Basilium Valentinum vixisse tempore Maximiliani, scilicet I. quem tamen Basilium (b) constat, si existerit unquam, toto seculo ante Maximilianum I. existisse.

3. Quod opinatus sit Luem veneream fratri Basilio Valentino notam olim fuisse, quæ scilicet in Europa non apparuit nisi tempore Maximiliani I. atque adeo integro seculo post Valentinum. (b) Ibid.

Secundo. Exposita deinde morbi diagnosi multa profert præparata Mercurialia, quæ credit ille tum ad luem veneream confirmatam, tum ad morbos venereos locales egregie facere. Sed hæc, si cui probentur, repetantur velim ex Hartmanni Præctica; piguit enim præparata hujuscemodi describere, quod pleraque jam pridem obsolescentia sint nec immerito; cætera vero quæ sunt adhuc in honore nullibi non profert.

Tertio. Videtur ad hodiernam methodum curatoriam paulo magis accedere, cum hydrargyrosim proponit, quam probatissimum curationis modum esse affirmat, quam satis fuscè describit, quam putat cum purgantium exhibitione semper conjungendam esse; in eo tantum castigandus quod ex præiudicio ætate sua satis vulgari velit tota hydrargyrosi sudores moveri tum potu decocti Guaiaci, tum ope æstuarii.

Quarto. Notatione peculiari digna visa sunt sequentia.

I. Juxta Hartmannum recentissimum luis venereæ symptoma esse Crystallinam, quam vocant, vesiculam nempe glandem membri virilis adnascentem translucidam, qua de re vide quæ supra dicta sunt Lib. I. cap. 12. pag. 78. sed quæ ex allato Hartmanni testimonio videntur emendanda.

II. Vesiculam illam lethalem esse, si remediis exquisitis factis non citetur. Ferrum non pati, nec leviter coalescere locum affectum Solum spiritum Tabaci laudem hic invenire Tangatur, inquit, vesicula cum spiritu Tabaci quinquies ad summum & sponte evanescit, sed fiat id jacente patiente, alioquin ad levem tactum spiritus Tabaci stans procumbit humi, hoc est syderatus cadit & convellitur, quæ remedium male tutum esse abunde arguunt.

III. „ Si

* Nec Librum nec Libri locum profert: Piguit vero Opera Basili vel Basilii adscripta excutere, ut locum scrutarer.

- (a) In articulo, qui inscribitur, *Studia Anctoris*, pag. m. 11. col. 1. Utor autem editione Lugdunensi in fol. anno 1655.
- (b) *Ibid.* 1641.
- III. „ Si adest gonorrhœa, utile esse exhibere præcipitatum viridem, Lacertam viridem quibusdam dictum) aut gummi Guaiaci, quibus exhibitis propinetur Terebinthina, quæ abluta aqua violarum cum ovi vitello teratur ac cum decocto sarsæ-parillæ potabilis fiat.
- IV. „ Bubbionem maturandum esse cum emplastro Diachyli, vel bubone lege *buffone*] aceto madefacto & buboni imposito, quo intumescente remoto alius applicetur ut tandem emollescat: Tunc scapello aperiendum esse & saniem cum pure & cruore exprimendam: Postea Opodeldoch (*Emplastrum nempe cum gummati bus, quod ab ipso inferius describitur*) applicandum, quod numquam coalescere sinit ulcus, priusquam omnia fundamentaliter fuerint sanata.

CYPRIANUS MAROXA, Hispanus.

- (c) In tumulo Pestis art. I. Cujus generis sit pestis? pag. m. 147. col. 1.
- (d) *Ibid.* pag. 146. col. 2.
- (e) In articulo, qui inscribitur, *Studia Anctoris*, pag. m. 12. col. 2.
- (f) In articulo, qui inscribitur, *Columna* 3. pag. m. 9. col. 1.
- (g) Tumulus pestis, articulo, quo supra, pag. m. 147. col. 1.
- De febribus & Lue venerea. Vallisoleti 1641. in fol.
- JOANNES BAPTISTA VAN HELMONT, sive HELMONTIUS, Btuxelensis, natus anno 1577. cum ipse (a) testetur se cursum suum Philoſophiæ absolviſſe anno 1594. qui erat ſibi decimus ſeptimus. Patrem amiſiſſe [b] anno 1580. totius Belgii calamitoſiſſimo. Invita (c) matre, & inſciis agnatis primus in ſua familia, quæ nobis erat, ſe Medicinæ nuncupavit. (d) Anno 17. ſue adoleſcentiæ (N. B. vixdum abſoluto curſu ſuo philoſophico) prælegebat Lectiones Chirurgicas in Collegio Medicorum Lovanii a Profeſſoribus Thoma Fyeno, Gerardo de Villeers, & * Stornio conſtitutus, ſed ut ipſe fatetur, præſumebat docere, quod ipſe nesciebat, Hollerium, Tagaultium, Guidonem, Vigonem, Æginetam, totamque Arabum turmam adaptans, qui ſane omnes ſimul, pergit ille, apicem Chirurgiæ non intellexerunt. [e] Legit ibidem Inſtitutiones Leonardi Fuchſii, & Joannis Fernelii, bis Opera Galeni, ſemel Hippocratem, cujus Aphoriſmos pene memoriter didiciſſe totum Arriennam, & tam Græcos, Arabes, quam modernos forte ſexcentos ſerio & attente perlegiſſe, per locos communes annotans quidquid ſingulare ipſi in iis & calamo dignum videretur.
- Promotus (f) fuit ad Doctoratum in arte medendi Lovanii anno 1599. ſed tunc (g) nec veritatem nec ſcientiam in putatitia doctrina ſua reperiſſe ratus imprimis crudele ex alienis miſeriis nummos accumulare . . . Hereditatem ſuam viduæ ſorori inſcripſiſſe, & dono inter vivos tranſtulit, eo quod oportune illa carere vix poterat. Ipſe juvenis peregre profeſſus eſt, cum intentione Medicinam deſerendi, atque in patriam redeundi numquam Idiotæ ſe illi aſſociaviſſe, qui Pyrotechniæ manualia ſaltem noverat. Mox ille ut penetrare quorundam corporum per ignem inſpexiſſe, comprehendiſſe multorum ſepa-

* Legi debet *Sturmius*, & intelligi de Joanne Sturmio. Vid. Valer. Andream in *Bibliotheca Belgica*, in verbo *Thomas Fennus*.

separationes tum Libris nondum traditas, ac hodie aliquot incognitas. Dein in dies crevit sciendi & operandi aviditas Uxorem duxit piam atque nobilem, cum qua (a) anno 1609. post decennalem peregrinationem *Vilvordiam* (non longe a *Bruxellis*) se subduxit, (b) per septennium *Pyrotbecnia* se immolavit, ac pauperum calamitatibus subvenit ... Ex effluente charitatis Dei bonitate aucte sunt uxoris hereditates, & ampla suae familiae devenere patrimonialia, Quin imo depressit (Deus) praepotentes, qui illum ad infamiam & occultam necem sub pietatis involucrio persequerentur, quibus verbis puto intelligi quaestionem quam de ejus fide Inquisitores habuerunt, a quibus ajut diem illi dictum fuisse, quasi de religione male sentiret. [c] Interim gloriatur se quotannis aliquot myriades infirmorum sanare suis remediis non destitisse.

Sed *Thaumaturgus* ille sanare non potuit 1. Duos suos filios, qui peste perire, at vero ut se excuset (d) ait *Moniales* apud quas ambo decesserunt, sua remedia tanquam aliena recusasse. 2. [e] *Primogenitam* suam filiam; quae quinquennis leprosa evasit magis magisque, ac tandem ulcera livida, corneaeque squamae albae per totum corpus subnatae sunt, sed quae tandem septennis per miraculum sanata fuit ope *D. Virginis*, cujus imago *Bruxellis* celebris est in *Hospitali D. Jacobi*. 3. (f) Uxorem suam, quae jam ab aliquot mensibus dolore lacerti dextri premebatur, sic ut nec manus attollere posset, & atroci oedemate artuum inferiorum languebat, quae tandem a *Butlero* sanata est cum oleo olivarum, cui lapis suus intinctus fuerat. 4. Demum [g] *Ancillam* suam, cui in tibia dextra ter erysipelas male curatum passae crus erat plumbeum atque tumidum a genu usque in digitos pedum, & quae eodem oleo perfecte intra noctem unam convaluit.

Mortem (b) obiit *Helmontius* die 30. Decembris anno 1644. ætatis 67. ex asthmate, unde respiratio illi in tantum deficiebat, ut exsurgere cogere. tur & per fenestram proximam spiritum haurire, quo binis diversis vicibus pleuritis ipsi accersebatur, a qua dum se incolumen restitutum esse putabat oborta denuo febre, ex interna, ut puto, suppuratione vitam morte commutavit, postquam per septimanas septem ægrotavisset.

Hæc plusquam satis de ipsius vita; nunc pauca de ejusdem natura, indole, ingenio proferenda. Ut libere dicam videtur *Helmontius* fuisse Religiosus, probus, minime malus; at vero simul credulus, superstitiosus, anilibus fabulis addictus, Chemicus Chemicorum ineptis plenus, *Paracelsi* laudator, sectator, imitator, sed tamen judicio, ingenio, doctrina, *Paracelsi* potior, suorum arcanorum venditor & amplificator maximus, qui plerumque ceu lymphaticus quidpiam supra mortale sonans

&

(b) in præfatione *Operibus Helmontii* præfixa, & scripta ab Auctoris filio, *Francisco Mercurio Vanhelmont*, qui se dicit *Pilosophum per unum, in quo omnia. Eremitam peregrinantem.*

(a) In articulo, qui inscribitur, columna 3. pag. 9. col. 1.
(b) Tumulus pestis, ubi supra, pag. m. 148.
(c) Ibid.
(d) Tumulus pestis, in articulo, qui inscribitur, Proprie- tates pestis, pag. m. 176. col. 2.
(e) De Lithiasi, cap. 9. §. 27. p. m. 13. col. 1.
(f) In articulo, qui inscribitur, *Butler*, pag. m. 360. col. 1.
(g) Ibid. col. 2.

& divino velut instinctu proloquens ampullas projiceret & sesquipedia verba, quibus nequaquam miror non paucos, animo leves futesque, bonis litteris destitutos, qui amant magnificis pollicitationibus lactari, alioquin lactare, quibus nova & inaudita placent, quos arcana delectant mysteria, aliquandiu dementatos fuisse: At revera qui in arte Medica novus & inexpertus, nec ætiologiæ & therapeutiæ morborum satis gnarus, cum natura vel consuetudine asper mordax, maledicus esset, Medicos sui temporis obtrectare, Scholasticæ Medicas insectari nunquam desistit, ut veterem Medicinam rescinderet & antiquaret, quam putabat

(a) In articulo, qui inscribitur. Columna 3. 1^a g. m. 8. col. 2.

(a) *meram esse imposturam a Græcis introductam*, novamque monstrosis verbis magis quam dogmatis divitem conderet, in quo ducem Paracelsum sequutus parem cum eo successum habuit.

Nihil scripsit Helmontius ex professo *de Lue venerea*, sed (b) in pestis sumulo quæsitæ potius quam data occasione sequentia docet.

(b) In articulo, qui inscribitur. Peregrina Lues nova, p. m. 154. col. 2.

I. *Luem illam easenus incognitam primum visam fuisse in obsidione Neapolit anno 1494.* (quæ tamen revera non fuit obsessa)

II. *Placuisse quibusdam Orientalem plagam accusare, quos sane ipse non novi*) quasi inde morbi origo accersenda foret, sed fallitatis inde argui, quod nemo unquam Lusitanum accusavit, ac per consequens Indiæ Orientales immunes esse debeant, quas solus Lusitanus cum exclusione Hispanorum illustravit ac sibi subegit.

III. *Neque a Sinenfibus ad nos delatam videri, quamvis ab olim lues Sinenfibus sit assuea, cum inde nemo ad bellum Neapolim advenerit, & introitus in Chinam omnibus externis sub pœna capitis vetitus fuerit.* Adde Guaiacum, cujus usus apud Europæos 80. annis senior est quam radicis Chinæ, errat, nam Guaiacum anno 1517. Radix Chinæ anno 1535. innotuit] *ab Occiduis terris venisse.*

IV. *Neque meliori jure tribui Indiis Occiduis; quasi ibidem foret vernacula atque solita, siquidem occasus Indias immunes fuisse testatur ipse* Ferdinandus Cortesius earundem expugnator, quodque post adventum suum nondum ibidem enotuisset, sed eo advectam luem cum Æthiope, mancipio Pamphili de Narvaez, qui forte recens ab obsessu Neapolis eo appulerat, secumque attulerat.*

At vero Helmontius in errore versatur maximo, neque uno dumtaxat nomine: Nam 1. Demus luem veneream, ut ille putat, ante Æthiopis illius

* Scripsit tantum novi a Ferdinando Cortesio Epistolæ IV. quibus narrabat ordine quæcumque a se in Hispania nova gerebantur. Interiit prima: Exstant tres aliæ in Collectione Ramusii Italice redditæ. Narrat Ille in prima earum quæ supersunt, quæ ordine secunda erat, exitus civilis belli quo a Pamphilo de Narvaez lacessitus fuit, sed nec de Æthiope illo, qui Pamphili mancipium fuit, nec de contagione quæ hic in Zempoalanos induxisse dicitur, nec de nova ulla lue quæ ab Hispaniis in Indigenas novæ Hispaniæ manaverit verbum ullum ibidem facit. Reliquæ vero ejusdem Epistolæ ad alia pertinent negotia.

illius adventum, qui mancipium erat Pamphili de Narvaez jussu & auspiciis Jacobi de Velasquez arma in Cortesium moventis anno 1519. visam nondum fuisse in Mexicano regno sive Hispania nova, (de ea enim America regione hic quaestio est.) Quid inde porro? An ideo falsum futurum est luem veneream in Insula Haiti sive Hispaniola, quæ nunc Sancti Dominici dicitur, antiquitus endemiam, & ibidem ab Hispanis usu rei veneræ cum indigenis mulieribus conceptam fuisse anno 1492. primo Christophori Columbi appulsu, a quibus in Hispaniam traducta anno 1493. ubi certa sui dedit indicia, & cum Neapolitanis Gallisque communicata fuerit anno 1494? Neutiquam. Etenim horumce omnium certos, idoneos, oculatos testes, omnique exceptione majores supra adduximus, *Lib. 1. Capp. 9. & 10.* Sed si ea vera sint, ut verissima esse palam est, inde constare debet de prima luis veneræ origine ab *Indiis Occiduis* reperenda, non quidem ab Hispania nova, a qua neminem scio qui illam arcepsat, sed ab Insula Haiti sive Hispaniola, cui omnes uno ore eandem acceptam referunt. Proinde concessa etiam Helmontii sumptione, nempe luem veneream anno tantum 1519. primum in Hispania nova visam fuisse, & illuc ab Æthiope quodam, Pamphili de Narvaez mancipio, alibi ubivis videbitur infecto delatam, ruit tamen ejusdem assumptio, scilicet luem illam ab Insula Haiti sive Hispaniola longe ante ac anno 1493. in Europam non admisisse fuisse.

2. Verum enim vero concidit certius eadem consecutio, si sumptio ipsa, qua nititur, falsa sit, ut falsam esse manifeste liquet. Constat enim Æthiopem illum, Pamphili de Narvaez mancipium, non venerea lue, sed variolis laboravisse, atque adeo non veneream luem sed variolas in Zempalanos, ubi Narvaez castra metabatur, & hinc in cæteros Hispaniz novæ incola transfudisse. Quod potest facile argui ex morbi ipsius descriptione apud Historicos [a] coætaneos obvia, ut nempe qui celeri ^{(a) Vid. infra.} propagatione serperet atque adeo in distans; qui periculosus, gravis, acutus, mortifer esset; quo plurimi consumpti sint brevi temporis spatio; qui febrilem æstum accenderet, cujus impatiëntia sese in fluxivos Indi demittebant temperandi nimii fervoris causa; a quo perfuncti sædis cicatricibus deturparentur, propterea quod incauti prurientes pustulas deraflissent unguibus; quæ singula in variolas quidem optime, in luem veneream vero minime, conveniunt.

Sed porro quid opus est conjicere in re manifesta & apertissima, cum Historici Hispani, * qui coætanei erant, disertimis verbis testentur

P p

Æthio-

* Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por el Capitan Hernán Díaz del Castillo, uno de sus conquistadores, Cap. 221.

La Cronica general de las Indias, Segunda Parte que trata de la conquista de Mexico, por Francisco Lopez de Gomara, Cap. 102.

Histo-

Æthiopem illum variolis, quas Hispanice las Viruelas vocant, affectum fuisse, quæ a lue venerea las Bubas Hispanice dicta longissime absunt re & nomine; atque adeo certo certius sit ab Æthiope illo non luem veneriam in Hispaniam novam, ut temere credidit Helmontius primus omnium & fere unus, sed Variolas traductas fuisse, quas ab Europa in Americam manavisse, & cum lue venerea quæ inde accepta fuit, commutatas esse vulgaris est opinio, & certe nec Auctore nec auctoritate destituta.

Mirari tantum subit, quæ fuerit Helmontio errandi causa: Neque enim facile induci possum ut arbitrer ab illo, qui minime malus fuisse videtur propositam Historiam dolo malo depravatam fuisse. Conjecerim potius neque forte temere in manus illius casu venisse Historicum quemdam, ex Hispanis quidem, sed Gallice versum, ubi legerit Æthiopem illum, de quo tam sæpe, laboravisse *de la Verole*, unde factum sit ut vocis ambiguitate delusus reputaverit de lue venerea seu crassa variola, Gallice *grosse Verole*, debere intelligi, quæ revera & germano vocis Hispanicæ sensu de variolis seu variola parva Gallice *petite Verole*, intelligenda erant.

V. Addit Helmontius *alios contendere hanc luxuria luem incipisse, eo quod annonæ caritas mactatorum carnes cadaverum & suffurari & clanculum cocta. divendi suassisset, sed cum Anthropopagis Indis hæc lues ante adventum Pampbili fuisset ignota, non recipitur eorum allegatum.*

VI. *Astrologos.....asserere peregrinum stellarum situm, dumtaxat de super Neapolim influxisse, quem multa anxietate quærentes nondum invenerunt; Quasi idem astrorum situs numquam fuisset antea.*

VII. *Tandem Paracelsum.....copulam leprose meretricis cum scabioso milite Gallo inusare ac detestari (Sic nempe Paracelsus depravat Historiam, quæ a Joanne Manardo narratur [a] Epist. 2. Lib. 7. Epistol. Medicinalium.) Quasi vero antea nulla leprosa Gallo sordida commissa fuisset.*

Hic sic explosis rejectisque addit Helmontius *se scire quomodo Lues venerea sui initio fermentum atque radicem repererit.* „ Enim vero Laicus „ quidam, *pergis ille;* & vir sanctus, ad quæstiones arduas aliquot solitus „ visiones somniales, ac non raro quoque per mentis abstractionem „ notiones intellectuales suscipere, nimia forte curiositate has indagavit „ quæstiones. 1. Cur ista Lues præterito seculo & non antea erupisset, „ cum antea diebus Paganorum scelerata quælibet scurrilitas num- „ quam defuerit? 2. Unde, si non ab Indis, in Europam venerit? 3. „ Quæ causa sit continuitatis & mitigationis ac mutationis, si divinitus im-

Historia general de los Hechos de los Castellanos en las Islas y la Tierra firme del mar Oceano, escrita por Antonio de Herrera. Decad. II. Lib. X. cap. 4.

immisfa? Nam miracula raro per contagiũ tranſeunt, ac niſi tradito „
mandato ſuam in natura cauſam nanciſcuntur. Sed neque Deus inſon- „
tes punire ſolet, prout innocentes ſæpe lues veneris inſicit. Dixit ita- „
que Laicus ſibi in viſione intellectuáli viſum jumentum, quod pene dif- „
fluere ulcerẽ fœtido, qui morbus equinæ ſpeciei proprius, (Noſtrates „
den VVorm; Galli vero *le Farein* vocant) unde ſenſim equi purulenta car- „
rie pereunt. Hoc autem jumentum vidit velut canibus in eſcam deputa- „
tum, totum tergus vitiatum habens, etiam circa vas naturæ; nec „
præter iſtam viſionem aliud reſponſum habuit: Quapropter ſe ſuspica- „
ri dixit, quod in obſidione Neapolitana, (qua primum dira hæc lues „
emerſit) nefando aliquis peccato congreſſum cum ejuſmodi jumento ha- „
buiſſet.

Inde *conſpicis* Helmontius luis venereæ fermentum eo modo (permittente
Deo vindice) in humanam familiam tranſplantatum, mixtumque contagium
equinum inſanda libidinis actu (perinde atque bodie a meretrice ſordida uſque in
teſtes maris attrahitur ipſa lues) tum gonorrhœam, carcinoma, (ulcuſcula can-
croſa) atque bubones venereos &c. propagans.

Abſit ut abutar otio in conſutandis nugis iſtiusmodi. Per me licet cui-
cumque arriſerit, cum Helmontio ineptire circa primam luis originem,
neque enim velim cuiquam voluptatem extorquere, & demere per vim mentis
gratiſſimum errorem.

Reſert (a) idem alibi mulierem quamdam, quæ a marito lue venerea
infecta fuerat, & cujus totus corporis habitus ulcere exedebatur, exhibito
Corollato Paracelſi per albumen ovi paratum intra 26. dies convaluiſſe. Quod
ſane ipſe facile credo, ut qui ſciam Corollatum Paracelſi præparatum
e Mercurio remedium eſſe, cum præcipitato rubro, ſi non idem, plane
congener, quod mitius fit inde pluries diſtillando aquam albuminum
ovorum.

THEODORUS TURQUETUS DE MAYERNE, Genevenſis, pa-
trem (b) habuit Ludovicum, ſcriptis editis notum; natus anno 1573.
inter Philiatros Monſpelienſes nomen dedit anno 1592. & Doctõris
gradum in illa Academia aſſecutus eſt anno 1597. Hinc Lutetiam venit,
ac Henricum Ducem Rohanienſem, qui a Rege Henrico IV. ad Prin-
cipeſ, Ordineſque Germaniæ legabatur, ſequutus eſt anno 1600. tan-
quam Medicus. Redux inter Medicos Regis ordinarios locum habuit
patrocinio N..... Ribbits de la Riviere tunc Archiatri, quo munere
functus eſt ab anno 1602. ad annum uſque 1611. Multas cum Facultate
Medica Pariſienſi rixas habuit, præſertim de Chimicis remediis, quo-
rum ſtrenuus fautor erat. Anno 1611. Litteris Jacobi I. in Angliam vo-
catus eſt, ut tum ſuus, tum uxoris ſuz Annæ Archiatris eſſet, quo eo-
dem munere apud Carolum I. Jacobi filium functus eſt. Mortem oppetiit

P p 2 anno

(a) In ar-
ticulo,
qui in-
ſcribitur.
Cauſe &
initia na-
turalium
pag. m. 24
col. 2.

1650.
1651.
(b) Bayle
Diction.
Critique.

anno 1655. ætatis 82. Fufius de illo in *Historia Facultatis Medice Monspeliensis*.

Prodiere Londini longo post mortem Auctoris intervallo *Syntagma* duo *Praxis Mayeriana* ex *adversariis*, *consiliis*, ac *Epistolis Theodori de Mayerne* summa cura ac diligentia concinnata: Alterum anno 1690. *De Morbis internis*, præcipue *gravioribus & chronicis*: Alterum anno 1695. *quatuor Tractatus continens*, 1. *De febribus*, 2. *De Morbis externis*, 3. *De arthritis*, 4. *De Lue venerea*. Utrumque acceptum referendum est diligentæ Theodori Devaux, qui Theodori Turqueti amanuensis apographa a se descripta subministravit, maxime vero studio atque operæ Gualteri Charletoni, qui singula digessit & edenda curavit.

Tractatus ultimus posterioris Syntagmatis, in quo agitur de Lue venerea Capita 6. complectitur, cum præmio, in quo præmittuntur Prolegomena quædam, *De Mercurio ejusque præparatis & de salivatione*.

Nempe 1. Mercurium exhiberi posse vel crudum, vel præparatum, hoc est reductum in pulverem aut per sublimationem aut per præcipitationem.

2. Auctori notas & millesima experientia felicissime comprobatas Mercurii præparaciones esse Aquilam rubram, Pulverem Calomelanicum, Mercurium Lunarem, Præcipitatum album, & quod Auctor inventum suum esse gloriatur, Clystum metallorum, quorum singulorum processus explicat.

3. Catbartica cum exhibitis Mercurialibus addenda esse, eaque valida quæ quidquid illa moverint, cum ipsis quam citissime educant & avertrunt; neque enim tutum esse Mercurii quantumvis correcti diuturnam in corpore moram.

4. Demum sequentes modos salivationis provocandæ bonos esse, modo leniter festinetur. 1. Per pilulas vel bolos Mercuriales. 2. Per frictionem cum unguento Mercuriali. 3. Per emplastra Mercurialia. 4. Per suffumigia ex Mercurio. 5. Per soleas ex Mercurio crudo pasta aliqua excepto plantis pedum suppositas. 6. Per oleum Mercuriale carpis affricum. 7. Per pedilavium in solutione Mercuriali.

His in hunc modum præmissis, exponuntur Cap. 1. *Luis venereæ recens conceptæ symptomata*, quæ tria præcipue recententur, gonorrhœa seu prius *Πρροία*, virulenta caries pudendi, & Bubo inguina occupans.

Cap. 2. generalis explicatur curatio *Luis venereæ*, sed illa tantum quæ sudatione obtinetur, ad quam promovendam proponitur multa quidem sed incondita farrago remediorum, quæ jam dudum apud Medicos nullo in numero habentur.

Capite 3. jubet Auctor ad gonorrhœam adhiberi diluentia & temperantia,

rantia, quandiu urit ardor urinæ, deinde præparata mercurialia, ac deum injectiones adstringentes, aut boli vel pilulæ parvis similisque energiz. Inter cætera multum laudat bolum sequentem, quo solo curari ait gonorrhœam intra paucos dies, sed qui merito suspectæ virtutis esse videtur.

℞. *Campbor.* ʒ ʒ.
Sal. Saturnin. ʒ j.
Sal Tartar. gr. xij.
Cass. Fistular. ʒ ʒ.
Terebintb. Venet. ʒ j.
M. F. Bolus.

Quod si gonorrhœa contumaciior in habituale stillicidium abeat, tum aquam mentha *Quercetani*, tum maxime sequentem pulverem approbat. Caro bubula per sumum indurata, ab externa nigredine mundata discerpatur in filamenta, quæ multiplici ablutione aquæ calentis liberentur a fæsedine: Postea mansili optime deterfa post exemptum e furno panem iterata immisione exsiccentur, dum possint reduci in pulverem, de quo cape partes ij. baccarum maturarum bedere arboreæ partem j. misceantur exacte. Hujus pulveris ʒ j. pluribus matutinis consequentibus exhibeatur superhausto cyatho hydromelitis simplicis, vel decocti radicis *Eryngii*. Sufficit autem ad corpora pituitosa carnem siccare sine ablutione ulla.

Capite 4. laudat Auctor ad ulcera sive caviem & excoriationem pudendi suffitum e cinnabari, & unguentum *Diapompolygos* cum Mercurio crudo mixtum: Ad Bubones vero emplastrum ex *Radicibus Bryoniae, Althææ, Liliarum alborum*, cum farina triticea, terebintbina & axungia suilla.

Cap. 5. Ad *Hyperсарcoses* sive carunculas in urethra multis therapejam illam proponit, quæ obtinetur usu cathæreticorum fistula in urethram immistorum, sed quæ jam pridem obsolevit, ceu periculosa & inefficax.

Denique Capite 9. recenset symptomata graviora luis inveteratæ, ut ozenas, saucium aut palati ulcera, ossium palati caviem, nodos, tinnitus aurium, surditatem &c. & ad singulorum curationem remedia proponit, multa quidem, sed quæ præcedentibus probatiora non sunt. Sic inter alia laudat ad nodos venereos cataplasma ex equalibus partibus radicis *Sigilli Mariæ* & axungie porcine cum addito croco, quo vernaculo & euporisto cataplasmate nihil efficacius inveniri posse putat in venereis & aliis frigidis tumoribus. Sic proponit ad tinnitum aurium fumum caryophyllorum per infundibulum in aures excipiendum, unde fiet, ait ille, ut multa aqua per nares manet.

Cæterum, ut libere dicam, videtur Auctor ille, qui fama tamen valuit ætate sua, polypharmaciz æquo amantior fuisse, quod in Medico

peccatum numquam leve est, & anilibus fabellis nimium confidens, atque remedium undique conquistorum approbator nimis credulus, quæ graviora peccata esse puto. Sed venia danda est Operibus posthumis, quæ dubio procul emaculatiores proditura fuissent, si ab ipso Auctore essent edita.

1661. ANTONIUS EVERHARDUS, Medioburgensis.

. *Collatio antiqui Morbi recrudescentis cum Gallico vel Indico*. Medioburgi 1661. in 12.

JOANNES VVINELL, Anglus.

1670. *Lues venerea, vuberein the Names, Nature, Subject, Causes, Signs, and Cure handled, By John VVinell M. D. London. 1670. in 8.*

Libellus ille Anglice scriptus continet tantum *Capita undecim*, quibus breviter differitur de origine, nomine, definitione, subiecto, causis, signis diagnosticis & prognosticis, ac curatione luis venereæ, tum communi, tum particulari; atque variæ pro Auctoris modulo resolvuntur quæstiones, quæ circa propagationis rationem ac diversos morbi illius effectus moveri solent. Quæcumque ibi legisse memini, jam prius dicta fuerant; quamobrem Tractatus ille aliorum Tractatum, qui de eadem scripti fuerant, mera est Epitome, nec satis ordinate digesta. Hæc tamen animadversione digna visa sunt.

I. Credi ab Auctore luem veneream olim, cum primum apparuit in Europa, multo sæviorẽ fuisse; nunc vero [suo scilicet tempore, circa annum 1670.] mitiorem esse & minus lethiferam, in cujus mutationis causas inquirat *Cap. 7. Quæstione 9.*

II. Videri eidem luem veneream in Orbe nostro quondam celsaturam esse, ut in Italia Mentagra & Gemursa, & in Anglia Pestis sudatoria pridem celsavere, cujus futuri phænomeni causas rimatur *Capit. 10. Quæstione 3.*

III. Circa specialem morbi curationem nihil prorsus afferri *Capite 11.* nisi methodus curatorias distinguendas esse in *reprobatis*, quibus abstinendum; *probatasque* quibus utendum est: Inter reprobatas quidem recenset Ulum 1. *Remediorum vulgarium*. 2. *Fomiculorum*. 3. *Unguentorum mercurialium*. 4. *Suffumigiorum*, quorum duo postrema plurimum improbat. Eas vero tanquam probatissimas commendat, quæ curationem moliantur ope 1. *Theriace* & *Alexipharmacorum Indicarum*. 2. *Magnetis cuiusdam anti-venerei*. 3. *Remedii cuiusdam quod sympatheticum vocat*. Hæc ultima duo remediorum genera multis extollit laudibus, sed eadem tanquam arcana reticet, unde manifestum est hunc Tractatulum eo tantum fine ab Auctore confarcatum fuisse, ut remediis suis famam verbis faceret, quam non poterat effectis.

FRAN.

FRAACISCUS DE LE BOE SYLVIVS, Hanovienſis, natus[a] ^{1672.} anno 1614. Doctoratus gradum Baſileæ adeptus eſt anno 1637. Hanoviz & Amſtelodami Medicinam feliciter fecit. Lugdunum Batavorum vocatus eſt anno 1638. ad profeſſorium munus in locum defuncti Alberti Kyperi, ibique deceſſit anno 1672. ætatis anno 59.

Tractatus de Lue venerea inter cætera ejuldem Opera eodem volumine comprehenſus eſt in *Appendice Praxeos Medicæ*, quæ poſt Auctoris mortem cura Juſti Schraderi primum prodiit.

Sylvius pro more ſuo quæcumque ad lue veneream tum univerſalem, tum particularem ſpectant, in illo Tractatu breviter explicat 397. articulis, quibus aut in Theoria, aut in Praxi continetur nihil, quod novum ſit aut a vulgari opinione abludat.

Docet Auctor *Articulo 36. Venenum venereum in acido, ſed ſuo modo potante conſiſtere.*

Articulo 144. Lue veneream produci ab humoribus acidis & acrimonia ſua tum ſanguinem ipſum, cæteroſque ex ipſo humores ortos, tum pilos, tum glandulas, partesque glanduloſas omnes, tum cutim, tum oſſa ipſa corrumpentibus ac rodentibus.

Articulo 147. Primaria luis hujus remedia eſſe aut mercurialia, aut ex lignis radicibusque gummoſis atque ſudores morventibus petita.

Articulo 148. Optimum certe atque tutiſſimum luis venereæ remedium eſſe Mercurium crudum cum porcina æmungia vel aliis unguentis oleiſque mixtum & forinſecus illitum, Sed prudentia opus eſſe ſi & doſi ſpina coſis illinenda, quod ipſe ſaltem fieri nolle, niſi quando fruſtra illiſe fuerunt articulationes alia: Sed quod tamen nunc quotidie ab omnibus fieri conſtat ſine damno ullo.

Articulo 150. In eundem finem exhiberi ſæpenumero varia medicamenta ex Mercurio, tum ſublimato, tum præcipitato parata; Præſertim Præcipitatum corallinum, de quo Artic. 283.

Articulo 192. Ad venereæ luis curationem infrequentiori uſu eſſe decocta ex binis radicibus, totidemque lignis parari ſolita; radicibus puta Cbina atque ſaiſa-parilla; lignis vero Guaiaci & Saffaſras.

Articulo 213. Satiſ certe fore ſudoriferis, diureticis, ac per alvum purgantibus abſolvi curam luis venereæ, ſi ſemper iſtis abſolvi poſſes, licet plus temporis deſideret, quoniam tutius procedis, quam ejuldem per purgaſimum & vomitum inſiſtina cura, in qua major vis corpori inferitur: Adde quod ſi minus prudens fueris Medicus aut æger, facile in vita periculum incidat æger.

Articulo 216. Quoniam vero ſemper obtineri non poteſt luis venereæ curatio per ſola ſudorifica, diuretica, & purgantia deorſum, ideoque occurrendum eſſe nonnumquam, imo ſapius ad ſalvationem, tum ſolam, tum aliis junctam.

^{1672.}
(a) Ex
Oratione
Funebris
habita a
Luca
Schaſſ.
D.M. &
ad calcem
Opera
pervenerunt
Sylvii
adjecta.

Demum Articulo 304. *Curationem luis venerea per salivationem institui- tam ceteris preferendam esse, utpote talem, quæ non facile ullum recidivæ me- tum post se relinquat, nisi in lue inveterata & cum ossium carie conjuncta.*

1673. EDUARDUS MAYNVVARINGE, Anglus.

The history and mystery of the Venereal Lues, By E. Maynvvaringe, Dôctor in Physick. London. in 8. 1673.

Disserit hic Auctor *Capitibus sexdecim* de nomine, origine, propaga- tione, natura, symptomatis, sede, contagione & therapeia luis vene- rez, circa quæ antiquiorum Auctorum non opiniones modo, sed ple- rumque verba ipsamet sigillatim refert.

Potissimum vero singularem illius diligentiam mirari subit in recensenden- dis methodis curatoriiis, quæ apud diversas Europæ Nationes usu rece- ptæ erant suo tempore.

1. Apud Italos *Cap. 12.* quam exscribit a Sebastiano Aquilano, Gas- pare Torella, & Antonio Musa Bratsavolo.

2. Apud Germanos *Cap. 13.* quam mutuatur ab Ulrico de Hutten & Joanne Benedicto.

3. Apud Hispanos *Cap. 14.* in quo duces sequitur Joannem Almenar, Aloysium Loberam & potissimum Ludovicum Mercatum.

4. Apud Gallos *Cap. 15.* quam excerptit a Guillelmo Rondeletio Mon- speliensi Occitano, & Josepho Quercetano Armeniaco, hoc est *d' Arma- gnac* in Aquitania tertia, quem Auctor iste Geographiæ parum gnarus credit Armenum origine, sed quem tamen dicit in Galliis vitam duxisse & inter Regios Medicos locum habuisse.

Demum 5. Apud Batavos *Cap. 16.* qualis prostat apud Petrum Fo- restum.

Cæterum Auctor curatoriiis illis methodis nec hilum quidem de suo ad- dit, sed in Operis calce Lectores tantum monet in genere, ne remediis remediumque formulis, quæ ex variis illis Scriptoribus verbis iisdem exscripta sunt, imprudenter confidant, cum inter illa medicamina non pauca sint inania, fallacia & inefficacia, imo vero nonnulla peri- culi plena: qua de re vere quidem & recte monet; sed eum tamen ab omni culpa ideo vacare non puto. Præstitisset enim remedia hæc du- bia, incerta, periculosa corrigere, suppressere, vel obelo saltem no- tare, præsertim in Libro lingua vernacula scripto, quam in negotio tanti momenti Lectoribus plerumque imperitis judicium de illis per- mittere.

1670. NICOLAUS DE BLEGNY, Parisiensis, vir sine litteris, initio Her- niarius Chirurgus & subligaculorum artifex; Deinde anno 1678. Regiæ Chirurgus ordinarius; anno 1683. Chirurgus ordinarius Serenissimi Prin- cipis Philippi, Ducis Aurelianensis; anno 1687. Regis ac Serenissimi Au- relia-

relianensis Ducis Medicus ordinarius, & Director Academiæ cujusdam, quæ Lutetiæ Parisiorum circa eadem tempora nomen sibi arrogabat *Aca-*
Auriceus exploratorum in re Medica; Demum anno 1693. Regis ac Du-
 istrate & elianensis Fratris Regis Medicus, Eques, Commendatôr ac Admi-
 cipitur Generalis Ordinis Hospitalis Sancti Spiritus Monspelienſis, ut
 isarius dicit in fronte *Tentaminis cujusdam Historiæ Generalis Ordinum Mi-*
in Religiosorum, quod Lutetiæ edidit Gallice anno 1693. sed cum
 titulis sive legitimis sive fictis magnus semper ardore & veterator egre-
 gie impudens.

In carcerem conjectus fuit anno 1693. die 4. Junii reus non uno nomine. Arguebatur enim de Religione male sentire ac opiniones erroneas in vulgus spargere: Nolocomium suo jure nec impetrata prius a Rege licentia instituisse, quod privato non licet: Equitis nomen sibi arrogare sine titulo & sine genere: Maxime vero velle se antiquum [a] Sancti Spiritus Monspelienſis Ordinem instaurare & re-
 gere suo arbitratu contra quam Regia auctoritate sancitum fuerat. Di-
 citur aliquanto post e carcere traductus esse Pistavium, unde clam au-
 fugit Avenionem, ubi Medicinam fecit non sine nomine, & ubi vi-
 tam varie jactatam cum morte commutavit, sed quo anno nondum te-
 neo.

Ediderat Gallice Lutetiæ Parisiorum anno 1673. Tractatum de Morbis
 venereis, cui titulus est.

*L'Art de guérir les Maladies Vénéériennes, expliqué par les principes
 de la Nature, & de la Mécanique*, cujus prostant aliæ editio-
 nes:

Ibi reperire est congesta cumulataque, quæcunque Blegnyus ex variis
 Auctoribus, qui Gallice scripserant, corradere potuit, aut ex Discepta-
 tionibus Medico-Physicis compilare, quæ in ædibus Abbatis Bourdelot sta-
 to septimanæ cujusvis die tunc haberi solebant; sed quæ pro Auctoris mo-
 dulo tractantur & explicantur.

Quatuor sunt Tractatus hujusce partes, in quarum *Prima* agitur *Capitibus undecim* de natura, origine, causa, differentiis, diagnosi, prognosi & therapeja Luis venereæ in genere: *In Altera, Capitibus tredicim* de Therapeja singulorum affectuum venereorum, ut cariei pudendi, phimoseos, paraphimoseos, vesiculæ crystallinæ, tumoris testium, bubonis, gonorrhœæ, carunculæ in urethra: *In Tertia, Capitibus totidem* de methodo medendi luis venereæ sine Mercurio, usu solo diaphoreticorum & diureticorum, qualia Guajaco, sassafras, radicibusque Chinæ & salsæparillæ suppeditantur: Denique *in Quarta, Capitibus septem* de natura hydrargyri, methodoque debellandæ luis venereæ adhibitis illitionibus mercurialibus.

(a) Vid.
 de illo o-
 dine l'
Histoire
des Or-
dres Mo-
nastiques
Religieux
& Mil-
itaires, par
 le P. He-
 lyor. To-
 me II.
 Chap.
 30. & 31.

(a) *Parr.* I. Censet (a) Auctor ille, si tamen ejus opinio aliquo loco numerari
I. Chap. debeat, luem veneream antiquitus notam fuisse, quod probare conatur, tum adductis seu potius laudatis locis aliquot ex Hippocrate, Tacito, Suetonio, imo & ex Deuteronomio, quæ ab illo ne qui intellecta sunt, & quæ alibi jam explicavimus: Tum maxime *Heringia*, seu potius fabella, quam narrat de juvencula quadam, quæ sana a sex viris qui & ipsi sani erant, sæpius intra paucissimos dies copagata luem sponte contraxit, ex putredine, ut credit ille, seminem, quæ aliena & intra uterum copiosius admissa fuerant. Quasi vero scortillo, aut sex Ganeonibus, quorum mentiri proprium est, fides adhibenda foret, se prius ab omni venerea labe immunes fuisse asseverantibus.

(b) *Parr.* II. Usum (b) decocti sudorifici ex lignis Guaiaci & Sassafras,
III. & radicibusque Chinæ & Sassa-parillæ, usui mercurialium inundationum, si non præfert, saltem æquiparat, in quo ab opinione temere dissentire videtur, quæ jam sua ætate vulgaris & pervagata erat, & quæ Mercurio primas deferrebat in curanda lue venerea confirmata.

1673. JAONNES CASPARUS SPARR, Philiatros.

Dissertationes duæ Medicæ de Lue venerea, quibus additur Disputatio inauguralis Joannis Conradi Marthis, *De Mania*, Alteraque Marci Laurentii Donneri, *De Apoplexia*. Argentorati 1673. in 4.

Opinor Dissertationes illas Theles esse, quales in Academicis proponendæ proponi solent.

1676. RICHARDUS VVISEMAN, Anglus, Chirurgus Regius, scripsit Anglice Tractatus octo Chirurgicos, nempe de tumoribus, de ulceribus, de affectibus ani, de strumis, de vulneribus, de valneribus ab ictu sclopetorum, de fracturis ac luxationibus, ac demum de Lue venerea, quos edendos curavit in fol. Londini, anno 1676. cum inscriptione sequente.

Several Chirurgical Treatises, By Richard VViseaman, Serjeant Chirurgeon. London. 1676. in fol.

Horum Tractatum postremus, ubi agitur de Lue venerea, Capita 6. complectitur. I. De natura & contagione Luis venereæ. II. De remediis, quæ vulgo adhibentur ad ejus curationem. III. De remediis, quæ adversus hunc morbum specificè valere creduntur. IV. De cura symptomatum Luis venereæ. V. De gonorrhœa. VI. Denique de infortuniis quæ gonorrhœæ solent succedere.

Nihil quidem occurrit in ea Dissertatione, quod in præcedentium scriptorum Libris obvium non sit: At vero haud negandum est singula ordinate distribui, & paucis sed enucleate exponi.

I. Silet

I. Silet (a) Auctor de morbi origine; ^{(a) Cap. 1.} varias recenset contagionis vias, quibus contrahi solet, inter quas vix quidem admittit usum earundem vestium aut eorundem lecti-^{(b) Capp. 2. & 3.} torum.

II. Ad curationem præmissa purgatione, (b) jubet adhiberi salivationem, quæ interno Mercurialium usu, si morbus lavis sit & recens: quæ externo unguenti mercurialis illitu procuretur, si morbus gravis fuerit aut inveteratus. Post salivationem censet utiles esse sudationes ad exhauriendas morbi reliquias.

III. Annumerat (c) inter remedia ad curandam luem veneream usu recepta Mercurium sublimatum corrosivum, dissolutum in aqua fontana & ore exhibitum, cujus dosi congrua accieritum vomitionem, tum salivationem; additque id remedii genus a Practicis quibuscum multum commendari, ac deinde concludit frigidissime se tamen illo nunquam usu esse; in quo certe officio defuit suo, quod perniciosum hunc usum nulla graviore nota inuenerit, quem tamen debuisset aperissime improbare ceu lethiferum. ^{(c) Cap. 2.}

IV. In explicanda Therapeia variorum symptomatum, quæ a Lue venerea inducuntur, (d) affert Historias 69. ægrotantium a se curato-^{(d) Cap. 4.} rum, qui diversis morbis venereis afficiebantur.

V. Nec dispari (e) methodo, proposita breviter gonorrhææ ætiologia, ut sua ferebant tempora, ad explicandam ejusdem Therapeiam profert Historias 12. diversarum gonorrhæarum, quas a se curatas dicit. ^{(e) Cap. 5.}

VI. Demum (f) inter infortunia, quæ solent gonorrhææ succedere, ^{(f) Cap. 6.} quæstio est de urethræ carunculis, ac data occasione referuntur Historiæ 16. infirmorum, qui ea morbi specie ægrotabant.

BERNARDINUS CHRISTINUS A JUVELLINA, Cynæus hoc est ut opinor, Corsicensis. 1676.

Institutiones Medicæ & regulæ, consultationes & observationes; quibus accesserunt Centuriæ quinque curationum morborum. Tractatus de Lucæ morbo venereo, de febre pestilentiali, cum brevi Romæ contagii narratione; & Astrologicus ad Medicinam pertineus. Venetiis 1676. in 4. ^{(g) Registres de la Faculté de Montpellier. de M. Menjot. Amsterdam in 4. 1697.}

Liber hic in manus meas nondum pervenit. Auctor, cujus nomen præfert, Religiosus erat Observantiæ Fratrum Minorum sancti Francisci, sed qui antequam Religiosam vitam iniret, Lazari Riverii in Academia Monspessulana Professoris discipulus & Medicinæ Doctor fuerat. Hic ille est qui primus edidit Arcana Lazari Riverii, si tamen hæc Arcana Riverii sint; de quo plura in vita Riverii, in Historia Scholæ Monspessulanæ.

ANTONIUS MENIOTIUS, Parisinus, Doctoratus gradum consecutus est in Facultate Monspessulana anno (g) 1636. ac deinde Medicinam Lutetiæ fecit, ubi mortem oppetiit (b) ante annum 1697. octogenario major. ^{1677.} Scriptit

Scriptis *Dissertationes Pathologicas* plurimas, quarum pleræque seorsim & diversis annis primum prodire, sed quæ una simul collectæ & in quatuor partes distributæ Lutetiæ Parisiorum editæ sunt in 4.

Prostat ibi in *Parte ultima*, quæ typis excusa fuit anno 1677. *Dissertatio de Lue venerea* pag. 40. comprehensa, ubi Auctor probat L. Lucem illam antiquitus ignotam apud Europæos duo secula nondum implevisse, sed vertente anno *Epoche Christianæ* 1495. Oris *Ausoniis* primum incubuisse.

II. In *Indiis Occidentalibus* vernaculam esse & ab *Hispanis* una cum *exipilatis Americanorum* opibus convectam esse.

III. In tres gradus distinguendam esse pro intensione, primum, in quo *erosis capillorum radiculis* glabrities inducitur; Alterum, in quo cutem exasperant *pustule, parvule, rubicundæ, duriusculæ, ac rotundæ*; Tertium, in quo *malum ad membra solida, ut membranas, tendines, imo vero ossa ipsamet permeat*.

IV. Jam varias fuisse morbi facies, nempe 1. *Usque ad annum circitar sexagesimum a nota lue sædam gonorrhæam a morbo venereo abfuisse.* 2. *Egrotantes nonnisi quadragesimo anno Lææ venereæ pilorum defluvio cæpisse dedecorari.* 3. *In prima luis origine cutem ægrotorum pustulis ac ulceribus fuisse spurcissimam, artuum vero dolores vel nullos extitisse vel mitiores, sed insequentium annorum serie ægrotantium fuisse minus immundam, cruciatus autem membrorum σπρίχνης ac intolerabiles supervenisse.* 4. *Tandem morbum venereum ætate sua modestiorem esse quam initio, multumque deservisse ejus inclementiam.*

V. Redarguendos esse, qui *Elephantiasim* a *lue venerea* non sejungunt cum

(a) *Sydera terra*

(a) *Lucan*
8. *Pharsal*

Ut distant & flumina mari

Sic ambæ istæ affectiones cum causis, tum signis immensum distideant, quod illo multis confirmat.

Exposita eo modo morbi ætiologia Auctor de *Therapeia* silet, de qua verbum ne unum quidem adjicit, quod sane mirari subit in Medico, quem ceu opiferum non tam in describendo morbo, quam in proponenda ejusdem curandi methodo versari decet. Haud equidem nescius sum Menjotium liberationem culpæ omisæ in *Dissertationibus suis Therapeiæ* quantacumque potuit arte impetrare conatum fuisse in *Monitione ad Lectorem Parti 3. præfixa*, sed vix puto excusationem ullam ab illo adductam fuisse, quæ sit legitima.

Cæterum *Dissertatio illa de Lue venerea*, sicut & cætera ejusdem Auctoris Opera, licet eruditione multiplici referta sit, locisque undequaque corralis apte condita, in ni mio orationis studio peccare videtur, quæ modo

modo vocibus ad ostentationem quæsitis vel Græcis, vel Latinis præcis & insolentibus aspera, modo vero *per mellitos verborum globulos, dissi- que quasi papavere & sesano sparsa exaggerata* Philologum vel Rethora magis lapit quam Medicum.

THEOPHILUS BONETUS, Genevensis, natus anno 1620. ad Docto-^{1679.} raturæ gradum promotus est anno 1643. Medicus fuit Henrici ab Aureliano Ducis Longavillæ. Obiit anno 1689 ætatis 69.

Sepulchretum, sive Anatomia practica ex Cadaveribus morbo denatis, proponens Historias & Observationes omnium pene humani corporis affectuum, ipsorumque causas, reconditas revelans. Genevæ 1679. in folio.

Bonetus in hoc Opere *Lib. 4. parte 9.* ex variis Auctoribus exscripsit Observationes aliquot in Cadaveribus syphiliticorum institutas, quas luis adornavit scholiis.

STEPHANUS BLANCARDUS, Medicus Batavus, scripsit si fides^{1679.} habeatur (a) Joanni Devaux, Tractatum specialem *De Lue veneræ*, sed (a) Trai- quo anno nescio, in quo Helmontio assensus statuit venereos morbos, te de la- non ex Indiis Occidentalibus in Europam ab Hispanis advectos fuisse, sed Maladie contra ex Europa in Indias Occidentales devectos ab Æthiope quodam, Vene- qui Pamphili de Narvaez in Cortesium civile bellum suscipientis man- riennæ de- cipium erat, lueque in obsidione Neapolitana jam ante contraxerat, Charles Musitan, cui commentum ut fidem conetur facere, Auctores profert tum Antonium nouvelle Herteram egregium rerum Indicarum Historicum, tum ipsum Ferdi- ment tra- duit. Tom. nandum Cortesium celebrem Novæ Hispaniæ victorem, utrumque tamen I. pag 51. temere ut videtur. Sed de his diffuse jam supra ad annum 1644. ubi de Helmontio, pag. 535.

THOMAS SYDENHAM, Anglus, anno (b) 1642. Collegii Magda-^{1680.} lenæ Oxoniæ Socius creatus est, ac in Universitate anno 1648. Baccalaureatu (b) Joan- Medico condecoratus est, postea Cantabrigiæ Doctor Medicus renunciatus fuit. nes Jaco- Practicus experientissimus & celeberrimus, naturæ, successionis & vicis- bus Man- situdinis morborum Observator diligens, Londini Medicinam cum laude getus, in fecit per annos 25. nempe ab anno 1661. ad annum usque 1686. De- Biblioth. functus dicitur anno 1689. Scips. Medico- tum.

Exstat inter illius Opera Epistola ad Henricum Paman, Doctorem Medicum & in Collegio Greshamensi apud Londinenses Medicinæ Professore scripta anno 1680. *De Luis Veneræ Historia & Cura- tione*, in qua paucissimis quidem verbis, sed satis enucleate de prin- cipio, progressu & curatione tum gonorrhææ, tum luis veneræ disseritur.

Inter cætera tria ibi leguntur, quæ potissimum digna sunt ut anno- tentur.

1. Luem

1. Luem quidem veneream in Europa novam esse, sed non ex Americanis Insulis, ut vulgo creditur, originem traxisse, vetum e regione aliqua Nigritarum Guineæ conterminorum, quandoquidem mancipia recens e Guinea allata ad Insulas Caribas dictas, etiam antequam in terram descenderint, hoc morbo sæpe tentantur.

2. Nullum experimentum, quod ille sciat, afferri posse extirpatæ hujusce luis nisi per salivationem ab hydrargyro excitatam, quidquid tam Doctorem nonnulli quam indoctorum de aliis sanandi modi satis temere & audacter effutuerint.

3. Nonnullos hoc morbo male multatos in Galliam commigrare cogi, ut ab eo liberentur, cujus rei rationem non esse credit, quod Practici ibidem degentes, usus docti quidem, methodum qua hic morbus devinci possit melius calleant quam Medici in Anglia, sed quod aer Gallie, utpote qui salubrior ac magis serenus, spiritus corporis ac vires deperditas instaurare aprior sit.

Dolco potuisse Viro cæteroquæ docto duo excidere, quæ errore non vacant.

1. Experimentum testari nullis evacuationibus aut alio modo infirmatos ante hydrargyrosim, salivationis impetum multo melius sustinere quam eos quorum quasi ante prælium incisi sunt nervi venæ sectionibus & purgationibus præparatoriis, unde concludit æquum rerum æstimatorem haud dubie satius esse ducturum nihil agere, quam ita importune satagendo nocere.

2. Periculosum esse pyæmiam jam abiturientis & mox evanescere reliquias casbari deducere; a qua praxi, quæ vulgo obsinet specie vel Mercurii e corpore eliminandi, vel corrigendæ ejus malignitatis, nasci credit frequentes illas recidivas, quæ miseris accidunt.

PAULUS DE SORBAIT, Hispano-Belga, Medicinam in Universitate Viennensi in Austria docuit annos 24. circiter ab anno 1655. ad annum usque 1679. ac eodem tempore Medicus fuit Imperatricis Eleonoræ de Gonzaga, viduæ Imperatoris Ferdinandi III. Videtur ibidem decessisse circa annum 1680.

Scriptit *Praxim Medicam* Tractatibus septem comprehensam quæ Viennæ tertypis excusa est in folio, scilicet annis 1678. 1682. 1701. Tractatus secundus *De Morbo Gallico & Gonorrhœa*, reliquisque symptomatibus eis supervenientibus, in Paragraphos 17. dividitur, ubi de Morbi Gallici natura, causis, signis & curatoriiis methodis, atque de gonorrhœa, bubone, carie pudendi, nodisque & exostosis disseritur paginis 15. adeoque brevius quam pro materiæ dignitate.

Pauca occurrunt in illo Tractatu digna quæ excerpantur. Sequentia tamen notare visum est, quæ Lectorum judicio permittimus.

(a) §. I.

1. Morbum Gallicum (a) non differre nec a Mentagra, quam Plinius

nar-

narrat *Histor. Naturalis Lib. 25. Cap. 1. in Italia sæviisse medio Tiberii Claudii principatu, nec a Lichenibus aut impetigine, quæ ab Hippocrate describuntur, Libro de Morbis mulierum, & Lib. 2. Prædistor. sub finem.*

II. Morbum illum (a) sub Rege Francorum Carolo VIII. circa annum (a) *Ibid.* 1496. & in castris Gallicis, occasione obsidionis Neapolitana furere (b) *Ibid.* cœpisse Et tunc (b) factum fuisse a constellatione mala, quæ fuit anno & §. 17. 1483.

III. Ad hujus morbi curationem [c] internum Mercurialium usum (c) §. 6. inunctionibus præstare; cæterisque Mercurii præparatis Mercurium usum palmam præripere, quem ipse suum vocat, cujus præparandi descriptionem sibi *baënnus* reservaverat, quem tamen exponit ideo, quod eum posteritati negare vetes charitas. Ille autem Mercurius tam effuse laudatus nihil est præter ipsummet Mercurium præcipitatum rubrum, iterata spiritus vini affusione, distillatione, accensione mitigatum donec e rubeo palleseat, quem exhiberi jubet prima die ad gr. iv. dosim augendo quotidie grano uno, dum optata prodeat salivatio.

IV. Morbum (d) eundem curari etiam posse per Mercurium absque salivatione, si salivatio divertatur, mixtis cum Mercurio purgantibus, vel sumpto pridie Mercurio & postridie instituta purgatione, ut se felicissimo successu non semel expertum fuisse testatur. (d) §. 17.

V. Morbum [e] Gallicum amplius tam sævum non esse quam fuit in principio; quod ipsius venenum per multa adbibita pharmaca & dietas plurimum fuerit *baënnus* debilitatum. (e) *Ibid.*

VI. Demum (f) hanc luem per frequentem coitum citra aliud contagium (f) *Ibid.* generari posse, in quo ille a recta veri ratione non parum aberrare videtur.

Cæterum hic Auctor de plagio vix purgari potest, cum pleraque, quæ in suo Tractatu profert, ab antiquioribus Scriptoribus compilaverit; imo quod excusationem difficilius admittit, paragraphos suos 16. & 17. verbis fere iisdem transcripserit ex Capitibus 5. & 6. Tractatus, quem de Morbo Gallico Joannes Almenar, Hispanus Medicus, olim publici juris fecit.

JOANNES MICHAÛT.

Les Discours de Chirurgie pour l'explication des nouvelles Machines pour les os & pour la Vèrole ou Maladie Vènerienne, lorsqu'elle y fait des Nodus & Exostoses & des Anchyloses aux jointures, avec l'art de la guérir méthodiquement par la seule application du Mercure. Paris 1682. in 8.

Neque Librum neque Auctorum Libri novi.

DAVID ABERCROMBYUS, Anglus, Doctor Medicus.

Tura

1684.

Tuta ac efficax Luis venerea, saepe absque Mercurio; ac semper absque salivatione mercuriali curanda Methodus. Londini 1684. in 12.

Brevis ea Dissertatio Capitibus tredecim absolvitur. In primo dicit esse quosdam qui Luem veneream, ut Athanasius Kircherus olim Romæ pronuntiasset fertur de Peste, nihil aliud esse velint quam innumeram quamdam verniculorum inconspicuarum multitudinem, qua opinione rejecta ipse statuit, causam luis venereæ esse frigidum quemdam, humidumque vaporem a partibus generationis propulsum in corpus, vel attractum.

Inde post explicatam suo modo Luis venereæ propagationem & hydrargyri naturam, concludit Cap. 4. *gydrargyrum non esse Luis venereæ alexipharma*, ut qui cum natura frigidus sit frigido veneno mederi nequeat; sed veram illius morbi medicinam ex calidioribus remediis petendam esse.

Sic ergo Capite 5. proponit *facilem & tutam*, ut ipse putat, *Luis curanda rationem absque omni Mercurio*, per cathartica, insulum Guaiaci in vino albo, & opiatam quamdam, quam *Veneream* vocat, compositam ex calidioribus remediis, & opiatæ Fernelianæ, de qua (a) alibi, ita similem, ut vix ovum ovo similis sit.

(a) Supra
pag. 19.
& 488.

Quod si contumaciior morbus ea therapeia non extirpetur, alteram affert Capite 6. *Methodum probatam curanda Luis, absque mercuriali inunctione & salivatione, non tamen absque omni Mercurio*, usu scilicet decocti Guaiaci, Chinæ, Salsæ-parillæ &c; Vini albi cum infuso Mercurio vivo per horas 24. decocti ad medias; demum pilularum mercurialium ex Mercurio dulci, Scammonio præparato, Trochiscis Alhaandel, Aloe & Rhabbarbæ.

De cæteris silere visum est, quæ nullius fere momenti sunt. Quæ diximus satis sunt, ut liceat inde colligere Luem veneream ab Abercrombyo curatam numquam fuisse; vel ad summam curatam tantum in primo intensionis gradu. Nemo enim, cui curandæ Luis venereæ difficultas nota fuerit, crediderit unquam alterutra Therapeiarum, quæ ab illo proferuntur, Luem veneræam inveteratam & confirmatam potuisse eradicari.

Davidis Abercrombyi Opuscula hætenus edita. Londini 1687. in 12.

Prostat ibi secundus ordine Tractatus *De modo curandi Bubones venereos & superiores salivationis methodo.* Circa prius præmissa Bubonis definitione & causa, brevem (b) methodum medendi exhibet. Postmodum perstringit eos qui venæ sectionem pro cura rejiciunt: In Bubone enim candicante admodum proficuum illam esse, juxta accathartica exhibita refert. Deinde differt quibus cautelis & quomodo emollientia, atrahentia & digerentia externe sint adhibenda. Hæc de Bubonum cura.

(b) Ex
Actis Li-
psiensibus
anni
1687.

„ De

De tutiore salivationis methodo primo inquit quænam ex subje-
ctis Lue venerea infectis apta sint ad sustinendam Salivationem, re-
jēctisque phibitis & humidioris ac frigidioris temperamenti, solum
calidioris ac siccioris constitutionis disposita docet. Quæ deinde de
modo salivationem excitandi annectit, nova non sunt; Mercurii nam-
que dulcis ope omnium optime negotium hocce peragi posse tradit.
Cæterum notari velim in hoc Tractatu Abercrombyum ipsum ea revo-
care, quæ in præcedenti adversus salivationis Mercurialis usum pro-
tulerat.

CAROLUS THUILLIER, Rothomagensis, primum Rothomagi,
ac deinde Lutetiz Medicinam fecit, ubi Doctoralem Lauream adeptus
est. Scripsit gallice Tractatum cum sequenti inscriptione: *Observations
sur les Maladies Vénériennes, avec leur Cure sûre & facile*, qui Rothomagi
primum editus fuit anno 1684. in 12. at novis Observationibus auctus re-
cusos est Lutetiz anno 1707. Hæc altera editio continet Observationes 35.
& tres Epistolas.

1684.

1707.

Fatendum est nec ingenium nec eruditionem in illo Auctore desiderari.
Egregie probat Luem veneream in Europa novam esse, multisque eos
refellit qui contra sentiunt. At vero in eo merito culpandus est quod de
usu hydrargyroscos ad curandam Luem veneream detrahat quam maxime,
quasi de medicina incerta, difficili, periculosa; quod inunctionum mer-
curialium loco laudet & extollat arcanum quoddam, quod *Antivenereum
suum* vocat, quasi certum, efficax, facile, præsentissimum remedium;
quod anti-venerei illius præparationem de industria celet; & quod pess-
simus est, quod in hunc finem Opus suum vulgasse videatur, ut arcano illi
quo superbit, quod tam impense venditat, popularem auram conciliaret
quæstus gratia.

Non equidem facile condono Medico Christiano; ut remedium, si quod
in promptu habeat quod tutum & efficax sit, per avaritiam silentio sup-
primat in ægrotantium quamplurimorum damnum. At numquam concess-
erim, ut remedio suo quisquam publicam existimationem, quam eventis
non potest, conetur magnificis promissis comparare. Nonne hoc est *ver-
bosus strophis famam aucupari*, miserorum mortalium animas *negotari*, frau-
dulentiæ circulatorum artibus abuti? Quæ singula nec probum virum, nec
ingenuum Medicum decent.

Si quid autem conjectura valeo, opinor anti-venereum illud arcanum
a Carolo Thuillier tantopere venditatum ex Mercurio & Antimonio com-
poni; quod ex multis Observationum locis videtur posse crui, sed præ-
sertim ex 4. & 29. Itaque cum ille hac ipsa Observatione 29. utatur
anti-venereo suo cum pulvere viperino admixto, ut infra dicetur (a) [a] *Infra.*
de Gervasio Ucay; forsitan illius anti-venereum idem quoque fuit cum *pag. 552.*

Qq

hujus

hujus anti-venereo, nempe Pulvis ex duabus partibus præcipiti Mercurii rubri per se, vel præcipitati rubri Solaris, cum addita parte una sulphuris aurati Antimonialis.

(a) Tauri. Forſan quoque adhibuit Cinnabarim antimonialem ſequenti [a] modo paratam.

R. Mercurii præcipitati rubri per ſe parati ſine additamento & ſpiritu vini correcti ʒ ʒ.

Sulphuris ex Cinnabari antimoniali eduſti ʒ j.

Miſceantur ſimul & ex arte ſublimentur.

Cinnabarisea ratione parata ad morbos venereos exhibetur doſi xx. granorum.

Forſan demum uſus eſt panacea mercuriali vulgari cum addito antimonio illo diaphoretico, qui vulgo [b] *pulvis liquans de Rotrou*; aut forſan floribus mercurialibus & antimonialibus cum ſale Ammoniaco paratis. Sed de his omnibus iudicium illis permitto, qui etiamnum putant reclamante rerum experientia poſſe umquam præparata ulla Mercurialia hydrargyroſi caute adhibere præponi; quos inter ipſe numerari nolo.

1689. L. LE MONNIER.

Nouveau Traité de la Maladie Vénérienne & de tous les acciſdens qui la précèdent & qui l'accompagnent, avec la plus ſûre & la plus facile méthode de les guérir. Paris 1689. in 12.

Exiguus quidem Libellus, ſed apto ſatis ordine digeſtus, & in quo ſi nihil quidquam novi, at certe nihil quidquam abſurdi reperire eſt: Neque enim culpæ dari poſſe arbitror quod ſuadeat (c) ut inunctiones mercuriales ſuper univerſum fere corpus adminiſtrarentur, & ad ſingulas unguentum in validioribus temperaturis ad ʒ viij, in infirmioribus ad ʒ v. adhiberetur. Tunc enim ita ferebat uſus Medicorum plerorumque, etiam cauſiſſimorum; unde minime mirum eſt, ſi tam frequentia olim fuerint ex hydrargyroſi infortunia.

1690. G. B. DE SAINT ROMAIN, Docteur Medicus.

Méthode aſſurée & efficace pour guérir la Maladie Vénérienne ſans ſalivation mercurielle, compoſée en Latin par un célèbre Médecin d'Angleterre, & nouvellement miſe en lumière. Paris 1690. in 12.

Auſtor ille, qualiſcumque ſit, Gallicum fecit Traſtatum Davidis Abercromby, qui inſcribitur, *Tuta ac efficace ſuis veneræ ſepe abſque Mercurio, ac ſemper abſque ſalivatione mercuriali curandæ Méthode*, de quo ſupra ad annum 1684.

1694. MARTINUS LISTER, Eboracenſis, Societatis Regiæ Londinenſis Socius & ex Medicis Domeſticis Regiæ Annæ, inter alia Opera numero ſatis

fatis multa scripsit *Exercitationes aliquot Medicinales*, quæ primum numero sex Londini 1694. in 8. mox octo numero prodire Amstelodami in 8. 1698.

In quarta agitur *de lue venerea*, sed brevissime, & quod perpetuum est illius Auctoris vitium, satis incompote. Quinimo nec Observationes omnes, quas refert numero quindecim, videntur satis certe ad luem veneream pertinere.

1. Affirmat luem veneream *ab Insulis Americanis per Hispanos in Europam allatam esse*; sed quam in illis Insulis primitus ortam fuisse credit esu Laceratorum quorundam majorum, qui in illis locis occurrunt, & *Iguana* sive *Ivana* appellantur.

2. Vult totam luis curanda methodum includi *hodie in purgatione, medicamentis ex hydrargyro confectis, præcipueque numquam satis laudando illo Mercurio dulci dicto, & Guajaci decocto*, ita ut *hydrargyrus quidem veneni in lue antidotum sit, sed Guajacum hydrargyri*.

3. Audet infusum cantharidum interne præscribere; nam ad ulcus venereum prostaticarum sequens remedium proponit *Observatione XI.*

R. Spir. vini rectificat. lib. ʒ.

Gummi Guajacini ʒ ʒ.

Cantharidum ʒ j.

Cocbeineil. ʒ. ij.

Succi hypocystid. ʒ ij.

Spiritus Sulphur. ʒ j.

Digerantur cinere calido ad ʒ. horas: Filtrentur per chartam bibulam. Hujus Medicinæ gutt. xl. ex cerevisia tepida mane & sero quotidie propinentur.

4. Monet in Præfatione Dissertationibus præfixa *medicamentum* quoddam a se sine invidia edendum esse *ad comprimendam gonorrhœam, quo ab aliquot annis cum successu usus sit*. Videtur autem illud remedium, quod nullibi diserte prodit, nihil esse præter Cochenilliam, quam sæpius commendat. Hac enim utitur in *Observatione XI.* ut modo dictum est, ad ulcus prostaticarum, & in *Observatione sequente quæ XII. est*, ad gonorrhœam virulentam sub sequenti formula.

R. Cocbeineil. ʒ. iiij.

Cantharid. ʒ j.

Vini Rhenani lib. j.

M. Digerantur per diem B. M.

Infusi Cochleare unum e decocti Guajaci ʒ iiij. sume bis in die, Gonorrhœa curabitur.

Qq 2

Demum

Demum eadem utitur ad vesiculam seu Bullam crystallinam Balani in *Observatione XIV.* decocta ad ℥. iij. in decocto valentissimo Guajaci, quod z-
grotanti propinandum exhibet.

5. Denique minime abstinet ab injectionibus in urethram in gonorrhœa
incipiente, non anodynis modo, sed etiam astringentibus. Sequentem
enim ipse præscribit in *Observatione XIII.*

R. *Aquæ Plantag. Et Papav. Rboad.* ana ℥ iij.

Opii bene ustulati ℥ j.

Mellis rosati ℥ j.

Trochiscorum ex minio puro metallico ℥ ij.

Unde ait intra paucos dies & *urina punctiones & gonorrhœam ex toto desinere.*

Sed in hujus vestigiis insistendum esse vix puto.

CAROLUS MUSITANUS, Calaber, natus anno 1635. Aprusti
(a) in Calabria, haud longe a Crotona, in oppido quod (b) nunc *Castro-
villarium* appellatur, patrem habuit Scipionem Musitanum, & matrem
Lauram Pugliese. Humanioribus Litteris & Philosophiæ studuit in urbe
patria, sed Neapolim petiit Medicinæ discendæ causa. Ibi Sacris addictus
Sacerdotium inivit, imo confessionibus audiendis vacavit; Medicinam
tamen fecit cum laude, ac famam potissimum dicitur sibi comparasse
morbis venereorum therapeja. Defunctus est Neapoli anno 1714.
ætatis 79.

(a) Ex
Præfatio-
ne Operi
præfixa.
(b) Man-
getus, in
Biblio-
thec. Me-
dic.

Edendam curavit Genevæ anno 1698. *Trutinam suam* *Chirurgico-Phy-
sicam* in quatuor Partes distributam. I. *De Tumoribus.* II. *De Ulceribus.*
III. *De Vulneribus.* IV. *De Lue Venerea;* quæ pars ultima in quatuor Li-
bros subdividitur, ubi ordine exponit morbos singulos venereos, & pecu-
liarem singulorum therapejam explicat, sed ubi non desunt quæ merito of-
fendant.

I. Deridet acrius antiquiores Medicos, quos *Vulgares* appellat, neque
semper satis recte.

II. Nimium elevat remedia consueta, quorum pleraque sua laude non
destituuntur.

III. Dicendo nimis amplificat utilitatem remediorum quorundam, quæ
quasi nova proponit, quibus impense superbit, quæ tamen conceptæ exi-
stimationi nullo modo satisfaciunt; uno verbo non Medici ingenui, sed
Empirici personam plerumque sustinere videtur.

Hunc Musitani Tractatum Gallice redditum edi curavit Trivoltii anno
1711. Joannes Devaux Chirurgus Parisiensis, suisque adnotationibus
haud indolisita auxit, ut ea editio editioni Latine multum præstet.
Ex quibus noluerim tamen judicium duci de cæteris Scriptis Medicis non
paucis, quæ ab eodem Devaux Gallice versa sunt, quippe minime nescius

cum-

eundem pleraque contaminasse, & male vertendo ex Latinis bonis Gallica sæpius fecisse non bona.

GERVASIUS UCAY, Doctor Medicus Tololanus, Tolosæ edidit anno Tractatum de morbo venereo in 12. cum sequente inscriptione. 1699.

Traité de la Maladie Vénérienne, ou l'on donne les moyens de la connoître dans tous ses degrez, avec une methode de la traiter plus sûre & plus facile que la commune, & la résolution d'un grand nombre de Problemes tres-curieux sur ces matieres.

Qui Tractatus iterum recusus est Amstelodami anno 1699. ac tertium Lutetiz anno 1702.

Hujus Tractatus partes duæ sunt. Priore, novem primis Capitibus luis venereæ, tribusque ultimis cariei pudendi, gonorrhææ & bubonis venerei naturam, causas & therapejam exponit: Posteriore, Problemata 35. circa luis venereæ originem, contagionem, curationem &c. distinctis totidem articulis resolvit.

I. Credit (a) Auctor ille luem veneream non minus antiquam esse in Europa, cæteroque orbe antiquitus cognito, quam venerem ipsam vulgigagam, cujus semper certissima soboles fuit, & huic (b) sententiæ credit suffragari auctoritates quasdam ex Saliceto & Gordonio desumptas, sed quibus jam sæpius satisfactum est. (a) Part. I. Chap. 1. (b) Part. II. Probl. 13. & 14.

II. Fatetur (c) quidem Mercurium unicum esse luis venereæ rhizotomum, sed vetat illum inunctione unquam admoveri, tum propter tædia, incommoda & pericula, quæ inde ait imminere, & quæ ita (d) exaggerat, ut si audiatur, e centum syphiliticis ne unus quidem futurus sit, qui sciens ea subire velit; tum (e) propter expertam illius methodi inefficaciam, quæ conceptas spes non raro frustratur. (c) Part. I. Chap. 8. & 9. (d) Part. I. Chap. 9. (e) Part. II. Probl. 22.

III. Præstare censet (f) usum præparatorum Mercurialium, quæ blandam, benignam, gradariam salivationem promoveant, ut Mercurii sublimati dulcis cum pulvere viperino, & purgantibus scammoniatis; præcipitati rubri solaris, ex una auri & tribus Mercurii e cinnabari redi-vivi partibus, amalgamatis & lento igne in pulverem fusco-rubrum ex-coctis; præcipitati rubri per se & ex solo Mercurio lenta ignitione confecti &c. (f) Part. I. Chap. 8.

IV. Præfert (g) tamen cæteris omnibus pilulas sequentes, (g) Ibid. Chap. 9.

R. Præcipitati Mercurii carnei coloris, qui ex solutione Mercurii in aqua forti paratur affuso volatili urinae spiritu,
Et Præcipitati rubri solaris, aut illius loco si desit, Præcipitati rubri per se vel sine additione confecti, ana q. s.
Adde sulphuris aurati antimonalis partem tertiam. Tere in mortario marmoreo & addita mellis q. s. f. massa pilularum.

V. Jubet ex illa massa intra sex dies tres doses exhiberi, quarum unaquæque sit xxiv. vel xxx. granorum. Eliminata semel humorum faburra ἀρω καὶ χάρω, pyralisimum deinde movet, motumque fovet, si opus fuerit, pilulis iisdem, sed minore dosi administratis, ad duo nempe vel tria grana, ter in die, mane sub meridiem, & vesperi per dies aliquot.

(a) *Part. II. probl. 22.* VI. Contendit (a) sudorem a se in ægrotante quovis sympathice excitari posse pro lubitu, si cum duabus tribusve uncii sanguinis recens extracti admisceatur unguentum quoddam, quod confici ait ex mumia, adipe humana, humano cruore calore solis exsiccat, & tribus vitriolorum generibus folis ardore in calcem redactis tempore Caniculæ, ac nonnulla recenset experimenta hac de re coram testibus ut ipse ait, ac in diversis ægrotantibus instituta, sed quorum fides sit penes Auctorem.

(b) *Ibid.* VIII. Haud negat (b) sibi olim visum fuisse eadem methodo ipsam quoque lue veneream curari posse sudoribus, sed fatetur periculo a se facto rem ex voto non successisse; ægrosque levamen quidem inde qualescunque expertos, sed perfectæ valetudini numquam restitutos fuisse, quamquam cum unguento illo sympathico modo descripto Mercurium crudum una extinctum, præcipitatum ex soluto in aqua forti Mercurio paratum affuso spiritu urinæ, aliæque non pauca præparata Mercurialia de industria miscuisset, ut unguenti vis adversus virus syphiliticum illorum facultate dirigeretur.

1699. PETRUS GARNIER, Lugdunensis, Doctor Medicus Facultatis Monspeliensis, Collegio Medicorum Lugdunensium Aggregatus, secundæ Editioni *Novarum Formularum*, quas in usum Nosocomii majoris Lugdunensis concinnaverat, adjunxit anno 1699. Tractatum Gallice scriptum cum hac inscriptione: *Traité pratique de la Vérole* in 12. *tribus Capitibus* comprehensum, quorum primo *de natura & causa*, altero *de signis diagnosticis*, & tertio *de Methodo Curatoria Luis venereæ* agitur.

Hic Auctor, omiſſis quæ dubia sunt ac incerta, explorata tantum & comperta profert, atque curationi luis venereæ unice intentus, quæcumque ad illum scopum facere videntur, ingenuo animi candore enucleat. Duo tamen desiderari videntur; *Alterum* ut non de lue tantum venerea, sed de singulis morbis venereis pari diligentia verba fecisset, *Alterum* ut singula paulo fufius atque adeo enucleatius explicavisset. Adde ab illo proponi tantum ad luis curationem hydrargyrosim plenam & quotidianam a qua pyralisimus cieter nimius, tumultuarius, periculi plenus, nulla mentione facta hydrargyroseos intercalaris & paucioris, quæ morbo salivatione facili, pauca, moderata medetur.

Petrus

Petrus Garnier in Villafranca Segusianorum, quo advocatus fuerat ut febris pestilentiali & epidemica optularetur, ex contracto contagio extremum diem obiit, circa annum 1710. ni fallor, nondum ætate proventus.

SECULUM DECIMUM OCTAVUM.

N..... BOIREL, Doctor Medicus.

1702.

Nouvelles Observations sur les Maladies Vénériennes. A Paris 1702. in 12.

Libellus exiguus, in quo *Capitibus duodecim* brevissime agitur de morbis veneris, & in quo neque novi, neque observatione digni quidquam occurrit.

ADRIANUS HELVETIUS, Batavus, Medicinam Parisiis exercuit cum laude, famamque sibi fecit usu radicis *Hippecacuanhæ*, quam fors bona illi casu obtulerat, qua de re vide *Le Dictionnaire des Drogues de Nicolas Lemery*, in verbo *Hippecacuanba*. Locum habuit inter Medicos ordinarios Philippi Ducis Aurelianensis, Fratris Ludovici Magni.

1710.

Méthode pour traiter la Vérole par les frictions & par les sueurs. 1710. in 12.

Auctor præmissa præparatione parum methodica, jubet ægrum inungi unguento mercuriali, prima quidem frictione a summis pedibus usque ad genua, & a pugnibus usque ad cubita. Altero vel tertio die inunctionem iterari, & si nulla inde appareant instantis pruriginis indicia, tertium repeti, ita ut tribus frictionibus res tota conficiatur. Deinde Auctor est ut finitis frictionibus & saliva probe effluente sudor excitetur semel vel bis in die per dies 10. vel 12. Quæ singulæ cautiones a methodo quæ nunc usu recepta est, non parum abludunt.

JOANNES DEVAUX, Chirurgus Parisiensis, natus Lutetiæ Parisiorum (a) anno 1649. Chirurgiæ operam dedit ac præcipuos Corporis sui honores adeptus est. Vir fuit nec sine ingenio nec sine litteris, sed qui fuisset laudabilior, si sese novisset ipse melius, nec unquam viribus majora ausus esset. Obiit Lutetiæ anno 1729. plusquam octogenarius.

1711.
(a) Mémoires de Littérature & d'Histoire. Tom. VII. Part. 1.

De Chirurgia, imo etiam de Medicina Libros aliquot scripsit, sed multo plures translatos edidit, ex quibus hic eos tantum commemorare par est, qui ad præsentem de Morbis veneris quætionem spectant.

Primo. Librum IV. *Trutinæ Chirurgiæ* Caroli Musitani, ubi de Lue venerea agitur, gallice reddidit, egregiis adnotationibus auxit & illustravit, ac Trivulzii typis excudendum curavit anno 1711. in 12. Tomis duobus cum inscriptione sequente.

Traité de la Maladie Vénérienne & des remèdes qui conviennent à sa guérison, de Charles Musitan Médecin de Naples, nouvellement traduit avec des Remarques, par Monsieur D.V.... Maître Chirurgien Juré de Paris.

Ille quidem in adnotationibus suis Musitani errores emendat non semel nec indocte, vitiaque therapæjæ, quam Musitanus proponit, sæpe corrigi & plerumque recte: At vero ipsemet ibidem in errorem geminum incidit suapte culpa.

[a] In Ad-
notation.
5. ad Cap.
3. Lib. 1.
pag. 49.
Tom. 1.
(b) Ad
an. 1644.
pag. 583.
584.

I. Videtur (a) assentiri opinioni seu potius fabulæ ab Helmontio propositæ de Æthiope illo, Pamphili de Narvaez mancipio, a quo venerea lues in Zempoalanos ac inde in cæteros novæ Hispaniæ populos traducta dicitur anno 1519. Jam quidem abunde probatum est supra (b) ea de Lue venerea numquam dicta fuisse, sed de Variolis tantum, in cujus rei fidem adduximus apertissima testimonia ex Historicis Libris Bernardi Diaz del Castillo, Scriptoris coætanei & Ferdinandi Cortesii Commilitonis, Francisci Lopez de Gomara, & Antonii Herrera. At vero quod prima fronte admirationem moturum est, hunc eundem Herreræ locum ultimo laudatum affert ipse Deveaux in contrariam partem, quasi velit inde arguere Luem veneræam in Hispaniam novam ab illo Æthiope devesctam fuisse. Verum facile cognoscitur quid sit quamobrem tam turpiter erraverit: Nempe cum Hispanici sermonis ignarus esset Gallicam Herreræ interpretationem usurpavit, ut ipse quidem confitetur, quæ olim prodierat opera cujusdam Joannis de la Coste, ubi vox illa Hispanica *Las Viruelas*, quam Herrera in enarranda illa Historia adhibuit, quæ *Variolas* tantum significat, quæ constat ab Herrera *Variolas* tantum intellectas esse, gallice redditur *la Vérole*, quo vocabulo non luem veneræam sed variolas olim significari (c) supra dictum est. Sed cum antiquæ

(c) Lib. I.
Cap. 7.
pag. 44.

vocis illius *la Vérole* acceptio a Joanne Devaux ignoraretur, inde factum est ut fidenti quidem animo sed temere crediderit hanc Herreræ historiam de lue veneræa accipiendam esse; quæ de re vide quæ de Helmontio alibi monuimus.

(d) Ibid.
in Anno-
tar. 4. &
5. p. 42.
Tom. 1.

II. Objicit idem, (d) ut contra communem opinionem pugnet, veneræam luem nec Indigenis Insulæ Hispaniolæ, nec Hispanis advenis prius innotuisse quam anno 1503. auctore ipso, ut ille putat, Antonio Herrera, diligente rerum Indicarum Scriptore, unde colligit luem hanc ab Insula Hispaniola, ubi nondum nota erat, Neapolim in Gallorum exercitum trahi non potuisse anno 1494. ut vulgaris fert opinio.

Locus autem Antonii Herreræ, quem adducit, depromptus est ex Capite II. Lib. V. *Historiæ generalis Indiarum*, ut ille quidem ait, sed debuisset addere ex *Decade I.* cum ea Herreræ Historia in *Decades IV.* distributa sit. Cæterum laudato illo loco Herrera brevem quatuor pri-

mo-

morum Operis Librorum velut avacephalæosin instituit, multa que summam refert de moribus Indigenarum Insulæ Haiti, quæ licet negotiis quibuscumque ad annum 1503. referendis ordine postponantur, tempore tamen multo priora fuerant.

Nempe 1. (a) Cum Indi in advenarum odium sementem nullam fecisset, Hispanos inedia eo redactos esse, ut eficas insalubres & stomacho plane alienas ad cibos admiserint, quod arquatam morbum tam intensum illis attulit ut crocei viderentur.

(a) Vid.
locum
ipsum
Herræz.

2. * Simul etiam usu rei veneræ cum indigenis mulieribus morbum alterum ab iisdem contractum fuisse difficiliorem, graviorem, diuturniorem, contagiosum, notisque remediis majorem, uno verbo luem veneream, quæ inter Indos quidem familiaris, se Castellanis ad illud tempus ignota erat: Suborta esse scilicet in corporis habitu tubercula dura, renitentia, cum doloribus atrocibus, ex quo factum ut spe futuri ad bonam valetudinem recursus in cælo natali multi in patriam reversi sint, in quam morbum eundem una secum importavere.

3. Sed tandem divino beneficio concessum esse, ut aliquot post intervallo remedium ibidem reperiretur, ubi morbus repertus fuerat, mulieris Indæ Castellani cuiusdam uxoris indicio, quæ usum ligni Sancti ab incolis Guaiacan dicti patefecit adversus id morbi genus efficacem; unde non levis accessit remissio.

Sed horum omnium nihil quidquam est quod ad annum 1503. referendum sit. 1. Non fames, quæ inter Hispanos morbos vulgavit, constat enim illam evenisse anno 1495. 2. Non deprehensio ignorantæ efficacæ, qua pollebat lignum Sanctum adversus morbos venereos; constat enim lignum hoc ab Hispanis in Insula Hispaniola in usum prius vocatum non fuisse quam anno 1514. aut 1515. 3. Denique non ingressus Luis veneræ inter Hispanos; constat enim certa Historicorum fide

* La falta de vitualla, que huvo en la Espannola, elcomer los Castellanos muchas bascoñidades, y loque padecieron los Indios por causa de no sembrar como atras queda referida, causò en todos nuevas enfermedades: Pusieronse primero tam amarillos, que parecian acasfranados: y esto que les duro muchos dias, con la CONVERSACION de las mugueres se les vino a pegar un mal ORDINARIO entre los Indios, y entre los Castellanos no CONOCIDO, que les dava mucho trabajo. Eran unos granos, que naciaen per el cuerpo con dolores intensos, y era contagioso: y sin remedio ninguno, de que morian rabiando: y por esto se bolyieron muchos a Castillo pensando sanar cum mudanca del eyre natural, y PEGARON el mal. Pero quiso Dios que adonde se hallò el mal, se hallasse el remedio, porque alcun tiempo despues una India muguer de un Castellano mostrò el palo Sancto, que ilaman Guayacan, con que commencaron a tener algun descanso. *Historia general de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra firme del mar Oceano. Escrita por el Antonio Herrera, Cronista mayor de las Indias. Decada I. Lib. V. Capít. XI.*

fide id morbi genus primo Christophori Columbi ad Hispaniolam appulso, atque adeo anno 1492. cum Hispanis usu veneris communicatum fuisse ab indigenis mulieribus, apud quas antiquitus endemia erat; qua de re vide supra, *Lib. I. Capp. 9. & 10.*

Sed nec Herrera hac de re dissentit ullo modo, ut qui contra expresse *ibidem* testetur * Luem veneream in Insula Hispaniola antiquitus FAMILIAREM fuisse; in Castellanos, quibus IGNOTA erat, manavisse CONTUBERNIO cum mulieribus indigenis; ac demum ab iis qui in Castiliam rediere, TRADUCTAM fuisse in Hispaniam; quæ singula fictam & commenticiam Joannis Devaux fabulam funditus convellunt, causamque nobis adjudicant apertissime.

Secundo. Gallice vertit idem Devaux aliquot alia diversorum Auctorum Opera *De Morbis Venereis*, sed pleraque multis modis contaminavit ac male vertendo ex latinis bonis fecit Gallica non bona, ut

1. *Dissertationem de Morbis Venereis* Antonii Deidier celeberrimi Professoris in Facultate Medica Monspessulana, de quo *infra ad annum 1723.* quæ Gallice reddita prodiit Lutetiz anno 1725.

2. *Tetrabiblion de pudendorum Morbis & Lue venerea* Jacobi Vercelloni Pedemontani, de quo *infra ad annum 1716.* quod Gallice translatum editum est Lutetiz anno 1730. post mortem Joannis Devaux.

3. *Tractatum de virulenta gonorrhæe symptomatis, natura, causis & curatione* Guillelmi Cockburne Angli, de quo *infra ad annum 1717.* qui Gallice versus typis excusus est Lutetiz anno eodem 1730.

RICHARDUS BOULTON, Anglus.

1714

Physico-Chirurgicæ Threasure of the gout, the king evils, and the lues venerea. London. 1714. in 8.

Præter ea quæ de Arthritide & Strumis proferuntur & quæ ab Instituto nostro sunt aliena, pauca sunt in hoc Tractatu, quæ ad Luem veneream ipsam pertinent, nec ea nova sunt. Auctor de salivatione, quam probat, agit quidem, sed perfunctorie; ac in eo totus esse videtur, ut exponat ulum venæ sectionis, purgationis, vomitionis, enematum dia-phoreticorum &c. quæ auxilia præstantia sunt, sed ex se debellandæ lue venereæ plane imparia.

GUALTERUS HARRIS, Anglus, Collegii Medicorum Londinensis Socius, Medicinam Londini faciebat cum laude ante annum 1689.

1715.
1689.

in

* Hæc omnia omissa sunt in interpretatione loci illius Herreræ, quam Joannes Devaux adducit *laudati Tractatus pag. 42.* Sed omissionis culpa refundenda videtur non tam in illum, quam in Joannem de la Coste, a quo Herreræ Opus gallice redditum fuerat, & cujus interpretatio a Joanne Devaux optima fide profertur.

in quem incidit Thomæ Sydenhamii interitus, cum profiteatur (a) Tractatum suum de morbis acutis Infantum a se scriptum fuisse hortante Sydenhamio. In vivis etiamnum erat anno 1701. ut constat ex 1. & 3. Observationum, quæ in Lib. 2. exstant in Editione secunda.

Testatur ipse (b) se Medicum fuisse Guillelmi Principis Arausiæ & Regis Magnæ Britanniæ, ac illi (c) anno 1693. ad imperandas fœderatas in Belgio copias proficiscens primum servasse.

Videtur Auctor ille aniliter superstitiosus, cum putat (d) infantulum sex tantum menses natum, qui paulo post obitum Caroli II. Hispaniarum Regis, vespere Festum Christi Natalitium precedente anni 1700. a paroxysmo convulsivo liberatus per quartam horæ partem nunc o Deus, nunc o Jesus, clare ac distincte exclamavit, miserias cladesque forte præsentisse impendentes a bello internecino, cui Regis illius interitu locus datus est.

Scriptit Librum de Morbis acutis Infantum, cui accessere in Editione secunda, quæ proditit Amstelodami anno 1715. Observationes Medicæ de morbis aliquot gravioribus; & quedam de luis venereæ origine, natura & curatione.

In hac ultima Dissertatione, quæ 25. paginis in 12. comprehenditur, Auctor obiter docet.

I. Morbum a promiscua & vaga scortatione ortum habere, unde colligit in orbe nostro antiquum esse, in cuius rei fidem adducit varia Hippocratis loca ex 3. Epidemiorum, de quibus supra Lib. I. Cap. 2.

II. Morbi naturam esse aliam atque aliam secundum regiones magis ad Septentrionem aut Meridiem positas Et morbum, qui in Hispania & Lusitania mitis est, ferocem & immanem tyrannidem exercere in Anglia.

III. Hallucinari qui arbitrantur luem fractis & attritis senio viribus tyrannidem suam ferme omnem jam deposuisse & ad interitum suum cum senecta demum vergere: Sed contra constare experientia, ut ipse quidem putat, crudelissime etiamnum sævire, dubiumque esse utrum Mars, an Venus plures ex numero viventium tollat.

IV. Salivationem, cujus molestias tamen verbis amplificat, esse omnium methodorum, quas hactenus excogitavit peritia Medica, maxime expeditam atque efficacem ad virus illud venereum valde obrundendum, & malignitatem ejus perniciosam abunde frangendam, si minus ea valet non raro ad venenum istud penitus delendum. Videtur enim Auctor hanc inclinare opinionem, nempe luem veneream radicitus extirpari vix unquam posse.

V. Ligna exsiccantia, gummi, corticem & lignum Guajaci, lignum sassafras, atque radicem Salse-parilla & China ex se numquam apud

(a) In Tractatu suo proæmio.

(b) Lib. 2. Observ. 7

(c) Ibid. Observ. 2

(d) In præfat.

Anglos scopum attingere hydragyro prætermisso, venenumque venereum non posse penitus delevere & extinguere: Tamen robur nativum erigere & fovere, palloremque huic morbo congenitum in viridum ac sanum colorem certo certius immutare unde tantum fere emolumenti naturæ humanæ conferunt, & debilitatæ suppetias salutaris præbent, quantum damni & nocuenti hydragyrum corpori infligit, ut illi videtur.

VI. Inpostores illos imperitos, turpissimos lucriones ac nebulones vulgares, qui sine Mercurio, sine quacunque molestia, & nescio quibus Arcanis insulsis curationem brevissimam necnon infallibilem omnibus lue infectis cum insigni impudentia publice pollicentur, argumento bacillino quam Medico digniores esse, & fascibus Magistratum aut collistrigio, prout veteratores perfidos, potius castigandos esse, quam disceptationibus aut ullis rationum momentis accipiendos.

VII. Demum in Anglia ab ignaro vulgo credi lue infectos, si cum sana muliere mutuis amplexibus sese commiscuerint, a labe omni venerea confestim fore immunes, ex quo stupido & perniciosi errore virgines innocuæ quamplurimæ periire. Idem quoque & in Italia olim creditum fuisse supra notavimus pag. 305. ubi de Hercule Saxonia.

JACOBUS VERCELLONUS, Pedemontanus, natus anno 1676. Sordevoli (a) apud [b] Bugellas, Medicinæ operam dedit Mompelii desinente præterito sæculo. Inde Romam petiit anno 1699. ubi in Archibospitali Sancti Jacobi incurvabilem praxim Medicam exercuit; unde in patriam redux Medicinam fecit Astæ, in urbe Episcopali Pedemontii, in qua commorabatur ipso anno 1724.

1716.
(a) Mangetus, in Bibliothecæ Medicæ.

(b) In Provincia Bugellensi, Gallicæ de Biela.

(c) In Prefatione.

Primam manum Operi suo de lue venerea admovit anno 1701 (c) ætate paulo junior, & annorum circiter viginti quinque, sed ut ipse ait, suarum partium esse duxit, ut incredibili ferme syphiliticorum numero opitularetur, qui operum suum imploratum veniebant.

Fidem omnem pene superat id quod ipse ultro confitetur, se nempe tunc temporis ita ignarum fuisse eorum, quæ in Medica Republica hæcenus gesta fuerant, ut censeret ante se neminem extitisse, qui venereorum morborum causas, differentias, signa & curationem denique tradidisset; ac ideo sibi potissimo jure Operis sui editionem urgendam tunc visam esse. Eam tamen aliquot annos suppressit consilio Bartholomæi Torini Archiatri Pedemontani, & Joannis Fantoni Professoris Taurinensis. In lucem tandem prodijt Astæ anno 1716. in 8. cum sequenti inscriptione, *De pudendorum morbis & lue venerea Tetrabiblion.*

Constat Tractatus ille Vercelloni Capitibus quatuor, quorum unumquodque in plures articulos & paragraphos subdividitur.

Primo conatur probare ex pura venere etiam impurum nasci, si peccetur in excessu, ac sæmina nimio concubitu exagitetur, præsertim si cum mul-

multis misceatur, quorum confusa semina corrumpantur. Sed infirma sunt ea, quæ proferunt argumenta, & jam a nobis in hoc Opere abunde convulsa supra Lib. I.

Capite altero differit de *Pudendagra muliebri*; hoc est de gonorrhœa virulenta mulierum, cujus causas, differentias, symptomata, diagnosim & prognosim distinctis paragraphis explicat.

Tertio Capite agit de *Mentulagra*, hoc est de porris, verrucis, ulceribus cancriosis, bullis crystallinis, phimosis & paraphimosis, quæ balano, fræno, præputio, mentulæ in viris accidunt, sicut etiam de gonorrhœa virulenta virorum.

Demum *Capite quarto* verba facit de bubone inguinali seu pano venereo, de rhagadiis & verrucis coxarum præsertim in mulieribus; de anicristis & condylomatibus, ac demum de lue venerea, quam *si recens & in primo aut secundo gradu fuerit*, Guaiaci aut Salsæ-parillæ decoctio curari ait; minime vero, *si vetus sit & ad tertium gradum pervenerit*, quo tempore Mercurio tantum cedit.

Multa quidem sunt in hoc Opere, quæ laudi, ut jam dicta satis indicant; sed non pauca etiam, quæ vitio vertenda sunt. Nam 1. Multa falsa, omissa, perperam explicata, aut negligenter tractata sunt. 2. Declarationis est styli tumor, qualis materiei minime convenit, quæ ornari negat contenta doceri. 3. Absent lucidus ille rerum ordo, qui in dogmatica Dissertatione in primis requiritur. 4. Demum, quod potissimum est, curatoris methodi nec ea qua par esset diligentia expositæ sunt, nec remedia complectuntur tutissima, efficacissima, usu maxime comprobata.

GUILLELMUS COCKBURNE, Anglus, Doctor Medicus & Societatis Regiæ Londinensis Socius edendum curavit Lugduni Batavorum in 12. anno 1717. Tractatum in duas partes distributum, cui titulum fecit *Virulentæ gonorrhœæ symptomata, natura, causæ & curatio*. Cum libellus ille, qui Gallice redditus Lutetiæ fuit anno 1730. passim obviis sit, haud opus est summa illius capita sigillatim explicare: Satis est annotasse circa duo potissimum Auctorem laborare; nempe I. Ut (a) statuatur in viris gonorrhœæ sedem, numquam in prostaticis, nec in vesiculis seminariis esse, sed in ipsis semper glandulis sive lacunis urethræ.

II. Ut (b) approbet usum cujusdam injectionis, qua fluentis materiei acrimoniam citissime mitigari, atque adeo gonorrhœæ virulentiam tutissime, ac sine ullo periculo compesci asserit.

Verum cum præparationem hujusce injectionis, quam tot tantisque laudibus extollit ceu efficacissimam & maxime præsentaneam, nullibi explicet, merito culpandus esse videtur, ut qui per avaritiam de industria silen-

1717.

(a) Cap.
4. Part.
prioris.(b) Cap.
1. Part.
posterioris

silentio supprimat remedium, quod ipse ait non gonorrhœæ modo virulentæ, sed etiam fluori albo utiliter conducere, atque adeo pessimo consilio humano generi invidet saluterum auxilium; quod & virum probum & ingenuum Medicum dedecet.

(a) Part.

2. Cap. 1.

(b) De

Benefi-

ciiis, Lib.

16. Cap.

28.

1717.

Neque audiendus est, dum (a) silentii sui odium conatur deprecari, quasi remedium illud ideo celet, ne vulgus perditorum hominum illius usu quasi certo prophylactico a futuræ gonorrhœæ periculo jam securum libidini se effrenatius dedat: Quasi vero, ut a [b] Seneca egregie dici memini, *Medicina & sceleratis opem non ministraret, & compositiones remedium suppressisset ullus umquam, ne sanarentur indigni.*

GHERARDUS [c] GORIS, Medicinæ Doctor.

Mercurius triumphator, continens argenti viri historiam, indolem, prerogativam & noxas in morborum chronicorum, præsertim luis venereæ curatione. Annectitur de curationibus sympatheticis Tractatus. Lugduni Batavorum 1717. in 8.

(c) Ex

Actis Li-

psensib-

us, an-

ni 1717.

pag. 154.

Auctor ille varia proponit de origine, natura, purgatione, variisque præparationibus Mercurii, quæ singula non sunt hujus loci. Quod ad luem veneream attinet.

1. Contendit non habuisse sua incunabula annis 1493. & 1494. licet tunc temporis plurimum sævierit; quandoquidem Guillelmus Salicetus, & Valefcus Tarantanus, qui diu ante vixerunt, plurima luis venereæ symptomata commemoraverunt.

2. Statuit luem illam nulli adulto supervenire, nisi qui contagio sese polluerit.

3. Posthabitis omnibus aliis medicamentis, Auctor Mercurium tantum probat, dicitque a se novum modum purgandi Mercurii reperi- tum esse, (*quem tamen non prodit*) unde Mercurius ingenta virulenta exutus absque ulla salivatione virus debellat, atque ex corpore per sudores, urinam, insensibilem transpirationem &c. tam placide eliminat, ut ejus energia, etiamsi valde efficax sit, vix ab alimen- tibus sentiat.

4. Iple tamen salivationem non penitus rejicit, sed existimat illam haud temere instituendam esse, & nisi cum morbus jam nimis inveteratus & pertinax aliis remediis non amplius cedit.

5. Affirmat tamen Mercurium, qualis vulgo adhibetur, non esse verum & specificum luis venereæ antidotum, cum pryalissimum excitando utiles pariter ac inutiles humores evacuet.

6. Sed contendit Mercurium e metallis extractum salivationem inducere nullam, atque ita præstantissimum & tutissimum esse medicamentum & in morbis venereis polychrestum.

Horum pleraque parum comperta sunt, vel temere dicta, ac proinde

cre-

credulum Auctoris animum arguunt, qui aliorum fide multa proferre non dubitet; quod sane manifestius liquet ex adjuncto Tractatu *De curationibus sympatheticis*, ubi conatur ille probare curationes, quas vulgo *Magneticas* dicunt, veras esse.

N.....BOUEZ DE SIGOGNE.

1721.

Methode nouvelle pour guérir les Maladies Vénériennes, beaucoup plus sûre & plus aisée qu' aucune de celles qui ont été en usage jusqu' ici, avec une réfutation des anciennes hypotheses touchant les memes Maladies. A Paris 1722. in 12.

(a) *Quid dignum tanto feret hic promissor biatu?*

Vanam tantum declamationem, in qua Auctor, qualiscumque sit,

(b) *Id sibi negoti credidit solum dari,*

Populo ut placerent quas fecisset fabulas,

Et ut arcano cuidam, quod ambiciose venditat,

(c) *Verbosus acquireret suis famam strophis.*

(a) Horat.

in arte

Poetica

(b) Ter-

rent. in

Prologo

Andriae.

(c) Phae-

drus, Fab.

14. Lib. I

Cæterum hujus Operis Auctor ad curationem luis venereæ, cætero-
rumque morborum quorumvis, duobus tantum remedijs utitur, atque
adeo ægrotis omnibus eandem methodum adhibet, quo nihil potest
fingi ineptius. 1. Exhaustiri jubet quotidie mane jejuno ventriculo
duas libras aquæ, in qua admistum latet sal quoddam catharticum
Martiale, forte sal Martis purgans vulgo notum, quo alvus per diem
blande solvitur. 2. Bis in die mane & vespere exhibet in infuso ca-
lido Theæ guttas aliquot *Elixirii* ut ille vocat rubicundi, quod ipse
coniicio esse solutionem cinnabaris Mercurialis vel præcipitati rubri in
aqua forti edulcorata, qualis adhibetur ad Tincturam, quæ non ita
pridem magnifice jactabatur Lutetiz nomine *Les Gouttes du Général la Motte*.

ROGERUS DIBON, Chirurgus Parisiensis.

*Description de la nature, des causes des Maladies Vénériennes, & de
plusieurs remèdes propres a les guérir. A Paris in 12. 1724.
Tome 2.* 1724.

Sub modestiore titulo vana subest declamatio præcedenti compar &
eodem fine conscripta, nempe ut arcano cuidam auctoritas concilia-
retur. Prostant ad Operis calcem aliquot remediorum formulæ ex
diversis Auctoribus conquistæ, sed neque satis diligenter selectæ, nec
ut plurimum satis tutæ, & in quibus præinde periculum est ne junio-
res Chirurgi rectæ morborum venereorum curationis nondum gvari
offendant.

Dicunt a Chirurgo illo ad curationem luis venereæ exhiberi mane
jejuno ventriculo bolum ex præcipitato Mercurio albo multiplici lotio-
ne

ne mitigato, cum addito grani semisse pulveris de Algarot, ac superbendas præscribi libras duas ptisanæ ex levi decocto salis-parillæ & folliculorum sennæ. Hinc primis diebus nausea, vomitum, imo vero vomitio laboriosa proripitur, sed deinceps usu iterato ptisanæ purgantis omnia per inferiora ita deturbantur, ut nullus vel levis tantum pryalismus superveniat, quo tamen confidit ille lucem veneream radicitus extirpatum iri.

Verumtamen, cum numquam satis certa sit arcanorum exploratio, ut quæ debita opera mille modis succari soleant, ne quid in Chirurgum illum peccemus imprudentes, demus arcanum, quo gloriatur, a proposito remedio omnino diversum alterius qualiscumque naturæ esse. At certe aliquod unum est e præparatis mercurialibus. Demus iterum e numero blandiorum esse, quorum tuta est efficacia: Demus etiam tertium rite confectum præparatumque facultatis rodendi omnino expers esse. Ea quidem maxima sunt, necdum tamen satis. Demus ergo *quartum* arcanum illud tempestive semper & caute adhiberi, eaque dosi quæ ægrotantium viribus, ætati, temperamento, sexui, morbo conveniat. Ille sane æquiores animum a nemine posset exposcere. Quid inde porro? An ideo futurum est ut curatoria methodus, quam ille adhibet, legitimæ hydrargyrosi præferenda sit? Nullo modo prorsus: Sed methodus illa, ut de usu præparatorum mercurialium supra dictum est, *Lib. 11. Cap. 9.* in curanda lue venerea inveterata atque difficili plerumque inefficax erit, & si quando satis efficax sit, quod rarum futurum est, nihilominus tamen etiam tum longo concedet intervallo legitimæ inunctionum mercurialium administrationi, ut *ibidem* probatum fuit.

ANTONIUS DEIDIER, Monspeffulanus, Professor Medicus in Facultate Monspeffulana, scripsit *Dissertationem de morbis venereis*, quæ Monspelii anno 1723. in 8. primum edita, Londini iterum recusa est anno 1724. cum adjuncta *Dissertatione Medico-Chirurgica de Tumoribus*.

In illa Dissertatione præcipua rerum capita methodique curatoriz paucis sed enucleate explicantur. Contendit Auctor morbos venereos referendos esse in animalcula numerosa, minima, agillima, maxime prolifera, quæ ab infectis in sanos celeri contagione propagentur; quæ loca ubi hærent moriunculis impetant, imo etiam depalcantur, atque earatione symptomata omnia, quæ morborum venereorum propria sunt, inducant. Sed hæc quantumvis singularia videantur, nova tamen non erant, ut quæ a Davide (a) Abercrombyo indicata anno 1684. & a Nicolao HartsoeKero jam dicta essent anno 1699. in (b) *Epistola ad V. C. Nicolaum Andry* data.

(a) *Traité de la guérison des Vénérables*
(b) *Traité de la guérison des Vénérables*

Sanc

Sane longe prius similia quoque de Peste commenti fuerant R. P. Athanasius Kircherus Societatis Jesu in *Scrutinio Physico-Medico Luis, que dicitur Pestis etc.* edito Romæ anno 1658. & R. P. Joannes Sa- guens Ordinis Minimorum in *Systemate Pestis Physico* Tololæ anno 1721. typis edito. Profecto ut libere dicam, mirum est [a] *Homi- nem ingeniosum dixisse id quod si neges probare non possit: Ut enim illa* (a) La-
 nullo fundamento præferuntur, sic nullo quoque argumento opus est *stant. In-*
 ut refellantur, quemadmodum jam egregie animadversum est a lau- *sitione*
 dato Nicolao Andry. *Génération des Vers, Chap. 4. Art. 1.* *num divi*
nar, Lib.
3. cap. 23

ANTONIUS BENEVOLUS, Chirurgus Florentinus.

Nuova proposizione intorno alla Caruncula dell'urethra, detta Carnosità.
 Fiorenza. 1724.

1724.

Auctor ille refellit eos qui putant carunculas urethræ esse excre-
 centias in urethra subortas. Nititur potissimum observationibus tum
 ab aliis, tum a se institutis in cadaveribus eorum, qui dum viverent,
 stranguriæ obnoxii erant, & in quibus tamen post mortem contem-
 dit nullam excrescentiam unquam repertam fuisse.

Statuit ipse carunculas illas nihil esse præter caput gallinaginis,
 seu ut ille dicit, granum hordeaceum tumefactum, inflammatum,
 suppuratum, exulceratum; quod etsi sæpe verum esse concedam, in-
 de tamen non sequitur ut perpetuum sit, cum certis liqueat obser-
 vationibus dari aliquando veras excrescentias; cum præterea certum
 sit duriorē urethræ cicatricem, aut skirrhodem prostaticarum tumo-
 rem stranguriæ habituali locum dare aliquando sine ulla labe capitis
 gallinaginis, de quo vide *Lib. III. Cap. IV. §. 4.*

Ad curationem proponit Benevolus, ut in urethram immittatur
 candela cerea, vel stylus plumbeus ter vel quater in die per 15.
 aut 20. dies cujus apex ultimis curationis diebus cerato diapalmæ ob-
 ducendus est.

PETRUS VIOLETTE DU BOIS, Chirurgus Parisiensis.

1725.

Nouveau Traité des Maladies Vénériennes, par P. V. du Bois, Maître
Chirurgien de Paris, ancien Prevot & Garde de sa Communauté.
 A Paris 1725. in 12.

In hoc brevi Tractatu, tum modus usu vulgo receptus curandi gonor-
 rhæam virulentam, cariem pudendorum, bubones venereos, tum me-
 thodus administrandæ hydrargyroscos in lue confirmata ita proponuntur,
 ut Liber utilis quidem esse possit, quoties omnia ex voto succedunt; si
 vero morbi difficultate, medentium incuria, vel ægrotantium culpa infor-
 tunia quædam accidant, qualia non raro, usus ptane hullius, cum de illis

R r

in

modum ludificari; mirorque eos ad quos pertinet harumce rerum curatio & administratio in reprimendis ineptiis vel potius coerendis maleficiis istiusmodi indormire, quæ neglecta in magnum tum rei medicæ, tum rei publicæ detrimentum recidunt.

EDITIO tertia LUGDUNO-BATAVA Collectionis Luisininz. 1638.
Utilitas summa Collectionis Venetæ ab Aloysio Luisino procuratæ, qua in unum volumen cogeantur Opera Auctorum plerorumque, qui de lue venerea scripserant ante annum 1567. Virum clarissimum Hermannum Boerhaave, Professore Medicum Lugduno Batavum, minime latuit, ideoque cum veterum Editionum exemplaria rariora essent, Typographis Batavis, ut novam Editionem molirentur auctor fuit, quæ prodiiit Lugduni-Batavorum in folio an. 1728. & cui titulum fecit *Aloysii Luisini Aphrodisiacum, sive de Lue venerea*.

Dedit ipse in hac tertia Editione sedulam operam, 1. Ut [a] Im-
pressionum vitia, quibus Italica Editiones sadabantur, emendarentur. 2. [a] Boer-
Ut ex ipsis allegatis Scriptoribus loca restituerentur propria. 3. Ut reme-
diorum formulæ, quæque eo faciunt, alio excuderentur charactere. 4. Ut
locupletissimus index & usu vere pulcher ingenti Operi subnecteretur. Imo
Operi præfixit egregiam & eruditam Præfationem, de qua in articulo
sequente, ubi multis explicat quid ipse de veneni veneriei natura, pro-
pagatione, sede & effectibus sentiat.

Sed utinam Illi satis otii fuisset, ut susceptam hanc utilissimi Operis Editionem perfecte adornare potuisset, atque in hunc finem.

1. Auctores, qui in Collectione Veneta existant, ordine chronologico disponere, pro tempore quo singulorum Opera scripta, vel saltem edita sunt. Quid enim inordinatius, quam omnia ita promiscua esse, ut Nicolaus Leoniceus secundum tantum locum occupet, Coradinus Gilinus decimum quartum, imo Gaspar Torella vicessimum tertium; cum certum sit Auctores illos scripsisse anno 1497. anno scilicet tertio post ingressum morbi, adeoque omnium primos.

2. Auctorum Opera, quorum pleraque pro illorum temporum more uno orationis contextu scripta sunt, in capita, capitæque ipsa in membra parti, majoris perspicuitatis gratia.

3. Loca ex Auctoribus antiquioribus laudata alio charactere distinguere, ut nunc est ex usu, eo scilicet fine ut si opportunitum videatur, prætermisiss inter legendum iis locis, orationis seriei pressius instare liceret.

4. Peculiari indice, vel appositis notulis edocere qui qualesve fuerint Auctores qui laudantur. Hac enim ætate nostra Medicorum plurimi Historiæ Medicæ satis gnari non sunt, atque adeo ne nomine quidem plerique norunt Abolai, Aly Abbatem, Viaticum & Zoar,

Rr 2

Azar-

Azarninum, Isaacum Ebenaram, Pandestarium, Conciliatorem magnum, Jacobum de Forlivio, Arculanum, Franciscum de Pedemontio, Baverium de Baveriis, & alios ejusdem farinae sexcentos, qui in Collectione illa passim laudantur.

5. Demum Collectionem Luifiniam amplificare additione Austorum, quocumque de morbis veneris ante annum 1567. scripsere, & qui a priore Collectore omissi vel ignorati fuerunt, inter quos ipse numero Joannem Salicetum, dictum Vveidman & Meichinger, qui anno 1497. Simonem Pistorem, qui annis 1498. & 1500. Martinum Polichium, qui anno 1500. Conradum Schelling, qui anno eodem 1500. Josephum Grundbeckium, qui anno 1503. Bartholomæum Sileber qui anno 1525. Jacobum Abethencourt, qui anno 1527. Augustinum Niphum Philotheum, qui anno 1534. Joannem Antonium Roverellum & Joannem Vochs, qui anno 1537. Thomam Philologum, qui anno 1538. Michaellem Angelum Blondum, qui anno 1542. Rodericum Diaz de Isla, qui anno 1555. ac tandem Hieronymum Montium, qui anno 1558. scripsit.

1717.
1718.

HERMANNUS BOERHAAVE, Vianensis Batavus, Vir de re Medica optime meritis ac Scriptis suis egregiis orbi litterario notissimus, maximam famam in Academia Lugduno-Batava sustinet, fama tamen ipse major.

Scripsit anno 1717. Diatribam de lue venerea, quæ Præfationis loco præfixa fuit Editioni Lugduno-Batavæ Collectionis Luifiniae anno 1718. & quæ Gallice versâ Lutetiæ prodiiit hoc anno. Multa quidem ibi reperire est acute cogitata, graphice descripta, uno verbo Austore suo dignissima quibus recensendis ideo superledeo, quod sit hoc Opusculum in omnium manibus. At vero ut libere & ingenue dicam, duo quoque occurrunt ibidem, quæ dicta nollem, alterum in Theoria, in Therapæia alterum.

Primo. Quod ad prius attinet, existimat Boerhaavius veneni veneri sedem * *else in illo humore pingui corporis humani, qui naturaliter in bene sanis replet eam partem, quam adiposum panniculum Veteres, Hodierni & cellulosa membranam vocant*..... Ita ut si contagiosa labe per poros epi-

* Constat quidem a Boerhaavio sedem veneni veneri in adiposa membrana constitui, dum ulcera cancrofa molitur. At vero dubitatur utrum velit membranam illam sedem esse perpetuam veneni veneri atque adeo perennem luis confirmatæ fomitem. Sane in tota ejus Diatriba nihil legisse memini, quod huic conclusioni aperte faveat. Quapropter ab errore forsitan non vacat nuperus Interpretes, qui Diatribam illam gallice vertit, cum *Discours préliminaire*, pag. 3. firmissime asseverat *veneris contagionem juxta Boerhaavium sedem habere perennem & jugem in adiposa membrana*.

cutaneum integumentum superficialiter ad summum, funditus vero minime erosum fuisse demonstrat. Quæ de pustulis venereis debent quoque intelligi, quarum sedes est in sebaceis valculis sive lacunis per cutem sparsis.

III. Neque suam indolem deponit virus venereum, dum inveterascit. Tunc quidem contaminato sanguine humores, qui a sanguine scaturiunt, contaminari necessum est, non promiscue tamen & indiscriminatim, sed ordine certo, & plerumque secundum scalam affinitatum supra [a] propositam: Nempe commiscetur 1. Cum humoribus seminalibus; unde pudendorum morbi, Tumor testium, Bubo, Porri & Verrucæ, Ulculcula. 2. Cum humoribus cutis tum sebaceo tum mucoso; unde vitia cutis, herpes, maculæ, rhagades, alopecia, pustulæ. 3. Cum humoribus mucosis oris, faucium, & narium; unde ulcera gingivarum, palati, faucium, nariumque. 4. Cum synovia tum articulari tum musculari; unde dolores Arthritici, Rheumatici, Ischiadici. 5. Cum medullari ossium adipe; unde ossium Exostosis, Hyperostosis, Caries, Osteosarcosis. 6. Cum limpha, unde tumores glandulosi, aut Kystici, ut Melicerides, Atheromata, Steatomata. 7. Demum cum humoribus, qui oculorum auriumve proprii sunt, unde multiplices earundem partium affectiones, sed in iis omnibus constat experimento nec adiposam membranam, nec ulla membranz illius lacinias affici, lædi, pessumdari, neque adeo adiposam pinguedinem, qua turgent illius cellulæ, ullo modo vitiari.

IV. Verumtamen non nego labem membranz eidem aliquoties inferri, si pustulæ venereæ, vel quod pejus est, ulcera ejusdem moris cutem depascentia sibi diutius permittantur & per media suffossæ cutis stamina ad subjectum adipem agant cuniculos; si tubercula aut ganglia suppurata subcutaneos abscessus generent; imo vero si virus venereum cum adiposa pinguedine sponte commisceatur, quam ejus virulentiz (b) inaccessiblelem esse nequaquam puto. Sed hæc nedum quotidiana sint, inter insolentia luis symptomata referenda sunt, in syphiliticis, si unquam, certe tarde & raro obvia, unde videtur egregie refelli opinio de sede morbi in adiposa membrana.

V. Fateor cum Boerhaavio, dum adiposa membrana casu quocumque compurescit in hunc modum, *musculos nudatos vividissimos pulcherrimisque apparere, ulceraque solam tantum pinguem tunicam depasci, nec cuti nocere, nisi quatenus consumptis vasibus cuti suppositis, subducto paulo, hæc ipsa quoque tandem perit.* Sed id commune habet suppuratio, quam lues venerea in adiposa membrana potest aliquando efficere, cum suppuratione, putrefactione, gangræna quacumque membranz ejusdem a causa quavis alia; neque adeo id inde repetendum videtur, quod

(a) Lib.
IV. cap. 2.
(b) Vid.
supra pag.
328.

quod venereum virus adiposam membranam affectet singulari modo, sedemque in illa propriam habeat; sed potius quod peculiaris adiposæ membranæ conditio locum det mali incrementis opportunior. Nempe mollis est & laxi contextus, tenuissimis ac præteritis cellulis tota constat, perpetuo turget congesto succo adiposo, qui tardissime circulator, ac in loco eodem idem hæret diutissime: Inde fit ergo, ut confociata causarum efficacia ab adipe, si vitio qualicumque corrumpatur, facile labem sentiat celerem ac longe & late diffusam, sentiatque sola intactis & illæsis tum subjectis musculis tum cute superjecta, quod partes illæ, cum densiore & firmiore textura polleant, impetentium causarum energię minus pateant, hærentes humores fortius expellant elaterio insito, noxiosque facilius renouent, ac proinde multiplici nomine ab imminetibus injuriis sese diutius & efficacius immunes tuteantur.

VI. Cæterum hæc opinio de sede luis venereæ in adiposâ membranâ, cujuscunque pretii esse videatur, si non perfecte expressa, at saltem non obscure olim adumbrata fuit, quod scio ne Boerhaavio quidem suboluisse cæteroque eruditissimo, cum ipse prior & ultro non indicaverit. Constat tamen temporibus Antonii Saporæ, quondam in Academia Monspessulana Medicinæ Professoris, hoc est ante annum 1570. exstitisse nonnullos, qui non adiposum, ut Boerhaavio visum est, sed *carnosum panniculum in universo corpore diffusum, illudque regentem constituerent, a quo perniciofa hujus labis [venereæ] scaturiginem emanare crederent*, quos refellendos suscepit Saporæ (a) *Traçta- (a) Vid. riginem emanare crederent, quos refellendos suscepit Saporæ (a) Traçta- supra pag. tus de Tumoribus præter naturam Lib. III. Cap. 50. Usque adeo & de 544-544. opinionibus quoque vere dici potest, quod de vocibus ab Horatio dictum est, multas nempe renasci, quæ occiderant, & multas casuras esse, quæ nunc in honore vigent.*

Secundo. Circa posterius, quod ad Therapeutiam pertinet, haud diffitetur quidem Boerhaavius Mercurium ad expugnandum hoc malum efficacem merito haberi. At vero contendit simul medicatam ejus potestatem haud valere corrigere venereum tabum, quando ille figitur in locis, ad quæ actio cordis & arteriarum vix pertingit: Hinc Mercurio cariem diploes cranii non sanari; Inde & ossium medullam inguinatam hoc malo vix repurgari: Gonorrhœas in sola cellulosa penis fabrica berentes numquam sanari: Officula tenerrima, solis tenuibus testâ membranâ servari non posse ne excidant Unde concludit ille tunc ubi deficit Mercurius, juvare decoctum Guaiaci Hutteniana methodo exhibitum, quod cum argumentis tum observationibus conatur confirmare. Sed de his jam diffuse supra (b) diximus Lib. II. Cap. 9. quod adiri potest.

(b) Pag. 163. & seqq.

1731.
1698.

CAROLUS BARBEIRAC, Cæsariensis apud Gallo-Provinciales; natus anno 1629. Medicinæ operam dedit in Academia Monspeffulana, ubi Doctoris Medici gradum assecutus est (a) anno 1649. Medicinam cum summa laude exercuit in eadem urbe, ubi vitam cum morte commutavit anno 1699. ætatis 70.

(a) Ex
Actis Fa-
cultatis
Medic.
Monspe-
sul.

Prodiit nuper Amstelodami Liber Gallice scriptus cum sequente inscriptione:

Dissertations nouvelles sur les Maladies de la Poitrine, ou Cœur, de l'Estomac, des Femmes, Vénériennes, & quelques Maladies particulières, par M. Barbeirac Docteur en Médecine de Montpellier, in 12. 1731.

In Tractatu, qui de Morbis venereis inscribitur, paginis 50. Capitibus 7. differtur. 1. De Lue venerea. 2. De Gonorrhœa virulenta. 3. De Bubone venereo. 4. De Ulcusculis cancerosis. 5. De Porris & Verrucis. 6. De Phimosi & Paraphimosi. 7. De Hyperfarcosi in urethra.

Cæterum in hoc toto Libro tum de venereis, tum de cæteris morbis nihil legitur, quod non sit non modo vulgare, sed etiam ita mutilum, vitiosum & misere deturpatum, ut pro certo teneam hoc Opus non Caroli Barbeirac, sed junioris cujusdam Scholastici factum esse rerum medicarum plane ignari. Doldico sane nomen Practici sua ætate celeberrimi ab Anonymo Editore tam turpiter traduci, mirorque maleficia istiusmodi tam alte dissimulari ab iis, quorum interest Caroli Barbeirac gloriam factam tueri.

Interim caveant Lectores ne Barbeiracii auctoritate putent ad curandam lue veneream posse tuto frictions quotidie adhiberi, & ad frictionem quamlibet uncias quinque vel sex unguenti præscribi, ut in hoc Libello proponitur *Cap. I.* Hac enim temeraria therapæia ægrotos in manifestum capitis discrimen adducerent. Fateor equidem id olim ex usu fuisse Barbeiracii ævo; sed novi quoque pericula summa, quibus id remedium genus tunc infamabatur. Itaque prudentis Editoris fuisset praxim jam dudum antiquatam suppressere, vel saltem non evulgare hac ætate nostra sine nota censoria.

1732.

DANIEL TURNER, Anglus, e Collegio Medicorum Londinensium, Anglice scripsit nuperrime Tractatum de Morbis venereis, cui sequentem inscriptionem præfixit.

(b) Ita
scribit
Auctor.

(b) *Syphilis. A practical Dissertation on the venereal Disease, in two parts, London, 1732. in 8. Hoc est Syphilis, sive Dissertatio practica de Morbo Venereo, in duas partes distributa. Londini 1732. in 8.*

Agi-

Agitur in priore Tractatus illius parte potissimum de gonorrhœa; in posteriore vero de Lue venerea. In utraque de morborum singulorum ætiologia & therapeia satis copiose differitur, sed ordine parum composito, saltem non ea methodo quæ lucem afferat & quam in Anglorum Medicorum Operibus plerumque desiderari solemus.

I. Statuit hic Auctor cum Guillelmo Becketto a pag. 12. ad pag. 18. Gonorrhœam virulentam & Luem veneream ante annum 1494. in Europa, nedum ignotas, sed vulgo grassatas fuisse; cui opinioni ut fidem faciat, eadem profert testimonia, vel pleraque saltem, quæ a Becketto adducta supra recensuimus *Lib. I. Cap. 6. Nempe* 1. Loca quædam deprompta ex Opere manuscripto Joannis Arderi, Chirurgi Angli, qui exeunte decimo quarto seculo vixisse creditur; & ex collectaneis quibusdam Medicis, quæ scripta dicuntur circa annos 1390. & 1440. ubi de *arsura* sive incendio, Anglice *burning* sive *brenning* mentio est, quod morbi genus venere olim contrahebatur, & quod ideo volunt idem fuisse cum gonorrhœa virulenta, quæ hodie impura venere concipitur. 2. Integra statuta Lupanaris Londinensis in suburbio *Soutvark* dicto olim prostantis, quæ anno 1430. sancita creduntur, & ex quibus articulos aliquot ubi *nesanda scortorum infirmitate* & *de prostibulis arsura infectis* quæstio est a Becketto in opinionis suæ confirmationem adduci supra vidimus.

Sed cum his abunde satisfactum fuerit loco supra laudato, dum testimonia eadem a Becketto adducta diluimus, ne cramben recoquamus argumentum eodem denuo tractando superfedere visum est.

II. Circa propagationis modum Auctor confitetur quidem pag. 54. se quondam sensisse luem veneream contrahi non posse, nisi in genitalibus locis morbi quidam locales prælucere: At vero ait a pag. 55. ad pag. 58. sibi jam secus videri, quam opinionem ut probet, subjicit *ibidem* unam, alteramque pag. 297. observationem, quas ipse egregias, firmasque esse putat, sed quæ mæo quidem iudicio rem evincunt nullo modo.

III. In curanda lue venerea salivationem adhibet a pag. 180. ad pag. 190. quam movet interno præparatorum mercurialium usu, si morbus levis & recens; externo unguenti mercurialis illitu, si morbus gravis sit aut inveteratus. Laudat vero suffumigia ex cinnabari ad cariem pudendi, ulcera narium, nodos, gummata, dolores fixos, cæterosque morbos topicos.

IV. Nihil esse videtur in agitandis iis, quæ ad se tantum spectant & in sui defensionem scripta sunt. Iis etenim, etiam si vera forent ac legitima, cum ad rem plerumque non pertineant, constat Lecto-
ribus

ribus nauseam moveri, atque adeo Operis pretium non parum inaelevari.

V. In Circulatores, qui ad curandos morbos venereos audent temere aggredi, passim stomachatur, nec sine causa, cum id hominum genus, quod & vetabitur semper & semper retinebitur, cordatis Medicis, artisque suae amantibus merito invisum sit & odiosum. Sed quid tamen opus est cum iis ratione tam saepe agere, qui carent omni ratione, qui nullis inniuntur principiis, quorum varia est ac mutabilis praxis, notaque temeritas?

VI. Narrat ille pag. 99. ab Agyrta quodam Londinensi ad gonorrhoeae curationem diebus singulis in decocto avenaceo exhibitas fuisse guttas x. xij. vel xv. solutionis 3 j. sublimati corrosivi in alcoholis sive spiritus vini 3 j. cuius pessimum facinus, atque gravi poena animadvertendum exhorresco quidem, sed miror nullomodo, ut qui dum pro comperto habeam Circularorum imprudenciam cum impudentia parem esse.

VII. Ah huiusce Libri calcem prostant 1. Historiae triginta aegrotantium totidem, morbis venereis diversimodè infestorum, quos curandos Auctor habuit.

2. Remarcs upon Dr. Villoughby's Translation of M. Chicoynneau's method of cure by the Mercurial friction; Et M. Palmer's Letter to the Author about the same: Id est Animadversiones in methodum curandae luis venereae usu inunctionum mercurialium, quae a D. Chicoynneau scripta, & a Doctore Villoughby e Latina Lingua in Anglicam versa est, cum Epistola D. Palmer ad Auctorem data de eodem argumento.

1733. 3. A Discourse of gleets, inscrib'd to the surgeons, id est Dissertatio de leboribus ad Chirurgos scripta.

PETRUS DESAULT, Burdigalensis, Doctor Medicus & Collegio Medicorum Burdigalensium adscriptus, typis edendum curavit Burdigalae anno 1733. Tractatum sequentem in 12.

Dissertation sur les Maladies Vénériennes, contenant une méthode de les guérir sans flux de bouche, sans risque & sans dépense.

Adiectae sunt ad calcem duae aliae Dissertationes, altera de Rabie, altera de Phthisi.

Hic Auctor, qui certe valet ingenio, nec indiligens est rerum Medicarum scrutator, videtur tamen in Medicinae Historia nimium (a) Partis 1. chapt. 3. hospes.

1. (a) Contendit luem veneream antiquitus cognitam fuisse, & veneri vulgivagae coevam esse, contra quam a plurimis demonstratum fuit.

2. (a) Conatur astruere luem veneream a vermiculis venereis produci, ^{(a) Part. 2, chap. 1.} qui partes, in quibus hospitantur, rodant & depascantur; qua in re vidimus supra Virum eruditum Antonium Deidier jam illi præluisse, ut Deidiero Abercrombyum.

3. Demum (b) tanquam novam proponit methodum curandorum ^{(b) Part. 2, chap. 1. & suiv.} morborum venereorum hydrargyrosi intercalata, adhibendo scilicet inunctiones mercuriales per intervalla, & pryalismum, si quis cieatur, cathartico identidem supprimendo; quæ tamen methodus a primis morbi venerei temporibus nota fuit. Qua de re vide hujusce Operis Libri II. Caput 7.

HENRICUS HAGUENOT, Monspelienſis, in Academia patria 1734. Professor Medicus publici juris fecit nuperrime Schedulam seu Disseratiunculum de methodo nova curandæ luis venereæ cum sequente inscriptione.

Mémoire contenant une nouvelle méthode de traiter la Vénère. in 8. Montpelier 1734. 20. pages.

Huc redit methodus illa nova, ut balneatio in qua leviter calida, qualis vulgo ante inunctiones, eadem per ipsam inunctionum administrationem usurpetur. Scilicet præmissa tantum venæ sectione & purgatione ad hydrargyrosim properandum est; & prima statim die, postquam æger e balneo, in quo sederit per horam integram, egressus & exliccatus fuerit, destinata corporis loca more solito unguento mercuriali inungenda, quæ ambo altera vel tertia quaque die pari ordine iteranda sunt per mensem unum & amplius, nisi imminens salivatio vel gravior quidam casus prohibuerit.

Inde ait auctor utilitates non leves manare, 1. Sanguinem dilui & temperari, laxatoque partium solidarum tono immodicos crethismos præcaveri, nimiamque Mercurii vim retundi.

2. Perspirationem per incoſpicua cutis spiracula intendi, ut liquet ex *Aphorismo 25. Medicin. Static. Britannic. Joann. Keill*, unde fit ut non desint, qui in ipsa variolarum eruptione difficiliore balnei calidi usum inpenſe laudent.

3. Utroque illo nomine usû balnei pryalismum efficacissime declinari; quin imo si jam illatus esset, celerrime reprimi; atque adeo propositam illam methodum novam antiquiori plurimum præstare, ut quæ pari successu minorique noxa morbo medeatur.

At vero dubitari potest an ea methodus nova sit. Certe constat usum balnei tepidi in ipſo hydrargyroseos stadio ab antiquioribus quibusdam Scriptoribus pridem indicatum fuisse, non modo a Joanne Almenar, Hispano, qui in *Tractat. de Morbo Gallico*, Cap. 4. auctor est sit die qualibet loca corporis Mercurio illita decocto radicum althææ tepide foveantur, sed expressius a Jacobo Cataneo de Lacu Marcino, qui *Tractat. de Morbo Gallico*, Cap.

6. *Balneum quantum proposito suo conducit tripliciter distinguit; Unum preparativum Aliud prohibitivum, ut in hora operationis pharmaci Et in tempore quo frictiones exercentur; Tercio modo sumitur balneum ut perficiens, cum administratur postquam cessavit operatio pharmaci.* Demum omnium disertissime a Joanne Benedicto, qui *Libell. de Morbo Gallico, Capite 4.* jubet ægrum per sex dies syrupum alterantem, ut de fumo terræ, de buglosso, de epithymo &c. quotidie sumere: *tertia die inungi; sexta purgari soluti via Medicina ea intentione, ut materia quæ deberet pelli ad os, ne fiat nocumentum in ore, per loca inferiora ducatur.* Deinde interpositis nonnullis quæ non sunt hujus loci, sic pergit. *Intentio quinta, quæ die sequenti post purgationem, omnibus videlicet sex diebus reiteranda est, fiat cum balneatione aquæ dulcis, in qua bulliant herbe infra posite aut similes, fumus terre, lapatium acutum, bismarva, camomilla, melilorum, rose, viola: Ad hoc sequetur humectatio, quæ maxime in hoc morbo requisita est.*

II. Sed quid opus est in hujusce methodi antiquitatem anxie inquirere? Si olim usu recepta fuit, certe jam dudum in desuetudinem abierat. Profuit ergo eam renovari, ac experimentis iterum confirmari, cum utilitatem minime spernendam asserre quandoque possit ad curandos ægrotantes illos, qui exsucci, emaciati, biliosi, melancholici, hypochondriaci sunt, & in quibus periculum est ne humorum acrimonia staminumve tendebrium ariditate immoderati partium erethismi, sanguinis in circulando ataxiæ, aut abnormes humorum decubitus inferantur.

III. Porro tamen cavendum ne Mercurii vis funditus perdatur, dum refræuari creditur. Scilicet hac ætate plerorumque Medicorum consilia in id conspirare videntur, ut modis omnibus castrent Mercurii energiam, quam pavidi reformidant, ne dicam horrent; quasi vero nulli darentur limites, quos infra remedii illius efficacia curandæ lui veneræ impar fieret. Jam minima unguenti mercurialis dosis ad inunctionem unamquamque adhibetur; jam inunctio tertia vel quarta tantum die iteratur; jam data opera extergitur unguentum illitum, quod post frictionem in cute superest; jam admissi Mercurii pars interjectis idemdem catharticis præpropere eliminatur. Necdum tamen satis; Nunc proponitur iterati balnei usus, quo illiti Mercurii pars maxima a cute detergitur, quo pacato sanguinis orgasmo ejusdem efficacia notabiliter infringitur. Expecto dum accedat alius, a quo narcotica præscribantur, in quæ sentio nonnullorum vota inclinare, & quibus constat vim Mercurii magis magisque debilitandam esse. Quid inde porro futurum? Nempe ut operose nihil agatur, & ut Mercurius, remedium natura efficacissimum & potentissimum, tot vinculis atque repagulis coercitus, iners tandem fiat ac debellandæ lui veneræ plane ineptus.

IV. Profecto mirari subit Medicorum inconstantiam, & si cum Quintiliano loqui liceat, *inconstantiam.* Norunt illi nec pituitam a ventriculi

culi patietibus emetico extundi posse sine nausea & cardialgia; nec cacochyliam ab intestinis cathartico deradi sine torminibus. Putantne virus venereum, quod natura tam ferum, quod universis corporis partibus altissime insedit, quod omnes humores penitissime contaminavit, sine dolore, sine labore, sine noxa corrigi, destrui, exterminari posse?

V. Sunt præterea in eadem Dissertatione alia quædam quæ videntur haud satis recte dicta.

1. Credit Auctor pag. 2. Inunctiones quotidianas sed partiales a Carolo Barbeirac, celebri ætatis suæ practico; Et discretas ac interpositis aliquot dierum induciis iterandas a D. Francisco Chicoyneau, Archiatrorum comite, in usum Medicum primo inductas fuisse; cum tamen certo constet utramque illinendi Mercurii methodum jam a ducentis annis, atque adeo a primo natæ luis venereæ tempore & notam & ulurpatam fuisse, qua de re vide supra Lib. II. Caput 7.

2. Ait pag. 7. salivationem maximum curationi luis venereæ impedimentum afferre, unde in dissertatione sua totus in eo est, ut salivationi obviam eat. Contra vero supra probatum fuit nulla opera certius quam salivationis motu cognosci posse an Mercurius in sanguinem agat, agatque ea vi qua opus est ad morbi curationem, unde liquet salivationem unicam esse hydrargyroseos cynosuram, qua adoptatum portum appellere valeamus, qua de re vide supra Lib. II. Cap. 9. pag. 171.

3. Concedit ægotantibus, pag. 10. & 11. ut in ipso hydrargyroseos stadio suis fungantur officiis, ac libere divagentur. Haud nego equidem in regionibus calidioribus id aliquoties sine damno tentatum, at vero negotentatum unquam sine periculo. Quocirca nollem abusum, qui vix unquam dissimulari debet, in communem normam & præscriptionem proponi, qua de re vide supra Lib. IV. Cap. 9. §. 1.

4. Denique putat nec carniū, nec vini usum ex toto ægotis circumcidendum esse, ne illo quidem tempore, dum alternis diebus inunguntur Mercurio, & lavantur balneo; imo quod maximum est dum utuntur lacte quotidiano. Sane haud inficias vero hæc omnia simul sine uoxa aliquando ab iis tolerari, qui stomacho felicissime valent: Sed cum rara non sint artis, facilitatem illam ceu nimiam improbo, ac salutarem severitatem desidero a qua decet sedulum Medicum numquam desciscere.

Cæterum exaggeratam illius methodi utilitatem non parum elevat sequens observatio, quam a D. Morand, Chirurgo peritissimo nuperrime accepi. Ille enim experiundi gratia, ut artis suæ studiosissimus est, militibus sex lue venerea infectis in Regio invalidorum Militum Hospitio hydrargyrosim hoc ipso vere adhibuit, tribus quidem methodo recentiore quæ ab Haguenotio proponitur, tribus aliis vero antiquiore methodo; sed singulis eodem tempore, eodem unguento mercuriali, eadem unguenti dosi,

eodem frictionum numero, eodem temporis intervallo, ut omnia utrimque paria essent. Quid tum? Speras forsitan ptyalismum iis defuisse, qui recentiore; adfuisse contra iis, qui antiquiore methodo inungebantur, sed falleris. Ex tribus, qui balneationes cum frictionibus alternabat, duo ptyalismum & gravem & diuturnum experti sunt. Ex totidem vero, qui a balneis abstinebant, unus tantum ptyalismum sed levem sensit. Cæteroquin omnes perinde convalere utraque methodo. Adeo verum est quod jam centies, necdum tamen satis dictum puto, in tam multiplici variarum causarum syndrome, quæ singulæ in diversis suo quaque modo ad ptyalismum inducendum efficacitatem conferunt, unum id certum esse omnia scilicet esse incerta, atque adeo nulli methodo unquam nimium confidendum esse, sed ut in re semper dubia & periculosa plena alet, Medico qui πολλὰν ἀρτὰς ἁλίων esse cupit, diligentissime cavendum atque providendum Ne quid nimis.

1735. DE LA METTRIE, Doctor Medicus, Latinam Hermannii Boerhaavii Præfationem de Morbis veneris, quæ Aphrodisiaco præfixa est, in Gallicum vertit; huic Diatribem de eodem argumento a se conscriptam, ac Diatribæ suæ Antelogium præposuit, atque tria illa schediasmata in unum collecta excudenda curavit cum inscriptione sequente.

Système de Monsieur Herman Boerhaave sur les Maladies Veneriennes, traduit en François par Monsieur de la Mettrie, Docteur en Médecine, avec des Notes & une Dissertation du Traducteur sur l'origine, la nature & la cure de ces Malad. Paris, in 12. 1735. pagg. 213.

Hic quidem omittimus ex toto Præfationem Boerhaavii, cujus mentio supra facta est pag. 618. De Diatriba vero ab ipso de la Mettrie scripta, & in Cap. IV. distributa afferemus perpauca. In illa sane occurrunt plurima non inicite dicta, quorum pleraque tamen sibi neque constant neque cohærent, sed inconsequentia & quasi fortuita esse videntur.

(a) pag.

11.

(b) pag.

33.

(c) pag.

36. & 37.

(d) pag.

34.

(e) pag.

39.

(f) Vide

supra pag.

49. & 50.

(g) pag.

39.

(h) Vide

supra pag.

41.

Statuit Cap. I. ubi de origine morbi inquiri, luem in Europa non prius observatam fuisse quam (a) exeunte seculo IV. seu ut verius diceret, seculo XV. Primum infecisse Hispanos, quod verum est, & (b) Lusitanos, quod falsum: In Africa (c) endemiam esse, quod verisimile videtur, & inde in Americam, unde in Europam dimanavit, (d) mancipiorum deportatione traductam fuisse; quod in apertam rei veritatem pugnat, cum certum sit ex Africa mancipia nulla in Americam devecta fuisse, nisi longo post vulgatam in Europa luem veneream intervallo: Valentia in Hispania primum generatam fuisse (e) usque veneris Leprosi cum Scorto, quod quidem a Joanne Manardo olim narratum fuit, sed quod falsum esse (f) supra probatum est; certe quod cum iis manifeste pugnat quæ ab Auctore ipso modo referebantur: Demum (g) Van-Helmontium huic opinioni de origine luvis veneræ ex coitu Leprosi cum Meretrice assensuri, quod forsitan de (h) Pa-

racel-

so dici potest, at de Helmontio minime, quem vidimus (a) supra opinio-
nem non minus quidem *commensitiam*, sed plane diversam secutum fuisse.

Demum *Cap. IV.* ubi de gonorrhœa virulenta in viris, 1. Rejicit circa
illius therapejam (b) remedia *temperantia*, *refrigerantia*, *anodyna*; admit-
tit vero tantum purgantia (c) *moschlica*, *drastica*, *hydragoga* sæpius iterata,
ut Diagridium, Jalappium, Resinam Jalappii ac in primis (d) *Turpe-*
album minerale ad gr. iv. in quibus peccat ex utraque parte.

2. Injections in urethram a Guillemo Cockburne decantatas parum
ipse (e) approbat, & a Boerhaavio parum approbari ait, cui affirmat ob-
servatione compertum esse ægros illarum usu perfecte non convalescere.

3. Quod spectat ad curationem luis venereæ confirmatæ, existimat ille
(f) Decoctum Guajaci Mercurio efficacia non raro præstare: Internum
Mercurialium usum (g) semper utilem, tutum, efficacem esse: Contra ve-
ro (h) Hydrargyrosim nunquam non periculosam & fallacem, ut in qua
vix liceat admitti Mercurii copiam certo æstimare: Mercurii (i) virtutem
in curanda lue a ptyalismo totam dependere: Motum (k) ptyalinum ver-
sus inferiora cathartico deduci non posse sine damno; quæ singula a nobis
sæpius impugnata sunt (l) supra.

(a) Vide
supra,
pagg. 54.
& 584.
(b) pag.
69.
(c) pag.
67.
(d) pag.
84.
(e) pag.
77.
(f) Di-
cours
prælim.
pag. 5. &
6. Differ-
tat. pag.
108.
(g) pag.
100. &
101.
(h) pag.
107.

(i) pagg. 98. & 99. (k) pag. 99. (l) Vide supra, Lib. II. cap. 9. & alibi passim.

F I N I S.

A D D E N D A

(a) *Differ-
tation
sur la
Maladie
de Job,
commen-
cement
du Livre
de Job.*

Pagine 11. post artic. 4. Domnus Augustinus Calmet Benedictinus e Congregatione SS. Vitoni & Hidulsi in eruditis suis Commentariis in Biblia dum [a] inquit in morbum Jobi, occasione data differit ibidem de venerea lue, quam cum Jobi morbo eandem esse opinatur. Quapropter contendit luem illam antiquitus grassatam fuisse, cui opinioni ut fidem faciat, præter loca aliquot antiquiorum Scriptorum ex iis quæ ipsi recensuimus, tria adducit alia a nobis prætermissa nempe, 1. Locum ex Luciano in *Pseudo-Logista*, de morbo *Lesbio*: 2. Locum ex Ausonio in *Epigrammate* 71. in *Crispam*, de *Nolano Luxu*: 3. Locum ex Suetonio in *vita Augusti* Cap. 22. ubi de *inunctionibus*, quas Augustus ad ignem adhibebat.

Me quidem piget seu potius pudet primum & alterum locum ex Luciano & Ausonio exscribere, quia uterque turpissimæ obscenitatis. In tertio vero sic legitur. *Verum tantam infirmitatem corporis magna cura tuebatur Augustus, in primis lavandi raritate. Ungebatur etiam sæpius, sudabat ad flammam, deinde persundebatur egelida aqua vel sole multo calefacta.*

Putat autem Domnus Calmet morbum quidem *Lesbium* apud Lucianum & *Nolanum Luxum* apud Ausonium, de Lue ipsa venerea; *inunctiones* vero & *sudationes*, quibus Augustus utebatur ad ignem teste Suetonio, de curatione Jatralliptica luis venereæ accipienda esse.

Veniam equidem facile dandam puto Viro erudito, qui a rebus Medicis plane alienus erat. Sed hæc ille in errore versatur maximo. Nam 1. Constat a Luciano morbo *Lesbio*, & ab Ausonio *Nolano Luxu*, animi vitia, non corporis; impioissimas libidines, non morbosas affectiones intelligi, ut liquet tum ex ipsis locis, tum ex unanimi Interpretum sensu. 2. Tantum abest ut *inunctiones sudationesque* ab Augusto adhiberentur ad Jatrallipticam luis venereæ curationem pertinuerint, quam nemo tantæ antiquitatis esse dixerit, ut ne quidem ad curationem ullam medicam, sed ad dieteticam vivendi normam spectaverint. Nempe Imperator Augustus cum per valetudinem natura infirmiore non posset pro ætate sua recepto balneis & balneariis deliciis quotidie uti, ut horum vicem suppleret, *ungebatur & sudabat ad flammam*, ac deinde *persundebatur egelida* id est subtrepida aqua; qua de re *Vid. Lavium Torentinum* in hunc Suetonii locum.

Pagine 96. artic. 1. & pagine 571. artic. 2. Hic non quæritur utrum mater lue venerea infecta prolem morbo eodem actu infectam possit parere: Nam extra dubium est ab infecta matre partus edi squallidos, semi-putres, ulcerosos, vere syphiliticos, quod ipsi passim docemus, præsertim *Pagine 366. Art. 12. & 394. artic. 4.* Sed quæritur utrum a parentum alterutro infecto

A D D E N D A.

Et possit embryoni virus infundi venereum quod tota quidem pueritia tacitum fileat sine noxa, quod deinde vero in adultis sponte reviviscat, & sine nova ulla contagione veram & legitimam luem veneream producat, de quo jure dubitatur.

Paginé 473. n. IX. Methodus conficiendæ aquæ Rabelii, seu potius methodus edulcandi olei vitrioli addito spiritu vini, jam pridem descripta fuerat a Petro Maria Canepario, Cremensi, *Libro de Atramentis cujuscumque generis, Descrip. IV. Capp. 18. & 42.*

Paginé 524. artic. 2. Dionysius Fontanonus, Monspelienfis, inter Medicos ætatis suæ haud incelebris & tum *Practica sua Medica* quæ sæpius typis excusa est, tum Bibliographorum ferme omnium testimonio notissimus, dicitur per errorem in Editione Lugduno-Batava Collectionis Aloysii Lufini *Dionysius Fontaninus, Monspudienfis*. Sane confiteor mihi non liquere quid causæ fuerit cur ab Italicis Editionibus recedere visum sit in nomine tum Auctoris, tum patriæ illius.

Paginé 551. artic. 3. Reperi nuper fortuito nec a Liebautio Borgarutium, nec a Borgarutio Liebautium, sed ab utroque Jacobum Sylvium expilatum fuisse suppresso Sylvii nomine. Hæc enim eadem, quæ ab utroque narratur de *Nebulonibus se Medicos mentientibus & in asinum strigosum raptis, ut ex urbe cum scommatis educantur*, prostant verbis totidem in Præfatione Sylvii præmissa *Methodo sex Librorum Galeni in differentiis & causis morborum & symptomatum*, quæ Lutetiæ prodiiit anno 1539. in fol. Sed a Sylvio, sicut a Liebautio, qui Galli erant, narrantur ea de *Montepessulano clarissima & antiquissima Medicinæ Academia*, cum a Borgarutio, qui Italus erat, dicantur in genere de quibusdam optimis civitatibus.

Paginé 560. Capiti de Hieronymo Mercuriali. Scripsit reapse Hieronymus Mercurialis *Tractatum de Morbo Gallico*, qui constituit Librum IV. *Practica Medica*, qui illius nomine prodiiit in fol. Francofurti ad Mœnum ann. 1602. sive *Prælectionum Patavinarum*, quæ Venetiis in fol. editæ sunt apud Juntas ann. 1606.

Constat Tractatus ille sex Capitibus. I. *De definitione & subjecto.* II. *De causis.* III. *De differentiis & signis.* IV. *De curatione.* V. *De antidosis.* VI. *De accidentibus Morbi Gallici.*

Huc autem redit summa Doctrinæ, quæ ab Auctore proponitur.

I. *Morbum (a) novum esse nostro orbi, neque posse jure adnumerari inter ge- (a) Cap. 1. nera morborum Veteribus cognita.*

II. *Contagione (b) solum, & præsertim usu veneris cum infectis pro- (b) Cap. 2. pagari. Laudem esse Italorum, ut abundant hoc morbo, quia indulgent veneri & usuntur passim mulieribus infectis, ut non mirum sit esse quasi peculiarem morbum suarum plagarum.*

A D D E N D A.

- (a) *Ibid.* III. „ Procul (a) dubio futurum esse, ut quandoque pestis hæc prorsus finiatur. Ad hoc existimandum multis conjecturis se impelli: Unam esse quia cæteri morbi qui tempore majorum apparuerunt novi, omnes sunt tandem penitus extincti: Alteram, quoniam a principio, quo morbus hic cæpit, usque ad nostra tempora valde imminutus est, unde si præterita præsentibus comparemus, existimandum est in dies esse minuendum, ita ut tandem prorsus aboleatur.
- (b) *Cap. 5.* IV. Antidota (b) Morbi Gallici esse Lignum sanctum sive Guajacum, Salsam-parigiam & Chinam, quorum decoquendum & exhibendum Methodum multis describit. Silet vero de Sassafras.
- (c) *Cap. 6.* V. Inter (c) efficacissima morbi remedia recensenda esse linimenta & suffumigia Mercurialia, quorum componendorum & administrandorum rationem proponit. De interno vero Mercurialium præparatorum usu ne verbum quidem facit.
- (d) *Ibid.* VI. Quantitatem (d) linimenti variam esse debere pro varietate hominum, sed animadvertendum esse ut numquam utamini una vice linimentum, sed continere plus duabus drachmis argenti vivi; quod si non proficiat, poterit augeri argentum: Melius tamen esse semper augere quam detrachere; hanc enim tutiorem esse viam.
- (e) *Ibid.* VII. Numerum (e) dierum, quibus utimur linimento, ipsum etiam incertum esse: Alios ungere novem diebus, alios duodecim, alios etiam quindecim, sed semper interpolate. Inungimus, pergit ille, tribus primis diebus, deinde desistimus uno vel altero die; iterum inungimus tribus diebus, deinde desistimus una vel altera die.

Paginé 613. Capiti de Gervasio Ucay. Tractatus de Morbo venereo Gervasio Ucay Tolosæ primum editus fuit anno 1693. in 12. Auctor sibi in fronte titulum adscribit Magistri Artium liberalium & Doctoris Medici Tolosani.

Paginé 625. Quibus addi velim & ipsum Domnum Augustinum Calmet Benedictinum e Congregatione Sancti Vitoni & Sancti Hidulsi, qui in Dissertatione de *Lepre* Gallice scripta, suo in Leviticum Commentario præfixa & Lutetiz Parisiorum edita anno 1708. contendit Lepream, quam cum lue venerea, quæ nunc grassatur, eandem fuisse putat, ab inconspicuis vermiculis cutem depascentibus produci, quod multis rationum vel observationum momentis conatur confirmare, sed tamen incassum meo quidem iudicio.



INDEX RERUM.

A

- A** *Borhis* frequens a causa venerea, pag. 337. & 366.
tempore hydrargyroscos, 419
Absecessus venereus Perinei, 224
Adiposa membrana sedes est semini venerei juxta Boerhaavium, vel saltem ulcusculorum cancroforum in viris & in mulieribus, 628. 629. & 630
Quod utrimque refellitur, *ibid.*
Administratio unguenti seu linimenti mercurialis, 401
Vid. *Hydrargyrosim.*
Admissio veneni venerei, quibus viis fiat, 107.
Unde æstimanda veniat? 109. 110
Aeris intempesies luem veneream non adduxit, 48. & 49
Ægilops venereus, 336. & 357
Ætiops, Pamphili de Narvaez mancipium an luem veneream variolæ in novam Hispaniam invexerit? 593. 604. & 616
Æthyops mineralis vulgaris cum sulfure, 146
alii numero multi pro natura corporum gummosorum aut resinorum quibuscum Mercurius subigitur, 146. & 465
Vid. *Mercurialis.*
Affectiones cutis venereæ, 333
Affectus post hydrargyrosim superfluites sed qui fanabiles sunt, 433
Pene desperati, qui post hydrargyro-
sima aliquando supersunt, 402
Affinitatem scilicet, juxta quam humores a semine venereo solent ut plurimum infici, 339. & 340
quotuplici causa perverti possit? 341
Africa; an luem veneream endemiam habeat, & qua de causa? 65. 606. & 637
An inde in Americam traducta fuerit?
Agrypnia venerea, 606. & 637
Agryta quomodo excipiendi juxta Borgarutium? 336. & 361
juxta Gualterum Harris, 551
Agrytarum imperitia, & impudentia retenda est, 610
Albugines in cornea, *Præf.* xv.
Algarot. Pulvis de Algarot, 335. & 357
623
Alopecia in tertia luis venereæ periodo primum apparuit, 76. & 79.
Alopecia venerea, 334. 346. & 461
Altar Caravallii, 521
Alumni lactentes quibusnam morbis venereis obnoxii sint? 261. & 277
Ambra griseæ tinctura cum aqua Rabelij, 474.
Ambrosius (Sanctus) (syrupus Sancti Ambrosii laudatur ad curationem luis venereæ, 132
paratur ex decoctis milio & ficibus, *ibi.*
America devicta victores suos corrumpit morbo pessimo, nempe lue venerea. *Præf.* viii.
Andron. species oscheo-hydroceles Malabaræ peculiaris, 68
Angli luem veneream maritimo cum Burdigalensibus commercio cotraxere, quam ideo osim appellavere morbum Burdigalensem, 62
Anglica febris, Vid. *sudatorium febre.*
Antelosis venerea, 335
Animalcula. Non desunt qui opinentur luem veneream produci ab animalculis minutissimis & mordacibus, 164. 624.
& in addend.
Historia Circulatoris cujusdam, qui aiebat morbos omnes ab animalculis produci, 105
Anurexia a lue venerea, 336. & 362
Anthropophagi non erant indigenæ Insulæ Hispaniæ, 70

St 2

An.

INDEX RERUM.

Anti-eburadica Medicamina de Rotron, 470.
 qua ratione administranda? 473
Antidota quædam luis venereæ planè inefficacia, 563
Antilla a Christophoro Columbo detecta anno 1492. 54
Antimonium emeticum ad curationem luis venereæ a quibusdam adhibitum fuit, 568. 155. & 578.
Apolinaris scripsit morbum Jobi fuisse Elephantiasim, Pref. x.
Aqua Rabelii, 473. & in addend.
 menthæ Quercetani, 474
Aqua argenti vivi Vid. *Mercurium* vel *Hydragrynum*.
Aqua Mercuriales exitiales, 147. & 148
Arabes. Medici Arabes cur primi & sæpe differuerint de pustulis & ulceribus virgæ oriundis ex coitu cum foeda vel impura, hoc est menstruata muliere, 72.
 Primi omnium ausi sunt Mercurium exterius adhibere, 135
Arcanum Corallinum, 147. 500. & 596
 • anti-venereum Caroli Thuillier, quale fuisse videatur? 609. & 610
Arcana Lillieri ad gonorrhæam, 611
 Ad variolarum prophylaxim, quo factis temere gloriatur Petrus V. du Bois, 625
Arcana. An liceat Medico arcana utilia celare? 609. Pref. vii.
 An liceat remedia futilia pro arcanis efficacissimis venditare? 609. 623. 624. 625. & 626. Pref. vii.
Ardentium morbus sive ignis sacer Sancti Antonii jam pridem evanuit, 15
Ardern (Joannes) Chirurgus Anglus de arsurâ sive incendio locutus est, 29.
 & 633.

Sed hæc de gonorrhœa non debent intelligi, *ibid.*

Ardor. Vid. *Arsuram*.
Argelata (Petrus) an venereas virgæ pustulas notas habuerit? 24. & seq.
Argentum vivum. Vid. *Mercurium*, vel *Hydragrynum*.
Argentum quod pro stabilienda luis venereæ antiquitate deducitur ex eo quod

luis venereæ Gallice dicitur *la Verole*, Variolæ vero *la petite Verole*, diluitur, 45
Arlina eadem cum radice Chinæ, 585
Arsenici usus tum internus tum externis ad luis venereæ curationem approbatur a Davide de Planifcampy, sed errore pessimo, 586
Arsura. Quid eo nomine Medici Chirurgique olim intellexerint? 28. & seq. 633
 concubitu cum leprosis inductam fuisse, 29. & 633
 a gonorrhœa virulenta abfuisse ex toto, 31. & 633
Artum tremor a causa venereæ, si hydrargyroseos efficaciam eludat, qua ratione curandus? 365
Asthorum influxu luis venereæ inducitur non fuit, 47
Asthma venereum, 336. & 362
Atheromata venerea, 335. & 355
Atrophia, & marcor, a causa venereæ, 336. & 364.
Avenionensis Lupanaris statuta antiqua, 37. & seq.
Avenionis pons. Quid acciderit super pontem illum, 541
Augustus. An Imperator Augustus laboraverit lue venereâ? in addend.
Aulica ægritudines quales sint; 539
Aurifica tinctura, 470
Aurificum elixirium, 470
Aurium tinnitus venereus primum a Fallopiâ observatus circa annum 1562. 78.
 & 79.
Aurium morbi venerei, 336. & 358
Ausonij locus a Domino Calmet obiectus explicatur, in addend.

B

Baco (Franciscus Baco de Verulamio) consentit cum Leonardo Fioravanti de prima luis venereæ causa, 53
Balani (Tumoris) Descriptio, 290
 Cause, *ibid.*
 Symptomata, 290
 Diagnos, 296
 Prognosis, 294
 Curatio, 295
Bal-

INDEX RERUM.

Balsamum, quod chalybis dicitur, 575
Barbarosse pilulæ ex Mercurio crudo, & remediis purgantibus componebantur, 145
 Describuntur a Petro Bayro, *ibid.* 543
 Laudantur a Rondeletio, 563
Barbeirac. (Carolus) Editur illius nomine Opus Medicum, quod mihi non videtur genuinus esse Barbeiracii fœtus, 632
Bardane radix decocta in aqua. An utilis sit ad luis venereæ curationem? 133
 An a Petro Poena adhibita fuerit curando Henrico III. lue venerea laboranti, *ibid.*
Barrolinus (Thomas) approbat usum inter dum Cantharidum ad curationem gonorrhœæ, 100
Barycoja venerea, 336. & 358
Bassatione potest lues venerea traduci, 99
Basilius Valentinus an unquam existerit? 579.
 an de lue venerea scripserit? 579
 quo tempore vixerit? 579
Bateana pharmacopœa proponit Syrupum Sancti Ambrosii seu Decoctum Ambrosianum tanquam Diaphoreticum nobile, 132
Becketus (Guillelmus) Chirurgus Londinensis, multa testimonia nuper produxit pro antiquitate luis venereæ, & gonorrhœæ, quæ explicantur & diluuntur, 28. & seq. 62
Belga ab Hispanis luem veneream contraxere, quam ideo vocant morbum Hispanicum,
Bethencourt (Jacobus a Bethencourt,) veneream gonorrhœam accurate descripsit anno 1517. 97
Blancardus (Stephanus) Medicus Batavus dicitur scripsisse luem veneream ab Europa in Americam traductam fuisse ab Athiopo quodam, qui Pamphili de Narvaez mancipium erat, quod tamen falsum, 605. & 606
Blegny (Nicolaus de) quis qualifve fuerit & qua de causa in carcerem conjectus? 601
Bochea sudorifica, 131
Boerhaave (Hermannus) quid sentiat de efficacitate decocti Guaiaci ad curationem

luis venereæ? 162
 An satis recte sentiat? 164. 165.
 & 631.
 Scripsit Diatribam de lue venerea, quæ Præfationis loco præfixa est Editioni Lugduno Batavæ Aphrodisiæ, 628
 An existimaverit panniculum adiposum sedem esse perpetuam veneriei seminii? 628
 At certe opinatur panniculum illud sedem esse uscululorum cancrororum, 620
Boile, Circulator hoc nomine dictus, contendeat non ita pridem Lutetiæ morbos omnes ab animalculis inferri, 104
Bolducius (Jacobus) Capucinus, existimabat morbum Jobi eundem fuisse cum lue venerea, *Præf. vii.*
Borgarinius [Prosper] refert in civitatibus quibuldam nebulones se Medicos esse mentientes in asinum strigofum tapi, 551
 In quo Jacobum Sylvium expilavit sed suppresso illius nomine, *in addend. x.*
Borgia (Alphonsius) Alexandri VI. ex fratre nepos, moritur ex therapeia Mercuriali, 121
Brackenavv. (Wendelinus Hock) Vid. *Hock.*
Brassavolus (Antonius Musa) putavit luis venereæ originem deducendam esse a scorto vulgari, cujus in utero abscessus latebat, 50
 Constat luem veneream in Hispaniola endemiam olim fuisse, 55
 Descripsit gonorrhœam veneream anno 1551. 77
 seviria luis venereæ jam remissa erat illius ætate, 81
 Admittit, 234. Species luis venereæ, 523.
Broncocele, frequens & communis morbus in regionibus subalpinis. 68
Brubezjus [Petrus] Quid ille in suo *Almanach* statuerit de tempore tonsuræ? 539.
Bubas (las) sic lues venerea Hispanice dicitur, 44. 594
 Bu-

INDEX RERUM.

Bubonis venerei descriptio & differentiz,

248.

- Causæ, 249
- Symptomata, 251
- Diagnosif, 253
- Prognosis, 255
- Curatio 1. Resolutione, *ibid.*
- 2. Suppuratione, 259. 499.
- Problemata aliquot circa bubones, 261.

Bubo venereus potest apparere pone aures sub alis, 261 & 587

Bubonis fistulosi definitio & differentiz, 262

- Causæ, 263
- Symptomata, *ibid.*
- Diagnosif & Prognosis, 266
- Curatio. *ibid.*

Bubonis skirrodii descriptio & differentiz, 266

- Causæ, 267
- Symptomata, *ibid.*
- Diagnosif & Prognosis, 268
- Curatio. *ibid.*

Bubonis carcinomatosis descriptio & differentiz, 269

- Causæ, 270
- Symptomata, 271
- Diagnosif & Prognosis, 272
- Therapeia Curatoria, *ibid.*
- palliatiua, 273

Bubo inguinum in lue venerea observatus non fuit nisi in tertia morbi periodi, 76. & 77

Quid ergo sentiendum fit de observationibus Bubonum, quæ leguntur inter observationes Cumani? 481

quomodo maturandus fit, 590

Bubula caro per fumum indurata & in pulverem contrita utilis est ad gonorrhœam contumaciorem, 596

Bullarum Crystallinarum descriptio, 590

- Causæ, *ibid.*
- Prognosis, *ibid.*
- Symptomata, 292
- Diagnosif, 294
- Curatio, 295

Burning sive Brenning, quid ea voce olim apud Anglos significatum fuerit? 28.

& seq. 612.

Concubitu cum Leprosis inducatur, pag. 30. 623.

- Burios*, sic dicti in Hispaniola medica-
stri, 69
- Burteri lapis*, 590

C

Cæsalpinus (Andreas) narrat luem primum inductam fuisse ab expotis vinis quæ ab Hispanis leproforum sanguine infecta fuerant, 50 & 51

Calat Chirurgus Parisiensis venditat diu tanquam arcanum panchrestum ptisanam sudorificam, 131

Calnet (Augustinus) e Congregatione SS. Vitoni, & Hidulsi morbum Jobi cum hodierna lue venerea eundem fuisse arbitratur, *Pref. ix.*

Opinatur luem veneream olim antiquitus notam fuisse lepræ nomine, sed resellit, *in addend.*

Contendit lepram, quam cum lue venerea eandem fuisse putat, produci a vermiculis inconspicuis, *in addend.*

Campanus morbus, an cum lue venerea idem fuerit? 9 & 10

Cancer vox est æquivoca, si audiatur Petrus V. de Bois, 625

Cancer mammarum venereus, 337. & 365

Canibus familiaris morbus a lue venerea plane diversus, 16

Canones diagnostici numero octo, 378
generales hydrargyroscos, 410
maxime hydrargyroscos parciore & intercalatæ, 433 & 434

Cantharidum usus internus commendatur ad gonorrhœam a Bartholino, & aliis, 200. & 611.

Sed merito reprobatum tanquam perniciosus, 201

Capitis tumefactio in hydrargyrofi, 413

Capitis gravitas venerea, 356. & 359

Capistratio oris, 413

Caruvalgii altat, 514

Carca parilla. Vid. *Sarcam parillam.*

Caries pndendorum, vulgo *Chancres*. Vid. *Ulcuscula canerosa.*

Ca-

INDEX RERUM.

- Caries ossium* in secunda tantum periodo
luis venereæ observata est, 75
- Caries ossium venerea*, 353
- Illius species, 445
- & remedia, 447
- Caro humana* in escam appurata temere
ereditur luem veneream induxisse, 51.
- & 52.
- Carolus VIII.* de Regno Neapolitano in-
vadendo cogitat, & ideo pacem com-
ponit cum Ferdinando Arragonensium
Rege, 59
- Regnum Neapolitanum invadit, 60
- Ad illius statuam dicitur Chirurgus qui-
dam se provolvissse, ut gratum ani-
mum testaretur erga Regem, a quo
lues venerea in Gallias in vesta fue-
rat, 537
- Carolus V.* Imperator laboravit lue vene-
rea, 2
- Ufus est radice Chinæ, 517. & 529.
- Carolus IX.* Galliarum Rex ægrotavit ca-
runcula urethræ, 2
- Carpus* (Joannes Berengarius) non fuit
inventor Mereurii ad curandam luem
veneream adhibendi, 137
- Caruncula* in urethra, 234. & 235
- quomodo curandæ, 243. 244. 245.
- & 597.
- Contendit Benevolus nullas alias re-
periri præter granum hordeaceum
live caput gallinaginis tumefa-
ctum, 625
- Catameniorum* eruptio in hydrargyrosi,
419
- Cataplasia* minor laudatur ad curationem
luis venereæ, 557. & 491
- Cataracta* venerea, 336. & 358
- Cauliaco* (Guido de) an in illius Chirur-
gia mentio occurrat morborum venereo-
rum? 24. & seq.
- Cause ulcusculorum venereorum*, 277
- Tumoris præputii & balani, 393
- Phimoseos & Paraphimoseos, *ibid.*
- Bullarum crystallinarum, 291
- Phymatum & tuberculorum calloso-
rum, atque chordarum skirroi-
dum, 302
- Gangrenæ genitalium, 310
- Vorrorum, verrucarum, & condylo-
- matum, 317
- Crissarum, mororum, ficonum mari-
scarum & rhagadum ani, 324
- Luis venereæ confirmatæ, 337
- Cause gonorrhœæ virulentæ*, 177
- Siccæ, 214
- Spuriæ, 218
- Tumoris testium venerei, 219
- Abcessus venerei, in Perinæo, 224
- Stranguriæ venereæ, 235. & 236
- Bubonis venerei, 248
- Skirrhotidis, 266
- Carcinomatodis, 269
- Cauterium* variis in locis syphiliticis olim
inurebatur, ut hunc ab Hispanis facti-
tati dicitur, 120. & 484
- Cephalæa* venerea, 334. 360. & 525
- Chairedinus* Barbarossa dictus, Rex Alge-
rii & Rei maritimæ apud Turcas Præfe-
ctus, nomen dedit pilulis mercurialibus
144. & 529.
- Chapelet*, (Le) 333. & 345
- Chesneau* (Nicolaus) an utilis sit metho-
dus compendiarie curandæ gonorrhœæ,
quam proponit? 205
- China* radix, ad quos morbos efficax sit, 580
- China* radix Europæ innotuit circa annum
1535. 127
- Ejus descriptio, *ibid.*
- Quomodo decoquatur, & ejusdem de-
coctum exhibeatur? 127. & 331
- Celerem famam obtinuit, 128. & 524
- Sed quam retinuit parum diu, 128
537. & 575.
- Tentiginem in bibentibus excitat, 526
- Chirurgorum* anno 1494. antiquiorum loca
aliquot expendantur, quæ vulgo cre-
duntur de lue venerea posse intelligi,
23. & seq.
- Chondarum skirrodum* descriptio in viris, 307
- in fœminis, 302
- & in catamitis, *ibid.*
- Causæ, *ibid.*
- Symptomata, 304
- Diagnosis, 305
- Prognosis, 306
- Curatio, *ibid.*
- Chrysothomus* (S. Joannes) morbum Jobi
a Lepa non distinguit, *Præf. x.*
- Cine* radix. Vid. *China radicem.*

IN REX RERUM.

Cinedi, quibusnam morbis venereis obnoxii sint? 262. 277. 290. & 324

Cinnabaris antimomialis, 610

Circulatorum impetitia & impudentia retegenda est. *Præf. xv.*

Clavus venereus, 336. & 360.

Cochenilla a quibusdam adhibetur curandæ gonorrhæe virulentæ, 202. & 611
Sed plerumque frustra, 202

Cockburne (Guillelmus) temere gloriatur de injectione quadam in urethram, quam ad gonorrhæam mirabiliter facere contendit & cuius præparationem celat, 611, 638.

Columbus Christophorus ad insulam Haiti sive Hispaniolam appulit anno 1492. 54

Columella deperditio a lue venerea, 463

Condylomatum descriptio, 317

Causæ, 313

Symptomata, 320

Diagnos, *ibid.*

Prognosis, *ibid.*

Curatio interna, 321
externa, 322

Condylomata & chryssa, quæ post hydrat-
yrosim supersunt, 441
quomodo curari possunt? *ibid.*

Conglutinatio linguæ cum gingivis aut gin-
givarum cum buccis, 424

Conjectura de causis cur lues venerea in
Hispaniola cæterisque Antillis olim fue-
rit endemia, 68. & seq.

Quod repetendum non est ex eo quod
Indigenæ velscerentur humana car-
ne, 69

nec quod vitiosum ducerent aërem,
ibid.

nec quod pravis viscerarent cibariis, 70
Sed quod promiscua. uterentur vene-
re, nec a menstruatis mulieribus se
abstinerent, quarum catamenia in
earegione acerrima sunt, 70. & 71

Quod commune fuit cæteris quoque
Americæ, Africæ, & Asiæ locis,
ubi lues venerea creditur antiquis
latuisse tanquam in sociis pecu-
liaribus, 72. & 73

Afferitur ratio cur idem in Europa
locum non habuerit, 73

Constan tinopolis a lue venerea immunis
falso creditur a Friderico Hoffmanno, 84

Contagio luis venereæ initio ignorabatur,
95.

Suboluit primum Gaspari Forellæ,
ibid.

Diu tamen creditum fuit luem vene-
reæ generari interdum solo ero-
re in dicta, 95. 480. 483. 486.
487. 491. 497. 500. 502. & 510.

Contagio luis venereæ non propagatur in
ditans, 97. & 577

Forlan neque per semitem, 97. &
577.

Sed maxime per contactum, 98. &
533.

Nempe usu rei venereæ, 99. & 533
Lactatione, bastiatione, cubitu sim-
plici, contrectatione partium ulcer-
atarum, 99. 498. 533. 556. 564.
568. 578. & 603.

Contagium venereum cur ab aliis facilius,
difficilius ab aliis contrahatur? 110

cur aliquando ab iis qui innoxia jam
diu venere utuntur cum infectis,
oelerrime concipiatur, sicut levius
infectis rem habeant, *ibid.*
cur aliquando contrahatur ex iisdem
infectis, quibuscum diu ante res
habita fuerat sine noxa? *ibid.*

Contagium venereum. Vide *Virus vene-
reum*,

Contrectatione partium ulceratarum a ve-
nereo veneno lues contrahitur, 100

Cortesius (Ferdinandus) novæ Hispani-
æ seu Mexicani Imperii expugnator, a
Pamphilo de Narvaez bello laceffitur, 592

Huiusce belli exitum narrat *Epistola*
II. sed nec de mancipio Pamphili
Narvaez, nec de morbo quam ille
in Zempoolanos induxit, verba fa-
cit, in annot. 593

Crista genitalium. Vid. *Condylomata*.
Ani, 323. & seq.

Crollii Lapis medicamentosus, 475

CrySTALLINE vesicula recentissimum luis ve-
nereæ symptoma, 989

CrySTALLINE bullæ. Vid. *Bullas crySTALLINAS*.
Quid crySTALLINÆ nomine intellexerit
Tanequinos Guillaume? 580

Cubitu simplici lues venerea potest con-
cipi, 100
Cui.

INDEX RERUM.

<i>Cutis affectiones venereæ,</i>	333. & 345
<i>Cumatio ulcusculorum cancrororum in pu-</i>	
<i>dendis,</i>	285
Tumoris præputii & balani,	295
Phimoseos & Paraphimoseos,	295
Bullarum crystallinarum,	295
Phymatum, & tuberculorum callofo-	
rum, atque chordarum skirrroidium,	306.
Gangrænz genitalium,	312
Porrorum, verrucarum & condylo-	
matum,	321
Cristarum, Mororum, Ficorum, Ma-	
risicarum & Rhagadam ani,	328
<i>Caratis gonorrhææ virulentæ in prima pe-</i>	
<i>riodo,</i>	191
in secunda periodo,	193
in tertia periodo,	195
Quid peccari soleat in curanda gon-	
orrhæa?	197
Empiricæ methodi curandæ gonor-	
rhææ,	198
Gonorrhææ virulentæ siccæ,	216
spuriæ,	217
Tumoris testium venerei,	221
Abcessus venerei in Perinæo,	227
Gonorrhææ habitualis,	231. & 232
Stranguriæ venereæ,	238. & seq.
Bubonis venerei,	255
Bubonis venerei fistulosi,	264
skirrroidis,	266
carcinomatodis,	340
<i>Cyfra urbes duæ in Italia sic olim dictæ,</i>	522
<i>Cyprianæ Cysteriensis, quid de morbo</i>	
<i>Jobi sensent?</i>	<i>Prof. ix.</i>

D

D avid. An Lueu veneream passus fue-	
rit?	<i>Prof. viii. & x.</i>
<i>Decretum Senatus Parisiensis de Disciplina</i>	
<i>in curandis syphiliticis observanda,</i>	86
Sanctum fuit die 6. Martii anni 1496.	
hoc est juxta computandi tationem,	
qua nunc utimur, die 6. Martii	
anni 1497.	90
<i>Definitio bubonis venerei,</i>	248
fistulosi,	262
<i>Dematosa, sic appellatur lues venerea a</i>	

Rangono,	523
<i>Dentium casus a lue venerea,</i>	464
<i>Depilativa, sic a Rangono lues venerea</i>	
<i>appellatur,</i>	523
<i>Descriptio gonorrhææ virulentæ in viris,</i>	
<i>172.</i>	
in feminis,	173
Gonorrhææ virulentæ siccæ,	211.
& 216.	
spuriæ,	216
Tumoris testium venerei,	219
Gonorrhææ habitualis,	229. & 233
Stranguriæ venereæ,	233
Bubonis venerei,	248
<i>Descriptio ulcusculorum venereorum,</i>	276
Tumoris præputii & balani,	290
Phimoseos & Paraphimoseos,	290
Bullarum crystallinarum,	<i>ibid.</i>
Phymatum, & tuberculorum callofo-	
rum, atque chordarum skirrroidium,	
301. & 302.	
Gangrænz genitalium,	309
Porrorum, verrucarum & condylo-	
matum,	317
Cristarum, mororum, ficorum, ma-	
risicarum & rhagadam ani,	323
Luis venereæ confirmatæ,	322
<i>Devaux (Joannes) observat symptomata</i>	
<i>luis venereæ in dies mitiora esse,</i>	83
<i>Dietæ, qualis præscribenda sit in hydar-</i>	
<i>gyrosi?</i>	405. & 409
<i>Diagnosis gonorrhææ virulentæ in viris,</i>	
<i>184.</i>	
in feminis,	<i>ibid.</i>
Sedis gonorrhææ,	186
Causarum gonorrhææ,	187
Differentiarum gonorrhææ,	<i>ibid.</i>
Gonorrhææ virulentæ siccæ,	214
spuriæ,	218
Tumoris testium venerei,	221
Abcessus venerei in perineo,	225
Gonorrhææ habitualis,	231
Stranguriæ venereæ,	238
Bubonis venerei,	253
Bubonis venerei fistulosi,	262
skirrroidis,	267
carcinomatodis,	272
<i>Diagnosis ulcusculorum cancrororum,</i>	283
Tumoris præputii & balani,	294
Phimoseos & Paraphimoseos,	<i>ibid.</i>
Bul-	

INDEX RERUM.

- Bullarum crystallinarum.* *ibid.*
Phydatum & tuberculorum callosorum, atque chordarum shirrhoidum, 305
Gangrenæ genitalium, 311
Porrorum, verrucarum & condylomatum, 320
Cistarum, motorum, fcorum, mariscarum & rhagadam ani. 327
Luis venereæ confirmatæ 335
an adfit? *ibid.*
qualis adfit? 380
an adfit sola? 381
Diarrhœa a causa venerea 337. 363. 442.
Diarrhœa in dysenteriam degener, quæ accidit in hydrargyrosi, 415. & 426
Differentia gonorrhœæ virulentæ, 177
Unde proveniant, 179. & 180
Gonorrhœæ virulentæ siccæ, 212
Bubonis venerei, 248
Bubonis venerei fistulosi, 262
shirrhodis, 266
carcinomatodis, 269
Ulcusculorum venereorum, 275
Dogmata, quibus Medicina aucta est experimentis, quæ in syphiliticis ex improviso oblata sunt, *Præf. xiii.*
Dolor osteocopus contumax cariem ossis aut medullæ abscissum indicat, 455
Quibus sola operatione mederi licet, 456.
Dolores venerei variis in locis, 334 348
Rheumatici, 334. 348. & 443
Arthritici, 334. 348. & 443
Ischiadici, 334
Osteocopi, 348
Dominici (Insula Sancti) Vid. Hispaniolam.
Dracunculus sive Vena Medinensis, apud Arabes endemius morbus. 60
Dysuria venerea sicca. Vid. Gonorrhœam virulentam siccam.
- E**
- E** *Celestiasici locus obiectus an de lue venerea accipiendus sit?* *Præf. viii. & xi.*
Echinæ eadem cum radice Chinæ, 385
Elephantiasis Græcorum. Vid. Leprosam Arabum.
- Elephas morbus in Ægypto endemius,* 60
Elisirium aurificum. 470
Rubrum N. Bouez de Sigogne, 613
Empirica gonorrhœæ therapie, injectio- nibus mercurialibus in urethram, 199
Ufu interno cantharidum, 201
Exhibita cochenillia, 202
Mercurio præcipitato viridi, 203
Resina Guaiaci, 204
Saturninis remediis, 205
Methodo compendiaria Nicolai Chesneau; *ibid.*
Pilulis ex terebinthina cum Mercurio dulci, 206
Empiricorum impentia & impudentia re- tegenda est, *Præf. xv.*
Quomodo excipiendi sunt, 551. 620
Enchantis venerea, 337
Endemii morbi in multis regionibus, 68
Lues venerea in Insulis Antillis pari modo endemia fuit, 68. & 69
Conjecturæ de causis cur ibi endemia fuerit, *ibid.*
Quæ ad cæteros luis venereæ focos antiquos in America, Africa, & Asia pertinere possunt, 72
Ephelides venereæ, 333. & 344
Epilepsia venerea, 361
Superveniens in hydrargyrosi, 418
Epileptici, quomodo ad hydrargyrosim præparandi? 398
Epiphora venerea, 357
Episcopus Parisiensis præerat anno 1497. iis quibus negotium datum erat ut syphiliticis providerent Lutetiæ, 86
Europa a morbis venereis olim immunis fuit, 1. & seq.
Nec eisdem sensit nisi post repertas a Columbo Occidentales Indias unde delati sunt, 54. & seq.
Cur venus vulgivaga, etiam forte cum menstruatis, veneream lucem ibi nunquam produxerit, sicut in ple- risque Americæ, Africæ, & Asiæ locis? 73
Europa, quas periodos lues venerea in Europa habuerit in hunc diem? 74. & seq.
Eusebins. Locus Eusebii explicatur, unde amant colligere lucem veneream anti- quitus cognitam fuisse, 7. & 8
Exo-

INDEX RERUM.

Exstoles cum carie ossium secunda luis
venereæ periodo apparuerit ab anno 1516.
ad annum 1516. 75
Exstoles venereæ aliquando hydrargyrosi
non dissipantur, 455
Exstosis venerea, 334. & 349
Ossiculorum auditioni inservientium.
359.

F

F*abula* de origine luis venereæ, 46.
& seq. Vid. *Origines luis venereæ*.
Fallopius (Gabriel) refert luem veneream
ab Indiis Occidentalibus in orbem no-
strum comportatam, 57
Describit gonorrhœam & tinnitum au-
rium circa annum 1562. tanquam
nova luis venereæ symptomata, 77
Affirmat suo tempore luem veneream
jam mitiotem, 82
Farcin (le) an lues venerea ortum duxerit
a nelando congressu viri cum jumento,
quod eo morbi genere laboraret? 495
Faucium morbi venerei, 346. & 334
Febres intermittentes a causa venerea,
336. & 364.
Lentæ, 336. & 364
Febris superveniens hydrargyrosi, 414. 425
Ferdinandus Arragonensium Rex male stat
conditionibus pacis cum Carolo VIII.
sancitæ, 60
Ac demum cum eodem aperto mar-
te dimicat, *ibid.*
Fernandez (Gonsalvus Fernandez ab Oviedo)
affirmat luem veneream in Insula
Hispaniola Christianis primum cogni-
tam fuisse, 58
Fernelius (Joannes) Mercurio dissidens
duas opiatas anti-venereas impense lau-
dat sed quas non comprobavit exitus, 132
Nesciebat pyralismum moveri ab hy-
drargyro intro sumpto, 148
Quo tempore obiit? 540
Nimium confidit antidoto suæ Ale-
xipharmacæ in curanda lue vene-
rea, 490
Ficorum ani descriptio, 323
Causæ, 324

Symptomata, 325
Diagnosis, 326
Prognosis, 328
Curatio, *ibid.*
Fioravanti (Leonardus refert sed errore ma-
ximo luem veneream in Gallorum & Hi-
spanorum castris productam fuisse carne
humana ab annonariis præbitoribus in
escam Militibus apparatæ, 51. & 52
Fistula ani, 325. & 338
Fistula ani curanda post hydrargyrosim, 333
Fistula lacrymalis, 335. & 358
Quomodo curanda post hydrargyro-
sim? 333
Flores ammoniaci-mercuriales, 469
Focus luis venereæ celeberrimus fuit in
Insula Hispaniola, 58. & seq.
Huic tamen Insulæ non peculiaris,
sed cum plerisque Zonæ Torridæ
locis communis in Asia, Africa &
America, 64. & seq.
Formis (Samuel) Chirurgus Monspelien-
sis refert Henricum III. lue venerea la-
borantem decocto radicis Barbanæ a Pe-
tro Pena curatum esse, 133
Formula remedium qua methodo com-
ponendæ, *Pref.* ix.
Fonranonius (Dionysius) Professor Mon-
spessulanus, quomodo per errorem ap-
pellatur in Editione Lugduno-Batava
Luisini, *in addend.*
Fonsiculi in iis qui Gallica lue vexantur,
utiles sunt, 567. & 599
Fracastorius (Hieronymus) descripsit ele-
ganter symptomata luis nascentis 74
Primus locutus est de alopecia vene-
rea circa annum 1536. 77
Ferocia luis venereæ jam remiserat
eius ætate, 81
Fraga in ano. Vid. *Fiscos ani*.
Franciscus I. Gallorum Rex luem veneream
contraxit ab uxore mercatoris ferrarii, 2
De virtute ligni Juniperini rectius
sentiebat Rondeletio, 124
Quid de illo dictum fuerit ab Anto-
nio Gallo? 525
Fricciones Vid. *Inunctiones*.
Frizimelica (Franciscus) ano excrevit calcu-
lum ad magnitudinem ovi gallinacei, 541
Functionum læsio a causa venerea, 336. 568
Gad.

INDEX RERUM.

G

G Addeſden (Joannes) an venerea vir-
gæ Ulcera noverit? 24. & ſeq.

Galenus non vidit neque venam medinen-
ſem, neque febrẽm ſeptenam aut nove-
nam; neque lapidem egredientem ab in-
teſtiniſ, 527

Galeoſus Picus II. Comes Mirandulæ la-
boravit lue venerea, 532

Galli luem ab Hiſpaniſ, & Neapolitaniſ
contrahunt, quam cum cæteriſ Europæ
populiſ communicant, 59. & ſeq.

Gallus (Antoniuſ) bubonem venereum ex-
preſſe deſcribebat circa annum 1540. pro-
lato nomine vulgari Gallico *pulini*, 76

Ganglia venerea conrumacia, pag. 452

Gangrenæ genitalium deſcriptio, 309

Cauſæ, 311

Symptomata, *ibid.*

Diagnofiſ, 311

Prognofiſ, 312

Curatio, *ibid.*

Gangrenæ imminentiſ, *ibid.*

iacipientiſ, 313

confirmatæ, 316

Gemurſa, morbuſ antiquuſ, qui reſtinctuſ
eſt, etiam obliterato nomine, 14

Generatio. An lueſ venereæ ſeminiuſ in
generatione a parentibuſ in liberoſ tra-
duci poſſit, in legitimum luem olim
erupturum, 96

Genitalia variuſ morbuſ ſemper obnoxia fue-
runt, ſed qui a morbuſ venereiſ diverſi
eſſent ante annum 1449. 8. 34. 35. & 36

Genitalium morbi venereiſ, 333

Generantur in lue confirmata, 342

& 343.

Gintiliſ non vidit lapidem a ſtomaco e-
greſſum, 527

Gihni (Coradini) ſententia de origine
luſ venereæ, 47. & 484

Glandularum limphaticarum vitia vene-
rea, 335

Glaucoma venereum, 335. & 357

Gonorrhœa virulenta deſcriptio in viriſ, 172

in fœminiſ, 173

Sedeſ in viriſ, *ibid.* & 611

in fœminiſ, 174

Differentiæ in utroque ſexu, *ibid.*

Quotuplitiſ a variſ erroruſ ſit cir-
ca ſedem gonorrhœæ? 176

Cauſæ conjunctæ, *ibid.*

antecedenteſ, 178

Symptomata, 180

Diagnofiſ, 184

Prognofiſ, 188

Curatio methodica, 191

Curatiõniſ Empiricæ, 193

Prophylaxiſ, 207

Gonorrhœa virulentæ ſicæ deſcriptio, 211

& 215.

Specieſ, 212

Symptomata, *ibid.*

Cauſæ, 213

Diagnofiſ & Prognofiſ, 214

Curatio, 215

Gonorrhœa ſpuriz deſcriptio, 216

Sedeſ, 217

Cauſæ, *ibid.*

Diagnofiſ & Prognofiſ, 218

Curatio, *ibid.*

Gonorrhœa habitualiſ Deſcriptio, 229. 233

Cauſæ, 230

Symptomata, 231

Diagnofiſ & Prognofiſ, *ibid.*

Curatio, 232

Gonorrhœa virulenta ex lue venerea mali-
gna, calloſa, ulcereſa ſit, 343

Inde rariſen nova nunquam genera-
tur, 344

Post hydrargyrolim ſuperſteſ & qua-
re? 435

Quomodo tunc temporis curanda? 436

Gonorrhœa venerea cum arſura ſive *Bur-
ning* Anglorum nunime confundenda,

31. & ſeq.

Ante annum 1494. proriſ incognita

contra quam credit Beckettus, 28.

& ſeq.

Primuſ apparuit quarta lueſ vene-
reæ periodo, 78

A Bethencourt tamen deſcripta ante

annuſ 1527. 510

Gonorrhœa virulenta an curetur uſu vene-
riſ cum muliere Æthiope? 568

An uſu veneriſ cum virgine? 569

Gonorrhœa virulenta. An ad uſuſ curatio-
nem mochlica & draltica purgantia ſæ-
piuſ

INDEX RERUM.

- pius repetita præstent temperantibus, refrigerantibus, anodynis? 638
- An injectionibus in urethram a Guilhelmo Cockburne laudatis efficaciter curetur? 638
- Gordonius* (*Bernardus*) an locus e *Lilio Gordonii* depromptus debeat intelligi de morbis venereis? 24. & seq.
- Goutte* (les) du General la Motthe, quale sit remediis genus? 623
- Græca* nomina, quibus plerique morbi venerei designantur, æquæquam arguunt morbos illos antiquos esse, 46
- Guaiacum* in Europam primum deVectum circa annum 1517. 122
- Ab indigenis Insulæ Hispaniolæ indicatum fuit, *ibid.*
- Descriptio *Guaiaci*? 123
- Quæ ligna olim habita sint pro succedaneis *Guaiaci*. 124
- Ratio decoquendi, & administrandi *Guaiaci*, *ibid.*
- Virtus & utilitas decocti *Guaiaci*, 126. 529. & 580.
- Ejusdem pericula & incommoda, 127
- Guaiaci* usus, utrum præster usui Mercurii? 158. 163. 165. 601. & 638
- Olim in Hispaniola pro præsenii luis veneræ Medicina habitus & quare? 162
- Utilis etiamnum ad aliquot casus, 163
- Numquam Mercurii usui præferendus, 164. & seq.
- Resina sive gummi valet ad curandam gonorrhœam, 204. & 589
- Guaiacia* virtus ad curandam luem veneream a multis laudatur, 480. 501. 503. 504. 511. & seq. 522. 528. 532. 580.
- A multis damnatur, 509. 516. 521. & 573
- Guaiaci* utilitas ad curandos morbos multos a lue venerea diversos, 523
- Guaiaci* decoctum saluationem aliquando ciet æque copiosam ac usus Mercurii, 538
- Guicciardinus* (*Franciscus*) Scripsit luem veneream allatam fuisse ex insulis a Columbo detectis, 58.
- Gummatum* venerea, quæ hydrargyroseos efficaciam eludunt, 454
- Gutta* serena a lue venerea, 358
- Cypsum* cum farina de industria permixtum morbos venereos non adduxit, 50. & 51
- H
- Hæmoxylum*. Vid. *Guaiacum* sive *li-gaum sanctum*.
- Hæmalops* a venerea lue, 358
- Hæmorrhæa* a lue venerea. 336. & 361
- Supervenienti hydrargyrosi, 418
- Hæmorrhagia* ab ulceribus oris, 427
- Hæmorrhoides* a causa venerea, 336 & 363
- Hæreditaria*. Dubitatur an ulla sit lues hæreditaria, quæ in infantibus nulla fuit præbeat indicia? 96
- Hæti*. Vid. *Hispaniolam*.
- Harris* [*Gualterus*] videtur credulus & superstitiosus fuisse, 619
- Confer luem veneream ad interitum nullomodo vergere, 619
- Hassardus* (*Petrus*) Astrologus turpiter adductus, 538
- Hedden*, *Hefsteden*, *Hefsteden*. Vid. *Hefsteden*.
- Helmontius*. (*Joannes Baptista*) Scripsit anili credulitate luem veneream originem habere a nefando congressu hominis cujusdam nequam & improbi, cum jumento quod ulcere sætido distuleret, 53
- Medicinæ operam dedit Lovanii, ubi Doctoratus gradum consecutus est, 590.
- Idiotam in pyrotechniæ studio magistrum habuit, *ibid.*
- De fide suspectus fuit Inquisitoribus. ib.
- Quos ægros curare non potuerit? 591
- Quo tempore & quo morbo obierit? ibi.
- Ejusdem ingenium, mores, indoles, 582
- Credir luem ortam esse ex nefando congressu viri cum jumento scabido, 595
- Hemicrania* venerea, 360
- Henricus III.* Galliarum Rex gonorrhœam vitulentam concepit Venetiis, 2
- Convalescit ex lue venerea decocto radicis Bardanæ a Petro Pena exhibitio, 133
- Hernia* venerea, 219. & seq.
- Herodotus*. Locus Herodoti explicatur, quem luis veneræ antiquitati favere credunt. 6. & 7.
- Her-

INDEX RERUM.

Herpes venereus, 220. & 345
 In meatu auditorio, 358
 Post hydrargyrosim superflus quomodo curandus? 443
Herrera [Antonius] utrum referat suam veneream indigenis Hispaniolæ sive Insulæ Hairi primum innotuisse anno 1503. 616
 Quod contra rei veritatem pugnare demonstratur ex ipsis Historici illius verbis. 505
Hesceben sive lignum juniperinum olim usurpabatur ad curationem luis venereæ, 132. 428. & 549
Hiacan. Huatan. Hoaxacan Vid. *Guaiacum*.
Hippocrates. Explicantur Hippocratis loca, quæ pro stabilienda luis venereæ antiquitate proferri solent, 5. & 6
Hispani luem veneream contraxere in Antillis, 54. & seq.
 Quam deinde cum Neapolitanis, & Gallis communicavere, ac demum cum exteris Europæ, ac plerisque Africæ & Asiæ nationibus, 59. & seq.
Hispania nova. An luem veneream, variolæ ab Æthiops quodam, Pamphili de Narvaez mancipio, acceperit, 593. & seq. 616.
Hispaniola. Lues venerea antiquitus endemia fuit in hac Insula, 55
 Quod comprobatur multis & egregiis auctoribus, 54. & seq.
 Conjecturæ de causis cur lues in hac Insula cæterisque Antillis olim endemia fuerit? 68. & seq.
Historicorum veterum loca explicantur, quæ pro luis venereæ antiquitate adduci solent, 6. & seq.
Historici non pauci referunt luem veneream antiquitus endemiam fuisse in Insula Hispaniola, 57. & seq.
Hock (Wendelinus) Quid de luis venereæ origine senserit? 47
Horatius. An de lue venerea intelligenda sint loca ex Horatio adducta? 9. & 10
Humana carne in escam apparatus falso creditur lues venerea inducta, 52
Huttenus (Ulricus) accuratissime describit infortunia, hydrargyrosicos, quæ ætate sua usu recepta erat, 138. & 501
Hydrargyrus a quo, & quo tempore lui

venereæ curandæ adhibitus fuerit, 121
 A plerisque initio damnatus, *ibid.*
 Non est alexipharmacum luis venereæ juxta Abercrombyum, 608.
 Vid. *Mercurium*.
Hydrargyrus antidotum veneni venetei juxta Listerum, æget ipse antidoto, quod Guaiacum præstat, 611. & 612.
Hydrargyrosi intercalata cum Interjecta balneatione. An nova sit? 409
 An utilis? 410
 An ad pytalismum declinandum efficax? 411
Hydrargyrosi credebatur in ingressu morbi venetei inefficax ab aliis, ab aliis periculosa, & a plerisque Medicis damnabatur, 121
 Videtur in ipso luis Ingressu statim adhibita, 136
 Sed parca dosi & cautione maxima, 137
Empiricorum imprudentia cito infamata fuit, 138
 Neque immerito, si audiat *Huttenus*, *ibid.*
 Inde factum ut neglecta fuerit aliquandiu, cum usu maxime valebat administratio Guaiaci, Chinæ, Sarsæ-parillæ & Sassafras, 139
 Sed comperta remedium illorum inefficacia, ad usum revocata fuit, 140
 Quibus cautionibus nunc adhibeatur, 142.
 Quorum pleræque ab ipso morbi Ingressu cognitæ sunt, 143
Hydrargyrosi. Quibusnam in casibus ab hydrargyrosi abstinendum sit? 393
 Quo tempore adhibenda? 394
 Qualis præparatio hydrargyrosi præmittenda sit? 395
 Præparatio quæ vulgo adhibetur, *ibid.*
 Præparatio altera operosior in Pulmonariis, Cachecticis, Ictericis, Epilepticis, Scorbuticis, 398
 Quibusdam in casibus præparatio in totum omittenda, 400
 Irritus sæpe est illius successus si parior fuerit, 428
 Causæ cur hydrargyrosi parior tam sæpe irrita sit, 429
 Diluantur argumenta quæ in contrarium

INDEX RERUM.

- rium obijciuntur, 429. & 430.
Hydrargyros altera plenior, parciore altera,
 402.
 Plenioris tria sunt stadia, *ibid.*
 Primum, in quo ptyalismus mo-
 vetur, *ibid.*
 Alterum, in quo motus regitur,
 403.
 Tertium, in quo exhauritur, 405
 Parciore siue intercalatae leges, 406
 Plenioris hydrargyrosos infortunia,
 411. & seq.
Hydrargyros a multis laudatur, 67. 84.
 86. 93. 98. 511. 515. 522. 524. 529. 533.
 534. 538. 542. 545. 549. 556. 565. 569.
 572. & seq. 578. 584. 587. 589. 599.
 602. 619.
 A nonnullis improbat, 489. 493.
 511. 532. 545. 548. 567. 477. 608.
 613.
 An sterilitatem inducat? 551
Hydrargyros intercalata per inunctiones
 discretas ab ingressu morbi adhibita fuit,
 497. 510. 512. 515. 530. 537. 559. 562.
 572. 635.
 Etiam interiectis catharticis ad ptya-
 lismum declinandum vel compe-
 scendum, 497. 509. 525. 534. 544.
 560. 563. 589. 635.
Hydrocele venerea, 333. & 344.
Hydrocephalus venereus, 336. & 361
Hyperostosis venerea, 335. & 350
 Officulorum auditioni inservientium,
 357.
Hydrops a causa venerea, 336. & 363
Hyperascorisis in urethra Vid. *Carunculae*.
Hypochondriaca affectio, 336. & 363
 Ingravescens tempore hydrargyrosos,
 420.
Hypopyon venereum, 336. & 358
Hysan, 524
 1
 Icterus a causa venerea, 336. & 363
 Ignis sacer Sancti Antonii jam pridem
 evanuit, 14
 Inappetentia a lue venerea, 336. & 362
 Impotentia ad venerem, quae hydrargyrosi
 non curatur, 456
Incendium. Vid. *Arsum* vel *Burning*.
Indica mulieres libidinosissimae, 72
Infortunia hydrargyrosos plenioris,
 411
 In primo stadio, 412
 In secundo, 417
 In tertio, 421
Hydrargyrosos parciore,
 425
 Quae communia habet cum praecedente
 methodo, 425
 Quae habet propria, 428
Injectiones mercuriales in urethram ad cu-
 rationem gonorrhoeae virulentae laudatur
 a Musitano & Mayernio, 198
 Sad damnantur tum ratione tum ex-
 perientia, 199
 Astringentes in urethram, 612. 621.
 & 638.
Insula Antille. Vid. *Antillas*.
Insula Hispaniola siue *Haiti* Vid. *Hispa-
 niolam*.
Insultus Arthritidis vel Rheumatismi hy-
 drargyrosos tempore, 418
Intemperies aeris luem veneream non in-
 tulit, 48
Inunctiones mercuriales. Quibus legibus
 administrandae? 169. & 401
 A multis approbat, vide *Hydrargy-
 rosos* a multis laudatur.
 A nonnullis improbat, vide *ibid.*
 An sterilitatem inducant? *ibid.*
 Intercalata a primo morbi ingressu
 adhibetur, *ibid.*
 Etiam interiectis catharticis. *ibid.*
Ischuria, quae stranguriz supervenit de-
 scriptio, & Curatio, 138
Ista (Rodericus Diaz de) narrat luem ve-
 neream ab Hispaniola, ubi endemia an-
 tiquitus erat, in Europam devesse
 fuisse, 56
Itali morbis venereis abundant, & quare
 juxta Mercurialem? in addend.
Ivana vel *Iguana* lacerti species Insulae
 Hispaniolae peculiaris, 71. & 611.
 J
 Japoni luem veneream a Lusitanis con-
 tagione acceptam habent, quam ideo
 dicunt mortuum Lusitanorum, 64
 Joan-

INDEX RERUM.

Joanna I. utriusque Siciliæ Regina & Comes Provincie, an sanxerit Statuta de Dis-
ciplina Lupanaris Avenionensis? 37. *seq.*
Jobus an lue venerea olim laboraverit?
Prof. viii.

Ejus præsidium a siphiliticis olim im-
plorabatur, *Prof.* ix.
Morbus quo percussus fuit, erat ipsis-
sima lepra, *ibid.*

Jouberius (Laurentius) Scripsit luem ve-
neream jam mitiorem evasisse, & finem
aliquando esse habituram, 81. & 568.
Qua in urbe fato functus fuerit? 460

Judeis non licebat ingredi in Lupanar
Avenionense, 40
Insigni nota Rotæ de *senno* discreti
erant, 44

Juniperus, lignum Juniperi olim loco Gua-
iaci ad curationem luis venereæ adhi-
bitum fuit, 124. & 549

Falsa Rondeletii sententia de hujusce
ligni virtute, 124

Major bacca rufescente, sive oxyce-
drus, utilis ad curationem luis ve-
nereæ, 132

Juvenalis. An mentionem fecerit de lue
venereæ? 9. & 10

K

K *Apusæ* a lue venerea, 336. & 360
Kapadokia venerea, 236. 360. & 524
Kistici tumores, 336. & 356

L

L *Acerta* viridis. Vid. *Mercurium præ-*
capitatum viridem.

Lesiones functionum a causa venerea, 336.
& 360.

Animalium. 336. & 360
Vitalium, *ibid.* & 361
Naturalium, *ibid.* & 362
Universalium, *ibid.* & 363
Earum quæ scemini propriæ sunt,
337. & 364.

Lampatam. Vid. *Radicem China.*
Lafrancus de Mediolano an de morbis

venereis locutus sit? 23. & *seq.*

Lapis medicamentosus Crolli,
Butleri, 475
591

Leges in Syphiliticos sancitæ Lutetiæ a
Senatu Parisiensi, 85

A Præposito Parisiensi,
Tolozæ, 94

Lemnius (Levinus) testatur ætate sua luem
veneream mitiorem esse quam ante, 83

Leoniceus [Nicolaus] retulit primam luis
venereæ causam ad intemperiem aeris, 48

Lepra Arabum a lue venerea penitus di-
versa fuit, 11. & *seq.* 94. 581. & 604

Contrahebatur usu rei venereæ, 30
In arsuram sæpe degenerat, *ibid.*

Falso creditur duplicis generis fuisse,
alteram quæ cum lue venerea ead-
em esset, alteram quæ differret
ab eadem, 36

Cur Alexandriæ frequenter oriretur, 68
Sponte in interitum abiit in Europa, 81

Lepra Judaica a Mose descripta an eadem
fuerit cum hodierna lue venereæ? *Prof.* viii

Vid. *Elephantiasim.*

Leprosi in venerem promi, 31
Arsura remanebant forminas qui-
buscum sape habebant, *ibid.*

Leprosus cum scorto concumbens luem
veneream non produxit, 49

Neque vina leproforum sanguine in-
fecta, 50

Vid. *Elephantiasis.*

Lesbicus morbus, an apud Lucianum luem
veneream significet? *in addend.*

Liebene post hydrargyrosim superstites quo
modo curandi? 443

Lichnis Saponaria dicta laudabatur olim
ad curationem luis venereæ, 132

Liebauinus [Joannes] refert agvitas & cir-
culatorum in Montepessulano rapti in ali-
um strigofum, 551

In quo Jacobum Sylvium expilavit
suppresso Sylvii nomine, *in add.*

Lignum Guaiaci Vid. *Guaiacum.*

Sassafras Vid. *Sassafras.*

Sanctum Vid. *Guaiacum.*

Feniculatum Vid. *Sassafras.*

Limpha vitia venerea, 336

Lisler (Martinus) existimat luem vene-
ream in Insula Haiti ortam esse esse la-
cet-

INDEX RERUM.

- ertorum majorum, qui ibidem occurrunt, & *Iguane* sive *Ivane* appellantur, 611
 Laudat ad gonorrhœam usum internum cantharidum, *ibid.*
 Injections astringentes in urethram, 612
 Gloriatu de arcano quodam remedio ad gonorrhœam, quod cum cochenillia convenire videtur, 612
Lobera (Aloysius) bubonem venereum descripsit circa annum 1540. exptello *Bubonis* nomine, 76
Luciani locus a Domno Calmet oppositus explicatur, *in addend.*
Lues venerea nec Græcis nec Romanis olim nota fuit, 1
 Ut probatur silentio Medicorum, 2
 Historicorum, 2
 Et Poetarum veterum, 3
 A lepra Arabum plane diversa, 13.
 & seq.
 Falsum est ex venere vulgivaga sponte obortam fuisse, 15. 607. 613. 619. & 621.
 Ab anno 1494 ad annum 1496. Europæ primum innotuisse probatur multis & idoneis testibus, 17. & seq.
 Nec obstant testimonia a Guillelmo Becket allata, 28. & seq.
 Certe ante annum 1496. in Provincia ignota fuit, 44
 Initio a Gallis dicta fuit *crassa Variola*, la *grosse Verole*, 45
 Sed usu tandem invaluit ut *Variola* simpliciter diceretur, Gallice la *Verole*, *ibid.*
 Fabulæ de origine luis venereæ, 46
 & seq.
 Nec ab Astorum influxu, nec a Planetarum coitione inducta fuit, 47
 Nec a vitiosa aeris intemperie, 48
 Nec ab usu veneris leprosi cum scorto, 49
 Nec a scorto vulgari, cujus in utero abscessus lateret, 50
 Nec a puteis venenatis, aut gypso cum farina mixto, *ibid.*
 Nec a vinis leproforum sanguine infectis, *ibid.*
 Nec ab humana carne in escam ap-
 parata, 52
 Nec a congressu cum jumento scabido, 53
 Olim endemia fuit in Insula Hispaniola sive Haiti & inde in Europam devesa, 55. & seq.
 Ab Hispanis in Neapolitanos, ab utrisque in Gallos contagione dimanat, 60
Lues venerea contagione manavit ab Hispanis & Neapolitanis ad ceteros noti orbis populos, 62
 Apud quos varia nomina sortitur, 63
 Præter celeberrimum luis venereæ focus in Hispaniola Insula, extirpere alii non pauci in plerisque Zonæ Torridæ locis, 64
 Coniecturæ de causis cur in Insula Hispaniola olim endemia fuerit, 67. & seq.
 Sicut & in cæteris foecis in quibus antiquitus latuit in America, Africa, & Asia, 73
 Quasnam periodos habuerit hæc lues in Europa? 74. & seq.
 Quosnam in posterum habitura videatur? 81. & seq.
 Videtur multis ad interitum tendere, 81. & seq. 561. & 569.
 Causæ cur ad interitum gradatè tendat, 83
 Solvitur obiectio quæ in contrarium asserri potest, 84
 Non desunt tamen; qui coniciant luem veneream in perpetuum duraturam, 84
 Lues venerea cum primum apparuit, credita fuit serpere in distans contagione, 85
 Numquam generatur errore ullo in usu rerum non-naturalium, sed propagatur tantum ex traduce, 96
 Generatione vel contagione, 97. & 561. *in addend.*
 Contagione, non in distans nec per fomitem, 97. & 587
 Sed contactu immediato, ut usu veneris, læstazione, bastatione, cubitu simplici, & contrestatione partium ulceratarum, 100
 T. Num

I N D E X R E R U M.

- Numquam contrahitur *per saltum* &
sine prævia labe in parte, perquam
contrahitur, 107
- Luis venerea* confirmatæ descriptio, 332
- Causæ, 337
- Symptomata, 342
- Morbi genitalium, *ibid.*
- Vitia cutis, 344
- Dolores veneriei, 348
- Morbi ossium, 349
- Tumores glandulosi & limphatici, 354
- Oculorum morbi, 356
- Morbi aurium, 358
- Læsiones functionum, 360
- Lues venerea*. An morbus regius dicta fue-
rit? 551
- An finem aliquando habitura sit? 81
- ¶ *seq.* 559. 562. *Præf.* viii. *in ad-*
denda.
- Initio ferocior erat, 83. 559. 562.
598. 607.
- A quibusdam creditum fuit luem ve-
nericam curari, si insectus rem ha-
beat cum virgine, 570. & 620
- Lues venerea* confirmata semper gravis est
& difficilis, 383
- ita tamen ut illius gravitas variare
possit multis de causis, *ibid.*
- Unde fit ut quædam gravissimæ sint,
384.
- Nulla est quæ curari non possit, 388
- Sed aliæ curantur difficilius, *ibid.*
- Aliæ cum majore periculo, 390
- Aliæ demum diligentissima cautione
opus habent, 392
- Gemina est *luis venereæ* species; al-
tera quæ humores tantum, altera
quæ partes solidas corrumpit, 435
- Lues venerea* in Europa primum apparuit
circa annum 1494. 478. 487. 497. 561.
573. 604. 607.
- Primum in Italia palam observata est,
478. 492. 495. 508. 562. 605. 607.
- Deinde in Hispania Gallique, 482
- An indigenis Insulæ Haiti primum in-
notuerit anno 1503. 616
- Quod falsum esse probatur, *ibid.*
- Lues venerea* juxta quosdam ab omni ævo
cognita fuit, 482. 529. 539. 555. 571.
585. 602. 613. 619. 622. 633. & 634.
- Atque adeo eadem fuit cum Lepre sive
Elephantiasi, 480. 488. & 529.
- Vel cum lichenibus, & impetigine,
480. 486. 529. 556. & 607.
- Vel cum igne Pestico, 484
- Juxta plures vero morbus est novus
Veteribus incognitus, 480. 483.
487. 497. 510. 516. 520. 527. 540.
& *seq.* 574. & *seq.* 583. & *seq.*
592.
- Luis venerea* causa deducebatur ab aliis ab
influxu Syderum, 473. 484. 486. 490.
500. 510. 548. 594. & 607.
- Ab aliis a pluviosa aeris constitutione,
479. 483. 485. 500. & 536.
- Ab aliis a carne humana in anno-
nam militibus præbita, 479. 556.
585. & 594.
- Ab aliis ab Elephanticonum sangui-
ne, quo vinum corruptum fuerat,
479. & 585.
- Ab aliis a Meretrice, quæ sui copiam
leproso secebat, 479. 504. 595. &
638.
- Ab aliis ab Africa, unde in Ameri-
cam devecia fuerit, 606. & 638
- Ab aliis abusi veneris militum nau-
tarumque Hispanorum cum mulie-
ribus indigenis Insulæ Haiti anno
1492. repetæ, 479. 504. 510. 512.
527. 529. 543. 555. 569. 566. 568.
Vid. suprà ante causas.
- Lues venerea* credebatur initio sponte con-
cipi, 479. 484. 485. & *seq.* 510.
- Deinde credita fuit contagione qui-
dem propagari aliquando, at vero
sponte quoque aliquando generari,
479. 484. 490. & *seq.* 510. 515.
& 536.
- Jam dudum ab omnibus creditur
contagione tantum traduci, 479.
495. 516. 533. 545. 592. & 613.
- Lue venerea* curanda adhibita sunt in-
itio purgantia, & alterantia multigena
secundum therapeiam methodicam, 479.
484. & *seq.* 496. & *seq.* 510. 527. &
548.
- Deinde decocta lignorum, & radi-
cum, quæ vi hidrotica pollent,
479. 497. & *seq.* 524. & *seq.* 529.
599

INDEX RERUM.

599. & seq. 638. in addend

A multis laudatæ illitiones mercuriales,

A nonnullis improbatæ, vide Hydragryosis.

Sustinugia Mercurialia: a plerisque semper damnata, *ibid.*

Præparata Mercurialia: a paucis usurpata nec plerumque satis feliciter *ibid.*

Luës venerea potest in totum extirpari juxta Torellani, 492

Ab infecto aliquando non propagatur in sanum etiam in concubitu, 498

Luës venerea graphice deferibitur a Joanne le Maire, 506

Et ab Erasmo, 508

Luës venerea, si semel radices egerit in corpore, penitus tolli non potest juxta quosdam, 532

Luës venerea an prædicta fuerit a Paulo de Medelburgo? 500

An a Joanne de Regio Monte? 520

Luës venerea gravior est in regionibus frigidioribus, 509. 579. & 620

An ab immodico veneris usu oriri possit? 587

An ab Orientali plaga? Negatur ab Helmontio, 592

An a Sinarum regno? Negatur ab eodem, *ibid.*

An ab Indiis occiduis? *ibid.*

Negatur ab eodem sed nullo jure, *ibid.* & seq.

Lusini (Aloyii) Collectio naves suos habet, quos dolendum est in Editione Lugduno-Batava deterfos non esse, 627

Lumbago, 323

Lupanaria Avenionensis antiqua Statuta, 37

An genuina sint? 40

Lupanaria in multis Urbibus olim publice instituta fuisse, 41

Lusitani e Castellanis luem veneream acceptam habuere, quam ideo dicunt *morbum Castellani*, 62

Luxus capitalis Nolanorum. An de lue venerea apud Aufonium possit accipi? in addend.

M

*M*acollo (Joannes) quo epiphonemate librum suum concludat? 581

Macula cutis venereæ, 333. & 345

Magnes anti-venereus Joannis Winell, 598

Mahometani, Vid. *Turci*.

Mammiarum cancer a causa venerea, 336.

& 363.

Mainardus (Joannes) credidit luem veneream ortam fuisse a Scorto valentino, quocum leprosus rem habuit, 49

Mariske ani, Vid. *Ficos* ani.

Martialis. An in syphiliticos jocus sit nomine fisorum? 9

Martinus [Bartholomæus] Cardinalis Segobriensis moritur ob adhibitam therapeiam mercurialem, 121

Martinus Episcopus Varadiensis & Prorex Hungarie videtur medicum Montagnanz consilium petisse, 528

Massa (Nicolaus) de bubone venereo pauca quædam dixit anno 1534. 76

Matthiolus (Petrus Andreas) temere credidit luem veneream curari posse retendis plane inefficacibus, 316

Mantisani luem acceptam habent a Judæis ex Hispania exulare jussis, unde factum est ut ab illis *malum Hispanicum* dicatur, 55

Mayerne (Theodorus Turquetus de) laudat injectiones mercuriales in urethram ad gonorrhææ curationem, 199

Item bolum mercurialem, aquam menthæ, & carnem bubulam exsiccatam & pulveratam, 596

Mainardus (Petrus) primus descripsit anno circiter 1520. verrucas & porros venereis genitalium, 76

Falso olim tradidit luem veneream anno 1584 cessaturam esse, 81

Medicorum veterum loca explicata, unde creditur antiquitas luis venereæ posse colligi, 1. & seq.

Expenduntur loca aliquot Medicorum anno 1494. antiquorum. 22. & seq.

Medici complures testantur luem veneream endemiam olim fuisse in Insula Hispanota, 57. & seq.

Ini-

INDEX RERUM.

- Initio luis venereæ curationem detre-
ctabant in Italia, Hispania, Ger-
mania & Gallia, 118
Medici de morbis veneris consulendi sunt,
556.
Medicamenta antichæradica, 469
Eorundem administrandi ratio, 472
Medulla ossium morbi, 352
Melicerides venereæ, 335. & 355
Menjorius (Antonius) merito culpandus
quod in Dissertationibus suis pathologi-
cis therapelam omiserit, 604
Menstrua mulierum in calidioribus regio-
nibus acerrima sunt, 71
Ideo lege vetitum erat Judæis ne cum
menstruatis ullum haberent contur-
bernium, 71
Ideoque Arabes Medici, & primi &
sæpe differunt de pustulis & ulceri-
bus virgæ, oriundis ex coitu cum
fœda hoc est cum menstruata mu-
liere, *ibid.*
Inde videtur repetenda potissima cau-
sa cur lues venerea in Antillis en-
demia fuerit, *ibid.*
Menstruorum suppressio a causa venerea,
337. & 365.
Fluxus immodicus, *ibid.*
Eruptio tempore hydrargyrosæ, 419
Meniba aqua Quercetani, 474. & 587
Mensulagra, 494
Mercurius (Joannes) modestè silet de natu-
ra morbi, quo Jobus percussus fuit,
Præf. x.
Mercurialis [Hieronymus] an tractatum
scripserit de Morbo Gallico? *in addend.*
Mercurius ante notam luem veneream a
Græcis & Latinis damnatus, tanquam
deleterius, 134
Ab Arabibus ad usum medicos sed ex-
teriores vocatur, *ibid.*
Quorum exempla sequuti sunt Me-
dici Europæ, 135
Inde factum est ut ad curationem luis
venereæ accommodatum sit ex ana-
logia, 136
Sed initio dosi parcissima & cautione
maxima, 137
Aliquandiu tamen exolevit post dete-
cta Guaiacum, Chinam, Sarsam-
parillam & Sassafras, 139
In usum revocatur vilescitibus re-
mediis illis hidroticis, 140
Adhibetur interne vel externe, *ibid.*
Ufus externus Mercurii triplex est,
1. Sub forma unguenti vel linimen-
ti, *ibid.*
2. Sub forma ceræ sive emplastri, 141
3. Sub forma suffumigii, *ibid.*
Ufus internus Mercurii olim tantum
duplex erat, 143
1. Sub forma præcipitatis rubri, 143
2. Sub forma nativæ Mercurii crudi,
144
Nunc vero multiplex est, 146
Mercurius sublimatus dulcis, *ibid.*
Violaceus, *ibid.*
Præcipitatus albus, *ibid.*
Alkalifatus,
Anti-phthisicus,
Anti-scorbuticus,
Vivus dulcis,
Diureticus,
Catharticus, de quibus omnibus, 146
Præcipitatus ruber per se, 147. & 603
Solaris, *ibid.*
Lureus, 147
Vividis sive venereus, 147. 203.
& 579.
Vitz, 571
Effectus Mercurii in humano cor-
pore, 148
Postulata de Mercurii proprietatibus,
149.
Ratio æstimandæ quantitatis Mercurii,
quæ introducitur per illitionem, 150
Mercurius sublimatus corrosivus a quibus-
dam interne adhibitus curandæ luis ve-
nereæ, 603. & 634
Mercurius. Ratio æstimandæ quantitatis
Mercurii, quæ introducitur, cum ere
exhibetur, 152
Mercurium intro sumptum parcius, &
difficilius admitti quam illitum, *ibi.*
Lemmata de effectibus primariis Mer-
curii, 153
Corollaria de effectibus secundariis,
154.
Sufficit ad curationem luis venereæ
sine salivatione, 158
Mer-

INDEX RERUM.

Mercurii usus ad curationem luis venereæ
olim a multis damnatus, 159
Laudatus a pluribus, *ibid.*
Præfertur ului lignorum sudorifico-
rum duce experientia & comite ra-
tione, 106 622. 631. & 638.
Uter potior sit, an interior exterior-
ve *Mercurii* usus? 166. & 612
Quæ sit optima *Mercurii* foris adhi-
bendi ratio, suffumigiis, emplastris
an linimentis? 168
Ratio adhibendi *Mercurii* illitu cæ-
teris omnibus præstat, 169
Dosis adhibendi *Mercurii* in hydrar-
gyroli parciori difficilissime definiri
potest, 431
Mercurius corporalis curandæ luis venereæ
nunquam adhibendus juxta Paracelsum,
521.
Sed *Mercurius* instar cibi devoratus,
ibid.
Vulgaris, qui salivationem ciety, im-
probatur a Gerardo Goris, 622
E metallis extractus unice laudatur
ab eodem, quasi luem curaret sine
salivatione, 622
Mercurius fixus & diaphoreticus Davidis
de Planiscampy, 576
Præcipitatus ruber Pauli de Sorbait,
617.
Mercurius violaceus diaphoreticus, 468
Mercurii solutio per deliquium, 469
Mercurialis præparata ad quos morborum
venereorum casus valeant, 167
Pleraque describuntur ab Uncero, 574
Multa recensentur ab Hartmanno, 579
An præstent Hydrargyrosi? 607. 638.
Mercuriale unguentum quomodo præpare-
tur, 491
Meretrices Vid. *Scorta*.
Merobodus rationalis ad luis venereæ cura-
tionem, 119
Sed plane inefficax, 120
Mercurialis initio damnabatur, *ibid.*
Mexicanus regnum, an luem veneream,
variolasne acceptas habeat ab Æthiope
quodani, quod erat Pamphili de Nar-
vaez mancipium, 583. & seq. 616
Modus saturandi præparatis mercurialibus
ptisanam sudorificam, 468

Montagnana (Bartholomæus) existimat
ægritudines quasdam esse, quæ non ac-
cidant nisi longis temporum intervallis
527.
Quotuplex fuerit *Montagnana*? *ibid.*
Montanus (Joannes Baptista) refert luem
veneream Indiis novis familiarem fuisse,
57.
Montis Marchiones temere gloriantur se
a Regio Borbonio sanguine originem
ducere, 540
Montanus (Hieronymus) an fuerit Archia-
tros Henrici II. Galliarum Regi? 542
Mora ani Vid. *Ficos* ani.
Morbi venerei Vid. *Luem veneream*.
Morbi scortatorum, 8. 34. & seq.
Maxime si rem habeant cum men-
struatis, 72
Potissimum in regionibus calidiori-
bus, 72
Morbi meretricum, 42
Morbi venerei genitalium, 333. & 343
Oris, narium & faucium, 346
Ossium, 345. & 349
Oculorum, 345. & 356
Aurium, 326. & 358
Morbi alienigenæ. Horum alii brevi spon-
te intereunt, ut lepra; alii perennes fiunt,
ut variolæ & morbilli, 81
Morbus Regius, quid hoc nomine intel-
ligatur? 495
Novus militum, quid sit apud Basi-
lium Valentinum, 589
Lesbius, *in addend.*
Campanus, 10
Morbus (les Gouttes du General la) qua-
les sint? 623
Multiplicatur virus venereum semel admis-
sum, 111
Quænam sint multiplicationis illius
conditiones? 111
Causæ & effectus? *ibid.*
Munditia studium in utroque sexu utile
ad præcavendam luem veneream, 83
Murmur in auribus, 358
Musa (Antonius) Vid. *Brassævolum*.
Musculi qua de causa vividissimi appa-
reant, cum suppuratione venerea nudan-
tur, 630
Musianus (Carolus) se primum bullarum
T t 3 cry-

INDEX RERUM.

crystallinarum in genitalibus mentionem
facere putat, 78
Laudat injectiones mercuriales in ure-
thram ad curationem gonorrhœæ,
198.

N

N *Arcotica* salivationis tempore non
exhibenda, 411
Narium morbi venerei, 333
Narvaez (Pamphili de) mancipium. An
luem veneream detulerit in Indias Occi-
duas? 583. 605. & 616
Quod negatur argumentis gravissimis,
probaturque 1. Hancce Historiam ad
Hispaniam novam pertinere; nequa-
quam vero ad insulam Haiti, *ibid.*
2. Non luem veneream, sed vario-
las ab illo mancipio in Hispaniam
novam deventas fuisse, *ibid.*
Nasi depressio a lue venerea, 463
Neapolitani luem concipiunt ab Hispanis
quam cum Gallis communicant, 60. &
seq.
Neapolitanum Bellum Caroli VIII. Gallo-
rum Regis cum Regibus Neapolitanis,
& Ferdinando Arragonensium Rege de-
certantibus, cujus tempore lues venerea
Europæ primum innotuit, 59
Neapolitanum unguentum; ex quibus olim
componebatur, 140
Ex quibus & qua methodo compo-
natur hodie, 401
Nigritæ luem veneream endemiam Patlin-
tur, 65
Fallitur tamen Sydenhamius, dum
putat ab illis Insulas Antillas deve-
ctam fuisse, 67
Nodi venerei post hydargyrosim supersti-
tes, 454
Quomodo curandi? 587
Nolanus Luxus. An apud Ausonium de lue
venerea debeat intelligi? *in addend.*
Nutrices, quibusnam morbis venerei ob-
noxiaz sint? 161. 277. 290

O

O *Obstructione* lues venerea sæpenum-
ro contracta fuit, 100
Obstructiones jecinoris, lienis, pancreatis
a causa venerea, 446
Oculorum morbi venerei, 335. & 565
Oleum vitrioli dulcificatum seu aqua Rabe-
lii, 473
Oleum mercuriale carpis affricatum saliva-
tionem movet, 576
L' Onglade, 333. & 344.
Ophtalmia venerea, 331. & 346.
Ophtalmia venerea, 210. & 357
Opiate duz Fernelii, major minorque,
quas ad curationem luis venereæ lauda-
bat quasi efficacissimas, nullius virtutis
erant, 132
Opiate Palmarit ex illis duabus compo-
sita haud efficacior erat, *ibid.*
Opiate ad dentes firmandos & gingivas de-
tergendas, 477
Fernelii ad curationem luis venereæ,
540.
Palmarit, 556
Venerea Abercrombyi, 608
Opodeldoch, quidnam eo nomine intelli-
gatur? 607
Ora maritima Africæ, & Asiæ luem vene-
ream experta est commercio cum Gallis
vel Christianis quæ ideo vocatur *ibi mor-
bus Gallicus* vel *morbum Francorum*, 62
Origines refert morbum Jobi ad Elephan-
tiam, *Præf.*
Origo luis venereæ nec ab Astrorum influxu,
aut Planetarum coitione repetenda est, 47
Nec ab aeris intemperie, 48
Nec ab usu rei venereæ scorti cum le-
proso, 49
Nec a scorto, in cujus utero absoef-
sus lateret, 54
Nec a puteis Hispanorum perfidia ve-
nenatis, gypsove cum farina mix-
to, 50
Nec a vinis veneno infectis, 50
Nec ab humana carne in escam ap-
parata, 52
Nec a nefando concubitu cum jumen-
to

INDEX RERUM.

- to scabido, 53
 Sed a contubernio Hispanorum cum mulieribus Iululæ Hispaniolæ, ubi morbus ille antiquitus endemius, erat, 54. & seq.
Oris morbi venerei, 333. & 347
Oris factor venereus, 334. & 348
 Striclura sive capistratio post hydrargyrolum, 424
Ossium morbi venerei, 335. & 349
Ossium caries venerea, quotuplex est? 446
 Plerumque post hydrargyrolum superest, *ibid.*
 Illius remedia, 446
Ossium palatinorum iactura, 414
 Quomodo reparanda? 415
Osteosarcosis venerea, 335. & 354
Ovariorum hydatides, hydrops, abscessus a causa venerea, 366
 Tophi, scirri, tumores, 366
Ovum sive clavus, 335. & 360
Oxycedrus, sive juniperus major bacca rufoescente olim cusandæ lui venereæ adhibitus, 132
- P
- Abamvve* Vid. *Sassafras*.
P *Pacius* (Fabius) videtur potius Cathedralarius Professor fuisse quam Medicus practicus, 578
Palladius, Locus Palladii exponitur, qui creditur pro antiquitate lui venereæ facere, 7
Palmaris (Julius) ex duabus Fernelii opiatis anti-venereis unicam componit, quæ Fernelianis nihilo efficacior erat, 132
Palpebrarum Inflammatio, lippitudo, trachoma, sycosis, 335. & 356
Palpitatio cordis, 376. & 260
Panacea Mercurialis, 145
 Solaris & Lunar, 348
De la Vigne, Medici Parisiensis, 468
De la Brune, 465
Panniculus carnosus. An sit sedes seminis venerei, 555
 Adiposus, An sit sedes seminis venerei? 639
- Panus* venereus Vid. *Bubonem*.
Paralysis venerea, 336. & 361
Paraphimosis Descriptio, 454
 Causæ, *ibid.*
 Symptomata, 256
 Diagnofis, 258
 Prognofis, 259
 Curatio, 259
Parus (Ambrosius) an venenum instillaverit in aurem Francisci II.? 557
Paracelsus (Theophrastus) de bubone venereo mentionem fecit anno 1536. 76.
 & 522.
 Videtur quoque de gonorrhœa venerea mentionem fecisse anno eodem, 78. & 522.
Paracelsi (Theophrasti) genus, studia, remedia, vitia, mors, 517
 Nomina, 519
 Quid de lue venerea senserit, *ibid.*
 & seq.
 Fatetur tractatum suum de morbis venereis sibi vitio datum, 521
Pedilegium in solutione Mercuriali salivationem movet, 586
La Pelarelle sive *la pelade*, 334. & 345.
Pena [Petrus] dicitur Henricum III. lue venerea laborantem curasse decocto radicis Bardanæ, 133
Penis distortio, 453
Perinæ Abscessus venerei Causæ, 324
 Symptomata, *ibid.*
 Diagnofis, 225
 Curatio, 226
Periodi, quas lues venerea in Europa in hunc diem habuit, 74. & seq.
 Prima ab anno 1494. ad annum 1516. quæ a Fracastorio describitur, *ibid.*
 Altera ab anno 1516. ad annum 1526. in qua duo nova accessere symptomata, exostosis cum carie ossium, & porri aique verrucæ circa genitalia, 75
 Tertia ab anno 1526. ad annum 1540. in qua primum apparuere bubo inguinum & alopecia, 76
 Quarta ab anno 1540. ad annum 1550. quo temporis intervallo apparuit gonorrhœa venerea, 77
 Quinta ab anno 1550. ad annum 1562. 78.

INDEX RERUM.

crystallinarum in genitalibus mentionem
facere putat, 78
Laudat injectiones mercuriales in ure-
thram ad curationem gonorrhœæ,
198.

N

N *Arcotica* salivationis tempore non
exhibenda, 411
Narium morbi veneri, 333
Narvæz (Pamphili de) mancipium. An
luem veneream detulerit in Indias Occi-
duas? 583. 605. & 616
Quod negatur argumentis gravissimis,
probaturque 1. Hancce Historiam ad
Hispaniam novam pertinere; nequa-
quam vero ad insulam Haiti, *ibid.*
2. Non luem veneream, sed vario-
las ab illo mancipio in Hispaniam
novam deventas fuisse, *ibid.*
Nasi depressio a lue venerea, 463
Neapolitani luem concipiunt ab Hispanis
quam cum Gallis communicant, 60. &
seq.
Neapolitanum Bellum Caroli VIII. Gallo-
rum Regis cum Regibus Neapolitanis,
& Ferdinando Arragonensium Rege de-
certantis, cujus tempore lues venerea
Europæ primum innotuit, 59
Neapolitanum unguentum; ex quibus olim
componebatur, 140
Ex quibus & qua methodo compo-
natur hodie, 401
Nigritæ luem veneream endemiam Patian-
tur, 65
Fallitur tamen Sydenhamius, dum
putat ab illis Insulas Antillas deve-
ctam fuisse, 67
Nodi veneri post hydrargyrosim supersti-
tes, 454
Quomodo curandi? 587
Nolanus Luxus. An apud Ausonium de lue
venerea debeat intelligi? *in addend.*
Nutrices, quibusnam morbis veneri ob-
noxie sint? 161. 277. 290

O

O *Obstructione* lues venerea sæpenum-
ro contracta fuit, 100
Obstructiones jecinoris, lienis, pancreatis
a causa venerea, 446
Oculorum morbi veneri, 335. & 565
Oleum vitrioli dulcificatum seu aqua Rabe-
lii, 473
Oleum mercuriale carpis affricatum saliva-
tionem movet, 576
L' Onglade, 333. & 344.
Ophiasis venerea, 331. & 346.
Ophthalmia venerea, 210. & 357
Opiata duz Fernelii, major minorque,
quas ad curationem luis veneræ lauda-
bat quasi efficacissimas, nullius virtutis
erant, 132
Opiata Palmarii ex illis duabus compo-
ta haud efficacior erat, *ibid.*
Opiata ad dentes firmandos & gingivas de-
tergendas, 477
Fernelii ad curationem luis veneræ,
540.
Palmarii, 556
Venerea Abercrombyi, 608
Opodeldoeb, quidnam eo nomine intelligen-
tur? 607
Ora maritima Africæ, & Asiæ luem vene-
ream experta est commercio cum Gallis
vel Christianis quæ ideo vocatur *ibi mor-
bus Gallicus* vel *morbum Francorum*, 62
Origines refert morbum Jobi ad Elephan-
tiam, *Pref.*
Origo luis venereæ nec ab Astrorum influxu,
aut Planetarum coitione repetenda est, 47
Nec ab aeris intemperie, 48
Nec ab usu rei veneræ scorti cum le-
proso, 49
Nec a scorto, in cujus utero abscis-
sus lateret, 54
Nec a puteis Hispanorum perfidia vene-
renatis, gypsove cum farina mix-
to, 50
Nec a vinis veneno infectis, 50
Nec ab humana carne in escam ap-
parata, 52
Nec a nefando concubitu cum jumen-
to

INDEX RERUM.

- to scabido, 53
 Sed a contubernio Hispanorum cum mulieribus Iululæ Hispaniolæ, ubi morbus ille antiquitus endemius, erat, 54. & seq.
Oris morbi venerei, 333. & 347
Oris foror venereus, 334. & 348
 Stricture sive capistratio post hydrargyrosim, 424
Ossium morbi venerei, 335. & 349
Ossium caries venerea, quotuplex est? 446
 Plerumque post hydrargyrosim superest, *ibid.*
 Illius remedia, 446
Ossium palatinorum iactura, 414
 Quomodo reparanda? 415
Osteosarcosis venerea, 335. & 354
Ovariorum hydatides, hydrops, abscessus a causa venerea, 366
 Tophi, scirri, tumores, 366
Osum sive clavus, 335. & 360
Oxycedrus, sive juniperus major bacca rufescente olim curandæ lue venereæ adhibitus, 132
- P
- P** *Abamvve* Vid. *Sassafras*.
Pacius (Fabius) videtur potius Cathedralarius Professor fuisse quam Medicus practicus, 578
Palladius, Locus Palladii exponitur, qui creditur pro antiquitate lue venereæ facere, 7
Palmaris (Julius) ex duabus Fernelii opiatis anti-venereis unicam componit, quæ Fernelianis nihilo efficacior erat, 132
Palpebrarum inflammatio, lippitudo, trachoma, sycofis, 335. & 356
Palpitatio cordis, 336. & 260
Panacea Mercurialis, 145
 Solaris & Lunar, 348
De la Vigne, Medici Parisiensis, 468
De la Brune, 465
Panniculus carnosus. An sit sedes semini venerei, 555
 Adiposus, An si sedes semini venerei? 629
- Panus venereus* Vid. *Bubonem*.
Paralysis venerea, 336. & 361
Paraphimosis Descriptio, 454
 Causæ, *ibid.*
 Symptomata, 256
 Diagnofis, 258
 Prognofis, 259
 Curatio, 259
Pareus (Ambrosius) an venenum instillaverit in aurem Francisci II.? 557
Paracelsus (Theophrastus) de bubone venereo mentionem fecit anno 1536. 76.
 & 522.
 Videtur quoque de gonorrhœa venerea mentionem fecisse anno eodem, 78. & 522.
Paracelsi (Theophrasti) genus, studia, remedia, vitia, mors, 517
 Nomina, 519
 Quid de lue venerea senserit, *ibid.*
 & seq.
 Fatetur tractatum suum de morbis venerei sibi vitio datum, 521
Pedilavium in solutione Mercuriali salivationem movet, 586
La Pelarelle sive *la pelade*, 334. & 345.
Pena [Petrus] dicitur Henricum III. lue venerea laborantem curasse decocto radicis Bardanæ, 133
Penis distortio, 453
Perinei Abscessus venerei Causæ, 324
 Symptomata, *ibid.*
 Diagnofis, 225
 Curatio, 226
Periodi, quas lues venerea in Europa in hunc diem habuit, 74. & seq.
 Prima ab anno 1494. ad annum 1516. quæ a Fracastorio describitur, *ibid.*
 Altera ab anno 1516. ad annum 1526. in qua duo nova accessere symptomata, exostosis cum carie ossium, & porri atque verrucæ circa genitalia, 75
 Tertia ab anno 1526. ad annum 1540. in qua primum apparuere bubo inguinum & alopecia, 76
 Quarta ab anno 1540. ad annum 1550. quo temporis intervallo apparuit gonorrhœa venerea, 77
 Quinta ab anno 1550. ad annum 1562. 78

INDEX RERUM.

- novo symptomate auſa, nempe
tinnitu aurium, *ibid.*
Forſam & ſexta circa annum 1676,
quo veſiculæ cryſtallinæ dicuntur
a Muſitano primum apparuiſſe in
genitalibus, 78
Futuræ luiſ venereæ periodi, quas vi-
detur in poſterum habitura, 81.
 & ſeq.
- Secundum Paracelſum, 522
- Perſa* luem veneream a Turcis contagio-
ne accipere, quam ideo vocant *Morbum*.
 Turcicum, 64
- Peſtis* juxta nonnullos producit a vermi-
culis inconſpicuis, mordacibus, & ad-
modum proliſeris, 104. & 623
- Petronius* (Alexander Trajanus) fatetur
luem veneream *minui*, & in dies *mitio-
rem reddi*, 82
- Phimphor* Deſcriptio in viris & in ſæmi-
nis, 289
 Cauſæ, 290
 Symptomata, 292
 Diagnofis, 294
 Prognofis, 295
 Curatio, 295
- Phimphus* & paraphimphus habitualis, 437
 Quomodo curatur? *ibid.*
- Phrifus* [Laurentius] quid de origine luiſ
venereæ opinatus ſit? 47
 Daratat uſum inunctionum, 511
- Pbthiſis* venerea, 336. & 363.
 Plerumque inſanabilis ſi hydrargyro-
 ſi non diſcutiatur, 460
 Quomodo tamen idoneis remediis im-
 pugnanda, 452
- Phymaſum* calloſorum in pudendis deſcri-
ptio in viris, 301
 in ſæminis, 302
 Cauſæ, *ibid.*
 Symptomata, 304
 Diagnofis, 305
 Prognofis, 306
 Curatio, 306
- Phymata* indolentia quomodo reſolvenda,
 ibid.
 Quomodo extirpanda, ſi in cartino-
 ma denegaverint: 308
- Pulule* anti-venereæ Gervafii Uçay, 614
- Rilula* alexiteriæ, ſeu potius purgantes de
 Roiſſou, 471
- Pineda* [Joannes] e Soc. Jeſu, opinatur
morbum Jobi cum hodierna luc venerea
conſenſiſſe? *Pref. ix.*
- Pireal* ſeu *Perital*, ulcerofus tibiæ tumor
apud Malabaros endemicus, 68
- Planetarum* coitio luiſ venereæ cauſa non
fuit, 47
- Plica* morbus capillorum Poloniſ proprius,
Pneumatocèle, 333. & 344
- Poetarum* veterum loca, quæ pro antiqui-
tate luiſ venereæ facere creduntur, ex-
plicata, 9. & ſeq.
- Polychronius* cenſet morbum Jobi fuiſſe ſpe-
ciem Elephantiaſeos, *Pref. x.*
- Porri* genitalium in ſecunda tantum perio-
do luiſ venereæ primum apparere, 76
- Porri* genitalium Vid. *Condylomata*.
 Poſt hydrargyroſim aliquando ſuper-
 ſunt, 438
 Quomodo tunc extirpantur, 438
- Poulain*. Vid. *Bubonem*.
- Precipitatus ruber* deſcribitur a Joanne de
Vigo, 143
 A quo inter phagedænica numera-
 tur, *ibid.*
 Deſcribitur quoque a Nicolao Maſſa,
 ibid.
 A Mathiolo primo omnium in inter-
 num uſum adducitur ad curationem
 luiſ venereæ, 144
- Precipitatus albus*, 146. & 625
- Precipitatus ruber Solaris* & Lunar. 464
 Solaris Gervafii Uçay, 465
- Preparata* mercurialia ad quos caſus va-
leant? 147
 Olim frequenter adhibebantur Mon-
 ſpelii, 573
- Preparatio* ad hydrargyroſim, 393
 Vulgarior, 395
 Operoſior in quibuſdam caſibus, 396
 Omittenda in totum aliquando, 400
 An ſemper omittenda ſit? *ibid.* &
 606.
- Præputii* (Tumoris) deſcriptio, 289
 Cauſæ, 290
 Symptomata, 292
 Diagnofis, 294
 Prognofis, *ibid.*
 Curatio, 295

INDEX RERUM.

<i>Problemata</i> aliquot circa bubones venereos solvuntur,	261	Gonorrhœæ virulentæ siccæ,	214
<i>Problemata</i> aliquot de propagatione contagii venerei.	110	Spuriæ,	218
Curalii difficultius, facilius alii morbum contrahent?	110	Tumoris venerei testium,	221
Cur quidam, quibus diu innocuus est veneris usus cum maxime contaminatis, morbum celeriter aliquando concipiant, si cum aliis levius infectis misceantur?	100	Abcessus venerei in perinæo,	225
Cur nonnulli, qui cum infectis rem diu habuere sine noxa, deinde abque ulla morbi accessione, ab iisdem continentur?	110	Gonorrhœæ habitualis,	221
Cur alii a morbis levioribus venereis in lucem veneream facillime incidunt; alii contra non incidunt ne a gravissimis quidem;	113	Stranguriæ venereæ,	238
Cur in aliis lues mirior tardiorque, in aliis celerior maligniorque sit?	114	Bubonis venerei,	255
Cur vir qui sanus esse videtur sed in quo seminum later, mulierem quacum rem haber, lue aliquando inficiat, aliquando non inficiat?	117	Bubonis venerei fistulosi,	264
Cur ex multis liberis qui ab infectis parentibus suscipiuntur, unus aut alter Rachiride vel Strumis laboret, non vero alii?	ibid.	Skirroidis,	268
<i>Pronosis</i> ulcusculorum venereorum,	283	Carcinomatosis,	272
Tumoris præputii & balani,	294	<i>Propagatio</i> ex traduce lue venereæ propria non est, sed cum aliis morbis communis,	101
Phimoseos,	ibid.	<i>Prophylaxis</i> luis venereæ obtineri potest juxta Theodericum de Hery usu aquæ distillatæ ex Guaiaco,	538
Paraphimoseos,	ibid.	Aut pene post coitum suspectum immisso in disicillam & adhuc calentem columbam,	534
Bullarum crystallinarum,	ibid.	Nulla unquam fatis certa est,	583
Phymatum & tuberculorum callosorum & chordarum skirroidum,	306	<i>Prophylaxis</i> gonorrhœæ a multis diligentissime quæsitæ,	207
Gangrenæ genitalium,	312	A nemine reperta nec reperiunda, <i>ibid.</i>	
Porrorum, vetrucarum, & condylomatum,	321	Proinde caste vivat, qui se sanum esse cupit,	209
Cristarum, mororum, ficorum, mariscarum & rhagadum ani,	338	Videtur tamen posse divulgari, si qua unquam reperietur,	210
Luis venereæ confirmatæ,	382	<i>Pterygium</i> sive Unguis a lue venerea,	354
Que gravior, quæ gravissima sit,	383.	<i>Pisifana</i> sudorifica sive hidrotica,	130. & 146.
Que curatu faciliior aut difficultior,	386	Præparatis mercurialibus saturata, <i>ibid.</i>	
<i>Pronosis</i> gonorrhœæ virulentæ,	188	<i>Pryalismum</i> qua methodo excitandus?	402
Pro diversa sede,	ibid.	Quomodo regendus?	403
Pro natura inflammationis,	189	Deficit aliquando in hydrargyrosi, sed sine damno,	538
Pro natura symptomatum,	ibid.	Noxius est semper juxta Gerardum Goris,	622
		Joxta quosdam ad curationem luis venereæ semper requiritur,	638
		<i>Pullitæ</i> animalculorum minutissimorum luem veneream non producunt,	104
		<i>Pulmonarii</i> , quomodo ad hydrargyrosim præparandi,	397
		<i>Pulsus</i> qualis sit in lue venerea,	514
		<i>Pulsus</i> liquans de Rotrou,	471. & 610
		Ruber Joannis de Vigo,	496. 515. 556. & 588.
		Angelicus Nicolai Massæ,	515
		Joannis Macollonis,	585
		De Algarot,	623
		<i>Pul-</i>	

INDEX RERUM.

Pulvis rubens Joannis de Vigo Vid. *Præcipitatum rubrum*.
Pulvis Angelicus Nicolai Massæ Vid. *Præcipitatum rubrum*.
Pulvis astringens de Verny, 474
Pustule venereæ, 333. & 346
 A Cumano primo omnium observatæ, 481.
Putei ab Hispanis venenati luem veneream Gallis non intulere, 50

Q

Questiones de diversa ratione, qualues venerea concipitur vel non concipitur, concepta ingravescit vel non ingravescit &c. explicatur, 110. & seq
Quercetani aqua menthæ, 473

R

Rabel Empiricus, 472
Radix China Vid. *China radicans*.
Radix Salsa-parilla Vid. *Salsam-parillam*.
Remedia rariora, quæ ad luem veneream faciunt, vel facere creduntur, 464
Rhabarbarum diu suspectum fuit, neque ulli exhibebatur nisi jam deplorato, 538
Rhagadum ani descriptio, 323
 Causæ, 324
 Symptomata, 325
 Diagnofis, 326
 Prognofis, 327
 Curatio, 328
Rhagades venereæ, 333. & 344
 Si superfint post hydrargyrosim quomodo curandæ, 444
Rheu Lithuanicum, 533
Riverii (Lazaræ) arcana, a quo primum edita fuerint, 603
Rondeletius (Guillelmus) utebatur syrupo Sancti Ambrosii ad curandam luem veneream, 132. & 544
 Ubinam mortem obierit? 345
Rostimus (Petrus) Brassavoli tractatum de morbo gallico Italicum fecit, 586
Rotrou, Empiricus cujus remedia aliquot anti-choeradica laudantur, 470

Rudius (Eustachius) quo consilio luem veneream extirpandam esse cenfeat, 83

S

Sal catharticum martiale, 613
Salicetus (Guillelmus) an de lue venerea intelligendus sit? 23. & seq.
Salivatio, quomodo a Mercurio moveatur? 155
 Quare aliquando non moveatur? 157.
 Utrum tutius sit salivationem semper, an nunquam movere? 170.
 & 636.
Salivatio ad luis curationem semper movenda, 432
 Irrita sunt argumenta, quibus in contrarium aliqui pugnant, 430. & 431
Salivationis defectus in hydrargyrosi, 416
 & 528.
 Requiritur a Gerardo Goris ad morbi curationem, 612
Salivatio cietur aliquando usu decocti Guaiaci, 538
 Quot modis cieri possit usu mercurialium, 596
 Nunquam movenda ad curationem luis venereæ, nisi morbus inveteratus fuerit, 622
 Vid. *Pyralismum*.
Salsa-parilla Vid. *Sarcam* vel *Salsam-parillam*.
Saponaria decoctum laudabatur olim ad curationem luis venereæ, 132
Saporta (Joannes) ignarus Geographiæ & Chronologiæ, 572
Saracenicum unguentum, 135
Sarca-parilla in Europam delata eodem circiter tempore quo radix Chinæ, 129
 & 524.
 Guaiaco cedit, sed China virtute superior est, *ibid.* & 265
 Describitur, ac simul explicatur nominis etymologia. 130
 Decoquendi & administrandi modus, *ibid.*
 Ad quos morbos egregie faciat; 580
Sarcocoele, 333. & 343
Sassafras, Devestum in Europam circa

INDEX RERUM.

- annum 1550. 130
 Deoquitur & administratur eodem modo ac Guaiacum, *ibid.*
 Ad quos morbos maxime faciat? 580
Saturatio remedia. An curandæ gonorrhææ conducant? 205
Saxonia (Hercules) an a Maxmiliano II. accersitus fuerit in Germaniam? 568
Scabies venerea, 333. & 344.
Scala affinitatum, secundum quam humores a seminio venereo solent ut plurimum infici, 339
 Quotuplici causa pervertatur? 341
Scorbutus, Endemius apud accolæ maris Balthici, 69
Scorbutus cum lue venerea conjunctus hydrargyrosi non debellatur, 448
 Quibus remediis sanandus vel mitigandus? *ibid.*
Scorbutici, quomodo ad hydrargyrosium præparandi? 397
Scorta diabolaria variis affectionibus morboſis obnoxia erant, eniam antequam lues venerea orbi nostro innotesceret, 42
 Scorti Valentini cum leproſo concubitus priama non fuit causa luis venereæ, 49
 Neque effrenata libido militum Gallo- rum cum Neapolitano scorto rem habentium; cujus in utero abscessus latebat, 50
Scrofala sive stramaz, quæ cum lue venerea conjunctæ sunt, hydrargyrosi non dissipantur, 449
 Sed suis propriisque remediis, *ibid.*
 Unguentum ad strumas, 475
Sedes gonorrhææ in viris, 173. & 611
 In foeminis, 174
 Gonorrhææ spætiæ, 216
 Ulcusculorum venereorum, 278
 Seminij venerei, 556
Seminium venereum Vid. *Virus venereum*.
Serpentum usus utilis ad curationem luis venereæ, 533
Sibilus aurium a lue venerea, 568
Signa luis venereæ alia sunt demonstrativa, alia commemorativa, 366
 Demonstrativa rursus dividuntur in univoca, & æquivoca, 367
 Univoca sunt numero decem, 368
 & seq.
 Æquivoca duplicis generis, altera prima nota, altera nota secunda, 374
 Commemorativa numero novem, 376
Singultus a causa venerea, 337. & 363
Solea ex Mercurio crudo pasta aliqua excepto plantis pedum admotæ salivationem movent, 586
Solutio Mercurij vivi per deliquium, 146
 Cinnabaris vel præcipitati rubri in menstruo acido, 147
 Mercurij in spiritu nitri cum ptisana sudorifica permixta ab agyrtis propinanda exhibetur, 148
Solutio Mercurij per deliquium, 470
Solutio sublimati corrosivi interne syphiliticis exhibita, 603. & 634
Sparta-parilla Vid. *Sarsam-parillam*.
Spasmus venereus, 235. & 360
Spermatocele, 233. & 344
Sphacelus genitalium Vid. *Gangrenam*
Staphylomata venerea, 235. & 357
Status antiqua Lupanaris Avenionensis, 37. & seq.
 Dubitatur de eorumdem auctoritate, 40.
 Quartus Statutorum illorum articulus non debet intelligi de morbis venereis, sed de variis affectibus, qui contrahebantur corpus promiscue vulgando, 42
Stomatata venerea, 336. & 356
Sterilitas a lue venerea, 337. & 366
Stillicidium venereum e balano, 216. & seq.
Stillicidium seminis præternaturale, 331.
 & seq.
Stranguria contumachæ, quæ frequentioris gonorrhææ pedisequa est, Descriptio, 233.
 Causæ, 235
 Symptomata, 236
 Diagnofis, 238
 Prognofis, *ibid.*
 Curatio præſentis ischuriæ, 239
 Habitualis stranguriæ, 243
 1. Uſu cathæreticorum, *ibid.*
 2. Sectione urethræ, *ibid.*
 3. Introductione Turundarum linteærum, 244
 4. Opere

INDEX RERUM.

4. Opera virgularum plumbea-
rum, quæ ornatum optima me-
thodus, 245
Strictura oris post hyrargyrolum, 423
Stupor adhibebantur initio ad curandam
luem veneream difficiliorem, 120
Stupor utilitas ad curationem luis ve-
neræ, 490. 512. & 533
Sublimati corrosivi solutio ore exhibita ab
agyrtis, 147
Sudor an moveri possit sympathice? 614
Sudatoria febris Anglorum jam dudum eva-
nuunt, 14
Suetonii locus explicatur quo antiquitas
luis venereæ probari creditur, 6. & 7
Locus alter a Domino Calmet produ-
ctus explicatur, in addend.
Sulfur auratum antimoniale, 470
Sulfuris oleum seu potius spiritus laudatur
a Matthiolo ad curationem morbi vene-
rei, 516
Surditas a lue venerea, 334. & 559
Sydenhamus (Thomas) falso credidit luem
veneream in Antillas ex Guinea dedu-
ctam fuisse, 67. & 603.
Censet luem veneream *linguere in*
dies & miserioribus phenomenis fa-
ciscere, 73
Fateatur syphiliticos ab Anglia in Gal-
liam migrare, ut curentur, 603
Damnat therapeutiam præparatoriam ad
hydrargyrolum, 603
Symptomata gonorrhææ virulentæ, 180.
& seq.
Gonorrhææ virulentæ siccæ, 212
Tumoris testium venerei, 220
Abscessus venerei in perineo, 224
Gonorrhææ habitualis, 231
Stranguriæ venereæ, 236
Bubonis venerei, 251
Bubonis venerei fistulosi, 263
Skirrodos, 267
Carcinomatodis, 271
Symptomata ulcusculorum cancroforum,
280.
Tumoris balani & præputii, 292
Phimoseos & Paraphimoseos, *ibid.*
Bullarum crystallinarum, *ibid.*
Phymatum & tuberculorum calloso-
rum, atque chordarum skirrhoi-

dum, 304
Symptomata gangrænæ genitalium, 310
Porrorum, verrucarum & condylo-
matum; 320
Crillarum, mororum, ficorum, ma-
risicarum & rhagadum ani, 325
Luis venereæ confirmatæ, 342
Symptomatum luis venereæ quædam jam
prorius evanuerunt, 79
Accessere quædam alia, *ibid.*
Nunc in summa quatuor sunt potissi-
ma, gonorrhæa, bubo, ulcuscula
cancrofa & porri, *ibid.*
Syncope venerea, 337. & 362.
Syphilis Vid. *Luem veneream.*
Syphiliticus initio interdictum fuit ab om-
ni cum cæteris consuetudine, 87. & seq.
Jubebantur alienigenæ in patriam o-
cyus regredi, *ibid.*
Indigenæ domi se continere, vel ad
destinatas domos concedere ubi se-
gregas degerent donec convales-
cent, 88
Haud tamen visum fuit eosdem ad no-
socomia elephantiacorum, quæ præ-
sto erant deduci, ne leprosos nova
& aliena lue inficerent, 94
Syrupus Sancti Ambrosii utilis ad curan-
dam luem veneream, 132. 545. 546
Syrupus Sancti Ambrosii laudatur ad luem
veneream, 132

T

T*Abaci* spiritus laudatur ab Hartmanno
ad vesiculam crystallinam, 589
Qualis effectus inde succedat? *ibid.*
Tacitus. Locus Taciti, quem de lue vene-
rea intelligendum esse putant, explica-
tur, 7. & 8
Tartarus (Valescus de) an quidquam scri-
pserit in Philonio suo de veneris virgæ
ulceribus & pustulis? 24. & seq.
Terre [Joannes Baptista du] testatur se
novisse certissima scientia Hispanos Co-
lumbum sequutos primo itinere luem
veneream contraxisse, in Insulis Antil-
lis, atque inde in Europam traduxisse,
58.

Te-

INDEX RERUM.

- Testium tumoris venerici descriptio*, 119
Causæ, *ibid.*
Symptomata, 120
Diagnosis & Prognosis, 121
Curatio, *ibid.*
- Testium tumores*, qui hydrargyrosi non solvuntur, vix curationem admittunt, & quare? 451
 Quibus remediis curandi, si curati sint? 452
- Tetrarum Rex*. Videtur hoc nomine intelligi Chairaddinus Barbarossa, 129
- Theoremata*, quibus medicina amplificata est observationibus in syphiliticis institutis, *Præf.* xiii. xiv.
- Therapia nulla a Medicis iniussio adhibebatur* lui venereæ, 118
 Deinde adhibita fuit therapia methodica sive rationalis, 119
 Sed quæ propter inefficacem brevi exolevit, 121
- Tertio Therapia mercurialis*, sed qui initio a plerisque damnabatur, *ibid.*
- Therapia Bubonis venerici carcinomatodis curatoria*, 172
Mitigatoria, 273
- Therma satis remere laudantur a Victorio* ad curationem lui venereæ, 536
 Improbantur a Varandæo, 580
- Tbuillier* (Carolus) ingenio & eruditione satis valuit, sed in eo culpandus, quod de utilitate hydrargyroscos detrahat, & arcanum proponat cujus præparationem de industria celat, 609
- Tinctura aurifica*, 470
 Ambra griseæ cum aqua Rabelii, 475
- Tinnius aurium venericus a Fallopio* primum observatus circa annum 1562. 77
- Tinnius aurium a lue venerea*, 360. & 587.
- Tonitanus* (Bernardinus) credidit ætate sua luem veneream ad extremum seculum pervenisse, 82
 Refert a se visos fuisse duos resseve agrotantes lue venerea infectos siue prævio morbo ullo venereo locali, 107
 Sed illius observationes videntur merito suspectæ, *ibid.*
- Tonella* (Gasparis) sententia de origine lui venereæ, 47
 Consilium ad luem veneream extirpandam, 83
- Tremor artuum a lue venerea*, 316. 362. & 450.
Cordis, 326. & 362
- Tubercula callosa in pudendis* Vid. *Phymata callosa*.
 Post hydrargyrosim aliquando supersunt, 454
- Tumor testium* Vid. *Testium tumorem*.
- Tumor balani & præputii* Vid. *Balani & præputii tumorem*.
 Quibus de causis modo balanus citius rumeat quam præputium, modo e contra præputium citius quam balanus, 191
- Tumores kistici venerici*, 335. & 356.
Tumores glandulosi, 335. & 354
- Turca quo nomine appellant luem veneream*, 64
 A quibus acceptam habeant, 63
- Turpesium minerale*, 147
- Tussis venerea*. 335. & 362

U

- U** Cai (Gervalius) Ejusdem præcipitatus Solaris, 465
 Pulvis ejusdem anti-venereus, 610
 Quo anno liber ejus primum editus fuerit, *in addend.*
- Ulcusculorum canerosorum in pudendis descriptio, & differentia*. 276
Causæ, 277
Sedes, *ibid.*
Symptomata, 280
Diagnosis & Prognosis, 283
Curatio, 295. & 297
- Ulcera venerea faucium*, 346
 Palari, 347
 Gingivarum, *ibid.*
 Narium, *ibid.*
 Meatus auditorii, 358
- Ulcera venerea in aure interna*, *ibid.*
- Ulcera*, quæ in ore accidunt salivationis tempore, diligentèr observanda & distinguenda, 404
 Fovenda, si molesta sint; detergenda,

INDEX RERUM.

- da, & exsiccanda, si inutilia fuerint, 405
 Curanda finito pyralismo, 406
 Phagedænica, qualia scorbuticis accidunt tempore pyralismi, 410, & 428.
 Dylepultura post finitum pyralismum, 421.
Ulcera in diversis partibus, plerumque post hydrargyrosim sunt contumacia, & quare? 444.
 Qua ratione, iis tunc medendum sit? 445.
Ulcera venerea genitalium, qua ratione curanda sint juxta Torellam? 493
 Juxta Frisium, 511
 Numquam negligenda, 533
Ulcus uteri venereum, si hydrargyrosi legitima non cedat, plerumque insanabile est, 459.
 Sed cujus tamen curatio modis omnibus, tentanda, *ibid.*
Ulcus Jobi an de lue venerea debeat intelligi? *Præf. viii.*
 Minime vero, sed de Lepra, *ibid.*
Unguenta detergentia & exsiccantia lue venereæ initio adhibeantur sine Mercurio, 120
Unguentum Saracenicum, 135
 Ad strumas, 476
Unguentum mercuriale sive Neapolitanum, ex quibus olim componebatur? 140
 Ex quibus, & qua methodo hodie componatur? 401.
Unguis sive Pterygium a lue venerea, 335. & 336.
Unguium vitia & casus a lue venerea, 333. & 457.
Unguitiva, sic lues venerea appellatur a Rangono, 524
Uteri inflammatio a causa venerea, 335. & 365.
 Ulcus, 335. 365. & 358
 Skirrhus, 335. & 565
- V
- V**ariola magna. Sic apud Gallos lues venerea dicta fuit, 559
 An soboles fuerit variolæ parvæ? *ibid.*
Varubelmont (Joannes Baptista) Vid. *Helmontium*.
Varandæ (Joannes) testator ferocitatem luis venereæ sensum exolescere & minui, 83
Variola crassa Vid. *Luem veneream*.
Variola, Gallice nunc *la petite Verole*, antiquitus dicebantur *Variola simpliciter*, Gallice *la Verole* ante notam luem veneream, 34. & 584.
 Neque usus invaluit ut posthinc dicerentur *parva Variola*, Gallie *la petite Verole*, nisi ut a lue venerea distinguerentur, 45
 Variolæ in Europa alinigenæ sunt, sed tamen videntur perennes futuræ, 81
Variola ab Æthiope quodam in Hispaniam novam sive Mexicanum Regnum devehctæ anno 1519. 583. & *seq.*
Varicocèle 344
Vasabulus (Franciscus) quid de morbo Jobi senserit? *Præf. viii.*
Velfchius (Georgius Hieronymus) narrat luem veneream in Henrico III. deletam fuisse a Petro Pena detecto radicis Bardanæ, 133
Venera pleraque multiplicantur, postquam semel admissa sunt, 111
 Aliquando tamen latent in corpore sine noxa per aliquod tempus, 114
Veneris vulgivaga luem veneream non produxit in Europa, 15
 Venus pandemia multarum affectionum causa fuit in meretricibus, etiam ante notos morbos venereos, 42
 Videtur potissima causa fuisse luis venereæ in insulis Antillis, 71
 Sicut & in cæteris Americæ, Africæ & Asiæ locis, ubi antiquitus latuit, 73
 Cur parem effectum in Europa non produxerit, 73
Veneris usus frequentissimus est modus, quo lues venerea contagione serpsit, 98
Vercellonus (Jacobus) supinam in Historia Medica ignorantium consistetur, 620
Vermiculi. An lues venerea a vermiculis? 104

INDEX RERUM.

104. 608. 624. 635. & in addend.
 An pestis a vermiculis?
 Vid. *Animalcula*.
Verny Empiricus . Pulvis astringens de
Verny, 475
Verruæ genitalium lui venereæ accessere
 in secunda periodo, 75
Verrucarum Descriptio, Causæ, Sym-
 ptomata, Diagnôsis, Prognôsis &
 Curatio, 318. & seq.
Vesalius [Andreas] Hispanum nondum
 mortuum imprudens dissecat, 527
Vesicula crystallinæ Vid. *Bullæ crystallinæ*.
Vertigo venerea, 335. & 360
Vigo (Joannes de Vigo) primus descripsit
 exostoses venereas post annum 1519. 75
Vigne (de la) Medicus Parisiensis . Ejus-
 dem Panacea, 465
Vina veneno intincta falso creduntur luem
 veneream produxisse, 50
Vinache artifex liquandi æris, venditas
 aliquandiu Lutetiz tanquam arcanum
 pantheum, pristinam sudorificam, 131
Viperæ a multis initio laudabantur ad aver-
 rendas morbi venerei reliquias, ut ius-
 cula aut carpo viperarum, 120
Virium languor a causa venerea, 336. &
 363.
Virus venereum quale sit?
 Philogosticum est sive inflammato-
 rium, 101. & 571
 Corrosivum, 102. & 571
 Coagulans, *ibid.*
 Fixum, *ibid.*
 Inde deducuntur conjecturæ quædam
 de natura illius, 103
 Admittitur intra corpus forma ma-
 doris vel halitus, 106
 Partes, per quas admittitur, primas
 afficit, 107
 Accipitur a sanguine vel limpha per
 partem circulantibus, 109
 Estimatur admissi veneni quantitas
 ex parte infecti, ex parte inficien-
 tis, vel ex parte utriusque, 110
 Semel admissum multiplicatur intra
 corpus, 111
 Conditiones ad eam multiplicatio-
 nem requisitæ, 112

Conjecturæ de causa multiplicatio-
 nis, *ibid.*
 Ex quotuplici capite multiplicatio li-
 la æstimanda sit? 113
Virus venereum later aliquando in san-
 guine dat sine noxa, 114
 Non quod recondatur in loculamentis
 aut in glandulis quibusdam, 115
 Sed quod intra sanguinem jugiter re-
 novetur ad eundem gradum, *ibid.*
 Unde sequitur posse aliquando retun-
 di & edomari sine remediis & optima
 tantum sanguinis constitutione,
ibid.
Virus venereum cum sanguine confusum
 humores inde scaturientes inficit, 339
 Quosdam tamen citius faciliusque
 quam alios, 339
 Creditur esse acidum a Franc. de le
 Boe Sylvio, 589
Viruelæ (las) sic vocantur Variolæ ab
 Hispanis, 584
Vitia limphæ & glandularum lymphatica-
 rum, 335
Vitrioli oleum dulcificatum Aqua Rabelii
 dictum, 473
Vomica pulmorum venerea, 362
Vomitio a causa venerea, *ibid.* & 363
Vox Nasalis, 347
Vultus pallor & decoloratio, 109. & 364

W

Worm (den) belgice significat *le Far-
 cin*. An lues venerea ortum duxe-
 rit a congressu cum jumento scabido,
 quod eo morbi genere laboraret? 585

Y

YRaca, condimenti genus apud Indi-
 gas Insulæ Hispaniolæ, 70

INDEX RERUM.

Z

Z *Apata* (Joannes Baptista) laudabat
decoctum Saponariæ, tanquam spe-
cificum ad luem veneream, 132
Zempolani in Hispania nova, a quo va-

riolas acceptas habeant? 583 & 616
Zona torrida. Pleraque Zonæ torridæ loca
luem veneream experiuntur tanquam
endemiã, 64

Conjecturæ de causis quæ luem ve-
neream ibidem produciunt, 72



[illegible]